





27405/c





Digitized by the Internet Archive  
in 2018 with funding from  
Wellcome Library

[https://archive.org/details/b30413758\\_0004](https://archive.org/details/b30413758_0004)







ELEMENTA  
PHYSIOLOGIÆ

CORPORIS HUMANI

AUCTORE

ALBERTO V. HALLER,



PRÆSIDE SOCIETATIS REG. SCIENT. GÖTTING.

SODALI ACADD. REG. SCIENT. PARIS. REG. CHIR. GALL.

IMPER. BEROLIN. SUECIC. BONONIENS. ARCAD. BAVAR.

SOCIET. SCIENT. BRITANN. UPSAL. BOT. FLOR. HELVET.

IN SENATU SUPREMO BERNENSI DUCENTUMVIRO.

TOMUS QUINTUS.

SENSUS EXTERNI INTERNI.



LAUSANNÆ,

Sumptibus FRANCISCI GRASSET.


M D C C L X I I I







## P R Æ F A T I O.



A est mea fortuna, LECTOR BENEVOLE, ut  
 E cum omnibus eruditis cupiam bene, eorumque  
 mæ studeam, utcunque de me senserint; cum præ-  
 terea neminem adgressus sim unquam, solo COSCHWIZIO  
 excepto: & etiam ejus viri inventum juvenis & pene puer,  
 ann. 1725. & 1727. cum debita certe modestia susceperim refutare;  
 ita cum sim animatus, ut tamen acerbos & contumeliosos in me  
 libellos fere quotannis videam prodire de prelo. Et tamen,  
 quem ajunt adversarios inique tractasse, & vivo (1) HAM-  
 BERGERO, & mortuo (2) uti responderim, post similem  
 fere HAENII librum, est in omnium manibus. Ut GUN-  
 ZII merita laudaverim, uti de ALBINO & ante acerrimam  
 censuram, & post eam scripserim, de iis quidem facile est cui-  
 que judicare.

Consilium mihi difficile videtur. Ego quidem ad absolven-  
 dum longissimum opus propero, rusticatione usus, quæ sola  
 certum, etsi nunc quidem ab impositis mihi muneribus (3)  
 multum diminutum, otium promittit. De eo grato mihi &  
 omni lite utiliori labore, nolim decedere ad extricandas con-  
 tumelias, ad solvendo nodos, quibus manifesta experimenta  
 suscipiunt suffocare.

a 2

Ea

(1) In *Opusculis* anno 1754. Lausannæ editis.

(2) In *Mém. sur la respirat.* Laus. ann. 1758. edito, inque *opusculis* nuper  
 recensis, & in *Physiolog. Element.* T. III.

(3) Directorio Rupensi & Gubernatoris Aquilejæ vicibus.



Ea experimenta, ut magis & magis a gnaris viris repetentur, qui chirurgicis casibus volent uti, ea quidem sibi ipsis viam aperient ad incredulorum superanda dubia. Nuper HUNTERI, nuper CAMPERI, nuper CALDANI in hominibus experti, nuper BERDOTI testimonium nostris accessit: nihil non post ista exempla sperandum est.

Sed tu interim jaces, regerunt amici aliqui, qui meo honori videntur magis quam ego quidem studere. Tu audis convicia, & probas silendo; & nutris audaciam hominum, qui nihil, dum metuunt, audent omnia.

Ita quidem rem se habere experior, & tamen priora consilia mecum prævalent. Mihi ipsi malo parcere. Non possem forte, dum ad amarissimas voces, ad injustissimas criminationes respondeo; non possem forte humanis animis innatum dolorem evitare, & aliquam in respondendo acrimoniam. Nunc quidem multo mihi tolerabilius est, adversariorum iras ad posteros transire, quam quidem meas. Omni doctrinæ laude multo mihi majus videtur, bonum virum esse, & etiam adversariis æquum; denique si vitium in ea virtute esse potest, nimis bonum. Gravem esse inimicis, & metuendum male meritis, facilis est persona, neque, ut maledicamus, multum requiritur ingenii, quando ab indignatione adjuvamus.

Quæ tamen in HAENIANO (4) nuper libello possent ad causam ipsam facere, ea quæsiui sollicitus, & amici quæsi-  
verunt. Experimentum vir Cl. protulit nullum, nisi id velis  
quod

(4) *Vindicia* &c. Vienn. 1762. 8.



quod si quid valet, manifestò pro me est, tendinis humani, quam digito ( 5 ) comprehendit absque sensu hominis. Produxit equidem RADNIZKII medicinæ studiosi, & VANDELLI pariter nondum anatomici, neque a cellulosa tela nervos discernentis experimenta, ad quæ duobus antea annis responderam. Eas larvas mortuorum hostium, tamquam viverent, adversus me excitari amici vox fuit.

Cæterum cum frequentissime exprobraverit mihi contradictiones, ut vocat, perpetuas, ad hanc accusationem hic respondebo, quia breviter potest responderi.

Experimenta dum libro cum argumentatione, sæpe inveni, hanc illis contrariam obniti. Ita ad utrasque tunc partes præsto audientiam, quam negare esset hominis veri non cupidi. In exemplo, arteriæ præter truncos maximos per experimenta non videntur aut irritabiles aut contractiles; videntur tamen per alia non contemnenda argumenta contractiles. Ita fatendum est, arterias ad cultellum non videri irritabiles, videri tamen per alias causas.

Venæ in universum non sunt ( 6 ) irritabiles, sed neque carneas tunicas sunt nactæ: Verum vena cava thoracica, & superior, & inferior, & fibras habet, & contrahitur, & est irritabilis. Utrumque doceo, & id vocat Cl. vir me mihi ita contradicere, ut fides experimentis meis nulla haberi possit, neque in alio argumento sibi placet magis.

2 3

Tendi-

( 5 ) p. 102.

( 6 ) p. 104.



Tendines (7) non sunt irritabiles, neque vi insita contrahuntur, neque vi nervosa. Et tamen tendines etiam dudum mortui contrahuntur vi mortua, eademque est valvularum venosarum cordis conditio. Hæc adeo vera, adeo & vulgo nota, putat HAENIUS turpissime sibi contradicere.

Pericranium (8) ex analogia credas insensile esse, ut quod sit de periostii natura; idem in aliis experimentis injurias sentire videtur. Repunt per pericranium profundî nervi, quos non possis non incidere, dum pericranium violas. Itaque experimenta hic non ea sunt, quæ hominem sincerum convincant. Quare de pericranii sensu amplio, ut tamen analogiæ duræ matris plus tribuam. Et hæc adeo simplicia, magno cum convicio clamat vir Cl. esse contrarii sibi ipsi hominis.

De medulla (9) ossium experimentum proprium non habeo, & video difficile esse, sibi que contraria experimenta obstare. Ego amplio, quoad exstet aliquis, qui nervum cum arteria & vena nutritia ad medullam persequatur, tunc utique falsus, sensum habere medullam, quæ nervos habeat. Ea iterum sibi contradicere opinatur adversarius.

Cordis nervos (10) dixi multos, qui ad sensum adeo sufficientiant, sed parvos esse, qui non sufficientiant ad valde acrem sensum. Deinde cultello quidem nervos in lacertulos intimos, a sanguine venoso solo tenero involucri semotos, aut non deduci posse, aut certe non deductos esse fateor. Et tamen  
certum

(7) p. 146.

(8) p. 48.

(9) p. 172.

(10) p. 175. 177. &c.



certum videri, ad eam sedem carniū cordis pene nudarum ire nervulos, cum ad lacertos musculares undique in corpore humano nervi ferantur: hic vero in corde ejusmodi sint lacerti. Verissima hæc omnia, ut possint sibi contraria esse, viderint æqui judices.

Tussim (11) in animalibus non potuisse me irritando producere fassus sum, nisi in agno semel, neque optime. In hominē eadem irritatio, idemque, quem citavi, fumus sulfuris, facile tussim extorquet. Hæc iterum vehementer credit vir Cl. se oppugnare.

Cor quidem in solis frigidis (12) animalibus inaniri, præter verum dicitur. Nam & in pullo, qui ovo continetur, evidentissime inanitur, & in homine sæpe, etsi non semper, inane repertum est. Si non semper inane est cadaveri, causa est in superveniente ultima debilitate, quæ non sufficit, ut cor ultimos cruoris grumos expediat.

Cor (13) breve fieri longumque, etsi se non inanit, ex communi fibræ natura sequitur, quæ alternis ductibus huc tracta, & illuc, oscillat. Vehementer hæc sibi contraria esse HAENIUS, etsi utrumque phænomenon est certo visum.

Hæc inveni, quæ exponi esset satis, neque indigeant mea refutatione. Reliqua omnino ad causam non faciunt, etsi ad famam quidem meam spectant. Sed eam nisi meis vitiis contaminari non posse mihi persuasum est.

Unicum

(11) p. 180.

(12) p. 228.

(13) p. 236. seqq.



Unicum, & ut ipse puto, verum est convitium de *citationibus*. In numero immenso, cum senilis mea manus tremat in ducendis characteribus, cum a prelo in provincia absum, cum aut notarius, aut typographus, alium facile pro vero characterem possit supplere, cum ea omnia, dum folia de prelo emendo, castigare in homine magistratu defungente & severissimis curis distento, supra vires humanas sit, & persuadeor hic vitia subesse, & sponte deprecor. Non tamen credo ullius majoris momenti inesse sphalmata. Quæ enim ad confirmandam quamcunque thesin spectant, ea de præsentis auctoris libro descripsi, aut monui, ubi is liber non fuit ad manus. Et tamen etiam id jure repeto, citatos locos sæpe non ideo a me citari, quod idem mecum Cl. Viri dixerint. Esse, qui alia, tantum ad eam rem facientia, esse, qui contraria dixerint, & certum est & frequens, quoties scriptorum nomina nolui ita producere, ut refutarem, contentus ostendere citando, me eorum argumenta audivisse.

Ita vale, CANDIDE LECTOR, & laboribus nostris fave.

*Rupe Helvetiorum, die 11. April. 1763.*



## ELEMENTORUM PHYSIOLOGIÆ

## TOMUS QUINTUS.

LIB. XII

TACTUS.

SECTIO I.

ORGANUM TACTUS.

§. I. *Tactus in universum.*

**T**ACTUS duplici modo sumitur. Magis amplo sensu idem omnino fere significat, quod sentire, adfieri nempe a corpore aliquo eorum, quæ nostrum contingunt. Eo sensu tactus nervi in universum munus est: nervus enim & solus (a), & omnis (b) ita mutatur a corporibus corpus humanum ambientibus, ut inde in mente nostra mutatio oriatur, per quam ea conscia fit, aliquid in corpore suo mutari.

Calor adeo & frigus; Asperitas & levor; Duritas & mollities; Humiditas & siccitas, pondus dolorem inferens: aut figura: aut acrimonia; anxietatem faciens congestio; irritans acre etiam absque dolore (c): titillans causa pruritus excitans, & si quid aliud corpus nostrum ab aliis corporibus patitur, id omne a nervo percipitur. Experimentum sæpe crudele in denudato nervo cariosi dentis feci, qui has omnes corporum proprietates acerrime percipit. Id genus adeo tactus ubique in corpore humano regnat (d);  
non

(a) Lib. X. p. 270.

(b) p. 271. ad 294.

(c) Exemplum est in naribus coryzam patientibus.

(d) Is est tactus, qui papillis non eget *Claudii PERRAULT du toucher* p. 94. *des sens extérieurs* p. 39. ubi quidem non optime dicitur, tactum esse mentis ad fortiores motus adtentionem, qui solutionem continui faciant. Sensum doloris vocat *DES HAIS* l. c.



non in cute sola, sed intus etiam in corpore, manifesto ventriculi & intestinorum exemplo; magis, ubi plurimi nervi, ut in oculo, lingua, pene extremo: minus, ubi nervi pauci, uti in cutis nonnullis sedibus (*e*), in visceribus (*e\**), in corde (*f*): nullus omnino, ubi nulli nervi, ut in epidermide, pilo, ungue, osse, cartilagine, ligamento, tendine, membrana nervis nuda (*g*).

Deinde major sensus est & exquisitior, ubicunque aut nervus nudior organis ambeuntibus exponitur, ut in cute denudata; aut tenuioribus certe involucris tegitur, ut in glande etiam virili, ventriculo, intestinis.

Hæc, si nervus solus sentit, adeo sunt simplicia, ut nulla egeant demonstratione.

## §. II. *Cutis.*

Alio tamen sensu tactus sumitur (*b*), quando de industria corporis obliti eas facultates volumus explorare, quas modo nominavimus. Tunc enim sola cute utimur, & quidem potissimum digitis manuum extremis, etsi in pedibus, si perinde nudi essent, & molles servarentur, nihilo segnius organum tactus est. Lingua perinde ad eadem omnia valet.

Cutis adeo universi corporis humani involucrum est, quod aeri opponitur. Iterum vero in eo tegumento accuratius cutis nomine venit interiorius ejus tegumenti fundamentum, densum, stipatum, solidumque.

Undique extremitatem corporis diximus tegere. Videtur perforari in oculis, auribus, naribus, ore, umbilico, genitalibus partibus, ano. Satis vero nunc notum est, non rescindi in iis, quæ dixi, locis, sed introrsum (*i*) tractam, paulatimque mutatam, & narium caveam, & oris, & vulvæ & extremi intestini, oblinire, inque meatu auditorio tympani membranæ prætendi, in oculis denique continuam cum cute palpebræ conjunctivam tunicam ante scleroticam descendere. Observatum est in cibario systemate eo obtusorem sensum esse, quo longius a lingua recedit (*i\**).

Fabrica

(*e*) Super condylum internum humeri, SAUVAGES *diff. sur l'action des medec.* p. 14. Mea tamen cutis & eo loco sentit.

(*e\**) L. X. p. 291.

(*f*) L. IV.

(*g*) L. X. p. 289. 290.

(*b*) Contactum vocat Cl. PLOHR *de sapor.* n. 3.

(*i*) Suis locis accuratius dicetur. Conf. MORGAGN. *adv.* II. n. 6.

(*i\**) HARTLEY *of man.* p. 151.



Fabrica ejus in universum est, quæ membranarum (*k*): ex filis nempe laminisque (*k*\*) brevibus, intricatis, arcte cohærentibus stipata (*l*). Densior est exterior facies (*m*), interior, quæ ad cellulosum (*n*), subcutaneum textum respicit, sensim laxatur, ut denique continua degeneratione cutis in eum cellulosum textum resolvatur, neque usquam certi utriusque limites sint. In aqua etiam macerata cutis sensim intumescit, laxatur, inque suas, ex quibus nata est, laminas fibrasque (*o*) discedit, tum in homine, tum in brutis (*o*\*), ut coram in cute elephanti video, tantum ut laminæ latiores sint. Varia autem est densitas & durities. Tenuera in palpebris, genis, labiis, mammis mulierum, præputio; durior in capitis capillato corio. Mira est ad extensionem patiendam in cute aptitudo, dum ea lente fiat, exemplo feminarum gravidarum, obesorum hominum, hydropicorum. De uno digito copia 22. unciarum resecta fuit (*o*\*\*). Scirrhus tres quatuor libræ partes pendens versus os frontis & temporum (*o*†). Lorum uncia quadratæ magnitudine sustinet 200. libras (*o*††).

Qui tendines (*p*) dixerunt in cutis fabricam recipi, sententiam in homine certe non veram (*q*) protulerunt. Nam in linea alba (*r*), & in dorso, collo (*s*), genu (*t*), & cubito (*u*) facillime tendineæ fibræ integræ conservantur, dum muscoli mundantur, atque aliqua semper cellulosa tela a cute vera distant. Palmaris longus (*x*), & in pede similis aponeurosis utique in cutem fila tendinea immittit, nifallor nobis visa, neque

A 2

ibi

(*k*) L. I. p. 19. 20.

(*k*\*) Conf. Mem. de l'Acad. 1751. p. 109.

(*l*) Dav. Christoph. SCHOBINGER de cellulosa tela &c. LUDWIG de humore cutem inundante p. 6. 7.

(*m*) LUDWIG ibid.

(*n*) Ibid.

(*o*) In filamenta dissolvitur RUYSCHE cat. mus. rar. p. 138.

(*o*\*) HOOKE micrograph. p. 39. & 160.

(*o*\*\*) DISDIER splanchnol. T. I. p. 15.

(*o*†) RICHARDI constit. III. p. 117.

(*o*††) SAUVAGES theor. tum. 15.

(*p*) STENONIO imprimis auctore. Maximam inde cutis partem constitui GREW cat. musc. p. 6.

(*q*) Negat nobiscum Cl. LUDWIG l. c. & ALBINUS.

(*r*) Citat Stephanus LORENZINI Crampsisch. p. 14. FANTONUS. BARTHOLIN. spec. anat. p. 28. HEUCHER magna ars anat. n. 64.

(*s*) LORENZINI. FANTON.

(*t*) FANTON. anat. ed. III. p. 7.

(*u*) FANTON. BARTHOLIN. HEUCHER.

(*x*) In manu & pede LORENZINI. In canis olecrano GARENGEOT myol. T. II. p. 122.



ibi tamen admittit ALBINUS (y). An in animalibus aliquæ fibræ tendineæ cutem subeant, non dixerim (z).

Quadrupedibus, qualis fere homini, avibus tenuis cutis est, quas multi plumarum sibi incumbentium imbricati arcus defendant.

### § III. Arteriæ. Venæ.

Cellulosam ad telam has arterias plerasque adnumerat Ill. ALBINUS, quas ad cutem RUYSCHIIUS retulerat. Ita omnino se habere reperi.

Cæterum venæ quidem per cellulosam telam subcutaneam plurimæ & maximæ suis truncis incedunt, Saphenæ (a\*) utriusque, cephalicæ, medianæ, jugularis externæ exemplo. Eæ in alba femina vivente grato cæruleo colore cutem distinguunt. Ramos in cutem dant non valde notos, quia venæ subcutaneæ adprime valvulosæ sint. Arteriæ sub cute nunquam longæ, numerosis & brevibus furculis ex truncis emergunt, qui profundiori loco positi musculis teguntur. Earum ipsarum arteriarum trunculi in cellulosa tela dividuntur: rami primi cutem jam ab ea tela secedentem adeunt, iique numerosi, etsi non magni, id rete constituunt, quod solebat RUYSCHIIUS (b) replere, ut cutis ad inflammationis modum ruberet. Quo magis versus epidermidem, in cutis fibrillas exteriores arteriæ progrediuntur, eo minores fiunt (c), minutissimæ in ea facie, quæ epidermidem contingit, & quæ prima se, hoc velamento remoto, offert, tamen etiam in papillis (c\*) aliquæ. Et ea enim sede cutis grate rubet, & in vivo homine, cui vesicatorium medicamentum epidermidem detraxit, & in cadavere, cujus in arterias cocco tinctum filuri gluten inpuleris. Nascens homo totus saturate rubet (c\*\*), & paulatim

(y) p. 474. 604.

(z) In piscibus STENONIUS *myol. spec.* p. 75. In lacerta IDEM *ibid.* In abdomine torpedinis LORENZINI p. 14. In erinaceo FANTON *anat.* p. 22. In leone PARISINI.

(a) KAAUW n. 82. ALBIN. *adnot.* L. II. c. 9. t. 6. f. 1. In cranio adgnovit bonus senex discrimen, ut arteriæ in cellulosa tela arbuscularum similes sint, in cute reticulatæ *Thef. max.* n. 99. add. 15. 16. 156. *Cur. ren.* n. 52.

(a\*) Conf. Tab. EUSTACH. XXII. XXIV.

(b) *Thef.* VIII. n. 90. *Thef.* IX. n. 2. 35. *Thef.* X. n. 161. *Thef. max.* n. 10. 11. 12. 13. 17. 32. quod memini me a bono senè mihi ostensum fuisse: tum *cur. renov.* n. 38. 46. *Advers.* III. n. 8. p. 26. KAAUW n. 81.

(c) ALBIN. l. c.

(c\*) RUYSCH *cur. renov.* n. 38. KAAUW *perspir.* n. 65. 81.

(c\*\*) ROEDERER *obstetr.* ed. II. p. 38. Per dies 42. SEVERINUS PINÆUS *de virginit.* not. p. 161.



paulatim expallescit. In genis (*d*) & confusum semper ruborem, & in multis hominibus ipsa vascula ramosa rubra cutis oculus distinguit. Animalibus fere alba cutis est, qui cellulosa membranae nativus est color.

Si alibi vasa minorum generum (*e*) pellucidos liquores vehunt, nihil impedit, quin in cute similia vascula sint, & videtur suadere tenuissima, quam dicemus, perspirabilis humoris excretio. In ea vasa per inflammationem sanguis inpingi creditur, ut una confusa rubra macula pro tota cute sit (*f*). Mihi vero is sanguis potius extra vasa effusus videtur. Cur enim inflammata in cute nulla vasa rubra mole aucta adparent, sed similis undique rubor? Venas lymphaticas a digitis manuum pedumque natas recenset NUCKIUS (*f*<sup>\*</sup>); sed eae a cellulosa tela nascuntur (*f*<sup>\*\*</sup>).

§. I V. Nervi (*f*†).

Tota cutis numerosissimos (*f*††) & manifestissimos nervos sibi insertos recipit, ut cutis non minorem multo nervorum portionem, quam musculi (*f*†††), habeat, cum tamen tota cutis hominis experimento facto pondus quatuor librarum cum dimidia non valde superet (*g*). In artubus enim & toti suis locis dicti trunci nervorum (*g*<sup>\*</sup>), & aliorum ramorum innumera- biles propagines in cutem absumuntur: sic in femore (*h*), brachio (*i*), inque collo, & capite, in quo duri nervi (*k*), & trium ramorum quinti sur- culi & occipitalis a secundo cervicalium (*l*), & auricularis a tertio nati fre- quentissimae propagines cutem adeunt, plurimae fere labra nasumque.

A 3

Solent

(*d*) PECHLIN *de nigred. ath.* p. 161. add. SCHWENKE p. 52.

(*e*) WINSLOW III. *tr. des tegum.* n. 17. KAAUW. n. 801.

(*f*) SCHWENKE l. c.

(*f*<sup>\*</sup>) *Nov. invent.* vid. L. II. p. 175.

(*f*<sup>\*\*</sup>) Ibid.

(*f*†) Ex arteria vena & nervo cutis constat ARISTOTELES *de spir.* c. 5.

(*f*††) Etiam Erucae cutem subeunt LYONNET p. 195.

(*f*†††) Etiam VIEUSSENS in *neurolog.* praef.

(*g*) LOESEL *de ren.* p. 67.

(*g*<sup>\*</sup>) L. X. p. 245. & p. 249. 250.

(*h*) p. 245. seqq.

(*i*) Ibid.

(*k*) Cl. MEKEL icon in *Mem. de l'Acad. de Berlin.* T. IX.

(*l*) In icone Cl. ASCHE.



Solent ii nervi longis truncis suis per cellulosa spatia subcutanea ferri (*m*); deinde exiguis ramis (*m*<sup>\*</sup>), quos ægre cultellus sequitur, in cutem subire. Ii rami, cum nulla arte administrationem adjuvare possis, longe deduci nequeunt, & in cute evanescunt. Non (*n*) totam constituunt, quæ cellulosus textus sit, adeo autem numerosi sunt, & adeo exigua inter furculos suos intervalla nuda relinquunt, ut nulla pars cutis non sentiat, sentiatque acriter in omnibus nostris experimentis (*o*). Sed etiam, qui manu sua medicinam faciunt, satis norunt tunc dolere hominem, quando cutis dividitur, reliqua omnia fere absque sensu perfici. Exteriori superficie magis dolere cutem, minus interiori, est nuperum Cl. virorum experimentum (*p*). Qui insensilem (*q*), minusve sensilem (*r*) reppererunt, iis moribundi animalis summa debilitas, aut timor fraudi fuisse potuit.

#### §. V. Musculosa cutis Natura.

Multis in animalibus (*s*) cutis a potentibus musculis gubernatur, ut omnino & concussa insecta abigat, totumque animal mutata figura, retractis artubus (*t*), in globum convolvatur.

Ejusmodi motus fiunt ope musculosi strati, quod sub universo corpore, cutem inter & adipem intercedit, in quadrupedibus fere perpetui (*u*). Id in corpus humanum translatum (*x*), *panniculi carnosi* nomine pro tegumento proprio habitum est.

Irrita-

(*m*) Conf. tabulas EUSTACHII 19. 20. 21. 23.

(*m*<sup>\*</sup>) Hinc EUSTACHIUS multos esse negat in cute nervos, & in cellulosa plures admittit *de multib.* p. 159.

(*n*) GLISSON *de hep.* c. IV.

(*o*) *Réponse génér.* p. 77. TOSETTI L. IV. p. 14. &c. &c.

(*p*) POUTEAU p. 49.

(*q*) Absque sensu fuisse GIRARD.

(*r*) Non majori quam aliæ partes sensu LORRY *Journal de medec.* 1756. m. Nov.

(*s*) FABRIC. *de integum.* p. 44. In elephanto PARISINI. PLIN. L. VIII. c. 10.

(*t*) In echino WEYGAND *Bresl. Supplem.* T. IV. p. 60. MURALT *vadem.* p. 269. COITER p. 127. 128 BLAS *anat. anim.* p. 64. In Tatu s. armadillo PISO *hist. natur Ind.* L. III. p. 101.

(*u*) In phocæna TYSON *anat. turf.* p. 18. vere in cutem fibras emittit. In cane GARENGEOT *myol.* T. II. p. 122. BLAS *miscell.* p. 172. In ratto moschato *Mem. de* 1725. p. 329.

(*x*) Sibi tribuit N. MASSA id inventum *introduc.* p. 3. Habet etiam VESALIUS p. 279. & fusc tuetur & CUNEUS *apolog.* p. 37. JESSENIUS *Prag. anat.* p. 76. J. v. HORNE *microsc.* p. 221. C. BARTHOLINUS *anat.* p. 22. MOLINETTUS L. I. c. ult. WELSCH t. 27. PASCOLI. BOURDON p. 29. LAURENTIUS subiectum facit adipi p. 276. Tum in simia TYSON p. 25. Defendit contra negaturos BLASIUS *miscell.* p. 153. & PETRIOLUS *in apolog. med.* p. 8.



Irritabilem ideo cutem plurimi Cl. viri fecerunt (y), quos citavimus, cum cutis modo stricta sit (z), & modo laxa, cum in frigore & in animi etiam adfectibus rigeat (a); cum extensa se retrahat (b); cum pili ipsi in frigore, & in ira (c) erigantur, maxime in quadrupedibus.

In homine aliqui, non numerosi, muscoli in cutem se immittunt, eique motum aliquem impertiunt, in fronte, naso, labiis, mento, facie, jugulo. Reliqua corporis humani & maxima superficies nihil habet simile. In Darto scroti non musculus cuti subjicitur, sed cellulosa tela adhæret.

Universæ autem cuti in homine, nulla cum exceptione, cellulosa tela subjicitur, plerisque locis adipe plena, nonnullis, iisque raris, macilentis, ut in pene, auricula, palpebris (d). In piscibus abundantissima sub cute pinguitudo (d\*) effunditur.

Ea, olim descripta, cellulosa tela musculos cum cute ita conjungit, ut cum firmitate mobilis sit. Quam primum cutis super glandulam mole auctam detrectat moveri, vitium adesse certum est. Vicissim nimia (e) aliquando mobilitas fecit, ut late cutis de jugulo super nares superduci posset, & a musculis undique revelli (e\*).

Rubentem vidi, ut aliquo cum artificio pro membrana carnosa posset venditari (f). Ipsa natura nullam fecit, quæ ab adiposa membrana differat (g).

In ipsa cute, fibræ musculares nullæ adparent, neque ejusdem naturæ vis est in cute irritabilis, quæ in musculis; etsi riget a frigore & contrahitur; stimulis enim non obedit (h).

## §. VI

(y) L. XI. p. 445.

(z) KUHN *non nulla motus muscul. mom.* p. 13. 14.

(a) VANDENBOS *viv. corp. hum. fol.* p. 34.

(b) LORRY *Journ de medec.* 1756. m. Dec.

(c) TABOR p. 244.

(d) Conf. L. I. p. 27.

(d\*) In tursione, minimo cetorum, tamen unciam crassus.

(e) TULP. L. I. c. 57. add. exemplum BLANCAARD *Jaarregister* Cent. IV. n. 76.

(e\*) MEKERN n. 29.

(f) Vidit etiam in nuper natis RIOLANUS *Antbrop.* L. II. c. 6. Ab initio infantibus carnosum esse POSTHIUS ad COLUMBUM p. 500. Musculo simile ANTHROPOTOM p. 178.

(g) Adgnovit Cl. STEPHANUS L. II. c. 2. qui p. 351. in obesis nullum, in macilentis concrementum sanguinei coloris vidit: tum C. BARTHOLINUS nepos *meth. demonstr. spec. anat.* n. 16. 31. TASSIN *admin.* p. 59. COWPER ad BIDLOUM t. 4. f. ult. MORGAGNI *advers.* II. *anim.* VI. COLLINS p. 74. 75. qui in homine adiposam vocari jubet DIONIS p. 150.

(h) L. XI. p. 454.



§. VI. *Papillæ.*

MALPIGHII inventum est, quantum reperi, qui in brutis animalibus, inque suis imprimis pede primus reperit (*i*), cutem non in æqualem planitiem protendi, sed omnino exteriori sua superficie in tubercula aliqua elevari, quæ sub epidermide emineant.

Cum vero frequenter nimis brutorum animalium diversa a nostra fabrica cum humana confundatur (*k*), opus est cavere, ne ex ea aliquid ad nostram descriptionem se admisceat. Ergo in majori quidem parte cutis humanæ adeo exigua sunt granula, ut omnino præter levem aliquam inæqualitatem nihil a reliqua cute diversum adpareat. Ita in convexa parte pedis nullas papillas ipse reperit RUYSCHIIUS (*l*), alibique profunde in cute latere fatetur (*m*), neque adparere, nisi post injectos liquores coloratos. Porro & idem, & alii Cl. viri microscopio ipso adjuvante easdem papillas ægre conspici scripserunt (*n*), aut omnino negaverunt ullas esse (*o*), aut in iis tactum exerceri (*p*).

Sed hæc nimia sunt. In pollice enim pedis, parteque ejus ad plantam pertinente, dum de macerata cute epidermidem detraxi, manifesto vidi, filorum similes (*q*) papillas, pilorumve, de spiris (*r*) illis elevari: & eodem modo se in vola & planta habent (*r*\*).

Porro in iisdem pedis, manusve digitis, quando unguis molliter, sola adhibita maceratione removetur, cutis subjecta per longitudinem sulcata adparet, & in filamenta finditur, quæ secundum unguem inclinata antrorsum protenduntur (*s*). In minimis tamen digitis imperfectiores, neque

(*i*) *De externo tactus organo* Neap. 1665. p. 8. seqq. Add. DUVERNEY *Journal des Savans* 1689. n. 19 & ex eo du HAMEL *de corp. anim.* L. II. c. 1. In ipsis erucis cutis exterius granula habet LYONNET p. 68.

(*k*) Vide fictitias figuras BIDLOI tab. 4. f. 6. In avibus descripsit MERY apud du HAMEL. p. 315.

(*l*) *Adv.* I. n. 3. p. 10.

(*m*) *Advers.* I. n. 5. p. 15.

(*n*) C. BARTHOLIN. *specim. Anat.* p. 12. In planta pedis RUYSCH thes. I. aff. 3. n. 4.

(*o*) PERRAULT *Essais de physiq.* T. III. p. 53. *du toucher* p. 11. qui etiam in elephanto negat ullas esse p. 92.

(*p*) IDEM *Memoires avant.* 1699. p. 344. CHESELDEN ed. VI. p. 135. SBARAGLI *ocul. & ment. vigil.* p. 85.

(*q*) Cum filis comparat ALBINUS *de color. æth.* p. 7. HINTZE *de nat. papill.* n. 5. Longiores esse PRÆCEPTOR *adnot.* L. I. c. 3. p. 24.

(*r*) In sulcis pingit obtusas RUYSCHIIUS T. 17. f. 2. 3. Epist. XV. Habet WINSLOW n. 11.

(*r*\*) HINTZE l. c.

(*s*) Conicas vocat WINSLOW n. 13. Sed ita omnino, uti describo, vidi; add. LUDWIG in *progr.* Describit & depingit ALBINUS *Adnot.* L. II. p. 57. tab. 7. f. 4.



que subriguntur penitus, neque inclinantur, & pro portione breviores sunt (*t*). In vola & digitorum interna facie pariter fibrosæ reperiuntur (*t*<sup>\*</sup>).

Villorum etiam similes in labiis (*u*), buccis (*x*) & facie (*y*) adparent.

In glande penis mollissima, atque spongiosa cutis pariter fissuris (*z*) distinguitur, quæ floccos antrorsum procumbentes separant (*a*).

Obtusæ potius sunt, & conicæ in mamma muliebri (*a*<sup>\*</sup>).

In plerisque aliis cutis locis minimæ (*b*), arenula minores (*c*) sunt, ut leviter omnino cutem inæqualem faciant. Eadem ad microscopium obtusæ (*d*), & latiusculæ adparent. Ovales nuper in brachio ad microscopium pinxit Cl. *David Cornelius de COURCELLES* (*e*).

### §. VII. *Earum fabrica.*

Minima cum sit, non facile est particulæ ægre conspicuæ elementa explicare. Easdem tamen habere, quæ sunt cutis, probabile videtur, & confirmatur exemplo papillarum linguæ, in quibus hæc omnia ob oculos licet ponere. Primo ergo nervos recipient, quos ad cutis papillam usque Cl. *KAAUWII* (*f*) industria difficili (*g*) labore, persecutus est. Additur

(*t*) ALBIN. l. c. f. 5. 6.

(*t*<sup>\*</sup>) *Physiolog.* Amstelod. p. 412.

(*u*) WINSLOW l. c. n. 12. RUYSCH *Thes.* VIII. t. 2. f. 2. *Thes.* III. t. 4. f. 1. *Thes.* VII. t. 2. f. 5. MALPIGH. *posth.* p. 28.

(*x*) RUYSCH *Thes.* X. t. 1. f. 1. C.

(*y*) IDEM ad BOERH. p. 59.

(*z*) ALBIN. *adnot.* L. III. p. 34. t. 4. f. 1. Potius nimis distincte pingit & ovatas RUYSCH *Epist.* XV. tab. 19. f. 1. Pyramidales in glande gliris MALPIGH. *posth.* p. 28.

(*a*) ALBINUS. HINTZE n. 6.

(*a*<sup>\*</sup>) ALBIN *adnot.* L. III. t. 4. f. 2. p. 57. RUYSCH *thes.* I. t. 4. f. 14. *thes.* VI. n. 8. &c. & ex animale f. 1.

(*b*) Conf. p. 8. & iconem RUYSCHII *Advers.* II. tab. 1. f. 3. in pedis digito.

(*c*) *Thes. max.* n. 14. *Cur. renov.* n. 118. Cum capitulis aciculorum comparat HARDEE *apiar.* p. 30. 137. 138. & in ipso elephanto non majores fecit A. MOULINS p. 9. Minutissimæ sunt etiam in ea bellua *Musc.* PETROP. T. I. p. 14.

(*d*) Obtusas ad microscopium RUYSCH. *Epist.* I. t. 1. f. 4. conicas f. 5. *Aplaties* WINSLOW n. 10. Clavatæ in elephanto PARISINI. Pyramidales MOULINS. Rotundæ *Physiol.* Amst. ed. p. 412.

(*e*) *Musc. cap.* t. 1. f. 2. 3.

(*f*) *Acu & microscopio usus* n. 63. Iconem dedit VATER *de consensu* t. 2. 3. p. 26. Habet etiam MALPIGHIUS p. 29. ex conjectura: & GORTER *chirurg.* p. 260.

(*g*) Negat eo duci posse ESCHENBACH *anat.* p. 311.



tur autem non unicum filum, sed plura (*b*) in unam papillam convenire. Cum penicillo radiato comparavit vir Cel. (*i*), & in penicilli modo in fila secedere alius monuit (*k*).

Creduntur eo loco nudi nervi esse, & involucra deponere (*l*) cum & tenerrima grana sint, quando epidermis a medicamento vesicas excitante remota est, ut cum gelatina comparatae fuerint (*m*); & cum praeterea analogia id suadere videatur.

Porro etiam vascula rubra per basin (*n*) accipiunt, quae injecto tinctoque liquore repleri possunt, perque papillam ramosa dividuntur. Addunt, iis repletis papillas turgere (*n*<sup>\*</sup>), & demum in apice papillae convenire, ut in unum trunculum abeant, qui foramini epidermidis respondeat (*n*<sup>\*\*</sup>), & alii ALBINI discipuli, trunculum papillae in ambitum radios arteriosos edere, osculis patulis & apertis (*n*<sup>†</sup>). Ex cutis arteriolis nascuntur (*o*).

Quare neque simplex monticulus est, quae papilla dicitur, sed colliculorum acervus, in quos etiam dissolvitur (*p*) macerata. Ea enim vascula, iique nervuli, cellulosa procul dubio tela colliguntur, a qua firmitatem habeant (*q*), & ita colliculi nascuntur.

In apice papillas perforari, pilumque dimittere dictum (*r*) est, neque de nonnullis negaverim. Non tamen videtur pilus verus papillae hospes esse. In pulpa tactili digitorum manus pedisque, in glande virili, in lingua, nullus pilus producitur, pilusque, uti alias rectius dicetur, ex cellulosa tela nascitur, quae cuti subjicitur.

Quin tactu defungantur, vix dubitari potest, cum ibi sint majores, & nudiores, ubi tactus potissimum exercetur, in penis glande, apice digitorum

(*b*) Plurimos nervos vocat RUYSCH *Thes. max.* n. 193. tum DUVERNEY apud BLEIGNY *Zodiac. Gall. ann.* III. p. 4.

(*i*) WINSLOW n. 8.

(*k*) RUYSCH *thes.* I. *tab.* 4. f. 8. 9. *thes.* V. n. 80.

(*l*) KAAUW n. 64.

(*m*) BOERHAAVE *Praelecl.* T. III. p. 524. Negat tamen in gluten abire GORTER l. c.

(*n*) Numerosa RUYSCH *cur. renov.* n. 38 KAAUW n. 65. COURCELLES p. 4. SCHAAF *de tactu* p. 31. SACRELAIRE *de tegum.* p. 8. Unum aut duo HINTZE n. 13.

(*n*<sup>\*</sup>) HINTZE n. 2.

(*n*<sup>\*\*</sup>) ID. n. 17.

(*n*<sup>†</sup>) *Physiol. belg.* p. 413.

(*o*) KAAUW n. 80.

(*p*) SCHAAF *de tactu* p. 31. Ex 5. 6. minoribus HINTZE n. 16. In elephanto *Phil. transf.* n. 326. DUVERNEY *Journal des sav.* 1689. n. 19.

(*q*) GORTER l. c. Nervis majores esse, & aliud quid recipere recte SIMSON *Essays* p. 243.

(*r*) Cl. de COURCELLES l. cit. In elephanto *Philos. transf.* n. 326.



gitorum manuum pedumque, lingua; cum minores sint, ubicunque natura minorem in eo sensu subtilitatem requisivit; cum nervos accipiant immisos; cum objectis externis tanto magis exponantur, quanto fortius erecta & eminens particula, in filamentum producta, a resistente corpore percellitur, quam plana, aut depressa superficies. Addi possit ex vibrationum hypothese, sed id subtilius est; in unica papilla sectiones semper minores se sequi, & adeo nerveam naturam ad oscillationes majores minoresque aptam reddi ( $r^*$ ).

Vascula papillarum tenuem vaporem exhalare ( $s$ ) non est ab analogia alienum, cum cutis sint particulae, quae tota est perspirabilis.

§. VIII. *Epidermis.*

Ea est aeris aut siccitas, aut etiam acrimonia, ut nuda cutis ejus tantum tolerare nequeat. Siccatur enim exposita aeri, & in duram corii speciem abit. Idem elementum etiam in cadavere nervos in durissimos, pellucidos, succineos & fragiles funiculos mutat, & eadem fere tendinum est degeneratio. Ipsa ossa aeri exposita celeriter emoriuntur, ut nudata squama de vivo osse decedat, & depellatur. Neque novi ullam partem corporis humani, quae impune aeri possit exponi, praeter dentium partem vitreo cortice oblitam, & cuticulam.

Peculiariter nempe *cuticula* dicitur, aut *επιδερμς* involucrum omnino singularis indolis, siccum, ab aere immutabile, in aqua difficulter colliquescent ( $t$ ), neque in cellulosam telam intumescens, æquabile ubique & ejusdem naturae, insensile ( $t^*$ ), quo universa cutis obducitur, tum quae conjunctiva oculi dicitur, tum labiorum succulenta & spongiosa fabrica ( $u$ ), & penis glans, aut clitoridis, & gingivæ ( $u^*$ ).

Sed eadem cuticula manifesto, vel cultello ipso teste, continuatur & subit in anum ( $x$ ), vulvamque, & urethram ( $y$ ), & os, & nares ( $z$ ),

B 2

&

( $r^*$ ) Apud BONNETTUM nunc eam conjecturam reperi *analys.* p. 53.

( $s$ ) KAAUW n. 80.

( $t$ ) SANTORINUS L. I. c. 1. MEKEL *Mem. de l'Acad. de Berl.* T. 13. p. 65. tom. 9. p. 89. Ita saepe vidi, demum tamen in mucum dissolvitur MEKEL *Mem.* T. 13. p. 62.

( $t^*$ ) RUYSCH *thes.* VI. n. 115.

( $u$ ) Epithelium vocat RUYSCH *thes.* III. n. 23. & *thes.* VI. n. 115.

( $u^*$ ) *Cur post* n. 120.

( $x$ ) KAAUW n. 16.

( $y$ ) In hymene KAAUW n. 16. & n. 13. Sed ego in uterum usque continuam deduxi.

( $z$ ) KAAUW n. 16.



& aures, & ubique ( *a* ) totas eas longas cavitates replet, interiorque obtinet, ad quas ea foramina ducunt. Estque tunc villosa membrana intestini, ventriculi ( *b* ), oesophagi ( *c* ), palati ( *d* ); est membranæ tympani exterior quasi vagina ( *d*\* ), est lamina membranæ pituitariæ extrema; est asperæ arteriæ denique & bronchiorum tunica, quæ aerem contingit ( *e* ).

Nullum, puto, animal ( *f* ), nullum plantæ folium, neque caulis, est absque simili epidermide. Absque cuticula natos pueros ( *g* ) lego, meram puto fabulam. Nam in fetu tenerrimo adest primigenia ( *h* ).

Nulla in Epidermide partium adparet distinctio ( *i* ), nisi quod fulcis ( *k* ) variis percurritur, qui in dorso manus polygoni, multis cum lineis diagonalibus; in vola paralleli & longe recti, in extremis digitis singulari & artificioso modo spirales sunt ( *l* ).

In iis fulcis inter lineas parallelas quædam puncta sunt, utcunque foraminum similia, in quibus epidermis reticulo & cuti adhæret ( *m* ), quæ tamen post accuratiorem inquisitionem non visa sunt per cutem penetrare ( *n* ). Ea vero utique penetrant, per quæ pili exeunt. Creditur earum foveolarum causa esse, quod epidermis cute laxior, & amplior necessario in rugas contrahatur ( *n*\* ).

Cum reliqua cute Epidermis satis accurate cohæret, filis exiguis, quibus interior superficies quasi hirsuta adparet ( *o* ), ut tamen a vi ignis, aut ab ebullientis etiam aquæ potestate ( *o*\* ), decedat, tum ab acrium quo-

- ( *a* ) KAAUW n. 13. 15.  
 ( *b* ) RUYSCH *advers* III. p. 34. PRICE in vol. 35. *Phil. trans.* MONROO *Edimb.* III. p. 118. KAAUW n. 109.  
 ( *c* ) MONROO *ibid.*  
 ( *d* ) KAAUW n. 105. LEEUWENHOECK *Phil. trans.* n. 326.  
 ( *d*\* ) Manifesta cum suis fulcis KAAUW n. 16.  
 ( *e* ) L. VIII. p. 148.  
 ( *f* ) In cruce LYONNET *Chenille* p. 68.  
 ( *g* ) BLANCAARD *Jaarregister* l. c. 2. n. 17. quem oleo sanatum fuisse addit.  
 ( *h* ) Vide DIONIS. p. 150. ALBIN. *Adnot.* L. I. c. 5. p. 27.  
 ( *i* ) CHESELDEN p. 134.  
 ( *k* ) LEEUWENH. *Exp. & contempl.* p. 50. ALBIN. L. I. Tab. I. f. 1. Etiam in Elephant. *Mus. petr.* l. c.  
 ( *l* ) BIDLOO *tab* 5. f. 4. RUYSCH *Ep.* 14. *tab.* 17. f. 3. GREW *philos. trans.* n. 199.  
 ( *m* ) ALBIN. p. 25. 26.  
 ( *n* ) LEEUWENH. *Anat. & contempl.* p. 101. 197. ALBIN. *adnot.* L. I. c. 4.  
 ( *n*\* ) *Physiol. Anst.* edita p. 417.  
 ( *o* ) Continuo iterum eximendi. DAUBENTON III. p. 169.  
 ( *o*\* ) KAAUW n. 90. 92.



quorundam medicamentorum cuti inpositorum erodente vi, & denique a morbis. Frequenter enim post febrem (*p*), variolas (*q*), purpuram (*r*), morbos graves alios (*s*); postve podagram decedit, etiam latis portionibus (*t*).

Relinquit cutem plerumque furfurum modo, parvis squamis (*u*), variæ figuræ, unde forte factum est, ut Cl. in microscopicis experimentis auctor totam epidermidem pro squamarum tegmine (*x*) habuerit, cum aliqua piscium similitudine. Addebat, esse pentagonias squamas (*y*), aut subrotundas (*z*) vigesies quinquies latiores, quam crassæ sunt (*a*), & triplici sibi serie imponi (*b*).

Etsi autem per morbos subinde ejusmodi squamosa in epidermide fabrica subnata est (*c*), recentiore tamen studio adparuit, simplicem, planamque, quasi pergamenæ chartæ, absque squamis epidermidis naturam esse (*d*). Accurata opera anatomici fit, ut totæ continuæ chirothecæ (*e*), aut ocreæ de cute decedant: eæ solent, quam prius fuerant, esse ampliores (*f*). Longa maceratione, & in fetu puerove experimentum facile succedere reperi.

B 3

§. IX.

(*p*) SALMUTH L. I. n. 58. CONF. MARCELL. DONAT. p. 32. *Comm. Nor.* 1737. hebd. 19. BOCCONE *off.* p. 382. BINNINGER *Cent.* IV. n. 2. A CASTRO apud SACHS *gammarol.* p. 466

(*q*) HAASE *de renov. tun. vill.* n. 51.

(*r*) *Bresl. Saml.* 1726. p. 307. *Comm. Nor.* 1741. hebd. 36. *Hist. de l'Acad.* 1715. p. 14.

(*s*) Ex delphini esu intra 24. horas epidermis decessit BOCCONE p. 388. exque urli in cibum recepto carnibus *Voy. au Nord.* T. III. p. 154. Ex Colocynthidis usu SALMUTH L. III. n. 2.

(*t*) BOCCONE. BINNINGER. a CASTRO

(*u*) LEEUWENHOECK *exp. & cont.* p. 51. BOERHAAVE *Prælect.* T. III. p. 717.

(*x*) Anno 1674. *experim. & cont.* p. 46. seq. WINSLOW n. 33. adde *Phil. trans.* n. 106. Recipit eam fabricam G. COWPER ad *tab.* 4. BIDLOI.

(*y*) p. 46. f. I. K. M.

(*z*) *Arcan. & contempl.* p. 206. in ore.

(*a*) p. 47.

(*b*) Ibid.

(*c*) PANAROLUS *Jatrolog. Pentec.* V. n. 9. MARTINEZ *de monstr.* p. 3. VATER *phil. trans.* n. 440. HOFMANN *disquis.* p. 138. C. STALPART *Cent.* II. obs. 35. In lepra in squamas solvitur DAMPIER *travels* T. I. p. 334. & in morbo paragayensium BUFFON *Hist. natur.* T. III. p. 507.

(*d*) CAMEERAR. *spec. med. elect. diff.* VII. v. UFFENBACH *in itin. descr.* T. III. p. 357.

(*e*) SCHULHAMMER *physiolog.* p. CCCXXXVIII. ROYSECH *Thes.* III. aff. I. n. 13. *tab.* 3. f. 2. aff. 3. n. 56. GARENGEOT *splanchnologie* p. 75.

(*f*) KAAUW n. 41. RIED *de tactu* p. 9.



§. I X. *Vasa. Nervi.*

Qui omnia ex nervis in corpore generari ajunt, excipiunt tamen epidermidem, cum sensum nullum in ea percipiamus, & ea ablata cutis acerrime sentiat.

Sed neque vasa sunt in epidermide, certe, quæ liquore aliquo huc usque ab ullo anatomicorum repleta fuerint. Admissa sunt (g) a nonnullis, partim ex conjectura (h), partim per experimentum. Ipse vidi, & microscopio sum contemplatus, helvetii chirurgi St. ANDRE squamulas epidermidis, in quarum facie interiori vascula decurrebant, argento vivo plena. Potuit vero factum esse, ut cum ejusmodi epidermidis taleola aliqua una cutis particula auferretur, & interior adhæreret. Credulum fuisse hominem ridicula illa feminæ cuniculos parientis fabula demonstravit, quam & ipse pro vera accepit, & aliis conatus est persuadere. Qui plurimum in replendis vasis se exercuerunt (i), negarunt unquam, vasculum coloratum se in epidermide vidisse, neque unquam vidi, cum tamen de vasculis minimis cutis liquor tinctus manifesto exsudaret.

De vasculis perspirantibus & sudoriferis nondum agimus.

Multum est disputatum, si nulla epidermidis vascula sunt, qui demum & primum epidermis generata fuerit, & ablata restituatur, & in cute & in palato, lingua, systemate toto cibario, ubicumque denique suam sedem habet, etiam latissime patentes cuticulæ jacturæ refarciantur (k). Vescicæ enim urinariæ membrana interna, & intestini ulcerosi, & oris totius & asperæ arteriæ epidermis reparatur. Etiam in animalibus & decedit tota, & vicissim quotannis reparatur. In serpentibus (l) hæ notissimæ exuviae sunt, quæ etiam partem epidermidis corneæ oculi membranæ protensam continent,

(g) PASCOLUS apud FANTON. p. 22. BLAIR *Botan. eff.* p. 373. MIEG *Spec. anat. botan.* n. 25. GARENGEOT *Splanchnol.* p. 46. De SWAMMERDAMIO ADOLPHI *de frictione oper.* p. 436.

(h) DRAKE L. I. c. I. PARISINI in elephanto.

(i) RUYSCH *Thef.* III. aff. I. n. 19. Adv. III. n. 8.

(k) Infanti in partu tota cuticula decessit, & nova cum renata esset, fetus vitalis superfuit STOCK *de partu* p. 55.

(l) SEVERIN. *viper. pyth.* p. 231. 247. VESLING. *epist.* p. 72. PERRAULT *Mecan. des anim.* FABRIC. l. c. *de tegum. anim.* p. 9. 10. Etiam salamandræ cutem mutant du FAY *Mem. de l'Acad.* 1725. p. 142.



tinent, tum in erucis (*m*), araneis, aliisque insectis, quorum non semel, sed sæpius, exuviæ renovantur.

Fuerunt, qui etiam hanc membranam a papillarum nervearum efflorescentia (*n*) deduxerunt.

Alii, cum vasa in epidermide exhalantia detexissent, ex iis ipsis vasculis (*o*) adunatis, & ab aeris contactu leniter callofis, cuticulam composuerunt (*p*). Potest in eum sensum adduci pueri exemplum (*q*), in quo tota corporis superficies abiit in congeriem tubulorum exstantium, calloforum, subinde renascentium, quæ adnotatio ad microscopii modum theoriam LEEUWENHOECKIANAM confirmare videbatur; tum simillima fabrica cuticulæ in Manati, & Balæna (*q*\*), belluis marinis.

Antiqua tamen sententia est, ex humore (*r*) generari, quam vel plantarum exemplum confirmat, in quibus absque nervis epidermis est. Ut tamen rectius argumenta utriusque sententiæ percipiantur, aliqua oportet præmittere.

### §. X. *Lamina epidermidis.*

Cuticulæ non eadem undique est crassities. In vola manus, planta pedis, tum ad calcem, & in digitorum pedis articulis, ipso jam in fetu (*s*) crassior est cuticula (*t*).

In dorso manus, cute capillata, glande penis eadem tenerrima est (*u*).

### Laminas

(*m*) ERUCÆ LYONNET *Theol. des insect.* T. II. p. 16. FABRIC. p. 14. Etiam acari BAKER *micr. made easy* n. 23. scarabæi SWAMMERDAM p. 309. Locustæ ZINANNI *cavallette* p. 49. In nymphea asili in muscam abeunte pariter de toto oculo pellicula abscedit SWAMMERDAM p. 686.

(*n*) RUYSCH *Tbes.* II. aff. 4. n. 6. *Tbes.* III. n. 13. *Tbes.* VI. n. 115. *Tbes.* IX. n. 37.

(*o*) Apud FABRICIUM hæc opinio reperitur p. 2.

(*p*) LEEUWENHOECK *anat. & cont.* p. 206. *Epist. physiol.* XLIII. BOERHAAVE *prælect.* T. III. p. 557.

(*q*) MACHIN. *philos. trans.* n. 424.

(*q*\*) *Comm. Acad. Petrop. Nor.* T. II. p. 296. 297.

(*r*) Ex vapore humido ARISTOTELES. FABRICIUS p. 4. ex particulis fluidis siccatis CHEYNE *philos. princ.* p. 322. ex liquido coacto REVENHORST *de ling.* n. 53.

(*s*) ALBIN. KAAUW.

(*t*) GREW *mus.* p. 4. 31. certe ante III. ALBINUM Adnot. L. I. c. 5. L. V. p. 16. KAAUW n. 33. WINSLOW n. 38.

(*u*) RUYSCH *Cur. renov.* n. 117.



Laminas hujus membranæ multi veterum jam duas ( $x$ ) fecerunt, exteriorem teneram, alteram firmam & fibrosam.

In iis partibus corporis humani, quæ tritu & usu occallescent, non duæ, sed numerosæ denique laminæ epidermidis numerantur, quas tanquam libri paginas, bulbive alicujus tunicas, deinceps avellas, in pedis potissimum planta, quæ interior eminet, & corporis pondus potissimum fulcit ( $y$ ).

Quando enim a frictu, aut a calore fervidæ, aut ab acri veneni chemici tactu ( $z$ ), cuticula destruitur, renascitur primo simillima priori, perinde rugosa, & tenerior. Continuata vero causa frictionis, calorisve, ad priorem laminam callosam novæ perpetim accedunt ( $a$ ) aliæ, quæ demum in crassum corneumque ( $b$ ) tuber abeunt, & cum sint indolentes, nervos cutaneos subjectos adeo potenter a corporum nos ambeuntium actione tuentur, ut & prunas ( $c$ ) ardentes & ferramenta candentia ( $d$ ) in manu circumgerere, & fuso plumbo ( $e$ ), aut ferro ( $f$ ), aut cupro ( $g$ ) demum manus lavare discant, nihil a tanto fluidi metalli æstu passi. De ferrariis fabris leodiensibus narrabat BOERHAAVIUS ( $g^*$ ), suntque & alii testes ( $h$ ), & in vitri officina montium Basiliensium ipse olim similia vidi. A sola calida arena Ægyptiis soleæ non minus duræ ( $i$ ), quam bobus, ut possis absque dolore ferro calceare; & super ignitas prunas in flammis

( $x$ ) FABRICIUS p. 2. MUNNIKS *de re anat.* p. 3. BERGER *natur. hum.* p. 185. FANTON. p. 20 21. Multa strata esse COWPERUS, ad. T. 4. BIDL. f. 1. & squamas crassiores iterum in 3. 4. alias dividi. Duas esse etiam laminas, ubi tenuissima est RUYSCH *thes.* III. ass. l. n. 13. nempe in dorso manus; conf. *Mus. petrop.* I. princ. In labiis COWPER l. c.

( $y$ ) COWPER l. c.

( $z$ ) Spiritu vitrioli vel sulfuris DESLANDES, ut ignem possent devorare *Brem. Magazin.* T. I. p. 665.

( $a$ ) WINSLOW n. 37. MEKEL *Mem. de Berl.* T. XIII. p. 65.

( $b$ ) Id. callus est PECHLIN *nigred. ath.* p. 77. Callus juglandi æqualis in hippiatri manu natus BARTHOLIN. *Cent.* V. hist. 85.

( $c$ ) Nigrita SERVIUS *de ung. armar.* p. 30. 31. SACHS *Gammarolog.* p. 467. Virgo BARTHOL. *Cent.* IV. h. 82. PECHLIN obs. L. II. n. 43. Turca SEVERIN *pyro techn.* L. I. P. I. III. c. 1. hic in pede. Add. DESLANDES *Mem. de phys.* T. II. p. 31.

( $d$ ) PECHLIN. obs. 9. L. III. *Mem. avant.* 1699. T. X. p. 588.

( $e$ ) *Mem. avant* 1699. T. X. p. 590. BARTHOL. C. VI. n. 51. COSTÆUS *de ign. med. præf.* p. 85. ait Hibisci radicis, portulacæ & mercurialis succo manus ad id metallum ferendum idoneas reddi. Solo oleo olivarum HEUCHER *ignis non urens* p. 1115. oper.

( $f$ ) *Prælect.* T. IV. p. 12. BUSBEQ oper. p. 330. 331.

( $g$ ) BINNINGER L. I. obs. 8.

( $g^*$ ) T. III. p. 700.

( $h$ ) WEPFER *cicut. aquat.* p. 86. KAAUW n. 101. la CHARRIERE p. 429. *Mem. avant.* 1699. T. X. p. 589

( $i$ ) RADZIVIL *iter.* p. 144.



menfium ( *k* ) regno tuto ingrediantur, in Malabaria demum per tota 20. minuta horæ ( *l* ). Olim hirpini, in non adeo fervida regione, prunas ignitas impune calcabant ( *m* ).

§. XI. *Laminae veriores.*

Hæc omnia vel ad morbos pertinent, vel omnino comparantur cum aliis artificiis, in quibus omne genus membranarum tandem in laminas solvitur, quas non ideo oportet accipere, tanquam naturæ essent filiae. Veras laminas & habitus aliquo discrimine separari necesse est, & cellulosa tela interjecta, & demum fabricæ diverfitate.

Verum aliud secundæ laminæ genus in epidermide recentior industria invenit, cum præsertim a discrimine colorum in æthiopum cute indaganda adjuvaretur.

In nigritis adeo, africæ occidentalis incolis, cuticula per cantharidum vim de cute separata, separari potest in duas laminas, quarum utraque Europææ epidermidis integram crassitiem æquat: maculosas cæterum, per vincula fibrosa conjunctas ( *n* ).

Tum demum vero sub utraque lamina, quam diximus, ex fusco nigrum ( *o* ) involucrum reperitur, facile ab epidermide separabile, ad quod tamen fibras illas mittit, quas diximus, cuti firmiter adnexum, crassius quam in Europæis ( *p* ), & veræ membranæ simile, cum istis potius mucus sit coactus ( *p*<sup>\*</sup> ).

Ita ex Cl. viro malui exscribere, qui in Jamaica insula multa occasione incidendorum æthiopum usus est. Alii enim celeberrimi anatomici, duas  
in

( *k* ) *Algem. Saml. der Reisen* T. X. p. 257.

( *l* ) *Missions - Berichte* Cont. VI. p. 1448.

( *m* ) *PLINIUS* L. VII. p. 372.

( *n* ) *MITCHELL. Phil. transf.* n. 474. p. 110. Etiam Cl. *LIEUTAUD* a corpore reticulari corpus mucosum æthiopum distinguit p. 116.

( *o* ) *MALPIGHII* p. 21. *PECHLIN de color. æthiop.* p. 71. *CURTIUS raro morb.* p. XXII. *SANTORIN.* p. 2. *ALBIN. in ic. cut. æthiop.* *KAAUW* n. 36. *LITRE. RUYSCH adv.* III. n. 8. *Cur. renov.* n. 6. 59. 87. *TREW Comm. Nor.* 1731. n. 13. *MEKEL. Mem. de Berlin* Tom. 9. p. 88. *Mus. petr.* I. p. 7. *BAECK Swenk acad. Handl.* 1748. p. 12. *LIEUTAUD.* Est puto cutis media fusca olivæ candidæ colore A. *JOSELYN voyag.* p. 187.

( *p* ) p. 112.

( *p*<sup>\*</sup> ) p. 311.



in æthiope laminas cuticulæ non faciunt (*q*); id vero, quod dicitur *reticulum*, pro interiori lamina Epidermidis habent (*r*). Mihi opportunitas ad inquirendum defuit.

Deinde in æthiopibus manifestius constitit, non esse huic reticulo eam fabricam, quæ est in avium pedibus (*s*), inque lingua papillata animalium: in quibus reticulum per manifesta sua foramina (*t*) papillas prælongas, in vaginulas epidermidis ituras transmittit (*u*). Homini enim (*x*), & elephanto (*y*) integra, & continua membrana est, quæ absque foraminibus, papillis incumbit, & ab ipsis foveolas impressas patitur, minus fuscas, ut tenuiores (*z*). Sub unguibus uti longæ papillæ sunt, ita & ipsum id velamentum longis sulcis exsculpitur (*a*).

Uti etiam in æthiopibus non idem in toto corpore reticuli color est (*b*), ita minus omnino in Europæo homine. Huic enim, qua alba cutis est, & ipsum reticulum alias album est (*c*), alias fuscum (*d*) ab epidermide minus, quam a cute separabile (*e*).

Album infanti, per ætatem flavescit, ut ex ejus coloribus temperamentorum notas Cl. viri sumserint (*f*).

Subluteum (*g*), denique aliquando pene nigrum est, adeo enim nigrum (*h*) in feminae pube ipse vidi, ut ab æthiope non plurimum videretur differre.

In

(*q*) ALBIN *de colore æthiop.* p. 5.

(*r*) L. I. c. 3. p. 2. MEKEL tom. 9. p. 94. Non separat A. BLACK p. 9. 10. nec GARENGEOT p. 49.

(*s*) Conf. in struthiocamelo PARISINOS, & MERY apud du HAMEL p. 315.

(*t*) MALPIGH. p. 25. DUVERNEY l. c. LITRE l. c. RUYSCH *Epist.* I. f. 4. 5. 6. 7. *Thes.* I. Tab. 4. f. 8. WINSLOW n. 14. In bove descriperant PARISINI.

(*u*) ALBIN *adnot.* l. p. 23.

(*x*) ALBIN *de cut. æthiop.* p. 7. *adnot.* p. 24. KAAUW n. 44. GARENGEOT p. 59. SACRELAIRE n. 9.

(*y*) *Mus. Petrop.* T. I. p. 14. PARISINI.

(*z*) ALBIN *Adnot.* L. II. p. 58. t. 4. f. 6.

(*a*) *adnot.* L. II. p. 57. tab. 7. f. 4.

(*b*) ALBIN p. 8. RUYSCH variis locis TREW l. c.

(*c*) ALBIN L. I. p. 8. Inde fit, ut nolit in omnibus corporis partibus admittere LIAU-  
TAUD *Essai* p. 116.

(*d*) ALBIN p. 8. 9.

(*e*) WINSLOW n. 40. PECHLIN p. 71. GARENGEOT p. 48.

(*f*) RUSSEL *Oecon. nat.* p. 136. 156.

(*g*) RUYSCH *Thes.* I. aff. 3. n. 1. *Thes.* III. aff. 2. n. 34. 81. *Thes.* V. n. 5. *Thes.* X. n. 2. *Thes. max.* n. 9. *Advers.* III. n. 8. *Cur renov.* n. 79. GUNZ *de humor.* p. 140.

(*h*) ALB. p. 9. in viro. KAAUW n. 39.



In equo molle cum sit, diffluit (*i*), atque demum colorem suum per macerationem diffundit. Etiam a putredine in pollinem nigrum resolvitur (*k*).

§. XII. *Nigredinis Æthiopum sedes & formatio epidermidis.*

Parum difficultatis est in sede. Cum enim reticulum æthiopum saturate fuscum sit, epidermis vero modice (*l*) cinerea (*m*), & pene pellucens (*n*), cutis perinde ut Europæis alba (*o*), non videtur quidquam superesse, cur non transeamus in MALPIGHII (*p*) sententiam, qui in reticulo sedem ejus peculiaris coloris posuit. Si aliqua nonnunquam in æthiope nigredo est, cuticula utique a reticulo mucoso fucatur (*q*). Neque in cute ater color est, quæ alba, neque in epidermide, neque enim aut interius os, aut membranam villosam intestinorum nigram habent.

Porro multum nunc credo nos profecisse in detegenda generatione Epidermidis. Cum enim ea manifesto, in albis imprimis hominibus, sit exterior lamina reticuli (*r*), cum reticulum coagulatus mucus sit, qui in aqua diffluit (*s*): cum idem reticulum in membranam cogi possit (*t*) &

C 2

in

(*i*) SANTORIN p. 2. KAAUW n. 36. 92. ALBIN *adnot.* L. I. c. 4. p. 20. MEKEL *Mém. de l'Acad. de Berlin* Tom. 13. p. 62. T. 9. p. 83. 84. 85. 89. BAECK I. c. p. 11. Negabat *Alexius* LITTRE *Hist. de l'Acad. des Sciences* 1702. *hist.* 13. & CL. MITCHEL I. c. n. 4.

(*k*) BAECK p. 13.

(*l*) ALBA CURZIO p. XXII. *Mus. Petrop.* I. p. 7. MALPIGHIO p. 21. *Alexio* LITTRE p. 110.

(*m*) RUYSCH *cur renov.* n. 6. 59. 87. ALBIN *de col. æthiop.* p. 5. 6. WINSLOW n. 41. KAAUW n. 30. OSSELYN I. c.

Nigram facit RIOLANUS L. II. c. 4. SANTORINUS p. 2. BARRERE p. 4. BAECK p. 9. Nigricantem RUYSCH *Thes.* II. *aff.* 5. n. 12. MORGAGN. *adv.* II. p. 14. LEEUWENHOECK. *exp. & contempl.* p. 80.

(*n*) MITCHEL n. 4. PECHLIN p. 74. MEKEL p. 92. BAECK p. 12. Cornu nigri similem ALBINUS p. 6. Albam cum maculis nigris MITCHEL p. 110. Ita fit, ut rubor per eam in labiis & palma pedum pelluceat MITCHEL ib. qua sede etiam ipsum reticulum minus nigrum est *Physiol. amst.* edit. p. 423. *Journ. de Trev.* 1738. Juin.

(*o*) MITCHEL. I. c. p. 112. BAECK p. 11. 12. PECHLIN p. 69. SANTORIN p. 2. MALPIGHIUS.

(*p*) p. 21. Jam RIOLANUS & FLORENTINUS non contemnendus auctor, in cuticula nigrum feminae æthiopis invenit *de lacte* p. 39. atrorem ultra epidermidem non penetrare. Eo nempe tempore ad cuticulam reticulum censebatur.

(*q*) PECHLIN p. 72. RUYSCH *cur renov.* p. 59. ALBIN. p. 4. BAECK. MORGAGN. *adv.* II. an. 4.

(*r*) p. 18.

(*s*) p. 11. Pingue & mucosum in æthiope PECHLIN *nigred. æthiop.* p. 71.

(*t*) MEKEL *Mém. de Berlin.* Tom. 13. p. 62. Tom. 9. p. 89.



in vini spiritu & per siccitatem: cum ipsa epidermis possit in ejusmodi mucum reduci (*u*): cum reticulum una regeneretur, quando cuticula renascitur (*x*), non videtur quidquam repugnare, quin epidermis ex eo mucos per aëris actionem, per compressionem quamcunque, per siccitatem & exhalationem, in membranæ speciem coeat (*y*). Obscuritatem (*y*<sup>\*</sup>) facit fetus humanus, in quo mediis in aquis epidermis est (*z*). Multo tamen ea epidermis, quam adulto homini humidior, pulposior, propinquior est mucos.

A dura matre fieri, ejus hominis est divinatio, qui omnia ab ea matre deducat (*a*).

### §. XIII. *Causa ejus coloris.*

In universum quidem certum est, reticulum eo magis fuscum fieri, quo magis solis ardori exponitur. Frigidiorum regionum incolæ albidum habent (*b*); magis olivæ conditæ colore Galli meridionales & Itali: tinctius Hispani meridionales: fuscum Mauri (*c*) Africæ maritimæ incolæ ad 18. utrinque gradus ab æquatore (*c*<sup>\*</sup>); pene nigrum Malabari, qui Comandeliæ & Malabariam propriam colunt, tum Malayi, & incolæ insularum calidiorum Asiæ.

Solis ardori hunc saturatum colorem imprimis deberi, & feminarum exemplo patet, quæ suis in gynæcæis reclusæ, neque aprico unquam soli obnoxie, in Asia albæ sunt (*d*), parum ab Europæis diversæ. Sed etiam nobis Europæis maximo sæpe discrimine pars frontis pileo tecta, aut brachii, vestibus contenta, a reliqua nuda facie nudaque manu distat. Contra omnes

(*u*) p. 11.

(*x*) MEKEL l. c. Tom. 9. p. 95.

(*y*) IDEM ib. p. 88. Tom. 13. p. 64. MITCHEL p. 112.

(*y*<sup>\*</sup>) Etiam KAAUW n. 43.

(*z*) A liquore omni comprimi posse MORGAGN. *adv.* II. anim. 4.

(*a*) Le CAT p. 209.

(*b*) Nisi a ventis sordibus & unguentis fusci fiunt. (RAI *topogr.* p. 417.) Fusci sunt certo Grœnlandi, Samoedæ. Non ergo omnes gentes fuscae inter 20. & 35. gradum vetusti orbis habitant BUFFON T. III. p. 432.

(*c*) Ex rubris fusci ADANSON *relat.* p. 38.

(*c*<sup>\*</sup>) BUFFON T. III. p. 449. Ardor ibi cæli summus ad 48. gr. REAUMURIANOS L. V.

(*d*) Etiam in insulis Mendocinis *Voyage des terres australes* T. I. p. 256. Maurorum filia pulchræ SHAW *voy.* p. 304.



nes nigritas in ardentissimis climatibus habitare certum est, & etiam eos, qui in maris pacifici insulis (e) degunt, naturales incolas Zonæ torridæ (f) videri; contra Americani monticolæ pene albi sunt (f\*).

Intelligitur, flavum sudorem esse; eum imprimis, quem acris solis vis ciet: eo humore videri non solum epidermidem extus illini, sed reticulum interius madescere, cum injectum in cadavere gluten ex cute ita exsudet, ut frequenter epidermidem depellat, subque ea in vesicas elevetur. Id integro in homine dum fit, potest flavus ejusmodi humor ad reticulum accedens, & crassius idem, & repetitis laminis fuscum reddere: quales sæpe facies, aut multa experti milites, aut qui calidissimas regiones frequentarunt peregrinatores, suis a civibus facile diversas, ex terris remotis referunt. Lusitanos ipsos, qui in Guinea nunc a seculo vixerunt, æque atros esse constat, ac ipsi quidem æthiopes (g). Contra albos factos esse novimus Abissinos (h), & Æthiopes in Africa orientali, ut minus æstuosa (i), & circa caput bonæ spei minus nigros esse (k), inque regionibus septentrionalibus sensim expallescere (l). Certe etiam nunc femina æthiops Londini videtur Europæum colorem indui, estque pars permutationis perfecta (m).

Sunt etiam in nigritis aliqua peculiaria, quæ nigredinem augere possint. Est in ipsis mollior (n), tenera (n\*), quasi oleosa (o) cutis, & perpetuus acriorque sudor, qui in plerisque gentibus africanis fætores peculiari (p) se distinguit, manifesto argumento, aquæ minus, & olei liquefacti & comminuti plus in eo sudore (q) esse. Sunt demum membranæ omnes cuti injectæ crassiores, quod omnino plus sudent, & copia major fatidi

C 3

(e) *Voy. aux terres australes* T. I. p. 160. 441.

(f) *Voyages aux terres australes*. T. II. p. 378.

(f\*) BOUGUER *introd.* p. CI.

(g) *Saml. algem. Reisen*. L. VI. p. 148. MITCHELL. l. c.

(h) MITCHELL.

(i) BUFFON T. III. p. 519.

(k) Hottentotti afrorum albißimi BUFFON T. III. p. 481.

(l) PECHLIN p. 128.

(m) *Phil. trans.* Vol. LI. P. I. p. 176. 177. *Lond. Chronicle ann.* 1760. Jun. 26. & prius *phil. trans.* n. 235.

(n) Sanguinem in vasa cutanea crassiora æthiopibus penetrare SENAC. *Ess. de phys.* p. 47.

(n\*) BARRERE p. 5.

(o) BARRERE p. 5. cum fætores.

(p) MITCHEL n. 4.

(q) Febribus malignis magis obnoxii sunt MITCHEL p. 153. cutisque morbis.



fætidæ olei ad reticulum accedat (s), albi enim nascuntur, & aliquamdiu pene albi manent (t). Albæ etiam sunt cutis cicatrices (u), & post variolas lente demum per flavorem in nigredinem transeunt (x). Ex morbis etiam nigritæ lutei fiunt (x\*).

Niger sanguis est, quo ipso credas problema esse solutum. Ab atro enim sanguine fuscum sudorem expectes (y).

Etiam bilem æthiopi nigram (z) esse ajunt; atque videri bilem inter cutemque, aut certe reticulum, naturalem aliquam conjunctionem esse, exemplo icteri, flavi, nigri (a). Et in Mullo, cui ruberrima cutis, hepar ejusdem coloris esse; neque enim vesiculam fellis is piscis habet (b).

Denique cerebrum a nigredine illa æthiopum peculiare non immune esse (c).

Ex ambustione adeo nigritarum colorem Cl. viri unice deduxerunt (d), ut omnino etiam albi homines eo in climate sensim in nigros sint degeneraturi (e).

Possint aliquid addere nuditas (f), unguentorum usus, crassities epidermidis major (g).

#### §. XIV. Num hæc firma sint.

Animus veri cupidus non requiescit, quamdiu omnino aliquid superest dubii, quod ipse sibi demere nequeat. Est in hac nigredinis causa aliquid, quod

(s) N. voy. de guin. p. 149. Sensim MULLER beschreib. von fetu p. 30. du TERTRE II. p. 506. KOLBE I. p. 91.

(t) Intra mensem MULLER; intra 5. menses KUNDMAN Seltenh. p. 350. intra annum Jesuitæ Journal de Trévoux 1738.

(u) PECHLIN p. 83. BOYLE color. p. 165. MITCHELL p. 124.

(x) MEKEL tom. 9. p. 91.

(x\*) Jesuitæ in J. de Trévoux 1738. m. Juin.

(y) BARRERE e rubro nigrum esse scripserat p. 5. Niger est & lintea tingit MEKEL Mem. de Berlin t. 13. p. 73. Nigrum etiam faciunt TOWNE. BUFFON T. III. p. 524. Ei sanguini nigrorem æthiopum tribuit VANDENESSE in disp. parif. 1742. edita. Negat MITCHELL p. 115.

(z) BARRERE p. 4. eo attiorem, quo cutis nigrior est BUFFON T. III. p. 524. Sed negant auctores du J. savans 1742. Mai.

(a) BARRERE p. 5. Habet SANTORINUS p. 3. PECHLIN p. 165.

(b) SANTORIN p. 4.

(c) L. X.

(d) BUFFON hist. natur. T. III. p. 481. 526. In Jour. de Trévoux. 1738. m. Jun. Anonymus. Non rejicit MITCHELL p. 133.

(e) lb. p. 483.

(f) MITCHELL. l. c. p. 138.

(g) IDEM p. 121. 124.



quod potius ad varietatem in hominum genere spectare videtur, ut omnino antiquissimis & ignotis nobis temporibus nata sint in hominum genere discrimina, quæ nunquam coaluerint, & quæ a patribus matribusque ad ultimos nepotes non interrupta serie transmittantur.

Et primum nigrita (*g\**) non ea sola habet privilegia, quæ audivimus, sed labia præterea tumida, nares compressas, ut in statua facile adgnoscas, absque colorum auxilio.

Contra Europæis naturale est, ut a cutē recedam, habere rectos crines, labia exigua, nasum exstantem.

Porro in iisdem illis æstuosis æthiopum regionibus Europæi nigrescunt quidem, ut tamen reliquæ suæ staturæ, criniumque & naturæ sint tenaces (*b*), neque unquam in colorem verum æthiopis transeunt, reliquumve corporis habitum (*i*). Sed etiam Mauri, qui inter æthiopes vivunt, nunquam in eorum staturam degenerant, neque oleosa cute teguntur. Et sunt in æstuosis illis terris integræ nationes albæ.

Contra Nigritæ, qui ex suis patribus avisque in minime æstuosis Europæorum coloniis nati sunt, perinde nigri sunt (*k*), neque a cæli frigore expallescent.

Et iisdem in regionibus pari sub solis ardore albas gentes mistas nigris reperiri frequens est (*l*).

Contra legimus in eadem Africa, aut in æstuosis insulis sacchariferis, ex concubitu albi hominis cum nigra femina, aut vicissim, colorem expallescere, mistumque ex europæis & æthiopicis characteribus hominem prodire, flavum (*l\**), pilo crispo (*m*). Manere vero immutatam flavedinem, si *mulatti* inter se misceantur (*n*). Deinde hybridem ex albo nigroque genitum hominem novo coitu cum albo homine fetum gignare  
Euro-

(*g\**) *Journ. des Savans* 1684. n. 12.

(*b*) LOPEZ Congo p. 9. Etiam eorum Lusitanorum post centesimum annum cum congenita femina geniti filii exalbescunt.

(*i*) Inter 12 & 14. gradum in terra spiritus S. *Voy. aux terres austr.* I. p. 125. In insula paschali T. II. p. 232. & 245. ad unum ab æquatore gradum I. p. 160. Similia monuit PECHLINUS.

(*k*) Post plurimas quidem generationes KALM *Amer. resa* T. II. p. 481. 482. 502.

(*l*) T. *austral.* l. c. de *V. voy. au Madagascar* c. 28. in Madagascar indigenæ albi, nigri ex Mozenbica advenæ.

(*l\**) v. CÆRDEN II. *voyage* p. 362 &c.

(*m*) *Hist. de l'Acad.* 1724. p. 17.

(*n*) *Ibid.* p. 18.



ropæo propiorem, dum fere post quartam ( *o* ) generationem, quasi sub repetita Europæa natura submersa indole æthiopica, homo prodeat nihil ab Europæo ( *p* ) diversus, crinibus fulvis. Si vero idem Mulattus cum nigra femina ( *q* ) rem habuerit, perinde repetita nigri feminis admistione; quarta pariter in generatione evanescere Europæam naturam, solamque superare æthiopicam.

Sed non solos demum æthiopes aliam ab Europæis gentem videre constituere. Americanos esse cupri colore rubros ( *r* ) & fuscus; sed capillis longis nigris durisque. Sunt, qui ajunt, barba carere ( *r*\* ); sed eam evellunt ( *r*\*\* ). Etiam isti secunda vel tertia generatione ad Europæam faciem redeunt ( *s* ).

Samojedas, Groenlandos & Laponos adgnosimus facie plana, lato naso & brevi, statura humili, quadrata ( *t* ), capillis nigris, parva barba.

Chinenses oculis parvis, barba rara, naso parvo, facie plana ( *u* ).

Et tamen, ne etiam huic opinioni nimium tribuamus, & genus humanum credamus a diversis stipitibus ( *x* ) natum, per suas species characteres distinctionis conservare, occurrunt contra eam opinionem albi æthiopes, colore equi, rosea oculi iride, impatientes lucis, debiles & teneri homines. Eorum passim solitaria exempla legimus ( *y* ); deinde integras gentes, in Java insula ( *z* ), in isthmo Dariensi ( *a* ), in africa ( *b* ) occidentali. In

( *o* ) GUMILLA T. I. p. 115. Gradus, quibus ad europæos aut æthiopes redeunt, accuratius habet ULLOA *usage* L. I. c. 4.

( *p* ) Griffith HUGHES *hist. of barbad* p. 14. DOUGLAS *hist. of northamer* T. I. p. 158. ULLOA l. c.

( *q* ) *Hist. de l'Acad.* l. c. p. 17. ULLOA l. c.

( *r* ) WAFER in isthmo Darien *relat.* p. 134. circa Maragnon fl. la CONDAMINE p. 226. BOUGUER p. Cl. & *Mém. de l'Acad.* a. 1744. p. 274. adde *Journ. de Trévoux* 1733. p. 1932. LAFITEAU *Mœurs des Sauvag.* p. 32. De Canadensibus CHARLEVOIX *hist. de la nouv. France* T. III. p. 310. 311. Vide eos Characteres accuratius apud ULLOA recensos l. c. c. 5.

( *r*\* ) BOUGUER. Alii ajunt a teneris evelli. *Phil. trans.* n. 454. LAFITEAU p. 104.

( *r*\*\* ) LAFITEAU. *Voy. au Miss.* p. 333. Gens crudivora *Esquimantzic* habent barbam CHARLEVOIX T. III. p. 179.

( *s* ) GUMILLA p. 110. ULLOA L. V. c. 5.

( *t* ) BUFFON *hist. natur.* T. III. adfunt. SCHEFFER *Lapon.* p. 31. *Gal. min.* V. p. 131. Etiam GASPESII *nouv. relat. de la Gaspes.* p. 392. &c.

( *u* ) *Journ. des Sav.* l. c.

( *x* ) M. R. *diff. sur l'origine des Negres* a. 1744. MAILLET *de l'Egypte.*

( *y* ) PISO *de re nativ. Ind.* p. 43. 44. CAMELLI *Phil. trans.* n. 307. *Hist. de l'Acad.* a. 1734 p. 15. 16. 1744. n. 5. *Venus physique* c. 14.

( *z* ) Chacrelas ex BUFFON T. III. p. 399 501. 502. Bedas *Recueil d'obs.* T. XI. p. 324.

( *a* ) WAFER p. 134.

( *b* ) Tondos æthiopes jam PECHLINUS habet p. 174. in *senealia Venus physique* l. c.



In mediterraneis æthiopix flavas gentes memorat J. ATKINS.

Ii albi homines ex æthiopibus nigris (c), & ex rubris demum indis nascuntur (d).

Hi iidem homines nunc colorem suum neque a sole habent, neque a parentibus. Morbum esse conjectura est Cl. virorum (e). Sed etiam in Brasilia Guaymures gigantes, albos feros homines, vetusti historici referunt (e\*). Id non improbabile, fit, cum etiam maculatos videas homines & seminigros (f), & demum in arietum & canum palato maculosam naturam frequentissime videamus, ut nigrum ab albo reticulo ne loco quidem separetur, & nigredo tanquam morbus in europa (g) supervenerit, & avium vetularum pennæ nigrescant (h).

Adparet id solum liquere; & per parentes ad filios nigredinem aut albedinem reticuli propagari; & per morbos causasque ignotas subnasci absque seminali principio; & multum ad utrumque colorem producendum posse clima, non tamen vel clima solum, vel seminale principium causam esse, quæ de colore definiat.

#### §. XV. Ungues.

Unguium historia cum epidermide conjuncta est, cui vehementer adhærescant, & cum qua macerando decedant (i). In homine certe Europæo aliter se habent, quam in animalibus. Crassi his & conici; homini, paucisque animalibus (k) plani sunt tenuesque.

In

(c) *Venus. physique.* BUFFON T. III. p. 501. 502. PISO. GUMILLA p. 132. certe de albedine.

(d) WAFER p. 134.

(e) MAUPERTUIS l. c. *Mém. de l'Acad. de Berlin* T. XI. p. 13.

(e\*) MONTANUS *Americ.* p. 383.

(f) p. 21. m. LABAT. *voy. d'Italie* T. I. p. 172. *Phil. trans.* n. 474. GEYER in *epist. itiner.* (hic tigridis similis,) tum *Hamb. Mag.* T. 19. p. 400. De integra tartarorum gente STRAHLENBERG edit. gall. T. II. p. 183. 184.

(g) In virgine 16. annor. *Phil. trans.* n. 323.

(h) REAUMUR *art de faire éclore* T. II. p. 307.

(i) ALBIN *adnot.* L. II. p. 59. WINSLOW n. 87. 88. FABRI *de plantis* p. 115. Etiam cum muscarum exuviis unguis abscidunt SWAMMERDAM p. 722.

(k) Simiæ. Opossum COWPER in ejus animalis anatome.



In pedis halluce unguem inveni ejusmodi. Possis in eo ungue tria distinguere strata, etsi ea omnia vehementer inter se connexa sunt.

In ungue humano distinguo epidermidem, veram naturam unguis, reticulum sulcatum subtus ungui subjectum, & papillas, quæ hoc reticulo, tanquam vaginis, continentur.

Ipse unguis fetui, & adulto, cui primum renascitur, mollis & plicatilis, deinde elasticus, cartilagine durior, cornu similior, planam faciem superiorem habet, ab adnata epidermide levigatam: & superficiem inferiorem sulcatam. Totus enim cum fibris fiat longitudinem (*l*) sequentibus, multis ordinibus sese incumbentibus, eæ fibræ interius, five versus os ipsum, qua nulla epidermis est, sulcis (*m*) distinguuntur pariter longitudinem sequentibus.

Totus unguis, ut epidermis, absque sensu est (*n*), & absque vasis.

Initium, five radicem (*o*) habet, ex linea ferrata, in aciem exeunte, qua ex adhærente cute oritur versus digiti articulum (*p*), cujus quidem capsulæ non aliter adhæret, quam cellulosæ telæ ope. Sed neque tendo (*q*) eo pertingit, visique sunt ungues renasci, cum ossiculum tertium, adeoque una tendines periissent (*r*). Margo ejus radices posterior, duoque latera, quadratam figuram ordiuntur (*s*).

Ea pars unguis alba est, & flexilior, & ex cute exit, fitque conspicua; denique parvo arcu, majusculi circuli, a reliquo rubro ungue separatur (*t*).

Inde porro in planitiem productus, sensim divergentibus lateribus latescit, rubrior nunc, sensim etiam crassior, cumque pulpa papillata connexus. Denique arcu quodam, ut quidem Europæi solent, terminatur libero; & continuo excrescente, ni refecaretur.

In.

(*l*) DUVERNEY *Journ. des Savans* 1689. n. 19. KAAUW n. 380. WINSLOW n. 89.

(*m*) KAAUW n. 379. LEEUWENHOECK *epist. physiolog.* p. 416.

(*n*) Ipso ungue compuncto symptomata magna supervenisse, cum sensilis esset, memorat MEKERN c. 63. Oportet causam aliquam fuisse nobis ignotam, quæ Cl. viro imposuit.

(*o*) WINSLOW n. 93.

(*p*) A secundo internodio oriri COWPER ad t. 105. BIDLOI.

(*q*) Eo pervenire POZZI *comm. epistol.* p. 55. LUDWIG *de unguibus* p. 8. Ex tendibus ungues oriri CHIRAC *des Cheveux* p. 76. Accurate rem indagatus, sola cellulosa tela reperi adhærere.

(*r*) PEYER *de bydrop. ovar.*

(*s*) KAAUW n. 367.

(*t*) ALBIN. L. H. c. 13. p. 56. t. 7. f. 4. f.



Interiorem superficiem, quæ os respicit, diximus sulcatam esse, & est equidem, ut sulci quasi membranaceis parietibus separentur. Tamen ea pars sola sulcata est, quæ ultra lunulam nuda producitur (*u*), neque ad lunulam usque sulci sunt (*x*).

Nunc epidermis ad unguem duobus locis accedit. Et quidem in superiori cutis origine solet lunata quadam figura quasi excindi, ut una cutis, & unguem recipiat. Non tamen excinditur, sed contra se ipsam reflexa, redit ad unguis radicem, eique partim in principio fere radicis adnascitur (*y*), partim, nisi resecetur, antrorsum etiam in conspicuam partem unguis producitur. Ita folium fit epidermidis, quod faciem nudam unguis vestit, & cum ea resecatur.

Sed etiam interior facies unguis, alio quidem loco epidermidem habet adnatam. A pulpa ergo tactili extremi digiti, quæ spiralibus sulcis exsculptur, redeuns versus unguis principium, ipsa quidem ad unguem adhæret, qua desinunt papillæ, & unguis incipit liber esse, atque absque dolore resecari (*z*).

Ab ea adhæsione corpus reticulare porro contra unguis originem continuatur, & cutem subjectam tam late tegit (*a*), quam late unguis sulcatus est. Quare etiam ea in sede nigredo est in æthiope (*b*). Idem porro reticulum productum, qua tegitur radice unguis, nunc albicat (*c*), & cum reticulo cutis ad latera unguis posita continuatur.

Reticulum hoc variis modis aliud est a reticulo reliqui corporis. Nam & sulcis inscribitur longitudinem unguis sequentibus (*d*), ut papillas subjectas apte contegat, & præterea molle, qua cuti subjectum proximum, sensim durius (*e*) est, qua vero ungui propius, donec omnino ab ungue porro distingui nequeat: ut qua parte unguis desinat, & incipiat reticulum, nequeas definire. Quare alii Ill. viri ab ungue non distinguunt (*f*).

D 2

Nunc

(*u*) ALBINUS L. II. ic. cit. g.

(*x*) IDEM f.

(*y*) KAAUW n. 363. 364. 365. 366. 368. ALBIN. l. c.

(*z*) ALBIN. p. 57.

(*a*) ALBIN L. II. l. c. 9. KAAUW n. 370. 376. 378. &c. SCHAAF p. 40. seqq.

(*b*) ALBIN *col. athiop.* p. 3. B. *in ic.* KAAUW n. 374. Ungues nigri Æthiopi ARISTOT. *Hist. anim.* L. 3. c. 9.

(*c*) ALBIN *ib.* C.

(*d*) KAAUW n. 376. 378. ALBIN g.

(*e*) MALPIGH. p. 99.

(*f*) WINSLOW n. 90.



Nunc de cute. Ea perinde, uti epidermis, parabolico fulco exscindi videtur, ut unguem recipiat: Sed continuatur utique. Et primum cutis cum periosteo mista, cellulosæ telæ rubenti similis, tegit radicem unguis conspicua, & occultat, & eadem ejus radice posteriori dentato margini adhærescit (*g*).

Sed præterea & ab articuli sede, mista cum periosteo (*h*) cutis, & eadem ab utroque parabolæ, quam dixi, curvo ramo os inter ultimum & unguem continuatur, & ad pulpam usque extremam tactilem, usque nudam, non interrupta producitur (*i*).

Non vero simplex ea sede cutis est, sed fila quasi tenera de ea secedunt, & superne, sive versus radicem unguis, nata, deorsum inclinata (*k*) sulcis reticuli recipiuntur, atque denique suam longitudinem emensa ad reticulum unguis adhærescunt, ut tamen macerando facile separentur. Ea fila non omnia supra unguem, sed deinceps (*l*) oriuntur, ubi sub ungue cutis producitur: Ut adeò unguis eundo crassescat (*m*), & fila prima breviora, quæ sequuntur longiora sint. Radici, cum sulcos non habeat, nulla adhærescunt. Mollissima prima, deinde duriora (*n*) sensim, minusque rubra, denique maxime anteriora omnino ungui non adhærent, cutisque solita fabrica restituitur, atque papillæ ad latera divergunt (*o*).

Ab his papillis acerrimus ille sensus est in paronychia ungui subjecta; & illa crudelis barbarorum tortura, quando ungues evelluntur. Tunc enim omnes papillas lacerari necesse est, quæ ungui adhærescunt.

## §. XVI.

(*g*) ALBIN *f. cit. a.* MALPIGH. l. c. WINSLOW n. 92.

(*h*) Non penitus dissentit Ill. LUGWIG p. 10. Cæterum periosteum non requiritur, ut ungues generentur. In linguis enim ferocium animalium papillæ unguum duritate sunt HEUERMANN *physiolog.* T. IV. p. 514. Sed & alibi ungues vitiosi efflorescunt in humero, cubito, digitorum primo internodio FRANK. *diff. de unguib. monstros.* PECHLIN L. II. obs. 42.

(*i*) KAAUW n. 359. seqq. ALBIN l. c. b. WINSLOW n. 92.

(*k*) MALPIGH l. c. add. DUVERNEY l. c. ALBIN b. KAAUW n. 360. 375. 381. WINSLOW n. 91. LUDWIG p. 4. HINTZE *de papill.* n. 5.

(*l*) MALPIGH l. c. COWPER ad *tab.* 105. DUVERNEY.

(*m*) HINTZE.

(*n*) MALPIGHIUS.

(*o*) KAAUW n. 381.



§. XVI. *Unguium origo, & utilitas.*

Multa certe habent cum epidermide communia: perinde per morbos laminis sibi impositis crassescunt: neque molliores fere in callos subinde epidermis mutatur, & pariter delabuntur sponteque renascuntur, carentque & vasis & sensu, suumque inseparabile habent reticulum.

Experimento facto, cum unguis lunulæ indelebilem maculam rubram, aqua regia solutum aurum continente inussisset BOERHAAVIUS (*p*) vidit, maculam sensim versus liberum finem unguis processisse, donec tota cum resurgmine dispareret.

Etiam a morte crescere lego, & in cadavere quidem D. Catharinæ VIGRI (*q*) nunc 250. anno conservatæ, quotannis refecari.

Est tamen in ungue plus, quam in epidermide, nam & cutem adhærentem accipit, & reticulum habet multo durius, & solidius, & ei reticulo adnatas papillas. Dubitabat etiam ALBINUS (*r*).

Cum cornu comparavit J. DUVERNEY (*s*) tantum ut in cornu plura sint strata fibrarum & laminarum, & evidentiora pro recipiendis papillis (*t*) cava. Sed eæ in ungulis animalium pariter papillæ profunde subeunt (*u*). Certe vitiosi ungues in vera laminata (*u*<sup>\*</sup>) cornua abeunt (*u*<sup>\*\*</sup>). In lepore loco unguium fibræ solidæ fetarum similes eruperunt (*u*<sup>\*\*\*</sup>).

Cum Pilis comparavit Ill. LUDWIGIUS (*u*<sup>\*\*\*\*</sup>).

Papillis nerveis tribuebat MALPIGHIUS (*x*), & per congelationem

D 3

ex

(*p*) *Praelect.* T. III. p. 714. Similia habet BOYLE *de porosit. corp.* HELMONT *paradox. disc. on man.* p. 51. 94. Diebus 31. renatum KRAFT. *Act. Petrop. nov.* T. II. p. 241. 242. Bis vel ter, etiam quater in iis mutari, qui manus in calida exercent FALLOP. *part. simil.* p. 178.

A veneno delapsos renatos esse ROGER BACON ap. FREIND. BOYLE *util. phil. exp.* p. 258. BROMEL *act. lit. suec.* 1726. p. 186. Etiam cornua vitiosa delapsa renascuntur *Phil. trans.* n. 257. MANGET. *bibl.* T. I. p. 34. JACOBÆUS *cat. rar.* p. 2.

(*q*) WRIGTH *travels* p. 437.

(*r*) *Lib. II. c. 15.*

(*s*) *L. c.*

(*t*) DUVERNEY *l. c.*

(*u*) MALPIGHIUS *de tact. organ.* p. 9. du HAMEL *de corp. anim.* L. II. c. 1.

(*u*<sup>\*</sup>) *Phil. trans.* n. 297. FRANK. de FRANKENAU *de unguib. monstros.* MALPIGH. *postb.* t. 19. f. 3. INGRASSIAS *de tumor.* p. 336.

(*u*<sup>\*\*</sup>) *Histoir. de l'Acad.* 1719. *hist.* 1.

(*u*<sup>\*\*\*</sup>) GEICHMEYER *patbol.* p. 43.

(*u*<sup>\*\*\*\*</sup>) *Progr. cit.*

(*x*) *Postb.* p. 100.



ex nervis oriri jam EMPEDOCLES (y) opinio fuit. Verum reticulum, & etiam magis unguis ipse, facile distinguitur a papillis.

Ex fabrica, quam descripsimus, satis videtur apparere, corpus reticulare induratum (y†) unguem efficere: pro modulo autem habere papillas inclinatas. Cur vero hic potius reticulum indurescat, ego quidem causam non video. Sed ubique tamen per morbos, cornua nascuntur vitiosa (y\*).

Utilitas ad tactum manifesta est. Is exercetur papillis in pulpa extremorum digitorum per spirales lineas dispositis. Eæ papillæ non poterant ab officulo solo sustineri, quod necessario pulpa illa brevius fieri necesse fuerit, ut satis habeat tegumentorum. Nusquam enim natura ossa absque sufficiente cellulosa telæ cutisque tegmine exposuit. Verum si nihil esset in parte dorsali digitorum, quod papillis resistat, cederent eæ pressioni, & in se ipsas redirent. Nunc unguem tanquam scutum habent impositum (y\*\*).

Possunt etiam ad fortiolem adprehensionem comprehendenda minutiora corpuscula inservire (z).

Armorum locum in animalibus tenent; sed alia cum fabrica, qui cum ossibus digitorum dearticulentur, & proprios musculos sibi insertos accipiant (a).

Hominibus equidem (b), quoties vel ex barbarie (c), vel ex more aliquo

(y) ARISTOTELES de spiritu c. 6.

(y†) BOERH. morb. nerv. p. 320.

(y\*) EX fronte ZACUT Prax. admir. h. 3. obs. 97. in viro. BARTHOLIN de Unicornu p. 3. hist. 27. Cent. V. RUDBEK propag. plant. HILDAN II. obs. 25.

EX maxilla BARTHOLIN l. c. p. 15.

EX capite duo cornua LEIGH Lancash tab. 7. & cornu 9. unciarum de capite feminae defectum THORESBY topogr. of Leeds p. 431. tum DOLÆUS Epist. III.

Undique ex cute capitis INGRASSIAS de tumor. p. 336.

EX omnibus digitis Phil. trans. n. 230.

EX femore vetulae Journ. de Med. 1761. fevr. Hist. de la Cbir. T. III. p. 7. 8.

EX vulnere genu Alex BENEDICTUS p. 13.

IN calcaneo ZACUTUS obs. 188.

Undique ex manibus, pedibus, capite, fronte INGRASSIAS de tumor. p. 336. in virgine, & similis homo Hamburg. Magazin. T. XXII. p. 514. Ex articulis artuum, natibus, mammis Zach. SYLVIVS nouv. republ. des lettres 1686. & ex corpore puellæ, cum cutis callosa esset Phil. trans. n. 176.

(y\*\*) Physiol. Amst. p. 432.

(z) HEUCHER p. 482.

(a) PLIN. L. VIII. c. 15. PARISINI in Leone. PERRAULT Essays de physiq. T. III. tab. 4. f. 1. In aquila radicem osseam habent CHESLDEN osteogr. c. 3.

(b) EX morbo duos pollices longos LINDENIUS habet physiol. p. 744.

(c) Olim Oritæ apud NEARCHUM ARRIAN in exped. alex. In insula Californiæ vicina DRAKE ap. de BRY Americ. T. VIII. p. 13.



aliquo antiquo omittunt refecare, ungues longi fiunt, ad tres (*d*), & quatuor pollices (*e*), & spithamam (*f*). Etiam ex morbo (*f*<sup>\*</sup>).

Sed homini natura meliora arma dedit, cum & ferissimæ nationes baculis atque arcu uti sciant. Debilia nimis forent, quæ hirsutis bestiis homines arma opponerent, digna pugnis virginum sectis unguibus acrium. Floridani (*g*) dicuntur unguibus in bello usi esse. Sed tota ea historia fabulosa est, neque nostris temporibus ullum est tam levium armorum vestigium.

§. XVII. Pili.

Non quidem ubique cum cute pili conjunguntur, tamen plerisque locis. Nempe homo ex sua natura hirsutum (*h*) est animal, totum pilis adpersum, in facie etiam, pectore, brachiorum & crurum parte magna: si usquam nulli sunt pili, videntur esse in planta pedis manusque, vola, inque pene. Plerumque homo pro animale glabro datur, quod pili, præter certas corporis partes, breves sint, mollesque; sed sunt tamen aliqui, & hirsuti nascimur (*i*), & formosissima femina faciem totam hirsutam habet. Cæterum homo, ut adversis se ventis pluviaeque tutius opponat, pectore & facie anteriori sui corporis hirsutus est (*k*). Animalia, quæ dorso pluvias accipiunt, dorsi longiores habent pilos (*l*).

Quoties ii pili, qui vulgo breves manent, in homine excrescunt, & parem cum pilis partium vulgo hirsutarum longitudinem induunt, tunc homines

(*d*) Chinesibus HAMILTON *Voy. to the East Ind.* T. II. p. 279. Vide etiam *Relat. au Nord* T. VI. p. 419.

(*e*) OVINGTON *voy. de Surate* T. II. p. 70. Digitum longi FRYER *travels* p. 102.

(*f*) In fanatico Malabarico Missionarii Dani *Cont. Relat.* XXI. p. 624.

(*f*<sup>\*</sup>) Unciam, & duas uncias longi *Phil transf.* n. 297. quatuor cum dimidio JACOBEUS *varior.* p. 2. conf. BARTHOLIN. *anat.* p. 557.

(*g*) De BRY *americ.* L. II. ad T. XIX.

(*h*) GLISSON *de ventr. & intest.* p. 54. ed. bat. BOERHAAVE *pralect.* T. III. p. 527. 528. Animalia quadrupeda sunt pilosa BUFFON *hist. nat.* T. II.

(*i*) BARTHOLIN. *Cent.* 3. *obs.* 38. RUYSCH *Thes.* III. *tab.* 2. *Thes.* V. n. 74. MALPIGH *posth.* p. 93. RÜDERER l. c. p. 99. In immaturo fetu LEHMANN p. 326. Pro simia habitus LANGGUTH *pilus pars non ignob.* In mamma pili PANAROL. V. *obs.* 37. In facie pulchrae mulieris IDEM.

(*k*) Tamen homo dorso pilosissimo MELLI *lancetta mis in pratica* p. 172.

(*l*) ARISTOT. *hist. anim.* L. II. c. 5.



homines monstrofe pilosi (*m*), feminæque barbatae (*n*) solent in annales referri. Integras ejusmodi gentes (*n*<sup>\*</sup>) reperiri fabulosum videtur.

Pilus non est cutis nativus hospes, etsi minor & mollior videtur non ultra cutem produci (*o*). Qui tamen accuratius hæc sunt speculati, reppererunt, etiam eos in facie molles albosque pilos a celluloso textu subcutaneo advenire (*p*). Ego demum in hominis facie ita reperi se habere, ut utraque sententia vera sit. Nam passim interiori faciei cutis adhærent, qua adipem contingit.

Adipem veram pilorum sedem (*q*) esse evidenter constat exemplo partium humani corporis, in quibus subinde vitio pili nascuntur. In iis omnibus adeps est, cum neque epidermis sit, neque reticulum, neque cutis. In ovarii (*r*) atheromate (*s*) plenas cellulas pilis crispis nigrisque ipse vidi, & vulgare fere est visas fuisse; tum in aliarum partium atheromati-

(*m*) Puer totus hirsutus HILDAN. *Ep med.* THORESBY *Topogr. of Leeds.* p. 601. Puella pilosa WELSCH *Epifagn. obs.* 96. BARTHOLIN. *anat.* p. 452. *Cent. I. hist.* 42. In facie hirsutus homo ZACCHIAS p. 602. *Eph. Nat. Cur.* vol. VI. *obs.* XI. Id. WOLF *obs.* 20 ZACUT *prax. obs.* 95. [etiam aure pilosa] *Opusc. scient. philol.* T. XIII. p. 407. tum Hispanus & vestalis COLUMB. p. 255. Ille manum & faciem excipit. Alia exempla habet LEHMANN p. 755. BLANCARD *Jaarreg.* C. V. n. 99. Conf. etiam LENTIL. *Iatromizem* p. 196. SCHULZE *Haarkrankh.* p. 105. 114. 118. *Act. hafn. ann.* I. p. 184. V. n. 103. Habet in Polonia RASCYNSKI *hist. nat.* T. II. p. 464. Pro hybride ex urso habitus barbarus RIOLAN. *de monstr.* p. 9. Iterum de ejusmodi hirsuto satyro non loquente habent aliqua VANDENBROECK *voy.* p. 426. & de variis hominibus in sylvis educatis DIGBY p. 51. 54. SCHULZE *trichias.* p. 104. 118. GLISSON l. c.

(*n*) Femina barbata & hirsuta ZACCHIAS *med. leg.* p. 601. Duæ juvenculæ ejusmodi C. BARTHOLIN. *de cerebro* n. XI. aliæ IDEM *anat.* p. 452. *hist. I. obs.* 42. 43. Habet etiam exempla LEHMANN *Chron.* p. 67. LANZON *anim.* 49. SPINDLER *obs.* 97. HELWIG *obs.* 14. PARSONS *hermaphrod.* p. 23. *Bresl. Saml.* 1724. Jul. LINDEN *physiol.* p. 551. ULMUS p. 307. FABER ad HERNANDEZ p. 763. etiam ARISTOTELES *hist.* III. c. XI.

(*n*<sup>\*</sup>) Satyros pilosos habet DIODORUS, & ARRIANUS. Homines feri hirsuti in insula S. Galli FRIKE *Reisebeschreibung* p. 194. & ex narratione P SIRESCUS *vit.* p. 286. 287.

(*o*) In facie WITHOF *diff.* p. 11. *Comment. Gotting.* T. p. 370. tum alibi BASTER E. N. C. v. VIII. c. 12. GARENGEOT *splanchnol.* p. 84. KAAUW n. 311. 320. 323. Ita scribit LIEUTAUD, tanquam rarius esset, longius produci p. 117. & plerumque non ultra cutem protendi *Physiolog. Amst.* p. 434.

(*p*) LUDWIG *de humor. cut. inung.* p. 13. 18.

(*q*) SBARAGLI sibi tribuit inventum *vigil. ment. & ocul.* p. 502.

(*r*) RHOD *Cent.* III. *obs.* 44. TYSON *Phil. transf.* n. 309. HORST *Epist.* p. 394. *Hist. de l'Acad.* 1700. n. 5. *Mem. de l'Acad.* 1746. p. 162. CASTEL *Journ. des sav.* 1751. TARGIONI *obs.* 46. p. 65. 66.

(*s*) BLANCAARD *chir.* p. 430. *Phil. transf.* n. 309. *Fränk. Ann.* T. III. p. 66. In fronte PARR *des monstr.* p. 462. In cystide semi ulnam longi pili *Mem. de* 1728. p. 411. In pila capillata abdominis virginis *Phil. transf.* n. 309. Pili ex ulcere cruris, DIEMENBROECK p. 329. In folliculo prope renes VALISNER II. p. 60.



romatibus, etiam in bestiis (*t*). Sed etiam in omento (*u*), ventriculo (*x*), & alibi passim in cute (*y*) pili effloruerunt, & in folliculo moschato (*a*<sup>\*</sup>). & cum urina (*z*) excreti sunt, aut per anum decesserunt (*a*). Linguam, in qua subinde pili sunt (*a*<sup>\*\*</sup>), possis ad cutem referre.

### §. XVIII. *Pilorum fabrica.*

Incipiam a perfectioribus exemplis, qualia in homine sunt pilorum, qui in scroto nascuntur, inque pube: deinde in mystace animalium ferocium.

Sub cute, in cellulosa tela (*a*†) reperiuntur bulbi (*b*) colorati, fere ovales; etiam ad minores faciei pilos perpetui. In capite tamen & pube ovales: in ciliis & superciliis rotundos: in lanugine graciles esse Cl. vir docuit (*c*). Ergo bulbi hemisphærico principio, teneriori (*d*), vasculoso, cum cellulosa tela connexi, vasa ab ea tela (*e*) accipiunt, & secundum anatomicos, me quidem subtiliores, etiam nervos (*f*), denique filamenta cellulosa (*g*).

Medio

(*t*) In carne bubula folliculus, in quo intricati pili reperti BARTHOLIN. *Cent. I. hist.* 100. Similis historia Aët. *Hafn.* Vol II. p. 140 In sacco moschati animalis, inter glandulas pili Mem. de l'Acad. 1731. p. 450.

(*u*) RUYSCH *obs.* Cent. n. 17. *Mus.* p. 129. *Thes.* III. n. 63. IX. n. 50. X. n. 1. max. n. 74.

(*x*) RUYSCH *advers.* III. p. 2. t. 2. f. 4. 5. Sic plumæ in adipe ventriculi anseris nates apud HANOW. *Seitenb.* T. I. p. 255.

(*y*) SCHULZE p. 74. 75. 94. pila capillorum super musculum rectum abdominis.

(*z*) KAAUW. n. 307.

(*a*) Add. WITHOF *Comm.* p. 369.

(*a*<sup>\*</sup>) Mem. de l'Acad. des sciences 1728. p. 411. 1731. p. 450.

(*a*<sup>\*\*</sup>) AMAT. L VI. cur. 65. In equo BOURGELAT T. II. P. 2. p. 322.

(*a*†) Etiam ex folliculis telæ cellulosæ BASTER E. N. C. Vol. VIII. *obs.* 12. MORGAGN. *adv.* IV. p. 61. &c. & glandulis sebaceis IDEM *adv.* I. p. 2.

(*b*) LEDERMULLER *microscop. Belustig.* Tab. V. fig. 99. MALPIGH. *posth.* t. 16 f. 1. 2. 3. 4. HOOKE p. 156. WITHOF *diff.* p. 17. Etiam in pilis glandulæ facci moschati Mem. de l'Acad. 1731. p. 450. Aliqui tamen his carent ib.

(*c*) WITHOF p. 371. 372. Graciles pingit LUDWIG *hum. cut. inung.* f. 2.

(*d*) Conf. KAAUW n. 315. WITHOF *Comm.* Gott. p. 371.

(*e*) Nonneg g. g. LEDERMULLER. add. LUDWIG *humor. cut. inung.* p. 19. Vidit KAAUW n. 317. WIDSLOW n. 98. BOERHAAVE *cert. ex physic.* WITHOF *diff.* p. 14.

(*f*) LEDERM. *ibid.* WINSLOW n. 98. LUDWIG *ibid.*

(*g*) Huc refero filamenta dicta WITHOFIO p. 22. & in *Comm.* Gott. ing.



Medio vero ventri bulbi circumponitur splendidum, durum (*b*), involucrum, in laminas fissile (*i*), quod versus cutem tenerius & subrubrum & angustius fit (*k*), atque sub foramine cutis finitur. Figura longe elliptica est, finibus gracilibus, ventre medio crassiori. Vasculis rubris percurritur (*l*).

In homine etiam bulbus reperitur cuti concolor (*m*), ut vix in duas tunicas separetur. Unicum certe habent Cl. viri involucrum.

Quando hoc durum involucrum aperitur, sanguis (*n*) ipse effluit satis abunde, ut in cavo aliquo effusus esse videatur. In aliis liquor tenuis est, subviscidus (*o*), in cellulosa tela sedens.

Tunc vero educto sanguine adparet alter interior bulbus (*q*) longe cylindricus, sine subrotundo, qui in tenero hemisphærio vaginæ continetur, reliqua sede albus & duriusculus.

Quando & hæc secunda pili testa aperta est, tunc demum pilus nudus adparet (*r*). Ejus initium est in parte teneriori vaginæ primæ. Gracilior est ibi, incurvus & conicus (*s*). Qua in bulbo continetur, mollior est (*t*). Inter eum & interiorem bulbum etiam viscidam & pingue unguen continetur (*u*) in celluloso spatio.

Inde pilus, cum cylindrica vagina interiori, & exteriori, ad porum cutis venit, ibique exterior vagina desinit (*y*): interior porro pilum comitatur (*z*). Invenit viam vel in centro aliquo linearum epidermidis aperto

(*b*) CHIRAC *lettre sur les Chev.* p. 13. f. 1. A. f. 2. D. MALPIGH. *posth.* p. 93. t. 16. f. 2. F. WINSLOW n. 98. Vagina pili LUDWIG *humor. cut. inungu.* p. 15.

(*i*) WITHOF p. 372. *diff.* p. 21.

(*k*) WINSLOW n. 97.

(*l*) BOERHAAVE, POZZI p. 53.

(*m*) WITHOF p. 372. LEDERMULLER l. c. In scroto RUYSCH *Ep.* I. t. I. f. I.

(*n*) CHIRAC p. 13. MALPIGH. p. 93. FANTON. *anat.* p. 31.

(*o*) MALPIGH. p. 93. f. 4. Lentus humor ad radicem pili ARISTOT. *part. anim.* L. III. c. XI. Gluten WINSLOW n. 99. LUDWIG. *hum. cut. inung.* p. 20.

(*q*) Membrana glandulosa CHIRAC p. 13. f. 2. E. Ovale corpus MALPIGH. p. 93. & bulbosa radix ib. f. 2. E. f. 3. H. f. 4. I. l. An non Bulbus gelatinæ similis SORACI. Vocat molle pultaceum capitulum WITHOF *diff.* p. 23.

(*r*) WITHOF p. 371. 372. *diff.* p. 19. 20.

(*s*) LEDERMULLER. MALPIGH. f. 2. 3. 4.

(*t*) WITHOF *diff.* p. 23.

(*u*) IDEM p. 14. 19. 20. Gluten vocat SORACI *E. pili partes corporis viventes.*

(*y*) WINSLOW n. 99.

(*z*) WITHOF p. 373.



aperto (a), vel in glandula (b) aliqua sebacea, vel in papilla, ut multi Cl. viri (c) volunt. Negant alii (d), & certum est a sede tactus atque adeo a papillis præcipuis pilos abesse.

Per ejusmodi foramen pilus transit, & dum epidermidem attingit, eam vere non perforat, sed in speciem infundibuli (e), impellit, ut ex ipsa cuticula sibi vaginam faciat, inseparabili porro nexu alteri vaginæ adnatam (f), quæ est a bulbo; cornea vero est quam epidermis addit, elatere summo & dūritate, ut in mumia superfit. Hinc epidermidem detrahentem pili sequuntur (g).

Incisa ea vagina adparent fila elastica, quinque ad decem (h), cellulosa tela inter se invicem & cum cortice conjuncta (i).

Modicum lumen relinquunt, cellulosa tela (k) reticulari repletum, in qua humor (l) viscidus est, ut in bulbo, qui idem siccando evanescit (m).

### §. XIX. *Pilorum color. Incrementum morbi &c.*

Quæ sequuntur faciliora sunt & vulgo nota.

E 2

Pili

(a) p. 12.

(b) WITHOF p. 374. WINSLOW n. 100. RUYSCH *adv.* I. n. 10. *Physiolog.* amst. I. c.

(c) WITHOF p. 374. MALPIGH. p. 95. ic. 10. MORGAGN. *adv.* I. tab. 4. f. 1. TABARRAN *obs.* p. XIX.

(d) KAAUW n. 334. BASTER I. c. Non ergo sunt papillæ productæ ut RUYSCH *thes.* VIII. n. 97. X. n. 3. *advers.* anar. I. n. 3. *fabric. gland.* p. 19.

(e) RUYSCH *Thes.* III. p. 13. *Thes.* VIII. n. 97. KAAUW n. 316. 322. WITHOF p. 374.

(f) BOERHAAVE. In elephanto *Phil. transf.* p. 326. Tantum per 2. lineas continuari WITHOF *diff.* p. 24. Sed etiam in cruce epidermis de pilis decedit, quando vernatus SWAMMERD. *bibl.* p. 36

(g) RUYSCH *Thes.* V. n. 2. &c.

(h) WITHOF p. 375. *diff.* p. 31. Habet MALPIGHIUS p. 93. 94. f. 7. CHIRAC p. 26. 28. 29. MARIOTTE *Mem. avant.* 1699. p. 219. WOLF *Versuche* p. 38.

(i) WITHOF *ibid.* DERHAM *Theol. phys.* L. IV. c. 12. p. 221. HOOKE p. 157. 158. GREW *rat.* 22. in moscho. LEEUWENH. *Ep. physiol.* p. 49. 52. *Anat. & Contempl.* P. II. p. 34. *Phil. transf.* n. 140.

(k) WITHOF p. 376. *diff.* p. 2. LEDERMULLER d. d. MALPIGH. p. 94. f. 6. 9. Vo-eat le Fetus CHIRAC p. 16. seqq. & spirale pingit f.

(l) WITHOF p. 376. *Diff.* p. 2. LEDERMULLER c. MALPIGH. p. 93. CHIRAC. p. 34. SORACI I. c.

(m) CHIRAC p. 19. 34. Nullam facit HOOKE p. 156. in homine, equo, fele. Vacuas sedes habet MALPIGHIUS p. 95. LEEUWENHOECKIUS p. 49. Cavi sunt capilli PANAROLUS *Pentecost.* IV. *obs.* 34.



Pili, certe humani, cylindrici ( $n$ ) sunt, sine conico ( $n^*$ ). Neque nodos ( $o$ ), neque ramos ( $p$ ), neque fissas ( $q$ ) ex apice fibras accuratior industria ( $r$ ) confirmavit.

Crassities diversa est, fere a  $\frac{1}{700}$ . pollicis ad  $\frac{1}{300}$ . ( $s$ ) ( $t$ ). Cl. WIT-  
HOF in pollicis crassitie numerat pilos nigerrimos 572. fuscos 608. pal-  
lidos 790. ( $u$ ), qui adeo reliquis tenuiores sunt.

Extensilitas sicci capilli ut 5. humidus est ut 35 ( $x$ ). Firmitas summa  
est. Eam in filis bombycinis diximus ( $y$ ). In homine conpertum est,  
capillum 2069. grana sustinuisse appensa ( $z$ ) seta equina septies crassior  
grana 7970. ( $a$ ) suspendit. Quatuor in universum semunces WIT-  
HOF ( $a^*$ ). Hominis octennis capillus partes 7812. juvenis annorum 22. p.  
14285. annorum 57. omnino par. 22222. gessit in alio experimento ( $b$ ). In  
alio iisdem annis partes æquales sustentatæ fuerunt 10309. 12967. &  
25000. ( $b^*$ ). A calida insignissime debilitantur, ad decimam sui robo-  
ris partem ( $b^{**}$ ).

Indestructibilis fere natura confirmatur, cum in antiquissimis sepulchris  
conservata repertii sint.

Color est a succo ( $c$ ), qui cellulofam telam internam replet, quam  
medullam vocant. Fetui fere albus est ( $c^*$ ), & albus manet in frigidis, non  
tamen in frigidissimis regionibus. His enim fusci pili sunt ( $d$ ). Inde ad  
50. gra-

( $n$ ) Non bene quadrangularis SPIGELIUS p. 206. Angulosus LIEUTAUD p. 17.

( $n^*$ ) WITHOFF p. 377.

( $o$ ) Habet in insecto BONANNUS ic 107. 108. in homine LEDERMULLER Tab. V. in  
phoca ALBIN. adnot. III. p. 66. crassos & undulatos pilos.

( $p$ ) BIDLOO tab. 4. In acaro ramos habet LEEUWENH. Phil. transf. n. 333.

( $q$ ) In morbis finduntur sicci KAAUW n. 377. LEDERMULLER p. 12. f. 2.

( $r$ ) De nodis WITHOFF p. 377. Flocculi adhærentes sunt a pulvere, vel squama epider-  
midis, aut adipis particulis WITHOFF diff. II. c. 8. Comm. p. 377.

( $s$ ) MUSCHENBROECK l. c.

( $t$ ) ROBINSON Essays of natur Oecon. p. 320. etiam  $\frac{1}{317}$ .  $\frac{1}{350}$ .

( $u$ ) p. 379.

( $x$ ) ROBINSON p. 296.

( $y$ ) L. XI.

( $z$ ) MUSCHENBROECK de coar. corp. firm. p. 521. Erat 57es. crassior filo bombycino.

( $a$ ) p. 522.

( $a^*$ ) Comm. p. 380.

( $b$ ) ROBINSON ibid. p. 320.

( $b^*$ ) IDEM p. 319.

( $b^{**}$ ) IDEM p. 297.

( $c$ ) WITHOFF p. 376.

( $c^*$ ) Habet etiam ROEDERER l. c.

( $d$ ) p. 24. & crassi HARMENS med. Lap.



50. gradum olim certe capilli fulvi erant frequentissimi. Fulvi erant Germani, Burgundiones. Quo calidiores terræ sunt, eo frequentius capilli pilique nigri reperiuntur, folique supersunt in æthiopibus, præter albos illos, quibus pariter fere lactei sunt (*d*\*). Creditur phlegmaticos crudosque succos albos pilos facere; cholicum temperamentum (*e*) rufos (*f*); calidum & sanguineum nigros. Virides (*g*) in cupri fodinis (*h*) reperti fuerunt.

In senibus, omnibus in regionibus, pili canescunt, cum solus nunc epidermidis color supersit (*h*\*), exhausta medulla, a qua color erat. Una fere pellucet (*i*), ad albi vitri modum. Bulbos etiam minores esse ajunt. Subito aliquos a terrore canuisse multi auctores sunt (*k*), vehementer tamen improbabilis est historia (*l*). A morbis utique crediderim (*l*\*), sed lente (*m*) canitiem obrepere. In leporibus, & cuniculis quando colorem hieme mutare videntur & exalbescere (*n*), vel fusci unice pili albis misti numero minuuntur (*o*), vel apices soli albescunt (*o*\*).

Recti sunt capilli regionum borealium, crispi in meridionalibus (*p*), & plerumque in pube. Contra lana ovium crispa in frigidis, in calidis regionibus longa fit & rara (*q*).

E 3

Incre-

(*d*\*) Flavos tamen ad 14. gradus ab æquatore in Polynesia memorat auctor *Voy. des terr. austr.* p. 364.

(*e*) GALENUS *art. medic.* &c. A bile color capillorum ANDRY *orthoped.* II. p. 17.

(*f*) Medulla in rufis cruenta CHIRAC p. 18. Rufi difficiliter sanantur DESAULT *malad. Vener.* p. 224. Conf. *de ruforum sanguine* L. V.

(*g*) HARNISCH *Gedanken über das küpferne und eiserne Geschirr.* BARTHOLINI *Cent.* I. h. 40. BLANCAARD *Jaarregist.* C. I. n. 86.

(*h*) HARNISCH *ibid.* BARTHOLIN.

(*h*\*) Inanes & cavi GRIENDL. *microsc.* f. 6.

(*i*) Conf. POWER *obs.* 50. WITHOF *diff.* p. 18. 26. GLISSON p. 58.

(*k*) BOYLE *util. phil. exper.* p. 354. BORELL. *hist.* 26. *Cent.* I. *Miscell. Berol. Cent.* II. MARCELL. DONAT. L. I. c. I. *Bresl. Saml.* 1724. p. 420. T. BARTHOLIN in C. p. 243. *Fränk. Anmerk.* IV. p. 465. TURNER *diseases of the skin* p. 164. 165. TARDINUS *de pilis* p. 246. RUMLER *obs.* 63. RASZINSKI T. II. p. 338. 455.

(*l*) Rejicit BLONDEL *power of imag.* p. 164.

(*l*\*) Ex medicamento vehentissimo pili nigri subito in fulvos mutati *Journ. de Trévoux* 1703. m. Jul.

(*m*) HALLARY *Barbad.* p. 342. ARIST. *hist.* III. c. XI.

(*n*) PAULIN *lagogr.* p. 41. *Phil. transf.* n. 337 465. DIEREVILLE *acadie* p. 93. RAI *topogr.* p. 335. WALLIN *de hirund. alb.* p. 7. BOYLE *col'd.* p. 212.

(*o*) BUFFON *hist. nat.* T. VII. p. 244.

(*o*\*) De cuniculis in *sinu Hudsonis* ELLIS p. 176. de leporibus E. N. C. app. vol. X. p. 475.

(*p*) Cincinnati Guineenses DAMPIER T. III. p. 205. In nova Hollandia *Voy. des terr. austr.* T. II. p. 84.

(*q*) ADANSON *relat.* p. 37.



Incrementum pilorum perpetuum est. Fetui, & puero barbæ pili pubisque, & pubis in puella, sub cute in adipe latent ( $q^*$ ), & suo tempore erumpunt, hi fere duriores. A morte increvisse passim legas ( $r$ ). Si veri quid subest, a retracta cute longiores crediderim exstare.

Resecti perinde recrescunt ut epidermis, ut in facie intra septem dies fere ad lineam ( $s$ ) increvant ( $s^*$ ), totique demum non longo tempore renascuntur. Cum cutis avulsa fuisset, una & ipsi capilli redierunt ( $t$ ). Sponte delabuntur senibus, & quibusdam vel familiis ( $u$ ), vel gentibus ( $x$ ). Copiosissimi sunt in capite ( $y$ ) & longissimi ( $z$ ), tum in tota cute cranium operiente, fronte excepta & temporum parte: tum in viri facie infra eminens os malæ, mentique.

In brutis animalibus calidis in regionibus parci, abundant in frigidis ( $z^*$ ). Canes nostri in africanam translati calvefcunt.

Causa & materies incrementi est procul dubio a medulla, quæ suas per causas ex bulbo ( $a$ ) sequitur in capillum, perque ejus spongiosam naturam adscendit ( $b$ ).

Num perspirent alias inquiretur. Nimium incrementum ( $c$ ), & fere incredibile, & crassitiem auctam ( $d$ ), ex morbo habent, *plicam* vocant, Poloniæ ( $e$ ) indigenam. Una ajunt sanguine ( $f$ ) succoque multo repleti. Sunt

( $q^*$ ) De lanugine LANGGUTH *pilus pars non ignob.*

( $r$ ) *Isag. anat.* c. 43. KIRKPATRIK *de putred.* p. 26. De barba Sat. *phil.* III. n. 4.

( $s$ ) Die 81. capilli reparantur KRAFT *Comm. Acad. Petr. nov.* T. II. p. 242. Supercilia ne intra duos annos quidem renascuntur LANGGUTH.

( $s^*$ ) Ad 4. pollices in anno WITHOF p. 378.

( $t$ ) BARTHOLIN *Cent.* III. *hist.* 76. In cicatrice tamen nulli, DUVERNEY *mal. des os* T. II. p. 429.

( $u$ ) Patricia nobis gens est, cui, etiam in feminarum de ea gente filiis & nepotibus, calvities præmatura supervenit.

( $x$ ) Myconiata 20. 25. anno calvi TOURNEFORT *Voy. au Lev.* T. I. p. 333.

( $y$ ) Rationes habet Cl. WITHOF p. 378. ut sint in pollicis quarta parte quadrata in vertice capilli 293. in occipite 225. in sincipite 211. in mento 39. in pube 34. in brachio 23. &c.

( $z$ ) Duas ulnas longi WITHOF p. 378. Ad quatuor ulnas crescunt in Fakiris FRYE *Travels* p. 102. & in principe Tunguso IDES *reis.* p. 92. Longissima & ponderosissima coma sacrificulis mexicanis erat a COSTA *hist. nat.* L. V. c. 26.

( $z^*$ ) *Saml. der Reisen* T. 17. p. 270.

( $a$ ) CHIRAC p. 20. SORACI l. c.

( $b$ ) MALPIGHIIUS p. 95.

( $c$ ) Ad sex pedes JACOBÆUS p. 2. Ad quatuor ulnas *Phil. transf.* n. 417. 426.

( $d$ ) In equis TARGIONI *viag.* T. IV. p. 2. Plica valde immunda tonsione sanata TRIOEN *obs.*

( $e$ ) In germania visa GOEKEL *Cent.* II. conf. 16. & Jona LUDOLF *de plica.* n. 5. p. 6. In sicilia de CASTRO *mul. morb.* p. 68. In Alatia *Journ. de med.* 1761. Oct.

( $f$ ) Sectam sanguinem fundere GLISSON p. 38. 39. ed. Belg.



Sunt tamen non pauci Clari auctores, qui eum morbum totum ad fordes & immunditiem referunt (*g*); negant alii (*h*), neque propria principia habeo, ex quibus definiam.

Sensu nullo sunt; etiamsi enim cum dolore evelluntur, ut etiam gravissima mala ab evulsis vibrissis sequi visa sint (*i*), non tamen pilorum nervi fuerunt, qui doluerunt; sed crassi bulbi, dum per cutem sequi nequeunt, resistunt, cutisque adtrahitur. Epidermidis etiam vagina adtracta fuit, ut cutis cum dolore elevetur.

Denique pili igne explorati ea fere elementa suppeditant, quæ aliæ corporis humani partes, ut tamen minus aquæ, & plurimum salis habeant. Ex una libra (*k*) capillorum humanorum habuit NEUMAN-  
NUS (*l*) spiritus urinosi drachmas 46. salis volatilis drachmas 17. (*l*\*), olei drachmas 30. capitis mortui drachmas 35. in quo erant salis fixi grana 21. aquæ adeo copiam parcissimam.

Sericum, pilis valde adfines (*m*), dedit ex eadem copia spiritus urinosi drachmas 34. olei empyreumatici unciam unam; salis volatilis drachmas 30. salis fixi drachmas duas.

Quare & sericum & pili salis volatilis sui copia cornua & ossa separant. Sericum enim ex unciis 15. dedit drachmas 18. cornu cervinum non supra drachmas quatuor cum dimidia (*n*). Olim AVICENNA plus aquæ ex ossibus produisse monuit, quam ex capillis. Capilli humani demum serico ipso plus habent salis volatilis & spiritus.

Quare guttas suas, quæ dudum arcanæ *anglicarum* nomine venerunt, a Rege Carolo II. redemptas, J. GODARDUS ex serico crudo parabat (*o*). Eas ex pilis facillimum foret parare.

## §. XX. Folliculi & sinus pingues.

Tota cutis cum ficcitatem omnino non ferat, non uno genere unguinis undique irroratur. Muci primum fontes in piscibus Cl. viri reperiunt,

(*g*) DAVISSON *Journ. des sav.* 1688. n. 3.

(*h*) Negant alii esse a sordibus *Phil. transf.* n. 483. RASCYNSKI T. I. p. 378.

(*i*) STALPART van der WIEL *Cent.* II. n. 7.

(*k*) Oportet libram esse 18. unc.

(*l*) T. III. p. 760.

(*l*\*) Ex ejusmodi sale cum cupro ens veneris obtineri RONCALLUS *Europ. Med.* p. 434.

(*m*) Ibid.

(*n*) *Mem. de l'Acad.* 1700. p. 72.

(*o*) LISTER *trav. to Paris* p. 243.



runt, ut quo eorum animalium cutis contra aquæ vim macerantem defendatur. Ea in cetis quidem abundantissima, per cellulosa spatia effuso, & per proprios poros (*p*) transudante oleo obungitur, atque adeo glutinosa fit, ut vix super eam stari possit (*q*). In lumbricis similes sunt pori (*r*).

In aliis piscibus glandulæ (*s*) subcutaneæ sunt, simplices aliæ; aliæ compositæ (*t*), quæ per proprios ductus & conspicua foramina (*u*) mucum suum super cutem effundunt. Ejusmodi ductus aliquando longi & ramosi (*x*) prius sub cute oberrant, quam per ejus poros aperiuntur. In cane carcharia inania cava subesse legimus (*x*<sup>\*</sup>).

In lacertis (*y*), ranisque (*z*), sed in illis evidentiores sunt in principio femoris pori, per quos ex glandula simplici visceris aliquid exprimitur, lactis in rubetis (*a*), inque salamandris (*b*) simile. Muciferæ in cochleis (*c*) glandulæ sub cute abundant, quo mucos cutis se obducit, dum se recondit (*c*<sup>\*</sup>).

Porro in homine pro partium inungendarum diversitate alii & alii, visceris tamen omnes succi, cutem perungunt, & primum liquor oleosus, inflammabilis (*d*), blandus (*e*), & lentus nascitur, in folliculis membrana-

(*p*) LEEUWENHOECK *Phil. transf.* n. 334.

(*q*) MARTENS *Reise nach Spitzberg.* p. 103. 117.

(*r*) DERHAM *Theol. phys.* L. IV. c. 4. TYSON *Phil. transf.* n. 147.

(*s*) In squatina COLLINS p. 51. PECHLIN *aer. & alim. defect.* p. 473.

(*t*) LORENZINUS p. 15.

(*u*) STENONIUS *hist. pisc. ex can. genere* p. 112. *Rajæ anat.* p. 42. 43. COLLINS l. c. MURALT p. 363. PECHLIN *aer. & alim. defect.* FEUILLET T. 2. in carcharia *Piscis Sanger* plurimo mucos per cutem exsudante aquam inspissat KALM *Amer. Reis.* T. I. p. 118. 119.

(*x*) CALDESI *tab. 2 f. 1.* p. 5. 6. 14. 15. MALPIGH. *posth.* p. 25. PERRAULT *Ess. de phys.* T. III. p. 286 *tab. 20. f. 2.* Lymphaticum succum & vasa vasculosa in mustela fluviali vocant E. N. C. *Dec. II ann. 1. obs.* 46. GERING. F. G. In Lucio ramosos etiam ductus habent *Act. Erud.* 1687. p. 160. seqq. & GERING. In raja, in multos vasculos divisos. M. S. ROBERGIANA.

(*x*<sup>\*</sup>) FEUILLET t. 2.

(*y*) VALISNER T. II. p. 432.

(*z*) SWAMMERDAM p. 834. Duodenæ PEYER *exerc. anat.* p. 162.

(*a*) RÖSEL *van. Sect. VII.* Fætor est singulari p. 108.

(*b*) PARISINI in *anat.* VALISNERI T. III. p. 449. LISTER *humor.* p. 362. *Phil. transf.* n. 20. MAUPERTUIS *Mem. de l'Acad.* 1727. Eo succo creditæ sunt extinguere ignem BLANCAARD *Jaarreg. C.* VI. n. 80. VALISNERI T. II. p. 449. 450. si parvus ignis sit. Humore obducuntur exsudante JACOBÆUS *de ran.* p. 113. Salamandra GAECKO ichorem flavum fætidum, funestiarum virium exsudat BONTIUS L. IV.

(*c*) SWAMMERDAM *bibli.* p. 101. 113. 162. REDI *anim. viv.* p. 24.

(*c*<sup>\*</sup>) SWAMMERDAM p. 111. 121.

(*d*) BOERHAAVE *de fabr. gland.* p. 8. *Præl.* T. III. p. 552.

(*e*) KAAUW n. 219. MORGAGN. *adver.* IV. p. 59.



branaceis (f) rotundis, simplicibus capillatæ cutis capitis, & per longos ductus (g), atque cutis porum effunditur (h).

In ejusmodi cryptam arteriæ undique aperiuntur (i), succus autem oleosus de ea pressa effluit, & ipsos capillos oblinat (k), inque aere in squamas siccatur. Similem fere succum butyraceum glandulæ convexæ auriculæ sudant (l), & eo & ceruminosas refero, atque alarum glandulas (m): harum grandes sunt pori.

Deinde, præter capillos aliud (m\*) unguen lentius, ficius, album, pastaceum (n) in vermiculos figurabile (o) nascitur ex glandulis, plerisque simplicibus, aliquando tamen compositis (p) sub oculis (q), in genis (r), labiis (s), naso (t), naribus (u), auribus externis (u\*), cervice (x), dorso (x\*), areola mammæ (y), anique (z), clunibus-  
que

(f) COWPER ad t. 5. f. 1. BOERHAAVE p. 7. 8. 11. RUYSCH *adv.* I. n. 3. p. 12 KAAUW n. 217.

(g) KAAUW n. 218. 220. 222.

(h) BOERHAAVE l. c.

(i) KAAUW n. 218.

(k) IDEM n. 224.

(l) BOERHAAVE p. 8.

(m) COWPER ad t. 4. f. 6.

(m\*) LUDWIG *humor. cut. inung.* n. 15.

(n) BOERHAAVE p. 8.

(o) KAAUW n. 230 231. VALISNERI contra ANDRY p. 215. BOERHAAVE *Prol.* T. IV. p. 512. & *de fabr. gland.* p. 9. &c. Huc pili ex materie moschata facti *Mem. de l'Acad.* 1728. p. 411. Nihil aliud crinones esse CHUDEN *atroph. infant.* n. 10. cum quo satis consentit LYONNET *theol. des insect.* p. 214. Habet tamen diversos, rotundos, cum cauda prælonga vermiculos ANONYMUS in *Act. Erud. Dec. I. num. I.* p. 317.

(p) MORG. *Eist.* III. n. 4. BOERH. p. 8. MALPIGH. *posth.* p. 95. t. 16. f. 10.

(q) BOERHAAVE p. 9. MORG. *advers.* I. p. 9.

(r) MALPIGH. l. c. MORG. ib.

(s) MORGAGN. *adv.* I. p. 11.

(t) Pori majores & minores RUYSCH *Thef.* V. n. 92. *Thef.* I. aff. 2. n. 46. MORG. l. c. p. 9.

(u) VALSALV. *de aure hum.* c. 1.

(u\*) MORG. *adv.* I. p. 9.

(x) MORG. I. p. 11.

(x\*) KAAUW n. 92.

(y) MORG. I. p. 11. tab. 4. f. 2. KAAUW n. 235.

(z) MORG. I. p. 11. FANTON.



que (a), in perinæo (b) & umbilici area (c), in nymphis (d), & vicini pudendi labiis (e), in scroto (f), pube (g), forte & in pene (h), & clitoridis corona (i) ad genua (i\*), scapulas (k) & ubique forte demum, si plantas pedum, manuum volas, digitorum pulpam exceperis (l).

Reperiuntur autem ubique, ubi plica aliqua, vel ejus membri officium, frictionem (m) necessario requirit: sæpe ubi humor acris (n) teneram cutem contingit: demum ubi eadem aeri exponitur (o).

Has glandulas omnes in una classe numero, etsi aliquarum succus paulo potest mollior esse. Certe album unguen solidum clitoridis & penis summam cum sebo reliqui corporis, & mammarum unguine habet similitudinem.

### §. XXI. *Glandulæ sudoriferae.*

Hæ, quas diximus, glandulæ oculorum ipsorum confirmantur. Verum absque eo testimonio Cl. viri *Nicolaus STENONIUS* (p), & *MALPIGHII* (q), utque solet fieri, alii magnorum virorum sectatores omni in corporis ambitu glandulas receperunt, per quas ipsas sudor secerneretur, in adiposa membrana positas, arteriis, venis, nervisque præditas (r), osculo exiguo apertas (r\*); cui, ne quid deesset, valvulam præfixerunt, a *CONTULO* (s), & *MANGETO* (t) ita depictam, ut per eam se pedicu-

(a) MORG. I. p. 11. KAAUW n. 92.

(b) MORG. Ibid.

(c) Ibid.

(d) BOERHAAVE p. 12. MORG. adv. I. p. 8. tab. IV. p. 56.

(e) MORG. I. p. 11. BOERHAAVE p. 12.

(f) MORG. I. p. 11.

(g) Ibid.

(h) COWPER t. 48. f. 1. MORG. I. p. 7. 8. tab. 4. f. 4.

(i) MORG. I. p. 11.

(i\*) MORG.

(k) Id. ibid.

(l) KAAUW n. 232. Paulum forte nimis liberaliter. Ubique *Physiol. Amst.* p. 426. 427.

(m) In glande penis, mamma, in plica inguinis alæque, & poplite.

(n) In glande etiam penis, circa clitoridem nymphas, anum.

(o) In facie

(p) *Epist. ad BARTHOLIN.* Cent. III. n. 65. *anat. Raja* p. 42.

(q) *De ext. tact. org.* p. 38. 39.

(r) MALPIGH. ib. p. 39.

(r\*) Tubuli sudoriferi in æthiope conspicui *PECHLIN nigr. ath.* p. 86.

(s) *Tr. de lapidibus, podagra &c.* ex conjectura.

(t) *Theatr. anat.* T. 25.



pediculus libere moveret, utque adeo oculos nullo modo fugere possent (*t*\*). Numerosa est Cl. virorum series, qui ejusmodi sudoriferas glandulas adoptarunt (*u*).

Video universam cutem sordescere; & cutem ubique inungi est necesse; suntque aliqua vestigia harum glandularum passim in corpore humano subinde visa, ut particulæ aciniformes in humana (*x*) cute, glandulæ in cute elephanti (*y*), in hominibus tabidis (*z*), aut hydropicis (*z*\*), aut in frigore magis conspicuæ (*a*), alibique in humanis corporibus (*a*\*). Nondum tamen satis est experimentorum, ut in tota cute admittas. Nam & sudoris manifesto alii fontes sunt (*b*): & sordes exhalans pinguedo (*c*) abunde generat, & non facile sunt admittendæ corporis humani partes, quas sensus nostri non ostendunt (*d*).

Non ideo crediderim, papillas (*e*) fuisse, quas Cl. viri viderunt, a quibus dissentimus. Potuerunt glandulas sebaceas vidisse, quæ in parte magna cutis humanæ reperiuntur, easque transtulisse ad universum corpus. Potuerunt vitiose collectam materiem in folliculo pingui vidisse, quale in suis grandinum vitium est.

§. XXII. *Pinguedinis perspiratio.*

Non per solos conspicuos & organicos ductus humores tenues & calidi penetrant. Cutis hominis, & animalis, & calidæ aquæ (*f*), & calidi

F 2

olei

(*t*\*) Refutat eas valvulas WINSLOW n. 46.

(*u*) LITTRE *hist. de l'Acad.* 1702. p. 40. DUVERNEY in *Zod. Gall.* p. 208. 212. COWPER ad t. 4. f. 6. VERHEYEN L. II. p. 134. BERGER p. 184. LISTER *de hum.* p. 376. ESCHENBACH *anat.* p. 322. 327. PERRAULT *Ess.* T. III. p. 284.

(*x*.) RUYSCH *Thef. max.* n. 99.

(*y*) MOULINS p. 12.

(*z*) BOHN l. c. p. 208.

(*z*\*) DRELLINCOURT apud PESCHELIN *de purg.* p. 472.

(*a*) FERREIN apud RAMSPERK *specim.* p. 23. in foveis positas, & ductu suo cutem perforantes.

(*a*\*) STÄMELIN *Spec. Anat. Botan.* ad annum 1721.

(*b*) p. 45.

(*c*) p. 44.

(*d*) Rejicit etiam Cl. LUDWIGIUS *de humor. cut. inung.* p. 12. 16. 17. HEISTER *Comp.* T. II. n. 35. 36. FLURANT *splanchnol.* I. p. 107. RAYMOND *mal. qu'il est danger. de guerir* p. 71.

(*e*) RUYSCH ad BOERHAAVE. p. 53. 58. 59. RAYMOND l. c. p. 71. 75. Contra cum MORG. *Epist.* III. p. 5.

(*f*) SENAC *Essays de phys.* p. 194.



olei lentam mobilitatem male coerces. De cetis diximus (*f*<sup>\*</sup>): homini perinde de adipe subcutaneo pars (*g*) aliqua ex cute penetrat, variis quidem modis. Nam & pilum cingit (*h*), cumque eo exit, per idem foramen, pilumque obungit (*i*). Eadem facilius cutem penetrat, & in tubercula coacervatur, quæ in foveolas cutis subeunt (*i*<sup>\*</sup>). Hoc oleum facit, ut pili omnium animalium aquam repellant (*i*<sup>\*\*</sup>).

Alibi etiam in facie passim pori (*k*) sunt, neque ii exigui, & adprime conspicui, qui non in aliquam sibi propriam glandulam ducunt, sed in subcutaneum adipem, quem fluidum transmittunt. Apparent circa nasum (*l*), in genu, in collo (*m*). In cuticula post mortem adeps sibi viam aperit, & flocculos facit (*n*), qui epidermidi adhærent. Id oleum est, quod LEEUWENHOECKIUS (*o*) descripsit, & PRÆCEPTOR noster BOERHAAVIUS (*p*), ut tamen ab oleo folliculoso non valde distingueret. Per eosdem poros dicemus suo loco, aquam subcutaneam dissipari.

Denique ipsos pilos exhalare (*q*) non pauci scriptores persuadentur, & foramina etiam producunt, per quæ medulla exsudat. Certe, etsi vias ignoremus, necesse est tamen, medullam, quæ continuo nova succedit, aliquem sui finem facere, & exsudare quidem, quando incrementum pili requirit. Exhalare materiam electricam, quæ scintillat crepitatque, multa experimenta confirmant, vel sponte nata (*r*), vel ex arte (*s*).

## §. XXIII.

(*f*<sup>\*</sup>) p. 40.

(*g*) RUYSCH *Epist.* p. 55. 56.

(*h*) LUDWIG n. 13. p. 18.

(*i*) IDEM n. 15. p. 20.

(*i*<sup>\*</sup>) LUDWIG l. c. n. 12. p. 17.

(*i*<sup>\*\*</sup>) MUSCHENBROECK *Essays* p. 343.

(*k*) KAAUW n. 299. 303.

(*l*) Id. ibid.

(*m*) In æthiope manifesti PACHLIN *nigred. æth.* p. 86.

(*n*) TREW *Com. Nov.* 1743. hebdom. 31.

(*o*) *Epist. phys.* p. 405. 406. 407. *Anat. & cont.* p. 197.

(*p*) BOERHAAVE *Præl.* T. III. p. 519. 551. *epist.* ad RUYSCH p. 55. KAAUW n. 299. 300. 302. 303. Hinc facies absterfa nitet HELMONT *paradox discours. en man.* II. p. 93.

(*q*) POZZI l. c. p. 53. in seta porcina. Animalia pilosa minus fecunda esse BUFFONUS suspicatur, quod plus per pilos perspirent T. II. p. 310. Sed insecta plurima & pilosa sunt, & fecundissima.

(*r*) *Epist.* ad WORMIUM p. 720. JALLABERT p. 52. 53. HELMONT l. c. *Epb. Nat. Cur.* Vol V. obs. 9. BOREEL. *Cent.* II. obs. 69. *Cent.* IV. obs. 43. Ex equorum crinibus NOLLET *phys. exper.* T. V. p. 36. Sed confirm. n. VI.

(*s*) JALLABERT p. 51.



§. XXIII. *Vasa sudorifera.*

In certis vitæ humanæ conditionibus epidermis undique humore madefcit, qui per poros plerumque inconspicuos epidermidis penetrat.

Per arterias eum humorem in cutis poros venire certum est (*t*), quod vascula a cute in epidermidem euntia, ligamentorum (*t*<sup>\*</sup>) modo utramque membranam obnubentium, abrumpantur, dum epidermis avellitur. Ductus aquosos a cute in cuticulam (*u*) ducentes sperabat se invenisse *Godofredus BIDLOO*. Eos non admisit editor *COWPERUS*, neque nuper conspicui fuerunt. Sed arteriosam sudoris originem confirmat imprimis experimentum constans & facile. In cujuscunque (*x*) artus arteriam, aut in aortæ truncum hominis junioris injicitur aqua, aut gluten piscium in vini spiritu solutum, & vivida cocci Mexicani purpura tinctum. Non facile fallit, quin per cutem (*y*) fere universam latæ vesicæ (*z*) oboriantur, in quibus ipsum tinctum (*a*) gluten est, quod undique de cute sudavit, & procul dubio sibi in epidermide respondentes poros (*b*) cum a morte strictiores inveniret, repulsum sub cuticulam se effudit. Angustæ enim viæ sunt, & in ipsa æthiopis epidermide non pori omnino, sed unice tenuiores (*c*), & pene pellucidæ regiones adparent. Sed epidermis a liquoribus facile penetratur (*d*). Adeps satis promte eam viam sequitur: etiam sebum (*e*), frequenter quidem decolor, aliquando tamen retento colore (*f*), quem admiscueris.

Hunc verum (*g*) sudoris fontem esse persuadeor, quod in toto corpore humano fistulæ arteriosæ sint, quæ liquorem exsudant, uti per totum corpus sudor exit: glandulæ vero certas ad sedes & regiones corporis sint restrictæ: quod sudor non sit perpetuus, & in multis mortalibus qua-

F 3

lem

(*t*) *KAAUW* n. 85. 86. *KEIL abridgm.* p. 11.

(*t*<sup>\*</sup>) *GUNZ de humor.* p. 180.

(*u*) T. 4. f. 6.

(*x*) In facie *COSCHWITZ de valv. ureter.* p. 22.

(*y*) Ubique *KAAUW* n. 97.

(*z*) Conf. *MERKEL Mem. de l'Acad. de Berl.* T. 13. p. 67.

(*a*) *KAAUW* n. 96.

(*b*) Inorganicos *MERKEL l. c.* p. 67.

(*c*) *MERKEL l. c.* p. 63.

(*d*) *IDEM* p. 68. In arboribus foraminulis patet *du HAMMEL phys. des arbr.* l. p. 9.

(*e*) *RUYSCH* apud *BOERHAAVE de fabric. gland.* p. 6.

(*f*) *ALBIN.* apud *KAAUW* n. 66 ap. *HINZE l. c.* n. 18.

(*g*) Non ex glandulis *GUNZ hum.* l. c.



lem ( *b* ) coram video feminam, rarissimus, cujusmodi in exemplis in in-  
mensum necesse esset glandulas tumere, quæ sudoris officinæ esse credun-  
tur, tot mensibus non inanitas: quod sudor denique fluidior sit, & aquo-  
sus magis, quam id omne unguinis genus, quo cutis oblinitur.

Non repugno adeo, quin materies sudoris, quando ad partem aliquam  
corporis uberius confluit, etiam in glandulas illas deponatur, & per ea-  
rum ductus excretorios prodeat. Deinde oleum illud, quod modo dixi-  
mus per cutem exsudare, cum vero sudore confundi, eumque tingere  
potest, & colore suo, & viscedine, & odore fætido, quem in alis, &  
inguinibus facile contrahit, ubi plus est harum glandularum.

## S E C T I O I I.

### S U D O R. E X H A L A T I O. I N H A L A T I O.

#### §. I. *Sudor in universum.*

**O**rgana hætenus descripsimus, sequuntur, quæ per alia experimenta  
potius cognoscimus. *Sudor* est conspicua humoris per integræ cu-  
tis poros eruptio.

*Sudamus*, non semper tamen, neque omnes. Inter animalia sunt, fer-  
vida cæterum, quæ nunquam sudant, canes ( *a* ) avesque ( *b* ), neque ra-  
tio hujus discriminis nota est. Guttulæ minimæ de cute manant, quæ  
cum sui similibus conjunctæ, continuo in majores confluant. Homo su-  
dat, quando supra mediocritatem concaluit. Hinc in iis regionibus, in  
quibus cælum æstuosius est, sudor etiam est perpetuus ( *c* ). Sudor per-  
fusissimus

( *b* ) Homo, qui omnino non sudabat, & ne sexto quidem aut septimo anno indusium  
mutabat BLANCAARD *Jaarreg. Cent.* I. n. 19. Ex morbo cutaneo nullus sudor CUR-  
ZIO *discussione* p. IX.

( *a* ) HARVEI *gener.* p. 282. BIRCH T. III. p. 341. MORTON *natural. hist. of*  
*Northamptonsh.* p. 473. MEAD *of poisons* p. 138. HEUCHER *oper.* p. 470. DUNTZE.  
*exper. circa calor.* BARICELL. *hydronos. natur.* p. 62. Parum sudare FLOYER *pul-*  
*sematch* T. II. p. 348. Etiam feles sudare negant HARVEI l. c. MORTON l. c. HEU-  
CHER. Sed Cl. noster DUNTZE *de calor. &c.* p. 30. utique sudare testatur.

( *b* ) BARICELLUS l. c. p. 63.

( *c* ) LIGON. p. 107. *Phil. transf.* n. 27. Feminarum Cutis inde perpetuo viscida LIGON. ib.



fusissimus, dum sub tropicis iter fit, guttis maximis (*c\**). Sudamus vero utcumque is calor natus fit, ex balnei colore (*d*); ex corporis exercitatione; ex nixu, ut in parientibus; ex studio ipso animi intensiori; ex animi adfectu vehementiori; a potu calido; a cibo nimio; ex dolore (*d\**); ex anxietate; ex febre; demum a relaxatione nimia pororum; ex metu, animi deliquio (*e*), quo forte sudorem a morte referas (*f*).

Non facile dicitur, quo in calore sudemus. Vidi cum summa celeritate pulsus ad 136. nullum fuisse, & notissimi sunt Clinicis æstus illi sicci, qui in principio febrium, & peculiarium paroxysmorum molestissimi, multum levantur, quam primum sudor supervenit. Nullum fuisse sudorem cum calore 108°. fahr. cum 102°. (*g*) vero erupisse, auctor est amicus noster, quem nuper amisimus, vir acris ingenii J. *Fridericus* SCHREIBER (*h*). Gradu 100. in quartana febre sudabat alius (*i*). In balneo 34°. REAUMURI. calcente (*k*) pulsu vix aucto sudor manavit.

Multum vero, ut jectigatio sudorem impedit, ita quies perfecta adductis sub stragulis artubus (*l*) eum promovet. Causam interim præripimus. Transpiratio nempe circa quietum & curvum corpus collecta cutem emollit, ut facilius cedat exhalanti madori. Hic forte sudor voluntarius *Oli-gerii* PAULI (*m*). In summo æstu, sed cum vento sicco, non sudabat Cl. ADANSONUS (*n*). Æstate squalida in febribus sudor nullus, supervenientibus demum imbribus succedit (*o*).

Non rarum est aliquam partem corporis solam sudare, ut frontem, alas, inguen.

In

(*c\**) *Phil. transf.* n. 27. 37. ZUCCHELLI *relaz. di Congo* p. 70.

(*d*) Blandissimus in Balneo Cæsaris le MONNIER *voyag.* p. CLXXXVIII. De balneis montis aurei *Mem. de 1744.* p. 167.

(*d\**) In tortura LABAT *Voy. d'Ital.* T. VII. p. 6.

(*e*) HALES *hamust.* p. 7. in equo ex hæmorrhagia pereunte.

(*f*) BADI *Anastasis cort. Peruv.* p. 58. De KIRCHIO celebri astronomo similia vulgo legimus.

(*g*) SCHWENKE p. 56.

(*h*) *De peste* ed. nuper. p. 83.

(*i*) SCHWENKE p. 100.

(*k*) Le MONNIER *Mem. de l'Acad.* 1747.

(*l*) DOMERGE *moyen de conserver la santé*; addit oportere ventrem inflare.

(*m*) *Act. Hafn. Ann.* IV. obs. 82.

(*n*) *Relat.* p. 162.

(*o*) GALEN. *Com. ad Prognost.* III. p. 4.



In uno etiam & solo latere sudor non est infrequens, mihiq̃ sæpe cum dextrum latus sudaret, nondum perspirabat sinistrum. In dextra gena sudor (*p*).

## §. II. Sudoris materies.

Sudor sani hominis, & nitide se habentis, fere aquosus est, colore minus quam aqua pellucido, neque tamen aliter lintea tingente, quam aqua solet; fluidus idem, viscidulus tamen, inodorus, sapore subsalfo (*q*), pariter imprægnatus materie electrica (*r*). Globulos in eo vidit LEEUWENHOECKIUS (*s*).

Analyses chemicæ paucæ sunt, dat tamen elementa lotio analoga (*t*), nisi quod minus habet acrimoniæ (*t*\*). Alcalescentem vidit PETITUS (*u*).

Varie autem idem sudor mutatur. Frequens est admisceri & sebum, & oleum folliculorum & pororum, quos diximus (*x*). Ab illo albet, flavet (*y*) ab isto. Viridem (*z*), cæruleum (*a*), nigrum (*b*) passim historiæ medicæ referunt. Odorem, & eum ingratum, multa excitant; & ipsa natio. Dantur enim gentes fætidæ sudoris, ut Æthiopes occidentales (*c*), & Judæi.

Præterea, sordida vita & aliqua peculiaris insalubris humoris excretio fætorem facit in pedibus, inque toto corpore multorum hominum. Solet tunc cum bono effectū conjungi, & cum periculo supprimi (*d*).  
Fæto-

(*p*) MARCELL. DONAT p. 21. HARTMANN *sudor unius later.* p. 37. *Hist. de l'Acad.* 1740. p. 1. sed hic a destructa epidermide.

(*q*) THEOPHRASTUS *de sudorib.*

(*r*) Lucidus cum colore phosphorico in homine sano HENKEL *kleine Schriften.*

(*s*) *Phil. transf.* n. 106.

(*t*) Analogum fecit RAYMOND l. c. p. 80. BOHN p. 204. Sudor tenuis urina LISTER *hum.* p. 376.

(*t*\*) TACHEN *hippocr. Chem.* p. XII.

(*u*) Ut violarum syrupus inde viridesceret *Epist.* II. p. 31.

(*x*) p. 44.

(*y*) Tingens indusia croceus III. VAECARENGHI *Med. Rat.* p. 274. In febre HIL-  
DAN. VI. p. 77 Luteus a Rheo BARTHOE. *Cent.* IV. *hist.* 62.

(*z*) BOERHAAV. *præ. med.* p. 285.

(*a*) LOWENI *Vindic. Willis.* p. 62. EDM. MERRA p. 93 In hypochondriaco E. N. C.  
*Dec.* I. ann. 6. 7. *obs.* 67.

(*b*) ZACUT l. III. *obs.* 76. BARTHOLIN. *Act. Hafn.* I. p. 155.

(*c*) PYRARD. *Voyag.* T. II. p. 38. le PAGE *de la LOUISIANE* T. I. p. 343. Non omnes tamen, neque nigerrimi ex gente gallofforum IDEM p. 344.

(*d*) Inde glandularum tumores, febres MADAI *von Wechselfiebern* p. 76. RAYMOND  
*sudor pedum cum fluore albo alternans* E. N. C. *Vol.* VIII. *obs.* 38.



Fætorem in alis, in inguinibus, sebum admistum addit. Cibus multum potest: nam allia, & cepe aliique cibi una & visceri & odorati sudorem inficiunt: etiam hædina caro, ex veteri aut historia, aut fabella (e), & vinum (f), & guajacum (g) & oleum olivarum (h), & cerevisia (i), & decocta (i\*) cumque herbis medicata aqua, & opium (i\*\*).

Porro acidi cibi copia, & lente nata acidi humoris abundantia, ipsum sudorem acido (k) odore inficit, inque lentis nonnullis morbis (l).

Singularem fracedinem, a clinico medico distinguendam, spirat in variolis, in miliari morbo (m), in podagra (n), in peste demum (o), inque petechiis (o\*), febre carceraria (p) fætidiſſimus. Sæpe utiliter editur (q), adeo viscidus, & vehementer vestibis & suppellectili insidens, ut in ebulliente demum aqua deponatur (r).

Adeps subcutaneus potest cum sudore exhalare per poros, quos diximus (s). Ea est curatio hydropis per arenas, & olim celebris & in gallia calidiori nondum obsoleta, ut ex suavissimo ITHIO didici. Ea est vis vaporarii CHRYSIPPI a GALENO laudata (t).

Sanguis

(e) Athleta robustus, sed fætore abominabili ex eo cibo.

(f) BARTHOLIN. *hist.* 62. Cent. 4. FANTON. p. 233. LANGE *cat. morb. per ebr. cur.* p. 3. BERNIER apud VERDUC *usag.* I. p. 228.

(g) BOERHAAVE l. c.

(h) SCHRÖDER *Pharmac.* L. IV. p. 133.

(i) SALMUTH L. II. n. 28.

(i\*) CONSTANT *abr. de la med. belv.* obs. 52.

(i\*\*) TRAILLES *de opio* p. 175.

(k) LEIGH *dissert.* p. 99. QUESNAY *Essays* T. III. p. 62. WOODWARD *cases* p. 256. 257. falsus cum acore OTIO *de sang. constit.* n. 21 BENNET *theatr. tab. ex.* 29. LUDWIG *patholog.* p. 64. 122. A medicamento HOMBERG. *Mem. de l'Acad.* 1712. p. 274.

(l) Femine SOUTIOT ossa sponte emollita sunt NAVIER *amollif. des os* p. 62.

(m) Acidus ingratus in febre anomala GRAINGER *febr. Bat.* p. 33.

(n) COSTE *sur la goutte* p. 22. 23.

(o) FALLOP. *de bub. pestil.* p. 3. SYDENHAM p. 174. PÖLZER *de sudore.* HODGES *de peste Londin.* p. 159. LIEUTAUD *précis* p. 47.

(o\*) HOFMANN *descript. const. epid. Halens.*

(p) PRINGLE *diseases of the army* p. 299.

(q) POLZER. HODGES. DEIDIER *de la peste* p. 407. SYDENHAM.

(r) *De la peste* p. 373. Subdulcis ingratus LIEUTAUD.

(s) p. 44.

(t) *De util. respirat.*



Sanguis ipse ( $t^*$ ) in summo æstu ( $u$ ); in motu vehementi ( $x$ ); a vita vinolenta; ex terrore ( $y$ ), & anxietate ( $z$ ); ex dissolutione sanguinis ( $a$ ), variisque causis ( $b$ ) visus est per sudoris vias sequi; etiam minime malo eventu ( $c$ ), manifesto argumento, vasa sudorifera arteriolarum rubris non valde minora esse, neque summa violentia sanguinem indigere, ut in ea succedat ( $c^*$ ).

Bilem ea via exsudasse necesse est, cum flavo sudore icterus sanatus sit ( $d$ ): & suppressam urinam ( $e$ ).

In nonnullis hominibus arenulæ ( $e^*$ ) cum sudore prodierunt, falemque ipse vidi in facie vitrariorum in crystallum collectum, viditque Cl. vir *Theodorus TRONCHIN* ( $f$ ). Strigæ salinæ de cute deterfæ ( $g$ ). In cute balænæ vis particularum salinarum ( $g^*$ ).

### §. III. *Copia sudoris.*

SUDOR a sanissimo homine abest, estque morbi genus ( $h$ ), cui non essemus ferendo, nisi remitteret. Vehementer adeo nocet infirmis ( $i$ ), & phthificos destruit ( $k$ ), & a febribus intermittentibus languentes

( $t^*$ ) Humor sanguini similis THEOPHRASTUS *de sudorib.* p. 457.

( $u$ ) In africa ADANSON p. 162. in insulis antillis HELVETIUS *perte de sang* p. 87. 88.

( $x$ ) In sphæristerio SLEVOGT *de sudorib.* p. 21. a saltatione ROSEN *anat.* p. 227.

( $y$ ) SCHNEIDER *de catarrh.* L. III. p. 369.

( $z$ ) In servatoris exemplo.

( $a$ ) VALISNER. T. III. p. 305. HORST. inde enim debilitas, & mors.

( $b$ ) WELSCH *Episagm.* obs. 93. BINNINGER *Cent.* IV. obs. 52. in infantibus THEOPHRASTUS *de sudorib.* p. 457. HORST. *Phil. transf.* n. 171. 109. VALISNERI T. III. p. 304. BOERHAAV. *Praelect.* I. III. p. 585. &c. ALLIOT *diff. de sudor. sang.* RUYSCH *adv.* Dec. III. n. 3. BORELL.

( $c$ ) SCHURIG. *hamatolog.* p. 285. FALLOP. *vuln.* p. 371. BINNINGER *Cent.* V. n. 58. Eo represso apoplexia RAYMOND *malad. dang. à guérir* p. 268. Sudor sanguineus Criticus ZACUT *prax. admir.* L. III. obs. 75.

( $c^*$ ) Adeo copiosus, ut corpus omnino exsanguie fieret, eventu funesto in *Vigneul de MARVILLE misc.*

( $d$ ) *Hist. de l'Acad.* 1737. p. 49.

( $e$ ) S. J. M. D. *vom Signo dem Urin* &c. adde interim *Comm.* ad. n. 384.

( $e^*$ ) HENKEL *Bergsucht* p. 78. J. Dan. HORST, SCHURIG *lithol.* p. 235.

( $f$ ) A salis marini abusu *Coliq. de Poitou.*

( $g$ ) BOHN p. 204.

( $g^*$ ) LEEUWENH. *Phil. transf.* n. 135.

( $h$ ) Diocles CARYSTIUS apud CÆLIUM *acut. pass.* II. c. 7. RYB p. 291. Sudor semper violentus est SANCTOR. S. I. n. 110. *Secl.* V. n. 3. LISTER *hum.* p. 377. COLE *Cas. epilept.* p. 81. & minus utilis GORTER p. 174.

( $i$ ) Non debent sudare CHEYNE *sanit. infirm.* p. 17.

( $k$ ) HIPPOCRATES *περὶ τῶν νόσων* S. IV. p. 86.



guentes (l). In Bengala frequens morbus est, in quo profusissimi sudores mortem inferunt, nisi temperentur (l\*). In ea parte morbus est, ubi sudor (m). In febribus solvit equidem paroxysmos, & plerumque levamen infert aliquod, quando aridum cutis calorem cum febre conjunctum sequitur: sive quod particulas alcalinas, & calorificas aliquas de sanguine dimittat, sive quod perspirationis interceptæ vices repleat (m\*), sive quod papillas cutaneas molli aquula consoletur, quibus calida ficitas molesta est.

Negaverunt (n) criticum sudorem apud HIPPOCRATEM reperiri, passim tamen reperi (o), etiam a divo sene per medicamenta quæsitum (p) fuisse.

Plerumque in principio morborum acutorum nocet (q); rectius tunc succedit, quando facta coctione materies morbi per cutem expelli parata est. Ipse tamen per se ipsum neque petechias, neque miliarem morbum sanat, neque variolas, & periculose per calida medicamenta (q\*) quæritur, ut ne calidus quidem potus nimis tutus sit, quem vidi, de mitissimis herbis decoctum, bis intra triduum in delirium atrox hominem miliari febre laborantem conjecisse: qui idem refrigeratione undique quæsitæ levatus, denique convaleuit.

Quantum exsudetur, non est facillimum definitum. Ad  $\frac{3}{8}$ . pintæ (r), ad tres libras (s) effluxisse, replevisse calyces (t); & in curatione luis veneræ, quæ guajaci decocto eo tempore quærebat, ad 100. (u) uncias in indusio collectas esse lego. Majorem quam perspirationem, facere humorum humanorum jacturam, quando continuus supervenit, ut in febris intermittens declinatione (x), dudum adnotatum est.

G 2

§. IV.

(l) GORTER p. 154.

(l\*) Lettres Edif. & curieuses. T. XV.

(m) HIPPOCR. aphor. 38. L. IV.

(m\*) COLE I. C.

(n) FREIND ad Epid. L. 3.

(o) Aphorism IV. n. 36. περί κριτικῶν ab init. COAC L. IV. Cap. 2. n. 1. In causo Epid. II. Sect. 3. In febre acuta Epidem. III. sect. 2. agr. 6. in pleuritide n. 8. in febre remittente n. 10.

(p) Vide loca apud TRILLERUM in Epist. critica contra FREINDIUM p. 74.

(q) COAC L. IV. Sect. II. n. 3.

(q\*) In variolis ann. 1666. SYDENHAM p. 183. in miliari febre HAMILTON c. 6. &c.

(r) NICHOLLS in hist. génér. des voy. L. 4. c. 6. ut in homine fere in habitum ea mensura transisset.

(s) WILLIS pharmac. p. 114.

(t) ÆLIUS SPARTIANUS de Maximino Imperatore.

(u) CARDAN in aphor. p. 287.

(x) QUINCY de perspirat. p. 219.



§. IV. *Perspiratio insensibilis.*

Minus perspicua, multo tamen majori apud medicos fama altera hæc est per cutem exhalatio. Res ipsa antiquissima est, quam & HIPPOCRATES (y) habeat, & THEOPHRASTUS (z), & ERASISTRATUS (a), & ASCLEPIADES (b), & GALENUS (c), & reliqui scholæ pristinæ medici. Famam addidit SANCTORIUS (d), cujus in ipsa perspiratione nomen perenne superest, quod primus medicorum per experimenta in causas ejus exhalationis & in mensuras inquisiverit.

§. V. *Elementa perspirationis. Aqua.*

*Insensibilem* vocaverunt, quod oculis minus, quam sudor, sit obnoxia; non ideo vere invisibilis.

In homine impetiginoso, dum se scalpebat, squamas fumum emittere vidit Ezech. de CASTRO (e). Obversa glaciei manus fumat, etiam sicca, & undique (f). Cum sol tergum feriret in exedra umbram recipiente, vidit BONETUS fuliginem adscendere (g). Advocatum legimus fuisse, cui, dum causam orabat, fumus a commissura sagittali & coronali adscendebat (g\*). Loco obscuro, unica candela illustrato, manum fumantem se ostendere adfirmat Laurentius BELLINUS (h), idemque metalli contactu credidit se demonstrare, id enim fuscatur & macula in guttulas colligitur (i), sed tactu quidem experimentum corrumpitur admisto oleo seboque, & halitus ad metallum distans rectius colligitur (k). Umbram hu-  
jus

(y) Περὶ τροφῆς: *Epidem.* VI. Sect. 6.

(z) *De sudoribus.* Vocat ἀνεύρη, quod perpetuo & absque sensu excernitur.

(a) Apud GALENUM *de vene sect.* adv. ERASISTRAT. c. 9.

(b) Ab ea suppressa morbi CELSUS p. 9. AURELIANUS.

(c) GALEN. *meth. med.* L. III. VIII. *de natur. hum.* L. I. c. 12. *de atra bile* c. 4.

(d) *Medicina statica*, quæ primum Venetiis ann. 1614. excusa fuit, inde innumerabiles editiones prodierunt.

(e) *Ign. lamb.* p. 60.

(f) PERRAULT *Eff.* T. III. *des sens ext.* p. 37. 283.

(g) *Prodr. Anat. præf.* c. 3.

(g\*) MALVICINI *collect.* p. 322.

(h) *Discors anat.* II. p. 55.

(i) p. 57.

(k) KAAUW n. 171.



jus fumi, qui ex capite adscendebat, æstivo tempore vidit *Benignus WINSLOW* (l).

Facillime demum perspiratio in aere densiori conspicitur. In cuniculis subterraneis *Clausthalia* & *M. Rammelsberg* vidi de singulo digito, de facie, deque omni nudi corporis particula fumum nubemque exhalare. In lepore eminus nubeculæ similem adparere testis est Ill. de BUFFON (m). In lecto manu inter oculos & lucem posita vidit Cl. PENROSE (n). De fugiente balæna fumus quasi bullientis aquæ adscendit (o). Transpirationem suam propriam sub tela oleo tincta collectam, ad quatuor uncias collegit TACHENIUS (p). Brachio in vitrum misso aquam ex vaporibus falsam collegit *Martinus LISTER* (q), & simile experimentum est *Abrahami KAAUW* (r), ut tamen vaporem in salem ammoniacum emitteret, quo vitrum repleverat, ut frigus faceret. Stilla, quæ hieme frigida de naribus pendet, est perinde coacta perspiratio (s).

Ea, quæ perspirat aqua, in vaporem resoluta est (s\*), adeo tenuem, ut vitrum quidem obfuscet, cæterum sponte iterum diffluat (t).

Hinc perspiratio introrsum conversa aut urinam auget, aut diarrhœam facit, aut salivationem (u). Alvus sano homini, & bene (x) perspiranti dura est: Veste sericea pro pellicea induto lienteria (y). Nihil potentius est ad alvum laxandam subito frigore (z). Diarrhœa minuit perspirationem (a).

Aqua etiam inprimis est, quam plantæ perspirant (b), non pura tamen, siquidem citius corrumpitur (c).

G 3

§. VI.

(l) p. 59.

(m) L. c. T. VI. p. 262. & dudum GAFFAREL opusc. T. II. p. 352.

(n) *Essays* p. 26.

(o) MARTENS *Spizberg - Reise*. p. 103. 117.

(p) *Morb. princ.* p. 153.

(q) *De humor.* p. 376. & GREISEL *Eph. Nat. Cur.* I. ann. 3. obs. 46.

(r) L. c.

(s) KAAUW n. 18.

(s\*) Etiam NERUCCI *lettere* p. 116.

(t) GORTER l. c. p. 342.

(u) GORTER p. 145.

(x) SANCTOR. I. n. 72. II. n. 13. III. n. 30. 104.

(y) RIVIN *morb. æsoph.* p. 7.

(z) STEVENSON *Ess. of a societ. at Edimb.* P. II. p. 895. INNES de ILEO p. 35.

(a) ROBINSON *discharges* p. 80.

(b) HALES *veget. stat.* p. 17.

(c) Du HAMEL *phys. des arbr.* T. I. p. 144.



§. VI. *Materies electrica.*

Etiam alio modo conspicua redditur perspiratio, quando nempe scintillarum specie de excussis capillis, vestibusve nuper de corpore tractis exit. Id phænomenon ita est in libros relatum, ut crederetur, quibusdam animalibus (*d*) & hominibus (*e*) quasi proprium & rarum esse phænomenon. Huc enim pertinent animalia, quæ viva, non mortua lucem emittunt, ut scolopendra (*e\**), lampyrides americanæ, quæ debiles parum lucent, a morte nihil (*e\*\**); sic fullo (*e†*), & alia insecta (*e††*).

Sed omnino perpetuum est omnibusque commune, nescio an non primum advertente MERCURIO ab HELMONT (*f*) lucem de nobis perspirare.

Nuper quidem post excitatos torrentes electricos puncta luminosa de capillis cum sensu formicationis & dolore aliquo exire (*g*) innotuit.

Sed etiam extremæ plumæ (*g\**) pilorumque apices, ejusmodi punctis luminosis replentur (*h*). Vapores electrici partem faciunt transpirationis (*h\**).

Frictione

(*d*) In equis LICET gener. spont. p. 128. NOLLET *leçons de phys.* T. V. p. 36. Ejusmodi equos ajebant superstitiosi a dæmonibus curari. In fele, hyæna HEUCHER p. 103.

(*e*) De CHRISTIANO IV. cum indusium mundum indueret, aut crines pecteret, & regina, cum togam induerat WORM. *Epist.* p. 720. & de filio CHRISTIANO V. BARTHOL. *de luce* p. 78. De rege PHILIPPO V. BETBEDER p. 5. Femina, cui corpore leviter tacto scintillæ exsiliabant Ezech. de CASTRO *ign. lamp.* p. 14. Plura BIANCHINI *parere* p. XXXIX. Femina ignem perspirabat, ut vestes scintillarent Job. de VIANA *de peste Malagensi* p. 46. Lux ex indusio mundo calido frictio BIRCH T. IV. p. 70. Homines calidiores scintillas edunt, quando nudos se constringunt LICET *spont.* p. 128. add. Flamma de femina innocens *opusc. scient. filol.* T. II. p. 6. Matrona veronensis de cute scintillas exprimebat, quam vidit T. BARTHOLINUS *de luc. anim.* p. 262 263. Aliud exemplum habet MAFFEI *de fulmin.* p. 94. Eruditus vir capitis scintillas audiebat, dum se excuteret PLOT *Staffordshire* p. 116. Habet etiam exempla ROGER p. 41. Etiam in veste exteriori [robe de chambre] corpuscula lucida natantia *Hist. de l'Acad.* 1746. p. 23. Qui balteum dum exsuebat, spargebat scintillas C. a REYES *Quest.* 35. p. 420. Flammam in manu natantem subito uxor vidit, & maritus VALISNER. T. III. p. 215.

(*e\**) *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. I. obs. 118. LINN *singul. insect.* p. 26.

(*e\*\**) Du TERTRE *hist. des antil.* T. II. p. 281. LABAT T. II. c. 19. Lux inter motum de ubiis emittitur, per quietem nulla, *Phys. des anim.*

(*e†*) *Bresl. Saml.* 1721. m. Nov.

(*e††*) CAMER. *Cent.* II. n. 50.

(*f*) Per poros cutis ignis erumpit *lect. on man.* II. p. 93. & feminæ dum se pectunt, ignem excitant.

(*g*) JALLABERT p. 51.

(*g\**) De capillis CARDAN. L. VIII. c. 43. LICET *spont.* p. 128. de crinibus in equis l. c. Conf. varia LICET *Monstr.* p. 162.

(*h*) JALLABERT p. 52. 53.

(*h\**) *Hist. de l'Acad.* 1747. p. 8.



Frictione & ictibus ficcarum manuum sola cæruleam lucem excitavit (i) Cl. WILSON.

Cæterum hæc materies adeo evidenter cum electrico elemento convenit, ut & odor idem sit in atmosphæra electrica, & felis dorso (k), quod frictum scintillat, & demum crepitat (l). Et per pulcherrima Cl. SYMMERI (m) experimenta ficcum tibiale per simplicissimam inductionem super nudam cutem, omnibus viribus electricis imprægnatur, corpora levia adtrahentibus, repellentibus, aliisque, uti imprægnatur ferrea virga, quæ rotato vitreo globo cominus admovetur. Sic etiam capilli a genis adtrahuntur & repelluntur. Calet eadem materies, & manus manui applicata concalescit per 12. gradus (m\*\*). Mane manus maxime electricæ sunt (m†).

Ejusmodi cæterum materies & ex cadavere (n), & ex foliis plantarum (o) prodit.

Eadem materies videtur esse, quæ lucidas carnes non raro facit (p), & quæ flammæ specie dicitur ex cadaveribus erupisse (q) etiamque ex animalibus (q\*).

§. VII. *Partes volatiles fætida.*

Vel conjuncta cum hac materie prodit, vel omnino ejus pars est, crassior, subputrida, fætida (r) materies perspirantis halitus, quem animalia sagacia facile, & nonnunquam ipsi sagimus.

Eam

(i) WILSON *on electr.* p. 213.

(k) VERATTI *med. electr.* p. 77.

(l) *Pest. Malagens.* p. 46.

(m) *Phil. transf.* T. 51. P. I.

(m\*\*) IDEM p. 57.

(m†) ROGER p. 86.

(n) JALLABERT p. 52. 53. de pilis & plumis. Tum olim WAIZ *electr.* p. 158. 225. qui addit debilem esse. Carnes lucentes *Fabric. ab AQUAP. musc. act.* p. 405. pisces MONCONIS T. I. p. 20. 23. ostrea *Phil. transf.* n. 12. &c.

(o) NOLLET *Mem. de l'Acad.* 1748. p. 175. ex foliis plantæ, in qua torrens electricus excitatus fuit.

(p) Du HAMEL *hist. acad.* p. 156. PLOT *Staffordshire* p. 265.

(q) BOTTONUS *de igne Messanæ.* Eadem videtur fuisse, quæ spiritum vini incendit, ut qui eum ingurgitaverant, ambugi perierunt. BIANCHINI *historia Comitissa* ZANGARINI BANDI, tum MAFFEI *de fu. mine* p. 898. BARTHOLIN *hist.* 56. Cent. III. Cent. I. *hist.* 70. *Act. Hafn. Vol. I. obs.* 118. ROGER *electr. anim.* p. 52.

(q\*) A perta cute suis MORTON p. 454.

(r) BAYLE p. 283. NICHOLLS p. 51.



Eam esse ipsam materiem (*s*) corporis (*s*\*) animalis, in fluidam naturam reductam; inde patet, quod animalia sagacia facillime genera animalium, ipsaque individua distinguant, genera, quando docti canes (*t*) omissis cervis solos lepores, aut leporibus omissis solas vulpes persequuntur: individua demum, quando iidem inter decem cervos unum solum sibi commissum exagitant: suumve herum in turba hominum, centum aliquando leucis distantem per multos dies, per viarum trivia sequi norunt, & adtingere, qualis in arce *Altenklingen* mira fidi animalis virtus in tabula dedicata habetur. Non possent autem sagacissima animalia personas distinguere, solasque sequi imperatas, nisi propriæ cuique homini in perspiratione sua notæ essent: neque eæ suæ personæ propriæ esse possent, nisi de antiquis humoribus partibusque indigenis decessissent.

Quod & spiritus (*u*) aliqui ad eam materiem admiscentur, qui de cutis papillis (*u*\*) exhalent, conjectura est Cl. virorum, ex qua sequi videretur, perspirationem vires minuere.

An aer (*x*), qui per corpus nostrum circulum obiit, denique exhalat? De elastico aere (*y*) vidimus, nullum esse. De fixo eo elemento non dubium est, quin aquam sequatur.

#### §. VIII. Cibi potusque particula.

Magna certe pars perspirationis est a potu (*y*\*), quoties una calor accedit modicus. Aqua enim pene omnis, quæ bibitur, ab homine sano sub stragulis molli cum tepore perspirat, ut vix quidquam supersit, quod in matula adpareat. Idem halitus, si corpus frigori exposueris, subito introrsum conversus, pellucidus, & ab aqua pura parum diversus, per matulam redditur (*z*).

Sed

(*s*) Esse excrementum tertiæ coctionis SANCTORIUS *Sect.* III. n. 84. GORTER p. 25. 26. COLE *post cas. epileps.* p. 97. 99. de solidis & succo nutritio.

(*s*\*) Etiam solidæ partes perspirant DODART p. 243 Adde GORTER p. 26.

(*t*) Et homines nonnunquam, ut sylvicolæ Acadiensis DIEREVILLE *Hist. de l'Academie* p. 120. 122.

(*u*) COLE. De GORTER p. 26. 21. BERGER p. 187. QUINCY *Essays on Gout* p. 400. H. HAGUENOT *de perspir. insens.*

(*u*\*) BERGER *ib.* GORTER p. 21.

(*x*) Negat MERY *Mem. de l'Acad.* 1700. & 1707. In Erucis utique per cutem exspirat REAUMUR *Mem. pour servir à l'Hist. des insectes* IX. T. I.

(*y*) L. VIII.

(*y*\*) Chyli pars magna perspirat GORTER p. 26. 30.

(*z*) KAAUW n. 1077.



Sed etiam ciborum ( $z^*$ ) pars magna perspirat, aliquando cum suo peculiari odore, ut allium ( $z^{**}$ ), cepe, asa fætida; aut suo cum colore, ut de vino & æthiope minerali legitur ( $z†$ ), alias subacta & in halitum resoluta materies, quæ nullam manifestam notam retinuit. Id ostenditur, quod multo plus cibi sumatur, quam per alvum exit, etsi ad eas fæces multum bilis mucique intestinalis accedit. Duas fere, ut ostendimus, libras ( $z††$ ) ciborum cum quatuor unciiis intra 24. libras adsumsit G. RYE; per alvum egressit uncias fere 4. ( $a$ ). Reliquæ adeo duæ libræ per cutem disperierunt. Adparebit per singula, quantum de quoque cibo ( $b$ ) per cutem exhalet.

§. IX. *Materies perspirationis ut a sudore differat.*

In utramque sententiam disputatum est, ut alii Cl. viri eandem ( $c$ ) utique materiam facerent, tantum ut confertior perspiratio in sudorem confluat: alii diversam ( $d$ ).

Possunt materie differre: possunt organo.

Diversa est hætenus materies, quod a perspiratione omne genus olei ( $e$ ) cutanei sebike absit: quod perspiratio neque flava, neque oleosa, neque viscida sit: quod sit fluidi tenuioris, & aquosi magis; quod ex ipso naturæ consilio perpetim ( $f$ ) exhalet, sudor vero morbi sit genus.

Quod ad organum pertinet, idem ( $g$ ) videtur omnino, ut unice modica vis impulsu humoris halitum faciat, cujus guttulæ se eminus sequuntur, violentia nimia eas adeo celeriter cogat se consequi, ut guttulæ

( $z^*$ ) Negat COLE l. c.

( $z^{**}$ ) GORTER p. 422. n. 283. ex ipso chylo p. 26. 30.

( $z†$ ) Apud CHEYNE p. 49.

( $z††$ ) Cl. RYE sumsit cibi potusque libras 5. 4. Inter eas erant cibi l. 2. unciae 4. p. 212. vel inter 30. & 24. uncias apud ROBINSON tab. 9.

( $a$ ) De Ponder. n. 59. Potus ad cibum portionem SANCTORIUS facit. uti 10. 3. L. CORNARO uti 7. ad 6. G. RYE uti 4. ad 3. LINING uti 11. ad 3. ROBINSON uti 5. ad 2. of discharg. p. 35.

( $b$ ) SANCTOR. III. n. 4. 8. 23. 24. 45. 82. 87. &c.

( $c$ ) BAYLE p. 283. SECKER medic. stat. n. 18.

( $d$ ) COLE l. c. p. 70. seqq.

( $e$ ) p. 48. 49.

( $f$ ) THEOPHRASTUS l. c.

( $g$ ) PERRAULT *Essays* T. III. p. 284. LISTER de humer. p. 325. BOHN p. 207. de GORTER p. 143. LOESEKE *Arzneyen* p. 151. SACRELAIRE de tegum. p. 9.



tulæ minores in majores confluant. Quindecim guttulas perspirabilis halitus in unam sudoris guttam LEEUWENHOECKIUS vidit confluere.

Sæpe in me ipso naturæ opus observavi; cum abunde exhalarem; cutis mollis erat, subrubra, quasi tumens, ad tactum non sicca, neque aquosa tamen, poris etiam ad oculum apertis, ut ipsi pilorum meatus grandiores sint. Hinc deleta epidermide, laxatis vasis cutis, ea sede sudor perpetuus (*b\**).

Paulo post eodem sub stragulo sequebatur halitum conspicua aqua, in guttulas se adtrahentes, subalbas, sibi succedens, qua epidermis inundabatur, ut nunc digitos madefaceret. Videtur adeo per eosdem, sed paulum dilatatos (*b\*\**), poros sudor halitum sequi. Quare cum sudor supra naturalem diametrum apertos poros poscat, minus cum natura convenit (*i*).

Via etiam eadem esse videtur, argumento injectorum humorum, qui undique de cute per minimos poros exeunt, sudoris similes, sed adeo conferti, ut nulla sedes in cute sit libera, quin ei sudori pateat. Num per inorganicos (*i\**) poros epidermidis? Ut in cadaverum humores exspirant (*k*)? Num adtractione, non expulsionem, fit exhalatio, quod minus subtilis fit, nec a vasis urgeri queat (*k\**).

Certe ex arteriis (*l*) cutis is halitus exit, quod neque veteres ignoraverunt (*m*). Arterias intelligimus minimas, sed aquæ tamen patentes (*m\**). Absque arteriis exhalationem, quasi de liquore evaporante fieri, omnino repugnat. Sicca enim epidermis mollem cutem ab aere defendit, neque exhalatio ullius momenti est, nisi cum signis impulsione arteriosæ acutæ,

(*b\**) *Hist. de l'Acad.* 1740. obs. I.

(*b\*\**) Sudor ex paucioribus ostiis dilatatis, perspiratio ex pluribus LUDWIG *physiol.* n. 465.

(*i*) Invisibilis perspiratio fit visibilis, quando motus major est GALEN. *method. medend.* L. III.

(*i\**) STAHL *theor. med.* p. 338. 339. Pars sudoris BOHN p. 212.

(*k*) HOOKE *microg.* p. 203. DODART *med. stat. gall.* p. 228. KRAFT *physic. gener.* p. 103. KRUGER *Physiol.* p. 153. Etiam ossa BOYLE *de porosit. corp.*

(*k\**) ARRIGHI apud CORNACHIN *rispost. apologet.* & fere HAMBERGER l. c. p. 276. seqq.

(*l*) PERRAULT l. c. p. 284. CHEYNE *philos. princ. of relig.* p. 295. RUYSCH. KAAUW p. 84. 93. Vascula se credit vidisse LEEUWENHOECK, in quavis squamula quinque *Anat. & Contempl.* T. II. p. 206. 207.

(*m*) Calidior vena HIPPOCR. *περί τροφῆς* Sect. IV. p. 50. GALEN. in *comm. de Hipp.* & *Plat. decr.* L. 8. NEMESIUS c. 23. & Auctor *Isag. anat.* c. 4.

(*m\**) Uno pulsu exhalare 5, 625, 000, 000, 000. grani unius SIEVERS de *f. motu circ.* p. 15.



acutæ, calore, rubore, pulsu. Exhalat autem & universa cutis exterior, & interior oris narium, genitalium, viæ cibariæ & aereæ ( *n* ).

§. X. *Transpirationis copia in universum. Inventores.*

Magnitudo organi, innumera vis fistularum in exiguo spatio stipatarum, cele-  
ritas, qua fumum de manu videmus exhalare, seque consequi, arteriarum ad uni-  
versam cutem, etsi parvæ sint, tamen vastissimus numerus, omnia consentiunt,  
ut halitus cutanei uberrima sit excretio. Neque ea, quæ apud S A N C T O-  
R I U M legimus, debent nobis adeo paradoxa videri, cum a solo calore  
plantæ plus perspirent, quam homo; homo & calorem majorem habeat,  
& vim cordis impellentem. Quotidie perspirans halitus pondus rami su-  
perat, de quo prodit ( *o* ). Coronæ solis perspiratio est ad humanam,  
uti 17. ad 1. ( *p* ).

Primus ad mensuram fumendam adspirasse dicitur Cardinalis C U S A-  
N U S ( *q* ), cujus opera nunquam vidi; deinde Cl. S A N C T O R I U S longo  
tempore sumtis experimentis perspirationem ad pondera revocare studuit.  
Nondum tamen doctus experimenta in diaria, inque tabellas conjicere, aphoris-  
mos nobis dat, qui ponunt tamquam fundamentum sylvam adnotationum,  
quam quidem sylvam pariter oportebat edidisse, ut cuique constaret, num  
justa corollaria sint, quæ Cl. vir sola dedit. Nunc fere in fidem ejus re-  
cipere oportet, a non gnaris, quibus experimentis persuasus ea configna-  
verit. Ostensum est etiam ( *q*\* ), multa loca S A N C T O R I I ad Galenico-  
rum placitorum ( *r* ), & ad theoriæ analogiam accommodata esse; alios  
Cl. viri aphorismos sibi contradicere ( *s* ). Multa mihi adeo peculiariora vi-  
dentur, ut omnino absque infinitis experimentis resciri non potuerint.

Post eum in Gallia pius vir & doctus *Dionysius* D O D A R T ( *t* ) in pro-  
prio corpore experimenta fecit per multos annos, initio facto ab 1668.  
cum 33. ( *u* ) esset annorum. Etiam hujus viri tabulas non habemus, sed  
pauca omnino corollaria.

H 2

Etiam

( *n* ) K A A U W *perspir.* n. 18. H I P P. *Epid.* VI. *Secl.* 6. G A L E N. *de usu puls.* c. 5.

( *o* ) *Mem. de l'Acad.* 1748. p. 573.

( *p* ) H A L E S *veget. Stat.* p. 12. sumtis unciiis 31. pro perspiratione humana p. 10.

( *q* ) Ab eo sua non habuisse S A N C T O R I U S in I. *fen. avic.* p. 81.

( *q*\* ) Multa non satis certa esse S C H E L H A M M E R *Physiolog.* p. 388.

( *r* ) S E C K E R n. 6. 7

( *s* ) I. n. 56. & III. n. 76. & IV. n. 29. S E C K E R n. 16.

( *t* ) *Memoire de l'Acad. avant* 1699. p. 276.

( *u* ) *Static. gallic.* p. 217, 220.



Etiam CAROLUS II. (x) M. Britanniae rex experimenta statica in se ipso amabat facere.

Deinde JACOBUS KEIL (y), Medicus, qui in oppido Northampton vixit, experimenta 10. annorum in se ipso fecit, cui vitio est datum, quod liberam nimis vitam vixerit, coenaverit largiter, & multum potu diuretico *punch* sit delectatus. Diarium tamen suorum experimentorum primus edidit (z).

Accuratiora sunt experimenta Bryani ROBINSON (a), in Hibernia facta, & in eadem Hibernia, inque urbe Cork G. RYE (b), hæc valde accurata.

Johannes de GORTER (c) docte in SANCTORIUM commentatus etiam experimenta fecit, ea vero singulatim non edidit.

Demum Cl. LININGS (d) cælo sub æstuoso in Carolina meridionali exquisita experimenta cepit, inque diaria conjecit. Nihil habemus hætenus plenius. Nuper FRANCISCUS HOME (e) aliqua sua experimenta addidit.

Experimenta, quæ Ill. noster Collega Georgius Gottlob RICHTER in juvenibus a multis annis fecit, nondum sunt edita. Aliqua prodidit vir doctus HARTMANNUS (f), in se ipso facta.

Habemus ergo experimenta facta ad gradum latitudinis 56. Edinburgi: ad gradum 53. & ultra Dublini; ad 52. & ultra Northamptoni, & perinde fere Helmstadi, aut in vicinia, ad gradum 51. & ultra Corkii, inde ad 49. gr. Parisiis, ad gradum 45. Venetiis, ad gradum 33. in Carolina meridionali.

Modus, ut experimenta accurate fiant, aliquid curæ requirit. Habenda est statera in cista biloculari, cujus in altera sede excrementa omnia redantur, & quotidie in tabulas referantur, in altera cibi, & potus, quos facile sit ponderare, si vasa, & quando adferuntur, in statera ponderantur, & quando auferuntur. Ejusmodi armarium Ill. SEGNERUS invenit.

## §. XI.

(x) BIRCH L. I. p. 393.

(y) In *medicina statica Britannica*.

(z) RYE p. 199. add. SECKERUM ad

(a) *On food and discharges*.

(b) In epistola ad Cl. ROGERS, quæ Dublini ann. 1734. cum ejus *essays on epidemic diseases* prodiit.

(c) Duæ sunt editiones, & altera plenior est.

(d) *Phil. transf.* n. 470. & 475.

(e) In *medical facts*.

(f) De *sudore unius lateris* p. 25.



§. XI. *Cautela.*

Non adeo promptum est porro ab experimentis concludere. Potest multis modis perspiratio aut nimia fieri, aut nimis parva. Ergo teneri oportet, pro perspiratione haberi omne decrementum ponderis, quod non est a fæcibus alvi & ab urina. Sit homo 160. librarum: accipit non octo libras, rara enim ea est voracitas, sed sex cibi potusque l. intra 24. horas. Decessit urinæ v. c. unciam 33. fæcum ad unciam quatuor. Deberet idem homo sumtis libris 6. amissis tribus, nunc pendere libras 163. sed nihilo plus pendet, quam pridem, suas nempe libras 160. Ergo tres libræ, quæ ignoratæ disperierunt, sunt mensura perspirationis insensibilis. Ita SANCTORIUS, ita omnes scriptores.

Verum peccatur hic omnino in augenda perspiratione. Nam amisit homo, præter fæcem & urinam, etiam salivam, cujus in sputatoribus non est adeo exigua copia (g); mucum asperæ arteriæ, nariumque; pingue cutaneum, & sudorem; denique exhalationem pulmonalem. His consideratis, tres illæ libræ ad dimidias reducuntur. Nam de pulmone supra libram exhalat (h), sputatur facile, certe in ætate provectiori, ad uncias aliquot. Sordes sunt semidrachmæ (i).

Contra perspiratio ob alias causas iterum major est, quam per priora invenitur. Ostenditur & plantas, & animalia, & homines multum inspirare, etsi in homine nemo mensuram sumsit. Inspiret libram: eam libram totam perspiratione iterum compensatam fuisse necesse est. Alioquin ea materies corporis ponderi accederet. Eam ignoravit SANCTORIUS (k), cum oportuisset ejus habere rationem (l).

Sit ergo perspiratio x, inspiratio y. cibus & potus a, urina b. alvi fæces c. sudor & sordes z. sputum & salivæ v. perspiratio pulmonis t. erit vera mensura perspirationis  $= a + y - b - c - z - v - t$ . Cum vero pleræque harum quantitatum ignotæ sint, factum est, ut vulgo in calculis ponendis omittantur.

Deinde cum enormis potentia sit caloris potissimum humidi: cum potus, & maxime calidi perspirationem insignissime augeant: cum multa sit vis æ-

H 3

tatis,

(g) Vide interim *Prælect.* T. I.

(h) L. VIII. p. 353. BERGER p. 184.

(i) DODART p. 243.

(k) SECKER.

(l) ARBUTHNOT *on air* p. 65. RICHTER *de abstinentia*.



tatis, erit ad ea omnia respiciendum, quando regulam aliquam constituere tentamus. Potuit ea sumi a summa observationum numerosarum, denique a vera non remotissima colligi. Nimios enim numeros faciunt calida regio, & anni tempestas, quæ præterea potum urget, ætas juvenilis: nimis parcos regio frigida, ætas senilis, anni frigidior tempestas.

§. XII. *Perspiratio in regione boreali.*

Eundem ergo per singula, ut medium numerum inveniamus.

*Francisci HOME* pauca sunt experimenta: cibus potusque tantum 4. lib. unciarum trium (*m*), fæces  $3\frac{1}{2}$ . unc. (*n*), lotii libræ  $2\frac{1}{2}$ . (*o*), &  $3\frac{1}{2}$ . perspirabilis humoris in hora duæ uncia tertiæ partes (*p*), uncia una (*q*), fescunx (*r*), uncia duæ (*s*), & ultra (*t*), tres (*u*), quatuor (*x*), & dimidia (*y*), sex demum (*z*) uncia in sole aperto.

Intra noctem horis duodecim perspiratio est unciar. 12 (*a*), 13. (*b*), 14. 15. (*c*) 16. 17. (*d*), & 18. unciarum (*e*), & intra  $23\frac{1}{2}$ . horas librarum 3. unciarum  $3\frac{1}{2}$  (*f*), alias 2. l. unciarum  $6\frac{1}{2}$  (*g*).

Clar. RYE in urbe Corke, mense decembri (*b*), perspirationem habuit ad urinam 5. 4. eratque urinæ ratio librarum fere 66. unc. 14. intra 26. dies, adeoque in 30. diebus unc. 1234. perspirationis vero libræ 80. uncia 4. & in mense 1531. unc.

Januario

(*m*) *Exp.* 5. p. 243.

(*n*) *Ibid.*

(*o*) *Ibid.*

(*p*) *Exp.* 14.

(*q*) *Exp.* 1. 4. 5. 6.

(*r*) *Exper.* 14. & pene 18.

(*s*) *Exp.* 2. p. 240. 241. *Exp.* 19.

(*t*) *Exp.* 3. p. 241. *Exp.* 5. p. 243.

(*u*) *Exp.* 3. 10.

(*x*) *Exp.* 9.

(*y*) *Exp.* 5.

(*z*) Ab exercitatione corporis *exp.* 3.

(*a*) *Exp.* 11.

(*b*) *Exp.* 3. 5.

(*c*) *Exp.* 15. & paulo ultra *exp.* 16.

(*d*) *Exp.* 7.

(*e*) *Exp.* 6. 13.

(*f*) *Ibid.* p. 241.

(*g*) p. 243.

(*b*) p. 377.



Januario mense (*i*) erat in diebus 15. urina 31. l. 2. u. adeoque intra mensem 30. dierum unciarum 1489. perspiratio 50. l. & in triginta diebus unc. 1600.

Februario urina 55. l. 10. u. (*k*) in 22. diebus, & in triginta diebus unciarum fere 1214. perspiratio 76. l. 6. u. & in triginta diebus unc. 1666.

Martio urina 42. l. 15. u. (*l*) in 17. diebus, & in triginta diebus unc. 1212. perspiratio 56. l. 13. u. & in triginta diebus 1604. fæces 6. 2. & in triginta diebus unc. 184.

Aprili urina 65. 11. (*m*) in 28. diebus, & in diebus 30. unc. 1126. perspiratio 116. 14. & in 30. diebus unc. 2004. fæces 8. 15. & in 30. diebus 153.

Majo M. (*n*) urina 73. 11. in 29. diebus; & in 30. diebus 1220. unc. perspiratio 110. 11. & in 30. diebus unc. 1797. fæces 9. 3. & in triginta diebus unciarum 152.

Junio M. (*o*) urina 67. 13. in diebus 28. & in 30. diebus unciarum 1270. perspiratio 105. 6. & in 30. diebus unciarum 1806. fæces 8. 12. & in triginta diebus unciarum 140.

Julio M. urina 66. 3. (*p*) & in diebus 30. unciarum 1056. perspiratio 110. 5. & in 30. diebus unciarum 1765. fæces 9. 6. & in 30. diebus unciarum 150.

Augusto M. urina 42. 2. (*q*) in diebus 20. & in triginta diebus unciarum 1026. perspiratio 83. 4. & in triginta diebus unc. 2148. fæces 6. 4. & in 30. diebus unc. 150.

Septembri M. (*r*) urina 53. 5. in diebus 26 & in 30. diebus pene 984. perspiratio 97. & in triginta diebus fere 1663.

Octobr. M. (*s*) urina 51. 13. in diebus 21. & in triginta diebus unc. 1184 perspiratio 61. 4. & in triginta diebus unc. 1400.

Novem-

(*i*) Ibid.

(*k*) p. 277.

(*l*) Ibid.

(*m*) p. 278.

(*n*) p. 275.

(*o*) Ibid.

(*p*) Ibid.

(*q*) p. 276.

(*r*) Ibid.

(*s*) Ibid.



Novembri M. (t) urina 75. i. five in 30. diebus unciar. 1201. perspiratio 88. five in 30. diebus unciarum 1408.

Ex his tabullis satis accurate porro confici potest, intra tres menses hibernos, Decembrem, Januarium & Februarium habere uncias urinæ 3937. perspirationis uncias 4797. Menses vernos Martium, Aprilem, & Majum urinæ uncias 3558. & perspirationis uncias 5405. Menses æstivos Junium, Julium, Augustum urinæ uncias 3352. perspirationis 5719. Menses tres autumnales Septembrem, Octobrem, Novembrem lotii uncias 3369. perspirationis 4471.

Medio numero sumto adeo in hiemali die urinam esse 42. unciar. cum  $\frac{7}{10}$ . perspirationem unciarum 53. Rationem fecit Cl. RYE, ut 5. 4. & ut 5. ad 3. (u). Verni diei urina est unciarum 40. perspiratio unciarum 60. Æstivi diei urina 37. unciarum, perspiratio unciarum 63. Rationem fecit RYE 4. ad 3. & 4. 2. (x). Æstumnalis diei urina est perinde 37. unciarum cum fere dimidia, perspiratio unciarum pene 50. Rationem facit Cl. vir ut 4. 3. & 5. ad 4. (y). Quæ iterum compensata faciunt mediocrem urinæ copiam in quovis anni die paulo minus, quam 40. unciarum, perspirationis vero 56. uncias cum dimidia, ut sit ratio communis urinæ ad perspirationem in meridionali Hibernia uti 10. ad 14. totoque anno, etsi incerta portione, perspiratio superet.

In his tabulis unice observo, hiemalem perspirationem grandem esse, non quod frigus perspirationem non moretur, sed quod cum diurna perspiratione unciarum 6. nocturna perspiratio sit unciarum 40. & 65. hominis nempe 9. horis in calido lecto (z) decumbentis. Ea perspiratio dupla est hominis extra lectum quiescentis (a), quam ad 38. Cl. vir æstimat.

Fæcum alvi medius modus est unciarum quatuor cum dimidia in die.

Hieme perspiratio maxima fuit unciarum 60. (b) & alio anno unciar. 51. (c). Aestate maxima non major, quam 93. (d), sed minima 33. & media 63. (e).

Cibi

(t) p. 276.

(u) p. 285.

(x) p. 284. add. 260.

(y) Ibid.

(z) p. 296.

(a) p. 284.

(b) p. 305.

(c) p. 310.

(d) p. 310. 260.

(e) Facit 6. p. 310.



Cibi potusque medius modus est unciarum 96. & paulo ultra.

Cura singula observare nequeamus, sumimus unice media.

*Jacobus KEIL* perspirationem facit 31. unciarum (*f*) in medio, urinam unciar. 38. (*g*), ut superet perspirationem urina. Fæcis pondus est unciarum quinque: cibi potusque modus unciarum 75.

Sic etiam *Cl. ROBINSON* concedit quidem æstate urinam minui, & perspirationem augeri in ratione insigni, ut æstate sint uncix mediæ 27, hieme supra 30. & alterne fere se compensent (*h*), & mensibus æstivis perspiratio & lotium sint; 5. ad 3. (*i*), mensibus hibernis uti 2. ad 3. Aprili, Majo, Octobri, Novemb, Decembri fere æquales (*k*). Perspiratio hieme est pene 28. unc. vere quidem supra 28. (*l*). In juniore homine ratio perspirabilis ad urinam fuit, 1340. 1000. in fene 967. ad 1000. (*m*).

Mediam copiam varie computavit (*n*) cibum fere 86. & 58. unc. cum senior esset; urinam 35. & 28. unc. perspirationem 46. & 27½. fæces 5½ & 3½. (*n*\*), atque adeo cum ætate (*o*) & cibis & omnes manifestæ excretiones minuuntur.

*Cl. HARTMANN* invenit cibum potumque 80. unciarum, lotium 28. fæces 6. ad 7. adeoque perspirabile 45. & 46 unciarum (*o*\*).

*Johannes de GORTER* in Geldria facit adsumta unciarum 91. perspirabile unciarum 49, urinam unc. 36. fæces alvi unciarum 8. (*o*\*\*).

Iterum *DODARTUS* fecit perspirationis rationem ad fæces alvi uti 7. ad 1. (*p*), ad sensibiles excretiones (*q*) uti 15. ad 12. vel 10. Porro æstate perspirationem æstimat unciis 40. drachm. 3. gr. 26. hieme

(*f*) *Aphor. stat.* p. 13. 14.

(*g*) *Ibid.*

(*h*) p. 76. *Essays* p. 260.

(*i*) *Essays* p. 261.

(*k*) p. 54. *Essays* p. 269.

(*l*) *Tab.* 2.

(*m*) p. 60.

(*n*) *Tab.* I. & II.

(*n*\*) p. 35.

(*o*) 65. annorum.

(*o*\*) *L. c.* p. 25.

(*o*\*\*) *De insensib. perspirat.* p. 15.

(*p*) *Med. stat. gall.* p. 224.

(*q*) p. 222.



hieme unciis 26. gr. 46. ( $q^*$ ), mediamque demum sumit unciar. 33. drachm. 2. Æstumat autem ad 5. & 6. uncias in hora eam perspirationem, quæ lintea madefacit ( $q^{**}$ ). Ad unciam in hora in Gallia perspirari admittit ( $r$ ); & in calidiori ejus parte 33. uncias, in diem exhalare, urinæ reddi uncias 22. alvi 5. cibi 60. ponit Cl. BOISSIER ( $s$ ).

Cl. *Everardus* ZEVIANUS facit transpirationem dimidiam excretionum conspicuarum ( $s^*$ ).

### §. XIII. *Perspiratio in regione calida.*

*Sanctorius* de SANCTORIIS Venetiis in aere calido & humido cibum potumque ( $t$ ) fecit librarum octo; perspirationem librarum quinque ( $u$ ); alvi fæces unciarum ( $x$ ) quatuor, lotium unciarum sedecim in una nocte ( $y$ ), atque in viginti quatuor horis, ex calculis reliquis, unciarum quadraginta quatuor. Recte adeo Cl. ARBUTHNOT monuit, eam rationem 5. 3. quam SANCTORIUS inter insensilem excretionem & conspicuam posuit, per æstivos soles in Anglia unice veram esse ( $z$ ). Plura, per pondera, vix addidit.

Verum in calida regione ( $a$ ) præstantissimus *Johannes* LININGS tabulas accuratas dedit. Fuit adeo M. Decembri mediocris cibi potusque modus unciarum 318. + 1186. = 1504. Perspiratio 574½. Urina 906. proxime; fæces alvinæ 50½. In uno die perspiratio media 42. 55. urina media 70. 81.

Mense Januario cibus unius diei fuit 331. proxime + ... potus part. 1324½. = 1655½. perspiratio part. 560. Urina part. 1014. fæces 56½. In uno die urina media 72. 43. perspiratio media 39. 97.

Mense

( $q^*$ ) p. 238.

( $q^{**}$ ) p. 242.

( $r$ ) *Mem. de l'Acad.* 1747. p. 270.

( $s$ ) *Physiolog.* p. 201.

( $s^*$ ) *Flato hypochondri* p. 158.

( $t$ ) *De ponderat.* l. n. 6.

( $u$ ) *Ibid.*

( $x$ ) *Ibid.*

( $y$ ) n. 59.

( $z$ ) *On aliments* Ed. I. p. 175.

( $a$ ) Vide L. V. p. 32.



Menſe Februario cibus fuit part. 344 + potus 1313. perſpiratio 524. urina 1090. fæces alvi 45. In uno die urina media 77. 86. perſpiratio 37. 45.

Martio cibus 315. potus 1154 $\frac{1}{2}$ . perſpiratio 540 $\frac{1}{2}$ . urina 882 $\frac{1}{2}$ . alvus 44 $\frac{1}{2}$ . Media urina 70. 59. perſpiratio 43. 23.

Aprili menſe cibus 277 $\frac{1}{2}$ . potus 975. perſpiratio 549. proxime, urina 680. alvus 39. Media urina 59. 17. perſpiratio 47. 72.

Majo in uno die 395 $\frac{3}{4}$ . potus 1362. perſpiratio 872. urina 842. alvus . . . . . Urina unius diei media 56. 15. perſpiratio 58. 11.

Junio cibus 329. potus 1491 $\frac{1}{2}$ . perſpiratio 1034 $\frac{3}{4}$ . urina 710. proxime. . . . . Urina media 52. 90. perſpiratio 71. 39.

Julio cibus 378. potus 1700 $\frac{3}{4}$ . perſpiratio 1344. + urina 683. + Urina media 43. 77. Perſpiratio 86. 41.

Auguſto cibus 383. pene, potus 1528. perſpiratio 1014. proxime, urina 1013 $\frac{3}{4}$ . Urina media 55. 41. perſpiratio 70. 91.

Septembri cibus 351. potus 1422. proxime, perſpiratio 1156. + urina 600 $\frac{3}{4}$ . fere, Urina media 40. 60. perſpiratio 77. 09.

Octobri cibus 371. proxime, potus 1127. perſpiratio 632. urina 779. alvus 34. Urina media 47. 67. perſpiratio 40. 78.

Novembri cibus 348. + potus 1083. perſpiratio 526. urina 821. alvus 36 + Urina media 63. 16. perſpiratio 40. 47.

Ex hac tabula adparet, uti ex ROBINSONIANIS, calidis menſibus perſpirationem ſuperare, frigidis urinam. Septem tamen menſibus ſuperavit urina, quinque tantum major fuit perſpiratio. Maxima totius anni urina fuit 143 $\frac{1}{2}$ . m. Decemb. maxima perſpiratio menſe Septembri 130. unciarum.

Toto anno ingeſta fuerunt ad urinam :: 2. 02. 1. ut tamen sæ pe ſint, uti 3. ad 2. ad perſpirationem uti 2. 18. ad 1. ad alvum :: 30. 13. ad 1. & perſpiratio totius anni ad urinam uti 1. 1. 08. (b).

Eſtque medius totius anni cibus unc.

potus  
urina  
perſpiratio  
fæces alvi

27. 18.

102. 17.

64. 84.

60. 10.

4. 35. (c).

I 2

Hæc

(b) p. 509.

(c) apud ROBINSON t. 9.



Hæc hæc hactenus dissentiunt a SANCTORIANIS, & a G. RYE exp-  
quod in regione æstuosa tamen urina superet. Id tribuit Cl. ROBIN-  
SON nimio potui diuretico *Punch* (d).

In altera dissertatione (e) nuperiori Cl. vir eadem fere experimenta  
habet. Urinam nempe vernam 53. 93. unciar. Æstivam 36. 62. autumn-  
lem 37. 67. hiemalem 53. 53. Summam adeo 18175.

Perspirationem vernam 33. 77. æstivam 51. 39. Autumnalem 48. 34.  
hiemalem 31. 91. summam 16541.

Fæces vernas 263. æstivas 266. autumnales 402. hiemales 290. sum-  
mam 1221. atque adeo urinam ad perspirationem fere uti 9. ad 8. ad al-  
vum uti 15. ad 1.

Totius anni perspiratio media 24. horarum 4. l. 29. urina media 24. ho-  
rarum 4. l. 90. (f).

Unius horæ diurnæ perspiratio media fuit unciae 1. 68. nocturnæ 2. 61.  
utriusvis 2. 145. (g).

Urina media diurna 2. 55. nocturna 2. l. 35. media 2. 45.

Hiscæ omnibus comparatis dubium omnino videtur, num exhalatio uri-  
nam superet, si medios numeros ex variis climatibus, ætatibus, cum tem-  
poribus sumseris. Eritque copia perspirationis multum infra numeros  
SANCTORIANOS, quæ in calidissima regione 60. uncias parum su-  
peret, in frigidioribus sit 56. 46. & 30. unciarum, & cum de ea co-  
pia decedant, quæ monuimus.

#### §. XIV. Quæ augeant perspirationem. Motus sanguinis auctus.

Liceat huic functioni corporis humani adeo celebri, paucas paginas  
dedisse. Faciunt ergo & augent adeo perspirationem I. omnia quæ cale-  
faciunt, efficiuntque, ut plures & fortiores intra datum tempus pulsus sint.  
Deinde omnia II. quæ humoris tenuis & meabilis in corpore nostro co-  
piam augent. III. Denique laxitatem cutis & vasorum perspirantium. Sum-  
ma vero fuit perspiratio, quando harum trium causarum vires uniuntur.

Qui cordis (h) vires a transpiratione excluderunt, quod eas in vasis  
minimis nimis parvas esse putarent, in eo quidem, ut alias ostensum est, evi-  
denter

(d) *Foe and discharg.* p. 87.

(e) *Phil. transact.* n. 475. n. 20.

(f) p. 323.

(g) *Ibid.*

(h) *ARRIGHI, HAMBERGER physiolog.* p. 276. 278.



denter errarunt: cum cordis succussiones in capillaribus vasculis distinguantur: cæterum non adtenderunt ad ea, quæ nunc sequuntur, phænomena, quibus manifesto ostenditur, siccissimum aerem perspirationi non favere (*i*), qui ex hypothese supra omnia faveret (*k*): aerem vero (*l*) ne requiri quidem ad perspirationem, cum in balneo mediis in aquis, earumque halitu, & in humido vapore, qui stragulis coercetur, & omnino optime exhaletur (*m*): demum vires cordis auctas perspirationem augere, diminutas suppressere, in eodem aere, nihil diminuta particularum perspirantium copia, cute potius laxata, exemplo deliquii animi, terroris maximi.

Motus ergo muscularis solus, dum calorem generat, perspirationis portionem auget. Sex uncias post ambulationem in sole unica in hora amisit Cl. HOME (*n*). Intra unum mane, cum motu, G. RYE perspiravit uncias 29. & intra 3. horas ambulationis 23. uncias (*o*), & demum unam libram in hora unica matutina (*p*).

CAROLUS II. quando in sphæristerio (*q*) se exercuerat, levior erat libris duabus, unciis tribus, & demum intra tres horas libras duas cum semisse perspiravit G. RYE (*r*). Alio exercitio intra semihoram libram amisit IDEM absque sudore (*s*). Non ergo tripla (*t*), sed 14pla fuit hæc perspiratio, si cum modulo consueto comparaveris: mediocris enim SANCTORIAVA copia biuncis cum tertia parte exhalantis humoris est. Exercitium hora a cibo septima ad duodecimam plurimum resolvit sine sensu (*u*). Ubi deficit perspiratio in sano homine sarcitur, exercitio (*x*). Corpus a motu potest ita perspirabile reddi, ut contabescat (*y*).

Neque frigus hibernum impedit, dum vis cordis sufficiat. Nam de 8½ l. cibi potusque una die sumtis, motus muscularis consumfit quatuor  
I 3 ponde-

(*i*) Vide de sicca cute in siccissimo & æstuosissimo vento testimonium Cl. ADAMSON.

(*k*) HAMBERGER l. c. p. 280.

(*l*) IDEM p. 278. 279.

(*m*) Non sine vi magna cordis id fieri, ut contra pressionem 6, 912, 000. l. aquæ vapor exhalans expellatur, monet QUINCY *med Stat.* p. 126. ad. WAINWRIGHT *of bathing* p. 139.

(*n*) *Facts* p. 251.

(*o*) p. 254.

(*p*) RYE p. 290. ROBINSON *discharg.* p. 84.

(*q*) BIRCH T. I. p. 393.

(*r*) RYE p. 291.

(*s*) Ibid.

(*t*) De GORTER p. 128. cum sudore.

(*u*) SANCTOR. V. n. 7.

(*x*) IDEM *ibid.* n. 34.

(*y*) n. 8.



ponderum dimidio ( $z$ ). Balænæ cursu calefcunt in glaciali mari, ut fæteant fumentque ( $a$ ). Aer frigidus robusta corpora reddit leviora ( $a^*$ ). Inde in hominibus per frigus rigidissimum corpus exercentibus integerrima sanitas ( $b$ ), & voracitas, atque durissimorum ciborum superatio ( $c$ ), & fames ad bulinum usque intensa, BRUTI exemplo ( $d$ ). Hieme ventres calidiores ( $d^*$ ). Et demum balneum frigidum perspirationem auget ( $e$ ); rubrique inde & calentes ( $f$ ) egrediuntur Scoti & Hiberni, iidemque in nivem se immergunt, ut concalescant ( $g$ ). Eadem est RUSSORUM consuetudo. Dysenteria sanata est balneatione in flumine, nempe aucta perspiratione ( $g^*$ ). Causa non obscura est. Adtritrus enim magnus fit humorum vi muscutorum vehementiactorum per rigida & melius resistentia vasa ( $h$ ).

Ita porro torrens electricus, quo corpus cingitur, uti humorum celeritatem auget ( $i$ ), ita perspirationem ( $k$ ), non tantum ( $l$ ) quarta parte, aut per 58. & 66. grana in 4. horis in fele ( $m$ ), aut ad 7. grana in 5. horis in avicula ( $n$ ), & ad 38. & 55. grana, quod maximum, in columba ( $o$ ), sed in exiguis demum aviculis 22. 24. 25. gr. ( $p$ ) &  $\frac{1}{57}$ . suæ massæ, quod æquivalet tribus libris humanis ( $q$ ). Homo intra 5. horas uncias

- ( $z$ ) RYE n. 297.  
 ( $a$ ) MARTENS *Spitzb. Reise*.  
 ( $a^*$ ) SANCTOR. f. 2. n. 5. *Ergo hieme transpiratio perfectior* B. MURRY Paris 1736.  
 ( $b$ ) In Belgarum exemplo, qui circa fretum *Weygats* hiemarunt add. MARTENS *Spitzberg Reise* p. 127. LORRY *Alim.* II. p. 329.  
 ( $c$ ) LISTER *de humor.* p. 386. 387.  
 ( $d$ ) Cum Appolloniam per nivem obsideret PLUTARCHUS in vita. Habet etiam BARTHOLINUS *de nive* p. 187. RHAZES ad MANSOREM L. V. c. 6. BOERHAAVE l. c. & olim XENOPHON in *expedit.* CYRI MIN.  
 ( $d^*$ ) HIPPOCRAT. *aphor.* I. n. 15.  
 ( $e$ ) KINNEIR p. 66.  
 ( $f$ ) COLE *perspir.* p. 149.  
 ( $g$ ) LISTER in *aphor.* p. 137. BOERHAAVE *Praelect.* T. III. p. 620.  
 ( $g^*$ ) *Idée de l'homme physique* p. 141.  
 ( $h$ ) GORTER p. 52. 53. 54. 55. 102. SCHWENKE p. 34.  
 ( $i$ ) *Univ. Magaz.* 1753. Maj. & vegetatio april. *ibid.* Pulsus accelerat *diff. sur le mouvement. des muscl.* p. 96.  
 ( $k$ ) NOLLET. *Philosoph. transf.* n. 486. *Univ. mag.* 1753. maj. in columba *Mem. de l'Acad.* 1748.  
 ( $l$ ) Ab  $\frac{1}{5}$ . ad  $\frac{1}{4}$ . KRAZENSTEIN *electr.* n. 46. a  $\frac{18}{80}$ . nempe libræ ad 4. uncias, five  $\frac{26}{80}$ .  
 ( $m$ ) *Mem. de l'Acad.* 1748. p. 178.  
 ( $n$ ) *Ibid.* p. 180. Amisit in 5. horis  $\frac{1}{52}$ . sui ponderis, & columba  $\frac{1}{140}$ . Illud  $\frac{1}{57}$ . æquivalet tribus libris humanis.  
 ( $o$ ) p. 179.  
 ( $p$ ) *Ibid.* p. 183. 184.  
 ( $q$ ) p. 187.



cias quatuor & sesqui drachmas perspiravit ( *r* ). Id quidem non multum videtur; & tamen 324. granis communem exhalationem ( *s* ) ejus hominis superat. Calor interim nihilo augetur ( *t* ). Sic vini generosi modicum perspirationem auget ( *t*\* ).

Ita ira & pericharia ( *u* ) corpus faciunt levius, timor & mœstitia gravius, levissimum ( *x* ) animi consolatio ( *y* ).

Sed etiam frictio perspirationem ( *z* ) auget, etsi Cl. viri repugnarunt. Nam & calor & rubor cutis ostendunt perspirationem augeri, & res ipsa ( *a* ).

Sic aer calidus ( *b* ), omnibus comparatis perspirationem auget, estque ea in omnibus nuperis experimentis æstivis ( *c* ) mensibus, quam hibernis, major ( *d* ); diurna nempe ( *e* ), nocturna enim hieme fit in aere calido. Ad focum hieme perspiratio æstivæ æqualis ( *f* ) fuit. Cæterum æstate diebus 9½. perspiratio fuit 27. l. hieme 27. diebus 26. librarum, dupla ergo æstate ( *g* ).

Ea confirmantur ab experimentis Cl. RYE ( *h* ), LININGS ( *i* ), KEILII ( *k* ). Aliter ergo interpretari oportet, quæ de hiemali perspiratione liberiori SANCTORIUS ( *l* ) prædicat. Ad robur videntur pertinere, quod nempe corpus hieme absque noxa diminutionem perspirationis ferat, quæ fit duarum librarum in die ( *m* ).

#### §. XV. *Aucta materiei perspirabilis penus.*

Primus modus, quo ea augetur, potus est uberior, cum calore conjunctus. Experimentum non reperio, sed facile est cognitu, ex cute rubente,

( *r* ) p. 190.

( *s* ) Ibid.

( *t* ) *Mem. de l'Acad.* de 1748. p. 189.

( *t*\* ) RYE p. 288. SANCTOR. *Secl.* IV. n. 62. cum allio.

( *u* ) SANCTOR. S. VII. n. 1. 11. 24. 25. ROBINSON *discharg.* p. 77.

( *x* ) n. 1. 15. ROBINS. *ibid.*

( *y* ) n. 6. 19.

( *z* ) KEIL p. 176. SANCTORIUS S. V. n. 22.

( *a* ) GORTER n. 95.

( *b* ) NERUCCI p. 57.

( *c* ) RYE p. 295. Parum perspirari, nisi ad ignem.

( *d* ) Venæ cutaneæ minores SWAMMERDAM *respir.* p. 106.

( *e* ) 6. unciar. in die RYE p. 296.

( *f* ) KEIL p. 175.

( *g* ) DODART p. 238.

( *h* ) p. 62. seq.

( *i* ) p. 66. seqq.

( *k* ) *Aphor. Stat.* p. 174.

( *l* ) *Secl.* II. n. 41.

( *m* ) *Secl.* II. n. 7. 52.



bente, molli, laxa, vapore leni madente, quæ post theæ potum sequitur, & sudorem præcedit.

Deinde huc cibi pertinent, quibus, qui abstinebit, parum certe perspirabit.

Qui non coenavit, is ea nocte tertia parte minus perspirabit [ *n* ]. Cum non coenasset Cl. HOME, ita non perspiravit, ut etiam pondere augeretur [ *o* ], cum post corporis exercitium incoenatus lectum petiisset. A jejunio unius noctis perspiratio minuitur 22. uncias [ *p* ], nempe ad 18. uncias [ *q* ] reducitur, quas oportet esse quadraginta. Post longum jejunium, si corpus liberalius nutriatur, perspiratio una libra fit plenior [ *q*\* ].

Contra cum Cl. RYE 8. &  $\frac{1}{2}$ . libras intra 24. horas consumsisset, perspirationem unius horæ habuit l. quatuor, unciarum octo, media in hieme [ *r* ]. Et alius, cum cibum & potum ad 7. l. & uncias 7. auxisset, perspiravit [ *s* ] libras quinque, uncias 13. plus quam SANCTORIUS: quem tamen Cl. SECKER [ *t* ], ob magnam cænam adeo abundantes nocturnas perspirationes habuisse suspicatur, & in universum voracem fuisse adparet, cum 8. l. cibus potusque omnium aliorum virorum mediam mensuram superet, qui experimenta fecerunt: uti perinde SANCTORIANA perspirationis mensura media maxima est omnium, etiam Caroliniana major.

Contra KEILIIUS, qui levissime coenabat, nocturnam perspirationem minimam [ *u* ] habuit: duodecim enim uncias [ *x* ] cum  $\frac{2}{5}$ . perspirabat: SANCTORIUS uncias 40. 50. & 80. Hinc illa ROBINSONI adnotatio, mutari perspirationem a calore & frigore eo magis, quando multum editur, & contra [ *x*\* ].

Potissimum autem in perspirationem cibus abit, quando aliquot horarum spatio vires digestionis expertus, in sanguinem resorbtus est, & ita nunc tenuis, ut per minima ostiola de corpore decedere queat. Nimis frequen-

[ *n* ] SANCTORIUS Sed. IV. n. 20.

[ *o* ] Ad duas uncias p. 250.

[ *p* ] SANCTOR. S. IV. n. 20.

[ *q* ] IDEM S. III. n. 2.

[ *q*\* ] IDEM S. III. n. 71.

[ *r* ] p. 297.

[ *s* ] p. 260.

[ *t* ] n. 13.

[ *u* ] DODART p. 236.

[ *x* ] p. 14.

[ *x*\* ] Food an discharg p. 59.



frequenter hoc experimentum ipse feci, quando post gravissimum morbum totis annis debilis vix carnis unciam digerebam. Post cibum pinguem, carnemve, diuturnum frigus experiebar, siccissima cum cute, & multa pallente urina. Id frigus sensim in aridum calorem, demumque in sudorem cum agrypnia solvebatur.

Tempus minoris perspirationis est, quando stomachus plenus [y] turget. Tribus [z] horis a pastu parum perspiratur [a] & quatuor [b]. In ipso pastu unius unciae in hora est perspiratio [c]. Quatuor horis vix libra perspiratur [d]. A quinta hora ad nonam perspirantur in somno librae duae [e]. Quinta nondum dimidiam libram, octava tres invenitur perspirasse, in hora libram [f]. Intra i. & sextam a pastu horam quatuor unciae in hora perspirant, sed insequentium horarum singula unciae novem [g]. Exercitium hora a cibo septima ad duodecimam triplo plus insensibiliter resolvit, quam alia hora [h]. Perspiratio matutina duplo major est, & trium unciarum [i], nempe librae in hora; contra si coctio non peracta fuerit, ne quadrantis librae [i\*]. Mane corpus maxime electricum est [i†].

Facile etiam intelligitur, plus perspirari post cibum levem, tenuem, qui facilis coctionis sit, minus post cibum pinguem, tenacem, qui difficulter superetur, & cujus pars magna, ob immeabilitatem, in conspicua & crassa excrementa consumatur.

Carnes a coena ad prandium perspirant uncias octodecim [k], tenues  
cibi

[y] SANCTORIUS Sect. III. n. 52.

[z] Minus, quam una matutina GORTER p. 120.

[a] SANCTOR. S. I. n. 53.

[b] GORTER p. 13. 16. 90. duplo parcius, quam aliis horis.

[c] DODART p. 233.

[d] SANCTOR. S. III. n. 76.

[e] Ibid.

[f] Id. Sect. IV. n. 29.

[g] DODART p. 233.

[h] SANCTORIUS S. V. n. 7. De ejus perspirationis magnitudine COLLE post consil. de Epilept. p. 89.

[i] GORTER p. 13. ed. nov.

[i\*] SANCTORIUS S. IV. n. 7.

[i†] ROGER p. 57. &c.

[k] SANCTORIUS S. III. n. 4.





cibi uncias 40 [l]. Caro fuilla [l\*], & boleti triente perspirationem minuunt; ostrea [m] non sunt perspirabilia Melones quadrantem auferunt [n].

§. XVI. *Cutis laxa.*

Maxima hujus laxitatis potestas est Et primo juniores homines, quibus mollis & expansa cutis est & madens, abundantius perspirant [o], sudantque [p], quam senes, quibus sicca cutis, in rugas collapsa, & dura est.

Deinde huc pertinet magna illa nocturna perspiratio, quæ fit sub stragulis. Tecti enim dum jacemus, animalium [q] plumis pilisve obruti, qui vaporem ex corpore nostro exeuntem coercent, neque sinunt diffugere, colligitur circa cutem nostram vapor tepidus, & humens, quo sensim cutis emollitur, & ostia cutanea laxantur. Id quidem non fit subito, serius vero ocysusve non potest non sequi. Roscidam vero, & cedentem sub digito cutem infantum, ejusque in matutino somno uvidam mollitiem solebat egregie BOERHAAVIUS pingere. In eo vapore adeo abunde perspiramus, ut cum cordis motu potius lentiori, in quietissimo corpore, hæc perspiratio diurnam æquet & superet, quæ fit corpore exercitato. Hieme, cum 16. uncias diurna moti corporis perspiratio non superasset, nocturna ad 35. [r] 40. & ad 60. uncias pervenit, fitque perspiratio [s] minimum diurnæ dupla [t].

Sed inprimis SANCTORIUS adnotavit, exercitio corpus minus perspirare, somno magis [u]. In somno corporum juxta cubantium bonæ malæque qualitates melius communicantur [x]. Somno si detrahis, minues perspirationem [y]. Post vigilias insolitas somnus 7. horarum auget perspirationem libra una [z]. Septem horis perspiratur ad 35. [z\*], 40. [a] uncias 2.

[l] n. 5.

[l\*] ID. S. III. n. 23. 24. 45.

[m] RYB p. 210.

[n] SANCTOR. S. III. n. 25.

[o] *Anc Mém.* p. 276. *Hist. de l'Acad.* 1707. p. 234. apud du HAMEL I. p. 67.

[p] Sibi juniore plurimum fuisse sudorem, a trigesimo vero quinto. anno urinam CARRAN in aphor. p. 286.

[q] RYB p. 296.

[r] DODART p. 236.

[s] RYB p. 295.

[t] p. 284.

[u] *Secl.* IV. n. 6. S. V. n. 25.

[x] S. IV. n. 58.

[y] S. IV. n. 30.

[z] S. IV. n. 54.

[z\*] In 12. horis nocturnis ad 1. *Fenz.* p. 557.

[a] S. III. n. 1. S. IV. n. 19.



uncias, & quinquaginta [b], & quinque libras [c], duplo plus, quam in vigilia [d].

Olim TACHENIUS, ut diximus, sub tela oleo tincta quatuor [e] aquæ uncias collegerat, & etiam ex ulceribus cutaneis noctu plus puris effluit [f].

In quiete perfecta melius perspiratur, quia vapor melius colligitur. Ea sola arte HARVEIUS [g] nonnunquam morbos avertebat, aucta, ut videtur, perspiratione. Hæc forte ratio est, quare corpus in lecto circumvolutum minus perspiret [h], & eadem facit, ut dolor perspirationem minuat [h\*].

Non est a somno, neque a majori motu cordis. Fusius alias ostendimus [h\*\*], somnum cum rariori pulsu, & lentiori respiratione conjungi, & homo, cum solis suis vestibis dormiens, in eodem aere certo friget. Qui dormiunt pedibus nudis, una libra minus in nocte perspirant [i]. Dormientem exiguum frigus magis lædit, quam vigilantem frigus intensius [k]. Stragula detecta plus nocent, quam vestes in vigilia abjectæ [l]. Contra vestibis calentibus melius dormitur [m], & perspiratur, & vestibis bene muniti melius [n] perspirant.

Hieme ergo, quando aer frigidus perspirationem minuit, longior in lecto mora requiritur [o], ut perspires, quantum satis sit. Somnus hieme utilior [p].

Sponte tamen id privilegium noctium tepidarum evanescit, pulsusque, qui fuerat frequentior, ad solitum numerum redit. Si corpus 10. a cœna horis quieverit, perspirabit multum, sin diutius, impediatur [q] per-

K 2

spiratio.

[b] S. IV. n. 1.

[c] S. III. n. 69.

[d] S. IV. n. 2. 18.

[e] *Morb. princ.* p. 153.

[f] *Elem. de physiol.* p. 126.

[g] COLE p. 145.

[h] SANCTORIUS S. I. n. 90. cum S. IV. n. 5. 13. & S. V. n. 4. KEIL p. 116. AUGERI GORTER p. 274. nempe si sub stragulis corpus agitur.

[h\*] SANCTOR. *Sect.* I. n. 49.

[h\*\*] L. XVII. *Sect.* III.

[i] SANCTORIUS *Sect.* IV. n. 12. KEIL p. 116.

[k] SANCTOR. S. IV. n. 14.

[l] ID. S. IV. n. 52. add. S. I. n. 50. II. n. 36.

[m] ID. S. I. n. 91.

[n] *Sect.* II. n. 47.

[o] RYE p. 295. 296. decem horis.

[p] SANCTOR. S. IV. n. 41.

[q] SANCTOR. S. V. n. 11.



spiratio. Nimio somno corpora frigescent [r], imperspirabilia fiunt & ponderosa. A nona post coenam hora ad 16<sup>am</sup> vix libra [s] perspiratur. Ita fit, ut somno pinguescamus, nempe pondere augeamur.

Cæterum non omnes scriptores in hac nocturnæ perspirationis abundantia conveniunt. Cl. LININGS & in prioribus tabulis [t], & in posterioribus [u], perspirationem diurnam nocturnæ facit sesquialteram, in ratione fere quæ sit 1. ad 0.644. [x].

Sed etiam KEILLIUS [y] nocturnam perspirationem perexiguam facit, & nonnunquam nullam, ut in augmentum ponderis degeneret. Et DODARTUS nocturnam minoris [z] æstimat, atque J. de GORTER [a], & B. ROBINSON [b]. Plerique forte ob parvam coenam [c], forte etiam ob minorem stragulorum usum, aeremque in Carolina præcalidum, qui faciat, ut & noctu homines male se contegant, & interdiu in æstuoso aere plus transpirent.

SANCTORIUS, sed unice a cibis difficilis coctionis, ad 18 uncias [d] nocturnam perspirationem aliquando depressit. Eam copiam Cl. HOME non valde superavit [e]. Certe rubra mollisque cutis hominis sani, noctuque ex Europæo more tecti, non sinit dubitare, quin libera sit transpiratio.

Denique non alius modus est, quo vehementiora perspirationis incrementa obtineantur, quam balneum, etiam si aliqua aqua inhiberi videtur. Conjungit enim vim caloris & laxitatis. In semihora uncia 15. cum semisse [g], & 16. uncia cum semisse [g\*], & in hora sesquilibra [h],  
per

[r] IDEM S. IV. n. 50.

[s] IDEM S. III. n. 76.

[t] *Philos. transf.* n. 470.

[u] n. 475.

[x] n. 475. p. 323.

[y] Ad 12<sup>2</sup>/<sub>5</sub> unc. cum diurnam faciat sesquialteram p. 14.

[z] Æstate nocturna perspiratio est 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub> unc. diurna 48<sup>1</sup>/<sub>3</sub>. apud A. Claudium DERR-  
ENY. *Ergo in somno perspiratio diminuit.*

[a] Ad 24. unc. ut summum.

[b] In ratione 1298. ad 896. p. 72. & tab. 3. 11.

[c] KEILLI & GORTERI. Nam belgæ parcissime coenant.

[d] *Secf.* III. n. 4.

[e] p. 244. &c. 248. 250. & libræ, unciarum 15. unciarum 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

[f] MARTYN *Phil. transf.* n. 607.

[g] Le MONNIER *Mem. de l'Acad.* 1747. cum calore 34. grad. REAUMUR pulsu non citato.

[g\*] Ibid. p. 270. Tantum 5. uncias admittit MARTYNE p. 270. &c. INGRAM *cases.*

[h] KEIL p. 16.



per balneo perspiravit. Intra 14. dies homo ex balneorum usu 28. libris levior factus est [i].

§. XVII. *Quæ perspirationem minuunt.*

Contraria priorum, ut facile intelligitur, minuunt perspirationem: quies primo, & vita iners, ex qua cutis pallet, corpus friget [k]. Frigore & quiete perspiratio unius horæ vix est semuncis [l]. Quietè in aere humido & frigido incrementum ponderis 13. unciarum [m].

Externum frigus magnam in perspiratione potestatem exercere ostendimus, cum hiemalis perspiratio æstiva semper minor sit [n].

Humidus etiam aer, quem oporteret igneas particulas vehementer educere [n\*], perspirationem valde minuit, ut in adtractionem convertat [n\*\*]. Ob frigus aeris inhalatio 8½. unc. in 2½. horis [o]. Humido frigidoque aere minus edendum est, quia minus perspiratur [p]. Siccitates imbribus salubriores, reddunt corpora leviora [q]. Autumno corpora pondere augentur, quia minus perspiratur [q\*].

Ipsæ scintillæ lucidæ, quæ de cute prodeunt, melius nitent, & copia abundant spirante borea, minuuntur ab austris [r].

Subitum si frigus calido corpori supervenerit, subito etiam constringuntur vascula [r\*] excretoria cutis, & vesicæ quasi excitantur, ut videatur, multa vascula in unicum convenire, quod porum multis communem habeat, eo vero poro a vi frigoris utcumque clauso, aquulam exhalantem super cutis superficiem effundi. Ea celeriter per vasa bibula resorbetur, evanescit, & alvum citat, ut sæpe monuimus, aut urinam. Sphincteres cutaneos Cl.

K 3

viri

[b\*] l. c. p. 27.

[i] WAINWRIGHT of *bathing* p. 164.

[k] SANCTORIUS *Sect. V. n. 12.*

[l] KEIL p. 15.

[m] RYE p. 206.

[n] p. 71.

[n\*] SHEBBEARE II. p. 22.

[n\*\*] KEIL *de vi adtrah. corp. anim* p. 43. & in *tabulis* 4. dec.

[o] LININGS n. 470. p. 497.

[p] Non excedendæ 4. libræ. RYE p. 210.

[q] SANCTORIUS S. II. n. 8.

[q\*] GORTER p. 320. ed. nup.

[r] BETBEDER *hydroceph.* p. 7. 8.

[r\*] Hæc tubercula ab humore unguinoso in vagina contracta ob constrictionem orificii collecto derivat III. LUDWIG *de humor. cut. inung.* n. 24. Sed non videtur ejus unguinis æque velox excretio esse.



viri suspicantur esse, qui ea vasa mordente frigore claudant [s]. Sed potest, absque musculari vi, etiam cellulosa fibra a frigore contrahi & crispari. Nam etiam a morte ea anserina cutis gignitur [t].

Alias, ut dudum monuimus, perspiratio ad urinæ vias convertitur. Suppressio urinæ sublata cingulo lato frigida intincto [u]. Alias eadem in pulmonem [x], in cellulosam subcutaneam redit [y]. Cum pori a terra selenitica balnei Carolini obstringerentur, tumor universalis subitus (y\*). Terror, qui frigus facit, etiam subito exhalabile in aquam conversum in tubercula convertit.

Materiem subtrahit ciborum vel defectus [z], vel mala coctio. Quoties enim materies ciborum non ita a viribus nostris subigitur, ut in sanguinem recepta, per minima vascula meare apta sit, deest utique penus exhalantis liquidi, & solet tunc alia excretio sensibilis in locum perspirationis succedere.

Robustus homo, inquit SANCTORIUS, cibos [a] absument perspiratione; minus robustus urina, debilis corruptione, nempe per alvum, aut vomitum demum; aut denique morbus supervenit (b). Qui plus adeo justo per excretionem visibiles amittit, is minus justo perspirat [c], idque malum [d] est. Sanus homo neque sudabit, neque multum minget, neque alvo erit fluida (d\*).

Et urina quidem, uti monui [e], in hypochondriacis male digerentibus sub primis a pastu horis abunde fluit, alvus altero mane liquida egerit.

Cutis rara, alvus densa [f]. Alvi fluxus perspirationem minuunt [g].  
Hinc

[s] LISTER *Anat. Exerc.* II. p. 28. BOERHAAVE *Prel.* n. 8. & 423.

[t] *Comm. lit. Noric.* 1740. hebdomada 35.

[u] RUTTY *Synops. of min. mat.* p. 21.

[x] A subita immersione in frigidam catarrhus funestus YOUNGE *currus. triumph. tereb.* p. 8.

[y] Ab ambulatione per frigus tumor mirus scroti HOFMANN *de aere microcos.* facit. Ex subito frigore hydrops IDEM *de morb. &c.* n. 13. A potu frigido tumor scroti, & universi corporis DIOMED. CORN. *obs.* c. 30. & DEIDIER *des tum.* p. 182. 183. Similia habet HERELIUS *de usu poros.* p. 12. *Bresl. Samlung.* 1723. M. Febr.

[y\*] SPRINGSFELD *Carlsbad* p. 254.

[z] p. 72.

[b] *Secl.* I. n. 43.

[d] S. I. n. 14.

[e] p. 73.

[g] SANCTORIUS *Secl.* I. n. 54.

[a] *Secl.* III. n. 14.

[c] S. I. n. 13.

[d\*] S. I. n. 12. 13. 14. 21.

[f] HIPPOCRATES.



Hinc in homine sano alvus vitio lubrica fit [b]: & exercitatio corporis alvum duram facit [i], ut copiosam perspirationem. Estque signum, bene perspirare cibum aliquem, quando ab eo faeces consistentes decedunt [k]. Diarrhoea perspirationem minuit [l]. Lactuca, ut alvum ciet, ita minuit perspirationem [m].

Ea die, qua medicamentum purgans sumitur, parum perspiratur [n], nisi lenissimo remedio alvus moveatur [o]. Et poterit fieri, ut purgatio, quæ sani hominis perspirationem minuit, ægro promoveat, dum aufert corrupta [p]. Certe KEILIIUS negabat a purgantibus perspirationem minui [q], neque a diarrhoea minui admittit G. RYE [r]. Satis est certum tamen, in morbis acutis, in quibus oportet cutem laxam esse, adeo adversam esse perspirationi diarrhoeam, ut eam felicissimi medici, ipseque WERLHOFFIUS, opio comprimant.

Hinc cibi non facile digerendi, neque perspirabiles sunt, ut ostrea [s] soleæ, fungi, cucurbitæ. Hinc perspiratio repersa alvum movet, ut pedum frigus, adpersio frigida [t]. Vomitus perspirationem pariter divertit [u].

Hinc excretiones se compensant [x]: & humores ab ulcere ad alvum, ab ea in sudorem, hinc in lacrimas, inde in salivam, denuo in alvum, denique iterum in cutem decubuisse visi sunt [y]. Dum glandulæ cutaneæ multum humorem eructant, dupla vis purgantis pharmaci requiritur ad solvendam alvum [z]. Ipsa pulmonum perspiratio [a] compensat canum aut nullum sudorem [b], aut perparcum [c].

Denique

[b] n. 104.

[k] Sect. III. n. 30.

[m] RYE p. 288.

[n] SANCTORIUS Sect. I. n. 53. S. III. n. 86.

[o] Cassia I. n. 48. add. KEIL.

[p] GORTER ed. prior. p. 107.

[q] p. 17.

[r] p. 273. cum faeces libras duas ponderarent.

[s] RYE p. 269. 288.

[t] STEVENSON *Ess. of a Societ. at Edimb.* T. V. p. 895. ed. nup. INNES de ileo p. 35. Lienteria a vestibis æstivis subito pro hibernis substitutis RIVIN. *de morbo. vestit.* p. 7.

[u] SANCTOR. S. I. n. 54. 89.

[x] RUSSEL *Oeconom. nat.* Sudor diarrhoeam & perspirationem minuit GORTER II. p. 178. 179.

[y] GORTER ed. II. p. 175.

[z] RUSSEL ibid.

[a] BERGER p. 184.

[b] p. 46.

[c] FLOYER *pulsewatch* II. p. 348. QUINCY *stat.* p. 46.



Denique cutis dura, & densa minus perspirat, ut in senibus exemplum est, inque nonnullis peculiaribus hominibus. Ita in CURZIANA [d] illa cutis induratione nullus erat sudor, nulla perspiratio, inque alio homine, nocturnis astrorum contemplationibus ita cutis induruerat, ut neque sudaret, neque omnino fordes in cute colligerentur [e].

Etiam tunc fere ab aliis secretionibus suppletur [f].

### §. XVIII. Utilitas perspirationis.

Cuti quidem, dum halitus arteriosus mollis cutem inter & epidermidem perspirat [g], videtur mollitiem & necessariam in papillis teneritudinem conservare [h], & epidermidem, ne nimis siccetur, humectare [i].

Universo corpori multam utilitatem præstare creditur, cum perspirare adeo commune sit omnibus animalibus [i\*], & vegetabilibus. Eo minus licet mirari, si a perspiratione repercussa morbos oriri ASCLEPIADES auctor fuit [i\*\*], febresque ab halituoso, quod non perspiraverit GALENUS [i†] deduxit, nisi aliqua alia evacuatione sublatum fuerit; si denique omnino a perspirationis integritate SANCTORIUS signum integræ valetudinis præcipuum sumsit, neque credidit nos ægrotare posse, quamdiu libera super est.

Integra valetudo conservatur, quando corpus absque sensibili evacuatione ad idem pondus redit [k] (nempe quando perspiratio maximam partem ciborum difflat). Stabilissima corpora sunt [l], quibus intra aliquot annos pondus non mutatur; & male habent, quibus est variabile [m]. Fluxile corpus est, quando perspiratio & sæpe interrumpitur, & reparatur [n]. Ita SANCTORIUS.

Ante

[d] *Discussione* p. IX.

[e] TURNER *diseas of the skin*. p. 127. Cutis induratae exemplum ZACUT. *prax. admir.* L. III. obs. 100.

[f] CURZIO *ibid.*

[g] KAAUW n. 773. 774. *thesis Par.* 1742. BARON. & du ROCHER.

[h] MALPIGHIUS *de organ. tact.* LISTER l. c. p. 380.

[i] PERRAULT *Ess.* III. p. 286.

[i\*] ERASISTRATUS apud GALEN. *advers. sect.* *Erasistr.* c. 9. Eruca intra 24. horas duplum sui ponderis æqualem cibum devorat, &  $\frac{1}{10}$ . augetur. Chrysalis ipsa plurimum perspirat LISTER *de humor.* p. 27. & pseudoeruca REAUMUR V. p. 96.

[i\*\*] Apud CELSUM l. c.

[i†] *Meth. medend.* L. VIII. QUINCY *anim. fibr.* p. 290. BOHN p. 213.

[k] I. n. 10. 15. II. n. 54.

[l] *Secl.* L. n. 69.

[m] II. n. 55.

[n] I. n. 16.



Ante morbum omnem perspiratio turbatur [o], indeque prima morbi semina dignoscuntur [p]. Ea diminuta corpus deficit [q]. Et totum corpus, quando non perspirat, laborat, & quæque pars [q\*] IDEM.

Qui bene perspirant, debiliores, sed saniores sunt, & a morbis facilius convalescunt [r]. Ipsa animalia multum boni a perspiratione habere videntur, ut equi a strigili & nitidiores, & saniores fiant [r\*].

Addebat vir Clar. nos ex aucto corporis pondere perspirationis diminutionem percipere.

Recte se ergo habere, quando corpus a somno leve fit, & mane leve de lecto surgit [s]. Certissimum signum bonæ valetudinis est, quando corpus ad stateram grave, tamen ad sensum leve est [t]. Contra lassitudines spontaneæ [u] mala morbosque prædicunt, & pessimum signum habetur, quando corpus, cum levius sit, ad sensum fit grave [x].

Satis etiam consentitur, diminutam perspirationem, per siccam senum cutem, causam esse podagræ [y], & rheumatismi; magis nocere diminutam in acutis morbis, minus in chronicis, quod in illis putredinis major sit metus [y\*]. Dysenterias epidemicas in antillis insulis grassari, quando frigida tempestas perspirationem sufflaminavit, ad alvum, ut videtur, percussis particulis acribus [y\*\*]. Calida tempestate eadem causæ febres faciunt; & ab ejus vi humores in putredinem [z] abeunt, cum volatile & acre elementum in corpore resideat. Excrementa tenuioris materiæ ea via emitti [a] GALENUS.

Exempla sunt abunde gravissimorum malorum a suppressa perspiratione natorum, quando corpus calidum frigori exponitur. Alios certe constat in maximos morbos

[o] Conf. I. n. 11. 43.

[p] I. n. 42.

[q] I. n. 40.

[q\*] I. n. 86.

[r] HIPPOCRATES περί τροφής.

[r\*] Lettera d'un cocchiere.

[s] Sect. I. n. 38. IV. n. 42.

[t] I. n. 30.

[u] HIPPOCRATES aphor. L. II. n. 5.

[x] SANCTORIUS S. I. n. 35.

[y] IDEM S. IV. n. 63. DESAULT de la goutte p. 29.

[y\*] GORTER p. 240.

[y\*\*] HILLARY barbad. HUGHES natur. hist. of barbad. p. 35.

[z] PRINGLE p. 429.

[a] GALENUS de atra bile.



morbos incidisse, febres [b], tetanosque [b\*], Linæ funestos, quando exæstuentes auram captaverunt [c]. Beriberi indorum, morbus ex convulsione & paralyfi conpositus, non alio modo contrahitur [d]. Alii omnino subito interierunt [e]. Eoque credas pertinere gangrænam pedum, in sola tela cellulosa residentem, quæ ex humido aere frequens supervenit [f]. Periisse puellam, cum undique cutis oleo obduceretur, in T A L M U D I C I S voluminibus legitur [g]. Hanc etiam viam esse probabile fit, per quam & in perenni quasi vitæ tenore sanguinem oporteat noxiis particulis purgari, & in febribus etiam magis, quando abundant. Intermittentes certe febres, & catarrhos, fere unice cum signis suppressæ perspirationis contrahi, humente cum frigore cute, certum est.

§. XIX. *Aliquæ ad ista animadversiones.*

Dudum vidit SCHELHAMMERUS [h], viderunt alii Cl. viri, nimium sibi in sua perspiratione S A N C T O R I U M placuisse. Aquam esse potissimum [i], quod exhalat, & cibi partem. Adeo facile aquam per alia vasa excretoria, cibum vero male coctum per alvum exire, ut non sit a diminuta [i\*], perspiratione multum periculi. Homines sanos perpetuo aliam & aliam portionem humoris cutanei exhalasse: ea ad duplum, triplumque diminuta, nihil morbi, & pro eadem portione aucta nullam ad meliorem valetudinem accessionem experiri. Cl. H O M E drachmas duas [k] perspiravit, & minus uncia [l], & unciam [m], & rescuncem [n], & biuncem [o], & tres uncias [p] & ultra [q], & quatuor

[b] ALEXANDRI post lavationem in Cycno fluvio. Funesta intra paucas horas febris DESAULT *de la pierre* p. 32.

[b\*] *Obs. Soc. Med. Lond.* I. n. 12. ULLOA p. 422. Stuporem membrorum Piso *de renatur. Ind.* L. II. p. 32.

[c] FEUILLEE *Journal*. Habet exemplum LAWRENCE *prælect.* p. 210.

[d] BONT *med. Ind.* L. II. c. 1. A frigore subita colica pictonum TRONCHIN p. 94.

[e] LORRY *des alim.* II. p. 328. DESAULT *de la goutte* p. 86. 87.

[f] HOME *factis* p. 82. 83.

[g] GUNZBURGER *med. talm.* p. 23.

[h] Nec satis certum, neque necessarium experimentum esse *physiolog.* T. I. p. 388.

[i] NERUCCI *Ep.* I. p. 116.

[i\*] p. 8. 79.

[k] *Exp.* 8. has cum incommodo, cum nempe auctus sit pondere *Exp.* 17.

[l] *Exp.* 4. 8. 12. 14.

[m] *Exp.* 1.

[n] *Exp.* 4.

[o] *Exp.* 3. p. 2. 3. p. 241. *Exp.* 5. 6. 7. 13. 19.

[p] *Exp.* 3. 7. 10.

[q] *Exp.* 3. p. 241.



tuor [ *r* ] uncias, & sex [ *s* ], atque adeo erat perspiratio 24plo major, quam cum minima esset. Neque minor fuit *Georgii Rye* in copia perspirationis varietas [ *t* ]. Etiam plantis iniqua est, & absque malo, perspirationis copia [ *t*\* ].

Denique perspirationem integram subpressam fuisse, inque inhalationem conversam [ *u* ], nulla cum noxa; & integras gentes [ *x* ], calidissimis in regionibus, oleo, unguine vario cutem ita obstruere, ut nulla libera ad exhalandum vasculorum oscula supersint; & tamen adeo parum ab ea cura lædi, ut credant se suæ salutis plurimum prospicere. Hydrops sanatus inunctione olei, & excitato urinæ fluxu [ *x*\* ]. Vitæ productionem a minori perspiratione *Franciscus Bacon* speravit, & nuper *A. de REAUMUR* [ *x*\*\* ], & ipse quod mireris *SANCTORIUS* [ *x*† ].

Etiam rigida hieme cutis [ *y* ] testimonio est, homines vel nihil perspirare, vel omnino exiguum quid, neque inde in morbos incidere.

Experimentis factis falsum esse addunt; ante morbos adeo certo perspirationem minui [ *z* ], & in plurimis & periculosissimis febribus primis diebus plurimam & exhalationem esse, & profusum sudorem, neque inde quidquam ferocitati morbi decedere. A felicissimis vero medicis & in variolis, & in miliari morbo, adeo non urgeri perspirationem, ut vim caloris emulsionibus, levique corporis operimento frangant.

Subitas illas a frigore mortes ad perspirationem suppressam non recte traduci, quæ alias in nervis subito concussis, in sanguine coacto causas habere possint [ *b* ].

Perspirationem maximam in regionibus æstuosis, Carthagenæ, in Barbado insula [ *b*\* ], Surinami, inque Persia [ *c* ] vires Europæorum subito fran-

L 2

gere,

[ *r* ] *Exp.* 9.

[ *s* ] *Exp.* 3.

[ *t* ] p. 62. seqq.

[ *t*\* ] *HALES Exp.* 1.

[ *u* ] *HOME Exp.* 17. *KEIL. RYE* p. 207.

[ *x* ] *HOTTENTOTTI* apud *NERUCCIUM* p. 109. *Nigritæ*, & varii *Orientalis indiæ* & *Americæ incolæ DAMPIER* T. I. p. 537. 538.

[ *x*\* ] *REAUMUR* II. p. 2. 52. 54. *GALEN. simpl. med.* L. IX. c. 2.

[ *x*\*\* ] p. 252.

[ *x*† ] *In l. fen.* p. 557.

[ *y* ] III *SENAC de febr. intermitt.* p. 9. *NERUCCI* l. c.

[ *z* ] *FLOYER* ante *asthma* nihil simile percipit. *Russi* ex fornace prodeuntes se in nivem sepelunt per duas horas

[ *b* ] *Sanguis* in magnis vasis & corde coactus *DESAULT de la goutte* p. 86. 87. *Bronchiorum* constrictioni tribuit *LORRY alim.* II. p. 328.

[ *b*\* ] *LIGON* p. 27.

[ *c* ] *CHARDIN* T. IV. p. 115. 116.



gere, neque minus debilitare, quam diarrhoeas [d]; debilesque etiam nobiscum esse, quibus palmæ manuum sudant. Persas minus edere, minus sanguinis habere, exercitia corporis minus ferre [e]. Posse morbosos humores utiliter perspirando diffiliari, sanum hominem cum magna in copia & in odore, atque adeo in naturā perspirationis varietate, perinde sanum esse posse. Cæterum & diffilatis aliquibus particulis acribus, juvat perspiratio, & boni signi loco est, quod cibos ostendit, ita subactos & extenuatos esse, ut perspirare possint.

Ponderis vero vel levitatis sensum nihil habere cum perspiratione connexum, pergunt IDEM. Proprii corporis pondus [f] non percipere sanos homines, quia in nervis musculisque satis est virium, ut id pondus elevare possimus, & transferre. Utique nos pondus percipere, quamprimum de viribus nostris aliquid deficit, magis humido aere, qui de solidarum partium viribus demit, minus sicco [g]. In febribus vero vires ex causa nondum satis cognita deficere videri; non quod cor nimiam partem virium sibi sumat; pessimis enim in febribus labor cordis non majore esse videtur, cum pulsus exigui sint: Sed ex putredinis in viribus frangendis peculiari potestate [g\*]: sed quod omnino id genus particularum, a quo febris nascitur, causam primam virium nervosarum in cerebro destruat. Diximus [h] de putredinosi odoris subita in occidendo efficacia. Analoga vis in febribus est ejus maligni & utcunque corrupti humoris, a quo morbus est. Sensi, & miror me convaluisset, ut testimonium possem eloqui, sensi repercussam febris miliaris materiem, ad ventriculum meum rediisse, eumque sensum lenis cumque vomendi conatu conjuncti deliquii excitasse, qualem homines experiuntur; qui in oscillando altius in aerem se projiciunt, & qui de eo ludo ob imminens deliquium coguntur desistere.

Ea nunc causa ante febres generatur & colligitur, easque facit & sustinet: neque est solita perspirationis materies; sed novum, & præter naturam collectum elementum, quod nullo augmento exhalationis superari possit,

[d] WAINSWRIGHT *of bathing* p. 176. *Med. Exp.* p. 323.

[e] CHARDIN.

[f] GORTER *perspir.* p. 167.

[g] ROBINSON *discharg.* p. 68.

[g\*] TRALLÉS *examen terr.* p. 191. 389. SAUVAGES *physiolog.* p. 138.

[h] L. VIII. p. 214. 215.



possit, aut expelli. Mihi quidem non perspirabile suppressum, sed alvi in unico die segnities, gravis morbi certissimum signum est.

§. XX. Inhalatio.

Primum ostendemus cutem humanam perviam esse aquæ, hydrargyro, tenuioribus particulis variis; deinde in homine vivo ejusmodi particulas utique per cutem nostram in ipsum sanguinem penetrare; denique ex aere aliquas particulas eadem via ad humorum nostrorum massam advenire.

Membranæ ergo humanæ omnes aquam transmittunt; cutis, ventriculus, vesica urinaria. Sal tartari in vesicam inclusus, ea in aquam projecta deliquescit [i]. Integerrima cadavera in aquis natantia, pota aqua intumescunt [k]. Corium hydrargyrum pressum facillime transmittit, etiam humanum [l], & metalla in corio a liquoribus extus circumfusus decolorantur [m]. Ova ipsa plurimis poris patent, & in muriam immersa saliantur [n].

Verum nunc non esse inorganicos poros, quos ea metalla penetrant, sed omnino venosos, qui ad cor ducant, hic ostendimus. Argentum vivum, notissimo exemplo, etiam cum pingui unguine cuti adfrictum evanescit, & si copia suffecerit, salivam citat, atque lueni veneream eodem modo sanat, quo quidem sanat per os propinatum.

Sed etiam absque frictu subit [o], & salivam ciet. Ab eo casu in braccas effuso angina [p]. Idem laminæ adplicatum, qua cancer occultus defendebatur, eodem cancro exulcerato effluxit [q]. Priori seculo, quo solo fere unguento mercuriali utebantur, vulgatissimum fuit, hydrargyrum resorbtum totum sanguinem replere, ut nummum ore receptum [r] dealbaret, aut cuti admotum [s]; &

L 3

in

[i] BOYLE *poros. corp.* p. 19. add. 42.

[k] KAAUW *perspir.* n. 437. 438.

[l] BOYLE p. 10. 12.

[m] IDEM p. 84.

[n] ID. ib. p. 21.

[o] HILD. V. *obf.* 93. 94.

[p] KAAUW n. 432.

[q] BARTHOLIN. *Cent. I. hist.* 7.

[r] VALVASOR *Ebre des H. Crain.* Vol. 1. p. 406.

[s] VALISNER *Oper.* T. III. p. 563.



in lotio [ *t* ] idem appareret metallum; & demum in ossium cellulis [ *u* ], inque perinæo [ *x* ].

Huc etiam pertinet, quod in curanda lue alii fumum incensæ cinnabaris mercurialem nudo unice corpore excipiant [ *x*\* ].

Etiam plumbum [ *y* ] frictione introducitur. In axillis gestatum lithargyrum fecit dyspnœam, lipothymiam, nauseam [ *z* ], vomitum, & similia mala cerussa ad intertriginem [ *a* ] admota successerunt.

Ab Arsenici tusi pulvere respiratio difficilis, dolor renum ( *b* ) & vesicæ. Ab emplastro arsenicali capiti imposito mors ( *c* ), & alia ægre servata, cum favo inpositum fuisset ( *d* ). A croco metallorum herpeti extus imposito vomitus ( *e* ). Vapor cupri ab aqua forte dissoluta digitis ad tactis fecit exurentem in tota manu dolorem, qui totum corpus pererravit, tamquam ex puncto ardente scintillæ spargerentur ( *f* ).

Oleum petræ vertici instillatum saporem in ore reddidit ( *g* ).

Ex plantis spirituosæ quidem medicamina extus admota inebriant ( *h* ): terebinthina manibus tractata vim suam exferit, qua urinam violæ odore tingit ( *i* ): oleum Cayeput plantæ pedis adfrictum ori saporem suum reddit ( *k* ): oleum tabaci in linguam felis, [ quæ cuti continua est particula ] instillatum totum animal odore suo imprægnavit ( *l* ), ejusque plantæ decoctum, cum eo caput lavaretur, vomitus fecit, & deliquium ( *m* ), & convulsiones ( *m*\* ) &

[ *t* ] VALVASOR *ib.* DEIDIER *Mal. vener.* p. 60. & 241. VERCELLONI. BURGHARD *vener. Krankh.* p. 940. BREYER *ophthalm. vener.* n. 13.

[ *u* ] MEAD. *of poisons* p. 206. qui ab usu potissimum externo derivat. BONNET *prodr. anat. pract.* c. 67. CARDAN *subtil.* L. V. BOYLE *l. c.* p. 61. FANTON. *Consultat. & res.* p. 100. MARC DONAT. *L. I. c. ult.* in dente BOYLE p. 62.

[ *x* ] MEAD. p. 193. CHREYNE.

[ *x*\* ] Sufficere PORTIUS *dissert.* p. 306.

[ *y* ] MALOUIN T. II. p. 49.

[ *z* ] ZELLER *docimæs. vini litharg. mangonifæ.* p. 18.

[ *a* ] IDEM.

( *b* ) *Journ. de Med.* 1759. M. April.

( *c* ) ASTRUC *des tumeurs* p. 400. WEPFER *cicut.* p. 209. MEAD. p. 110. &c.

( *d* ) *Eph. Nat. Cur.* Vol. IX. obs. 37.

( *e* ) *Eph. Nat. Cur.* Dec. II. ann. I. obs. 43.

( *f* ) *Phil. transf.* Vol. I. p. 1.

( *g* ) STORCH *Krank. der Schwangeren Frauen.* p. 175.

( *h* ) LOUBET *obs.* p. 125. & ore gestatum G. V. SWIETEN T. III. p. 213. *Physiolog.* Amstel. edit. p. 312.

( *i* ) KAAUW n. 430.

( *k* ) SCHWENKE p. 200.

( *l* ) BIRCH T. II. p. 42. 43.

( *m* ) KRAMER *med. milit.* II. p. 80. BOYLE *poros.* p. 23.

( *m*\* ) *Journ. de Medec.* 1757. Juill.



& ebrietatem ( *n* ), & vomitum, cum ventriculo imponeretur ( *o* ), & ejusdem plantæ oleo chemico illito, alvi purgatio successit ( *p* ). Panis ventriculo impositus roborat ( *q* ). Sed etiam opium in emplastro admotum fecit delirium ( *r* ), somnumque funestum, cum ad dentem admoveretur ( *s* ); timidius ista tamen recenseo, quibus alii contraria proferant ( *t* ).

Ab aconiti fasciculis sinui impositis omnino debilitatas fuisse puellas ( *u* ) bonus auctor exstat, & hellebori albi radices ventriculo impositas vomitum movere lego ( *x* ). Sic amara medicamenta abdomini extus admoti vermes subigere ( *y* ), pilulasque cordi impositas purgasse ( *z* ), & a contrectata colocynthide alvum valide solutam ( *a* ) fuisse novimus. Venenum Conganis notum esse lego, quod contacta manu occidat ( *a*\* ). Rubiam manu retentam lotium rubro colore tingere vetusta fama est ( *b* ).

Omitto experimenta ( *c* ), in quibus per electricum torrentem vapor balsami peruviani in corpus receptus: purgantium vero medicamentorum ( *d* ) manuve retentorum vires in alvum efficaces redditæ fuisse dicuntur. Suspecta enim experimenta esse non ignoro.

Cantharidum virus aut lectarum, aut manibus retentarum ( *e* ), aut in emplastro admotarum ( *f* ) vesicam mucosam privat, urinæque facit ardorem, etsi non penitus perpetuo ( *g* ).

Ut

- ( *n* ) BOYLE *util. exper. philos.* p. 276. *porosit* p. 23.  
 ( *o* ) *Ess. of a societ. at Edimb.* T. II. p. 46.  
 ( *p* ) BOYLE p. 24. ( *q* ) KAAUW n. 426.  
 ( *r* ) IDEM *impet. fac.* n. 436. LORRY in *Journ. Encyclop.* 1756. Janv.  
 ( *s* ) ALEXANDER BENEDICT L. II. c. 6.  
 ( *t* ) NEGAND *Pract. de Chir.* T. II. p. 204. extus admotum sopire.  
 ( *u* ) VIRIDET *du bon chyle* p. 204. & nuper CL. SCOPOLI *flor. Carinthia.*  
 ( *x* ) ETTMULLER *præf. chir. infus.*  
 ( *y* ) BAGLIV. p. 435. de unguento ex arthanita PECHLIN p. 408.  
 ( *z* ) FALLOP. *med. purg. simpl.* p. 22. 46.  
 ( *a* ) BRASSAVOL. *simpl.* p. 449.  
 ( *a*\* ) BUFFON T. III. p. 466.  
 ( *b* ) CARDAN *subtil.* p. 517. NONNUS p. 34. *Sim. SETHI.*  
 ( *c* ) PRIVATI *reflexion* p. 49. 50.  
 ( *d* ) BIANCHI apud VERATTI *obs.* XI.  
 ( *e* ) HEERS *observ.* p. 100. BOYLE *mir. subt.* c. 4. p. 29. ESSICH *de sorbendi modo* p. 14. ALLEN *synops.* L. X. c. 16. addend. *Hist. natur. des anim.* I. p. 390. de HEYDE *corp.* p. 38. 97. Febrem faciunt, & oris siccitatem LANGRISH *pract. med.* p. 166.  
 ( *f* ) La MOTTE *Chir. complet.* T. IV. p. 13. tanta stranguria, ut pro calculo haberetur. *Act. Vratisl.* 1744. April.  
 ( *g* ) GEYER *de canthar.* p. 39. 1717. *Mem. de l'Acad.* 1732. p. 233.



Ut propius ad humanum corpus accedamus, multi sunt scriptores, qui luem veneream tactu genitalium putidorum receptam esse consentiunt (*b*), aut cute, nam negant alii (*i*), vitia tamen cutanea & abscessus in dorso (*k*) inde supervenisse admittunt. Sic etiam, cum brachium gulæ animalis lue vaccarum peremti medicus inseruisset, mala multa passus, & in adfini casu mors ipsa secuta est (*l*).

Contra salutaris eventus halitus humani, aut animalis alicujus in resolvendis sugillationibus (*m*), in morbis gravissimis (*n*) superandis, inhalationem necessario ponit locum habere. A spongia ad lienis sedem admota sanatio (*o*). Manus vulnerata cum rigiditate, vivis canibus inserta, & paulum correctâ sanata est (*p*).

Huc pertinent illi, vulgo noti, boni effectus, quando ancylotici rigidi que artus in calido intestinorum decocto foventur, & similis atrophie sanatio (*q*).

Omitto sanguinis balneum ad lepram, ipso malo funestius, quod contendunt sanare (*r*).

Denique vapor aquæ calidæ in manum resorbetur (*s*), & homini in balneo constituto cutis tumet & rubet (*t*), corpus pondere augetur (*u*), fitis sedatur (*x*), & omnia signa eduntur aquæ resorbte (*y*), & sanguini admistæ (*z*).

A pediluvio diarrhoea, ex resorpta aqua (*a*).

Nunc

(*b*) *Eph. Nat. Cur.* Vol. VII. obs. 75. PALFYN *Anat. Chir.* p. 50. LOUBET obs. p. 199. BORELL. *Cent.* II. obs. 92. HILDAN. *Cent.* I. obs. 100. quæ tristis est historia.

(*i*) *Journ. de Medec.* T. III. n. 1.

(*k*) Negant enim alii eo modo & absque venere luem contrahi *Pandect.* VALENTINI P. I. Sect. II. c. 12.

(*l*) BERGIUS *förfök* 1756. p. 87.

(*m*) Sugillationes superat BURRHUS p. 58.

(*n*) Exemplum Cæsaris Borgiæ mulos insuti, cum a veneno vehementer laboraret, habet CARDANUS *de Venen.* p. 89. & RHODIUS *Cent.* III. obs. 37. *Conf. Bresl. Saml.* 1724. p. 321. 1726. p. 851.

(*o*) SCHWARZ *de decas.* II. obs. 9.

(*p*) BOYLE *poros. corp.* p. 49.

(*q*) BECKET obs. 30. Cuti quotidie recenti involutus artus.

(*r*) RICHTER *de balneo &c.* p. XIII.

(*s*) KAAUW n. 426.

(*t*) HENKEL *betbesda* p. 126. 127.

(*u*) DESAULT *mal Vener.* p. 54.

(*x*) KAAUW n. 423. CASSIUS n. 5.

(*y*) SPRINGSFIELD *Carlsbad* p. 293. BURGHART *Landekeybad* p. 194.

(*z*) BELLIN. *miss. sang.* p. 147.

(*a*) SIMSON *diff.* p. 183.



Nunc demum de vaporibus, quibus aer imprægnatur, certum est, aliquid per cutem resorberi, ut de terebinthinæ vapore (*b*) in cubiculo sparso, a quo urinæ odor inficitur. Accubitu contracta phthisis (*c*), & podagra (*d*), & contra celebre illud consilium HERMIPPI (*e*) puellarumque vegetarum accubitus senibus commendatus.

In aere humido (*f*) denique corpora humana adeo vehementer inhalant, ut id augmentum ponderis exhalationem superet (*g*). Nocturnam inhalationem ad 2. 4. & 6. uncias æstimat Cl. de GORTER (*g*<sup>\*</sup>).

In aere humido Jamaicensi perpetuo sudatur, neque eo minus mingitur (*h*), neque multum bibunt homines, equi vero & boves parum & raro (*i*). In mari pacifico natæ nono & 17. demum die bibebant (*i*<sup>\*</sup>).

Memorabilem denique aquæ copiam esse, quæ per cutem de aere resorbetur, tum amplitudo organi ostendit, quod resorbet, tum suppressio perspirationis, quam non credibile est nullam fuisse, etsi ab inspiratione superabatur, tum certa denique exempla hominum, qui maximam vim urinæ reddiderunt, cum interim parum biberent. Olim *Petrus CASTELLUS MASCARDUM* nominat, qui 10plo (*k*) plus per tres annos minxerit, quam bibebat. Duplo plus reddebat, quam biberat, & turbidam aquam alius (*l*), & triplo iterum alius (*m*). Apud *Matthiam de GRADIBUS* historia feminæ legitur, quæ cum cibos omnes revomeret, & plus revomeret, quam sumebat ciborum, & bis per septimanam venam secaret, sanguinisque emitteret uncias 7. 8. totis sex aut 8. mensibus, tamen supervixit. Duodecim pintæ quoti-  
die

(*b*) MERY *Mem. de l'Acad.* 1707. p. 167.

(*c*) SCHURIG *Spermatol.* p. 560.

(*d*) In catulos transiens BORELL. *Cent.* III. *obs.* 28.

(*e*) Jan. DAMASC. *aphor.* p. 54. pro paralyti: BARTHOLIN. *morb. bibl.* n. 9. SYDENHAM p. 79. BACO de VERULAM *hist. vit. & mort.* p. 360. KEIL p. 11. 20. Et in *Diff. de corp. anim. vi adtrah.*

(*f*) CHEYNE *sanit. inf. tuend.* p. 129. LANGRISH *med. pract.* p. 214.

(*g*) Ad duas uncias F. HOME p. 250. ad quatuor uncias LININGS *Phil. transf.* n. 470. p. 497. Ad 13. uncias G. RYE p. 206. Ad octodecim KEIL p. 11.

(*g*<sup>\*</sup>) p. 244. 245.

(*h*) *Phil. transf.* n. 27. LIGON *barbad.* p. 27.

(*i*) LIGON.

(*i*<sup>\*</sup>) *Voy. des terr. austr.* II. p. 72.

(*k*) In tripode delphico p. 50.

(*l*) HORNUNG *cist. medic.* p. 371. 372.

(*m*) DONAT *Hist. med.* IV. n. 27.



die per lotium redditæ leguntur (*n*), & quatuor amphoræ (*n*<sup>\*</sup>). Homo ex pectore laborans in 7. horis minxit libras 7., & in alio paroxysmo libras 10. deinde 3. 4. diebus continuis ad libras 70. (*o*). Virgo nobilis quotidie 260. uncias urinæ edidit, absque cibo & potu (*p*).

Ex GATINARIA (*q*) puella quotidie per 60. dies pocula minxit 16. qualia tria biberat, ut in eo tempore 1740. libris urina superaret, & super cibum potumque amiserit libras 1740. felici tamen eventu. Monacha urinæ incredibilem copiam reddidit (*r*). Virgo 20. libras absque siti vel morbo per 60. dies amisit (*s*). Totis diebus nonaginta septem, quadraginta quotidie libræ lotii redditæ (*t*).

Similem pene narrationem BOERHAAVIUS (*u*) refert, & hydropica corpora ejus naturæ esse, ut aerem imbibant, conjicit Antonius de HAEN (*x*).

In his exemplis, cum plus urinæ reddatur, quam cibus potusque possint reparare, & cum ipsum corpus paucos ad dies tantæ jacturæ sufficeret, etiam si totum in aquas diffunderet, creditum est (*y*), ab aere omnino humorem resorberi. Respiratione sola absorberi non posse tantum aquæ, calculis positus C. TAGLINI reperit (*z*).

Quare cum præterea & mortuæ spongiæ (*a*), & chordæ (*b*), & vestes (*c*), & omnes plantæ (*d*) perinde inhalent, uti exhalant, nihil videtur intercedere, quin perinde credamus, per cutem inhalare animalia, uti exhalant. HIPPOCRATI (*e*) id non ignoratum fuit, neque GALENO (*f*),  
scholæ-

(*n*) *Phil. transf.* n. 56.

(*n*<sup>\*</sup>) *Delic. Med. Chir.* p. 762. 763.

(*o*) PISSINIUS *de diabet.* p. 6. 7.

(*p*) PISANI p. 32. quæ nimis fere mira historia est.

(*q*) CARDAN. *variet.* L. VIII. c. 44. ex MARLIANO & GATINARIA. SCHENK *Excerpt.* p. 566.

(*r*) KENELM DIGBY *pulv. symp.* p. 168. 200. l. Pet. SERVIUS *de ung. armario.*

(*s*) PISSIN p. 5. annon eadem historia cum illa, quam ex GATINARIA citavimus?

(*t*) MUNDINUS *Comm. Bonon.* T. I. p. 145.

(*u*) n. 416.

(*x*) *Rat. med.* P. IV. p. 118.

(*y*) FONTENELLE de puella gratianopolitana BOERHAAVE &c.

(*z*) *De aere* p. 167. 168.

(*a*) GORTER *nov.* p. 131.

(*b*) *Ibid.*

(*c*) KEIL &c.

(*d*) HALES *veget. stat.* p. 150.

(*e*) Περὶ τρωφῆς p. 40. *Epidem.* IV. σαρκὶς ὅλκοι ἐξέρχον.

(*f*) *De usu puf.* c. 5.



scholæque toti, neque ulli nuperorum (*g*). Aerem ea via resorberi non fit probabile (*g*<sup>\*</sup>).

Per venulas cutaneas inhalari maxime probabile est, etsi non facile est, eas ita replere, ut sudent (*g*<sup>\*\*</sup>).

Est aliquod etiam inhalationis genus, quod non de aere resumit, sed de superficie cutis sub cuticula. Necesse est venas dari, quæ humorem resorbent, qui in vesicas ab ambustione factas effluxit, quando epidermis immobilis nihil transmittit (*h*).

§. XXI. *Quibus a causis augeatur.*

Contrarias cum exhalatione videtur causas habere. Plantæ certe, quæ interdiu, & per calorem exhalant, eadem noctu, & per frigus inhalant, turgent, mole augentur.

Huc etiam per priora pertinet aer humidus (*i*), unaque frigidus: quies (*k*), & desidia: adfectus tristis (*l*), a quo frequenter & subito urinæ in aquosas mutantur, percussio perspirabili (*m*); metus, a quo diarrhoeæ. Creditur metum cutis vasa inhalantia laxare, ut facilius morbosus effluviis pateant, in peste potissimum (*n*).

SECTIO III.

TACTUS.

§. I. *Tactus peculiariter dictus, quid sit.*

**Q**uando accuratius proprietates corporum nobis circumpositorum cognoscere volumus, de quibus neque ex oculorum judicio definire  
M 2 licet

(*g*) CROMWELL MORTIMER in diff. de humorum introitu in corp. hum. QUINCY stat. p. 126. GORTER l. c. p. 41. ed. 1. HAGUENOT de transpir. insens. Corn. CONSENTIN p. 230. LEFEVRE physiol. l. p. 100. DOULLET Ergo dantur vasa absorbentia. J. de SANDEN morb. cut. n. 158. ROSEN anat. p. 228.

(*g*<sup>\*</sup>) MUSSCHENBROECK de aere p. 40. 41.

(*g*<sup>\*\*</sup>) Per pilos vitale quid adtrahi HELMONT de homin. & mort. p. 116.

(*h*) BARON & DESBOCHERS in thesi Paris. 1742. discussa.

(*i*) p. 77.

(*k*) Ibid.

(*l*) Conf. p. 71.

(*m*). L. XVII.

(*n*) RIVINUS unice a terrore pestem credebatur propagari. Sed de ea re alias quæretur.



licet, neque alio ex. sensu, solemus uti apicibus digitorum nostrorum, qua sede epidermis in rugas spirales contorquetur: possemus autem perinde analogis apicibus digitorum pedis uti, nisi incessus, & calceorum confectio eos digitos minus idoneos redderent, quorum cæterum eadem est fabrica.

Ea pulpa digitorum nervis est plenissima, qui & secundum flexoriam partem digiti, & per latera adveniunt (*a*), adque eas papillas, ut videtur, ramis tendunt ultimis: sunt etiam papillæ, quam in dorso digitorum, & fere ubique in corpore, majores (*b*).

Magnum hoc hominis privilegium est, cum, præter simias, nullum animal quadrupes ejusmodi mollem pulpam habeat, qua corporum proprietates exploret; cum enim super extremos digitos fere incedant, gressu & pondere, & confricatione, callos sibi excitant ea in parte, quorum primordia in ipso animalis fetu sunt; vidi enim in juniore catello & callum, & musculum motorem insertum. Avibus etiam ea sede cutis callosa est.

Subtiliter addidit Cl. de BUFFON (*c*), hominem ob fissos digitos (*d*), distinctiores ideas corporum sibi præ brutis animalibus comparare: hinc pisces stolidi, quibus (*e*) nulli artus: serpentum vero esse proprium, quod se circa corpora plicent: multo denique perfectiorem fore (*f*) tactum, si in digitos numerosissimos manus finderetur.

Hæc partim vera sunt, partim falsa. Solidipeda, ut equus, potius dociliora, & minus stulta sunt, quam bisulca, qualis porcus est, quam aliqua fissipedum, ut cuniculus, quam demum ipsa simia, quæ hominis fere manum nacta est. Neque video, cur uno alterove digito non perinde subtilis tactus exerceretur; cum nos ipsi unico plerumque, aut ad summum duobus ad tactum digitis utamur.

Alia vero digitorum est prærogativa, quod soli globum, adeoque omnia corpora, rectius comprehendant, firmiterque teneant, dum longissimum polum, brevissimi fines æquatoris, medii medios meridianos contineant.

Ut

(*a*) Quatuor truncos describit ESCHENBACH n. 1022.

(*b*) p. 8.

(*c*) *Hist. général. & partic.* T. III. p. 358. seqq. Homo tactu excellit IDEM T. IV. p. 31.

(*d*) Habet etiam CONDILLAC I. p. 339. VANDERMONDE *moyens de perfectionner l'espèce humaine* T. II. p. 447.

(*e*) p. 360.

(*f*) p. 359. Negat CONDILLAC *des sensat.* I. p. 339.



Ut accuratius vero tangamus, fricamus leniter digitos contra corpus, cujus proprietates volumus dignoscere, adeoque multa puncta ejus corporis ad papillas nostras, aut idem punctum ad multas papillas adprimimus, & diverso gradu papillas ad id corpus urgemus, uti ad eas id corpus accedit, aut subjacet cominus, aut vicissim recedit.

Creditum est papillas erigi (g), & quasi de suis specubus prodire, ut accuratius objectum corpus explorent. Conjectura fuit, posse sanguine eo determinato repleri, ut promineant, papillæ muliebris exemplo, penisque, & demum linguæ (h) papillarum. In vivo certe homine, & in corpore, cujus arterias artifex colorato liquore replevit, papillæ convexiores sunt, & melius, quam in cadavere (i) eminent. Reliqua fere ex conjectura dicuntur, etsi ea non est improbabilis. Facile enim intelligitur, eminentes, & erectas, papillas & majorem superficiem corpori tangendo præbere, & longitudinem aliquam nactas facilius ab eodem compelli, & moveri. Acuta vero & conica figura aptius inpellitur, & melius corporum occurfus excipit (i\*).

§. II. *Qualitates corporum, quæ tactu dignoscuntur.*

Primum dignoscimus corporum figuras varias. Acumen adgnosimus a vehemente pressione ab exiguo objecto facta, rotunditatem a mediocri adfectione ex objecto etiam majori, aque ea adfectione per medium majori, per latera decrescente: ambitus omnes figurarum plerumque ex successione eminentis, adeoque efficacioris, limitis, quo figura ambitur, aut omnino non quidem magis efficacis, sed diverso tamen modo nos adficiuntis, ac quidem a reliquo corpore adficimur; asperitatem, & inæqualitatem sentimus, quia aliæ partes digitorum vehementius adficiuntur, quæ nempe eminentiis corporis adplicantur, aliæ minus inde patiuntur, quæ videntur respondere mediis convallibus. In levore omnes pariter adficiuntur.

M 3

Ad

(g) *De organo tact.* p. 7. 8. si hunc locum intelligit PRÆCEPTOR. VATER *de consens.* part. I. BOERHAAVE *Prælect.* T. IV. p. 4.

(h) BOERHAAVE *Prælect.* T. IV. p. 419.

(i) Ibid.

(i\*) HARTLEY p. 43. *Extremæ partes corporis acutæ acius sentiunt* IDEM.



Ad asperitates subtiliores refero colores, quos tactu dignotos fuisse adeo multi testes exstant, ut non audeas refragari. Cæcus (*k*) ex morbo colores commistos ita tactu dignoscebat, ut etiam in lineatis mistisque coloribus dignosceret, mistos esse. Femina colorem rubrum, cæruleum & viridum distinguebat (*k*<sup>\*</sup>). Asperrima ajebat (*l*) esse nigra lintea, rubra levissima. Colores chartarum lusoriarum distinxisse addunt (*m*).

Durum objectum esse cognoscimus, quod ei pulpa nostri digiti cedat; molle, quod cedat digitis; grave, quod vehementer premamur ab exigua mole; leve, quod parum premamur a magno volumine; humiditatem, quod aqua cuti adhærescat; siccitatem, quod idem non fiat.

Calorem metimur a comparatione cum calore nostri sanguinis, & potissimum cutis. Calida nobis videntur, quæ calorem nostrum superant; frigida, quæ infra eum sunt. Quare homini nulla vera mensura caloris data est; neque cognita fuit, ante thermometrum inventum. Hinc hieme calidæ cellæ, æstate frigidæ, nempe immutatis sunt caloris, qui hieme non perinde, ut in aere ambeunte decrevit, æstate non perinde auctus est. Hinc illa ab Academicis Gallis adnotata peregrinatorum, a montibus Quitenfibus ad maritimam planitiem descendentium, aut vicissim per eam a squalido littore adscendentium controversia, quorum illi in medio monte aerem incaluisse, hi refrigeratum esse adseverabant.

Ab experientia nata est illud cæci CARTESIANI (*n*) de distantia judicium. Duobus convergentibus baculis ante se prominentibus utitur, & ex angulo, quo se ii secant, de vicinia objecti judicat, nempe propinquum esse, quando is angulus magnus, remotius, quando parvus est. Non crediderim insitam Geometriam esse, & ad mera repetita experimenta refero, per quæ non de angulo constat, quem cæcus ignorat, sed discitur, vicinum objectum majori vi baculum contra nos impellere. Sed alias hæc melius redibunt.

### §. III.

(*k*) Organista Amerfortensis BOYLE *de colorib.* p. 42. ex relatione Eduardi FINCH. Eundem hominem vidit PECHLINUS L. III. *obs.* 8. Du HAMEL *de corp. adfect.* p. 278. MECKERN C. 15. Alium KUNDMANNUS *Seltenheiten* p. 700. Alium Mansfeldiæ comitem BARTHOLINUS *Hist.* 44. *Cent.* III. & alium STURMIUS *phys. gener.* p. 403. alios fratres wustios MURALTUS *Vademec.* p. 497. Habet etiam GRIMALDUS *de lum. & color.* RASZYNSKY *hist. nat. Pol.* p. 347. MURATORI *della fantasia* p. 28.

(*k*<sup>\*</sup>) HAMBURG. *Magazin* T. XX.

(*l*) Instar acuum pungere KUNDMANNUS.

(*m*) Le CAT *des sens* p. 211. FRITSCH *seltsame Händel* T. II. n. 9. p. 771. MECKERN l. c. Non tamen credo colores in chartis distinxisse, sed circumferentias figurarum.

(*n*) *De homine* p. 58. 59.



§. III. *Num tactus non fallat.*

Nostro ævo multi in eo fuerunt Cl. viri, ut ostendant cæterorum sensuum errores, & visus imprimis tactum corrigere (o), & ideas imprimere fortes, quæ melius conservantur: ut cæcus sculptor a tactu solo didiceret, simillimas hominum statuas fabricare (p).

Hæc omnia partim vera sunt, partim falsa. Id tactus quidem est privilegium, quod ab eo ipso corpore adficiamur, de cujus conditionibus pronunciamus, cum in visu oculus, in exemplo, non a conspecto corpore, sed ab alio, radio nempe colorato tangatur.

Cæterum multo minus, quam vulgo scribunt, sensus reliqui fallunt, ipseque visus.

Equus absque ullo tactus adjumento, ad quem unus quadrupedum ineptissimus est, distantiam oculo optime metitur, & destinatam fossam accurate transilit. Animalia recens nata, ut agni, matres suas quærunt, & inveniunt; musca, nunc de ovo exclusa, oculorumque nuper potens, ad fætidum corpus absque ulla experientiæ institutione, recta ex odoris ductu tendit. Sed de istis alias.

Deinde tactus perinde errat. Non adducam experimentum STURMI (q), quo decussati digiti unum globulum nobis indicant, tanquam duo essent. Sed omnino, siquidem a tactu de eorum conditionibus judicamus, eas notas conditiones ex tactu nunquam ejusmodi discimus, quales sunt in corpore, sed quales per media a natura interposita velamenta possunt a nostris papillis percipi, ut ea re nihil a visu tactus diffideat.

Sit in nervo aliqua major impatientia sollicitationis, quod frequens est in hypochondriaco malo (r), poterit perpetuus sensus quasi frigidaæ auræ ei homini incommodus esse, quod etiam lenissimus aeris adtactus ingrato modo ejus nervulos feriret. Anna Austriaca Galliaë R. sola in subtilissima tela, quam Baptistam vocant, quiescebat, eique lodices etiam ex pulcherrimis belgarum linteis facti, asperi videbantur. Alia neque holo ferici tactum, neque perfici mali teneram pubem ferebat (r\*).

Qui

(o) BUFFON *Hist. natur.* T. III. p. 363.

(p) Le CAT. l. c.

(q) STURM *sensus unus geminus* p. 8.

(r) *Comm. Nor.* 1738. hebdom. 49.

(r\*) POUTEAU *obss.* p. 172.



Qui calidæ manus immerfit, educit fere collapsos a vi exhalationis digitos, & adeo sensiles, ut præ incommodo vix vestes induat, asperaque ipsi videantur, quæ nullum sano homini sensum imprimunt. Quibus epidermis aliqua sede tenuior, ibi etiam ad lenem auram sensibilis est.

Contra stupent digiti ob paulo crassiores epidermidem, aut ob aliud vitium satis cognitum, ut in femina mihi cognata vidi, cui ad 70. annum nullus in digitis suæ manus sensus fuit (s). Sed & callus sensum supprimit; vidique robustos homines, spinas urticasque defringere, quæ teneræ puellæ cutem undique exulcerassent. Sunt etiam, qui vix ullum tactum retinent, sani homines (s\*), ut ne acum sub unguem infixam, neque unctionem percipiant (s\*\*).

A velamenti ergo crassitie etiam in tactu pendet inpressio asperitatis, aliarumque in corporibus, quæ tangimus, conditionum sensatio.

Iterum huc pertinent, quæ modo dixi. Consuetudo facit, ut frigida eadem videantur, quæ alia cum consuetudine calida viderentur. Intolerabilis æstus est officinarum vitriariorum, in quibus operæ liquidum metallum, tubis ferreis de fornace sibi sumunt, & sufflant, & nos ne minimo quidem tempore duramus.

Si tactus eadem corpora, cum iisdem conditionibus, aliter & aliter menti representat, potest adeo perinde judicia a mente excitare falsa, cum non possit contrariorum utrumque verum esse.

Ideas memoriæ minus fortes mihi imprimere videtur. Nam certe visa castella, montesque mihi facile repræsentant, inque cerebro pingo. Voluptates, & dolores absentes non possumus revocare. Sed de his alias.

#### §. IV. *Effectus tactus in corpus humanum.*

Præter relationes de corporum conditionibus, voluptas, titillatio, & dolor a tactu in mente excitantur.

Voluptas, quoad tactum, est is status corporis, partisve alicujus corporis, quem velis durare. Non omnis voluptas vehementer nervos emovet.

(s) Simile exemplum habet BOYLE *util. phil. exper.* p. 154. BLANCARD *Juarregister* I. C. IV. n. 33. & in se ipso COLLINS p. 58. qui amicum excitat, cui per totum corpus stupor molestus sit. In virgine BARTHOLINUS *Cent. IV. Hist.* 82. Aliud exemplum habet DIEMERBROECK p. 502.

(s\*) BARTHOLIN. l. c. ut ne quidem famem perciperet, neque gustaret.

(s\*\*) IBID.



vet. Scabere prurienti magis deliciosum est, quia cutis nuda fricatur; idem nimis vehemens. Infecta esse, quæ eam pruriginem excitant, ex optimi *Hyacinthi* CESTONI invento constat, quæ eadem & in farina habitant, & in scabiei pustulis, suoque incessu, suctuque, & compunctis cutis nervulis eam pruriginem excitant.

Vehementiores voluptates sunt, quando in partibus corporis humani summe sensilibus papillæ confricantur. Ut a venereis abstinence, in aurem penicillum subeunt Chineses, eumque rotant, ita sensum excitant vehementem, quem pro tertio a Venere & Cerere deorum dono habent.

Ea frictio, quando grandis nervus nudior subjacet, abit in titillationem. A leni frictione labiorum: a simili frictione plantæ pedis palmæve manus, & in nonnullis hominibus a cutis frictione, quæ costis & ossibus ilium interjacet, ea titillatio sequitur, vehemens certe sensus, ut grandis nervi, & ægre tolerabilis (t). Alii homines, quibus titillationis minor sensus est, videntur aut minores ea sede nervos habere, aut profundius positos, densiorique cute, aut adipis majori volumine tectos.

Dolor est is status corporis, quem esse nolimus. In nervis alias ostenditur (u), esse non adeo destructionem, sæpe enim innocentissimus dolor absque vestigio evanescit: sed emotionem quamcunque majorem, majorem inquam, nam eadem causa in calloso homine voluptatem, in tenero dolorem faciet, neque adeo gradus sunt alii, nisi quod minor emotio menti placet, major displicet.

Dolor omnis nervi est, omnis adeo partis corporis, major idem, ut nervi majores, cerebro propiores, nudiores sollicitantur. Dolor gravissimus est cutis nudæ, qua sede papillarum est plurimum. Barbari Americani, quibus laudi est & dolores maximos ab hoste pati, & infligere vicissim, norunt quid constantiam mentis turbet maxime. Ungues avellunt, ut adhærentes unguibus papillæ illæ longæ lacerentur: aut penem clavo transverberant, quem lente agitant. Inde paronychiæ dolores (x).

Sæpe in me ipso & nunc experior, hominem nunquam esse absque dolore, neque ita molliter sedere, aut decumbere, quin aliqua sensatio

(t) In mortem abeunt KLOEKHOF de morb. anim. p. 51.

(u) L. XVII. Sect. II. n. 1.

(x) Non a tendinibus, qui insensiles HEUERMANNUS T. III. p. 242.



tio ingrata superfit flexi artus pressive, aut alia quæcunque. Eam facile negligimus, & est ex iis sensationibus, quarum conscii non sumus. Quam primum animum adtendimus, totum corpus, in quo nihil sentiebamus, in sensum excitatur, & ubique fere incommodum percipimus. Hæc causa est, cur situm corpus necesse sit mutare: & cur in lecto nos agitemus.

§. V. *Epidermis.*

Ad tactus violentiam moderandam epidermis a natura facta est. Demeam adeo minimi momenti particulam, jam tota vita hominis tormentum erit. Cutis enim emplastri vesicatorii vi ab epidermide denudata nullam vestem, & ne auram quidem feret. Nunc & quidem singulis in partibus tantum de nimia papillarum sensilitate epidermis demit, quantum ad vitæ usus auferri præstitit: parum demit in glande penis virilis, in labiis, ad basia destinatis, ubi tenuis est; plurimum vero in principio inferiori hallucis, inque cute calci subjecta, cui corpus oportebat inniti. Utrumque non necessitate fit, sed a manifesta DEI providentiæ. Nam & puero jam tenera cuticula est, cui nullus penis est usus, & fetui crassa plantæ pedis epidermis, qui nondum se calceis adtrivit.

Mucus MALPIGHIANUS, oleum cum pilis exsudans, perspirabile sub epidermide adfusum, eas papillas conservant molles, tenerasque.

Pili in universum calefaciunt, & primævæ animalium sunt vestes: hinc in homine, quando nimius in capite æstus dominatur, utiliter refecantur. In delirio caput tondet ARETÆUS (y), in cephalea feliciter alii (z).

Eosdem pilos exhalationem olei promovere, dum foramen liberum servant, per quod idem oleum exhalat, & dum cellulosam telam circa finem bulbum colligunt; est Cl. LUDWIGII sententia (z\*).

LIB.

(y) *Errat acut. I. c. 1.*

(z) HELWIG *obs.* 73. p. 150.

(z\*) *Humor. cut. inung.* p. 28.



## LIB. XIII.

## G U S T U S.

## S E C T. I.

## SEDES ET ORGANI FABRICA.

S. I. *Organum.*

**M**ULTA cum tactu similia gustus habet: & acrimoniam, quam distinguit, etiam nuda cutis molestant percipit. Habet autem etiam alia, sibi propria.

Præcipua sedes hujus sensus est in lingua, & in apice (*a*) quidem linguæ, atque proximo margine: in dorso obtusior (*b*), & eo minus subtilis, quo propius ad Epiglottidem acceditur. Diuturniorem ibi esse (*c*), & vehementiorem alii monent; forte, quod acriori unice a sale oriatur.

Molliores sapes sola lingua percipit, ipsiusque sacchari dulcedo (*d*), & salis ammoniaci amaror (*e*) non alibi mentem adficit, quod experimentum & ego repetii, eoque ipso summis viris persuasum est (*f*) solam linguam gustare. Sed alii sapes sunt magis efficaces, & iique etiam alia, præter linguam organa adficiunt. Labia, inquit post veterum aliquas voces Cl. *Nehemias* GREW (*g*) helleborus urit: palatum (*h*) Belladonnæ saporem distinguit, uvula (*i*) pimpinellam percipit, & si-

N 2

napi

(*a*) BELLINUS *gustus organ.* p. 224. *Isag. Anat.* c. 58. NEMESIUS L. II. c. 9. HAMBERGER p. 464. &c.

(*b*) *Isag.* l. c. nullus BELLIN. ib. Gentianam sentit GREW. Elaterium tota lingua percipit IDEM. Radix linguæ etiam gustat C. A. BERGEN *pentas obs.* n. 2.

(*c*) HAMBERGER. PARSONS *Phil. transf.* n. 404.

(*d*) BOERHAAV. *Prælect.* T. IV. p. 25.

(*e*) BELLINUS *gust. organ.* c. 14. p. 224.

(*f*) BOERH. l. c. DUVERNEY *posth.* p. 259. etiam REVENHORST *de fabr. & usu ling.* n. 86.

(*g*) *Anat. plant.* p. 284. Buccæ LUCHTMANS p. 58.

(*h*) Palatum etiam gustat NOLLET *leçons de phys.* T. I. p. 162. LUCHTMANS p. 58. 76. LEEUWENHOECK *Phil. transf.* n. 315. NEMESIUS. BELLINUS p. 226. RUYSCH *Thes.* II. aff. IV. n. 12.

(*i*) LUCHTMANS p. 58. de absinthio. GREW. p. 285.



napi (*k*): oesophagus (*l*) absinthii saporē sentit. Imum os faucesque saporis non sunt expertes (*m*). Ventriculum sunt, qui addant (*n*): remonent vero de ore gingivas (*o*).

Inde naturam interpretari possumus, quando legimus, sublata lingua gustum superstitem fuisse (*p*). Puella, cui tuberculum pro lingua supererat, recte gustabat (*q*).

### §. II. *Lingua. Papilla truncata.*

Lingua tamen plerorumque saporum sola est particeps, & in omnibus acrior. Ejus communia quædam diximus (*r*); sequuntur aliqua, quæ peculiariter ad gustandum pertinent.

Linguae natura, quæ musculos comprehendit, cutanea est (*s*), continua cuti, quæ os & palatum convestit, pariter ex filis varie intricata, aliquanto tamen mollior, pinguior quasi, & pulposa magis, & cum musculosa carne absque motu connexa (*t*), a qua numerosos nervos habet.

Ejus cutis facies, quæ musculos recipit, & quæ cis apicem est, versus ductus whartonianos, simplex quidem est & brevis. Qua vero palato conditur, & in apice, atque marginibus, undique quidem efflorescit *papillis*, multo quam in cute conspectioribus (*t\**).

Earum in homine hæc natura est. *Primum* genus est peculiare, sola in parte postremæ proxima & superiori dorsi situm: eæque fere in speciem literæ V. (*u*) disponuntur, angulive, cujus vertex in media lingua posteriori

(*k*) HARTLEY *on man.* T. I. p. 156.

(*l*) Le CAT p. 221.

(*m*) NOLLET. PAULI in v. HORNE *microcosm.* p. 25. BELLIN. p. 226. inter uvulam & confinia, & in tonsillari lamina. Corticem peruvianum percipit PETERSEN *de cortice peruv.* p. 20. &c.

(*n*) Le CAT p. 221.

(*o*) LUCHTMANS.

(*p*) *Phil. transf.* n. 464. *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 3.* le CAT p. 225.

(*q*) *Mem. de l'Acad.* 1718. p. 8.

(*r*) L. IX. p. 421. 422.

(*s*) LUCHTMANS p. 64. REVENHORST n. 40.

(*t*) LUCHTMANS p. 63 64. REVENHORST *ibid.*

(*t\**) *Rimosa & lobosa* DUVERNEY *posth.* T. 18. f. 2.

(*u*) COLLINS p. 227. *tab. 2. f. 2. f. 2.* non bono ordine. SCHELHAMMER *programm. valedict.* n. 5. RUYSCH. *Thes.* III. p. 9. *thes. I. aff. 2. n. 2.* & *tab. 4. f. 6.* MORGAGNI *adv. I. tab. 1.* WINSLOW IV. n. 507. *seqq.* VATER *de duct. saliv. tab. 2.* COSCHWITZ *de duct. saliv. f. 3.* & in *mea disp. f. 2.* *Première classe* WINSLOW n. 508. LIEUTAUD p. 175. *Maximæ* DUVERNEY *posth.* p. 252. t. 18. f. 5. In camelo videntur pingere PARISINI.



steriori loco, & frequenter in ipso foramine cæco (*u*\*) reperitur. Septem ac octo, & novem numeros ejusmodi papillas, in una fere serie. Tres tantum fuisse ALBINUS (*x*), quinque VATER (*x*\*). Vidi supra 20. fuisse, cum una in cæco foramine, altera ante idem, alia pone poneretur, decem aliæ in duabus lineis, aliæ autem vagæ extra eas lineas distribuerentur. Sic etiam fere DUVERNEYUS (*x*\*\*).

Omnium papillarum longe sunt maximæ, & referunt conos truncatos (*y*), qui basi sua liberi, apicem in lingua haberent demersum. Ea basis aut magis manifesto, aut obscurius, in cavitatem infundibuli similem deprimitur, & puncto quasi perforatur (*z*). Duriusculæ sunt, & multum accipiunt conspicuorum nervorum (*z*\*) & vasculorum, quæ cum celluloso albo textu in unum colliculum abeunt. Solet eos fossa quædam circularis (*a*) circumdare, quam ipsam paulum tumidus anulus involucri linguæ finit. Vidi ex una fovea duas, aut tres papillas prodire (*a*\*). Aliquæ, non multæ, similes, per dorsum linguæ ante priores disperguntur.

A glandulis (*b*), utique sibi vicinis, facile separantur, duritate, soliditate non cava (*c*).

### §. III. *Papillæ fungiformes: conicæ & aliæ.*

Obtusæ papillæ & pone lineas illas truncatarum papillarum reperiuntur, & aliæ antè in lingua habitant. Tumores sunt hemisphærici, perforati, sparsi, distincti, ad triginta, & eadem papillarum classis in fungiformes (*e*) degenerare videtur.

N 3

Fungi-

(*u*\*) VATER *de ductu saliv.* p. 23. 28. *Mus. propr.* p. 89. MORGAGNI. TREW *epist.* ad HALLERUM p. 10. DUVERNEY t. 18. f. 2. 5. p. 253. Etiam duæ & tres f. 4.

(*x*) L. I. *Adnot.* c. 14. p. 56. Sex MORGAGNUS.

(*x*\*) f. 2.

(*x*\*\*) Tab. 18. f. 3. 4. Fere decem f. 6.

(*y*) Videtur etiam ita velle ALBINUS L. I. c. 14. p. 56.

(*z*) MORGAGN. in *ic.*

(*z*\*) DUVERNEY t. 18. f. 5.

(*a*) IDEM *ibid.* Circulum habet RUYSCH foveamque *Thes.* I. Circulum etiam exprimit MORGAGNUS.

(*a*\*) MORG. *Adv.* VI. p. 126.

(*b*) Glandulosas esse Cl. VERDIER. Muci officinas COLLINS p. 228.

(*c*) LUCHTMANS p. 74.

(*e*) Inter medias ALBINI p. 56. f. 6. *tab.* I. Seconde classe LIEUTAUD p. 175. WINSLOW n. 510. Cum lentibus comparat le CAT p. 226.



*Fungiformes* (*f*) plerumque cylindricæ sunt, apice obtuso, subrotundo, crassiori, sæpe tamen vix latiori, quam est pedunculus. Incipiunt in dorsi parte posteriori, hætenus rariores & sparsæ, potissimum ante duas lineas papillarum truncatarum, tamen etiam pone & circa easdem (*g*).

Deinde antrorsum sensim minores (*h*) fiunt, & versus linguæ apicem magis confertæ (*i*), ipsis conicis magis numerosæ pergunt. Ordinantur in lineas, quæ a media lingua divergunt, abeuntque in papillas gustatrices apicis, a conicis unice diversas, quod tamen obtusiores sint.

Numerosiores omnino sunt, & præcipuam tribum papillarum linguæ constituunt papillæ (*k*) conicæ (*l*), quæ & anteriora tenent, & posteriora (*m*), etiam pone foramen cæcum, sine modo gracili, modo brevius conico. Earum posteriores rectiores, anteriores magis inclinantur, & apice libero sunt mobilique. Eædem marginem linguæ & apicem pene solæ occupant. Penitus in apice linguæ mole valde diminutæ, descendunt secundum linguam in lineas parallelas, ad perpendicularum ordinatæ, & demum succedit glabra epidermis.

Intercedunt istis aliæ papillæ, ex conicis filiformes, cylindricæ, longæ, graciles, quales etiam circa truncatas reperiuntur, & antrorsum minores, & latera tenent confertæ, circa marginem acutum copiosæ. Earum aliæ majores, aliæ instar villorum angustæ sunt, eæque ceram abunde recipiunt.

Arcuatæ RUYSCHII (*n*). Minimæ ALBINI (*o*) de conicarum genere sunt, unice minores, subrotundæ, interpositæ reliquis etiam circa radicem.

Rugas addit CL. ALBINUS (*p*) transversas, quæ utique in lateribus postremæ linguæ reperiuntur, quas utcumque credit cum papillis conjungi posse degeneres.

Solent

(*f*) Mediæ ALBINI p. 56. LUCHTMANS p. 64. Capitata REYENHORST n. 41. Fungiformes RUYSCH *Thes.* I. t. 4. f. 6. DUVERNEY p. 252. t. 18. f. 2. 3. 6. Habet WALTHER p. 33. COLLINS t. 2. f. inf. In mustela PEYER *obs.* p. 62.

(*g*) ALBINUS p. 56.

(*h*) IDEM p. 57.

(*i*) IDEM p. 56.

(*k*) Minores ALBINI p. 57. Acuminatæ RUYSCHII *Thes.* I. ad f. 6. t. 4. Conicæ WINSLOW n. 512. *aff.* II. n. 2. Tertius ordo LUCHTMANS p. 64. Troisième classe LIEUTAUD p. 175. Le CAT p. 226. Minimæ DUVERN. p. 252. t. 18. f. 2. & c. Acutæ in mustela PEYER l. c.

(*l*) ALBINUS ib. Etiam angulosas vidit.

(*m*) IDEM ibid.

(*n*) RUYSCHII, quas minimas vocat, & obtusas pingit ad microscopium *Thes.* I. tab. 4. f. 6. aque conicis distinguit.

(*o*) p. 57. f. b. c. c. ALBINI. REYENHORST l. c. LUCHTMANS p. 65. Van den EBO de lingua.

(*p*) p. 58.



Solent Cl. viri classes papillarum distinguere tres (*q*), quatuorve (*r*). Verum certe multum est in istis arbitrarii; nam continua serie, & absque saltu, degenerant sensim aliæ in alias; & filiformes, & minimæ in conicas, hæ in fungosas, istæ in obtusas, denique in truncatas quasi per mediam colorum seriem diffuunt. Est etiam aliis & albis in linguis diversitas (*s*), quæ mihi magna omnino visa est, ut eæ species, quas diversis titulis produximus, & numero differrent, & fabrica.

§. IV. *Papillarum fabrica.*

Magis conspicua hic, quam in cute est, papillarum fabrica, cum & magnæ sint, & duræ, & adfinitatem habeant in maximis animalium papillis. Fiunt autem colliculo non uno, ut multa quasi tubercula in unum coacerventur (*t*), connexa tela cellulosa alba (*u*), solidiuscula (*x*), brevi, intricata, cujus fila minima sunt. In eam telam subeunt arteriæ numerosæ, quas facile repleas (*y*), earumque una quamlibet papillam adit pluresve. In eam papillam dividuntur eædem, ut non difficulter tota per ea vascula rubro colore tingatur (*z*). Ex eo vasculo, vel per porum summæ papillæ, vel omnino per alia inconspicua foramina, liquor aquosus injectus facile exhalat (*a*). Etiam sanguis aliquando ea via exsudavit (*a\**).

Venæ, quarum exigua adhuc est memoria (*b*), similiter & papillam adeunt, & per finem suum humorem tenuem inhalant (*c*).

Nervi

(*q*) Tres RUYSCHIIUS *Tbes.* X. n. 14. MALPIGHIIUS *de ling.* p. 55. LIBUTAUD: Le CAT. WINSLOW.

(*r*) ALBINUS *Adnot.* L. I. p. 55. seqq.

(*s*) ALBINUS p. 58.

(*t*) IDEM c. 15. p. 59. f. 7. 8. stamina vocat. Habet ex eo MOERS *de nutrit.* & alii Cl. viri discipuli. In fila fissas ad penicilli modum DUVERNEY p. 254.

(*u*) Durius, album quid ALBINUS.

(*x*) REVENHORST n. 42.

(*y*) ALBINUS arteriam unicam habet p. 61. tum LUCHTMANS p. 66. nempe in quodque tuberculum elementare unica venit f. 10. Papillas vasculosas esse RUYSCH *Tbes.* I. aff. 2. n. 2. & majorem partem vasculis fieri REVENHORST n. 42.

(*z*) ALBINUS p. 60.

(*a*) Patula esse suspicatur ALBINUS p. 62. Habet exhalantia foramina REVENHORST n. 56. KAAUW n. 107 112.

(*a\**) VALISN. t. III. p. 304.

(*b*) Probabile esse ALBINUS p. 64.

(*c*) REVENHORST n. 57. Conf. KAAUW n. 442.



Nervi (*d*) hic facilius, quam usquam ad papillas, etiam in humano corpore, perducuntur, quos non raro scapello a furculis quinti paris ad papillas potissimum lateribus linguæ viciniores perduxi. Ut vero finem sui in alba illa tela faciunt, id quidem ignoro (*e*).

Eas nunc papillas gustus esse organa non difficulter ostenditur. Nulla, vel minima in lingua sedes est, quæ iis non tegatur, necesse est adeo corpus quodcunque papillas primas adficere, quando gustatur.

Deinde experimento cognitum est, eam partem linguæ, qua nullæ sunt, non gustare (*f*), acerrime vero apicem (*g*), in quo & conicum (*h*) quidem genus abundat, cujus, cum maxima sit superficies in basin ratione, & cujus maxime mobilis sit natura, eo magis credimus experimento, quo præ reliquis eas gustare constitit. Aliqua pars ejus sensus ad genus truncatum (*i*), aliqua ad fungiformes (*k*), & ad minimas (*l*) pertinet. Primus in papillis sedem gustus experimento detexit *Laurentius BELLINUS* (*m*).

#### §. V. *Involucrum mucosum linguæ.*

Epidermis (*n*) linguæ crassa, & crassior, quam in reliquo corpore, levis membranæ similis, viscosa, alba, similis est, levibus inpressionibus (*o*) papillarum signata: nullis pervia foraminibus (*p*), nisi quando a papillis male soluta, ea sede laceratur (*q*) qua papillarum convexitati incumbit; id enim facile accidit, cum papillis validius adhærescat (*r*). Maceratione separatur (*s*).

Pariter

(*d*) *Conjicit*, eo ire *ALBINUS* p. 64.

(*e*) In vitulo ostendit *Horatius de FLORIANIS* p. 175. Pediculos nerveos vocat *FRACASSATUS* p. 158. Habet *BELLINUS* p. 210. seqq. & *MALPIGHIIUS de lingua* f. 3. n. 2. & *LANGIUS* apud *SCHAMBERG de gustu* n. 13.

(*f*) Inter frenulum & apicem *BELLINUS* p. 224. 225. & inter papillas. Caro non gustat *DUVERNEY* p. 259.

(*g*) *BELLINUS* p. 224. 225.

(*h*) *LUCHTMANS* p. 74.

(*i*) *IDEM*, *ibid.* nullum *BELLINUS* p. 225. & in tabacophilis *HAMBERGERUS* p. 464.

(*k*) *BIRR requis. ad demonstr. anat.* n. 57.

(*l*) *LUCHTMANS* *ibid.*

(*m*) *L. c.*

(*n*) *ALBINUS* c. 16. p. 65.

(*o*) *ALBINUS* p. 66. *REVENHORST* n. 51. *KAAUW* n. 106.

(*p*) *MOERS de gustu.* *ALBIN.* &c.

(*q*) *ALBIN.* p. 67.

(*r*) *IDEM* p. 66. cutique *REVENHORST* n. 51.

(*s*) *ALBIN.* *ibid.*



Pariter ut epidermis absque vasculis est, & absque sensu, & pariter reparabilis. Exemplum involucris linguæ ulcerosæ delapsi & reparati habet MARCELLUS DONATUS (t). Crustam villosam linguæ dixerat FALLOPIUS (t\*).

Verus inventor fabricæ humanæ vel Johannes MERY (u) est, qui in lingua humana cocta membranam crassam dixit, simplicem, in duas minime dividendam, sub qua continuo essent papillæ, & in cujus depressis interstitiis eæ locarentur (x); vel etiam Guilielmus COWPER (y), qui in lingua humana involucrum analogum epidermidi, & molle vidit. Sed cum fabrica brutorum humanam non bene conjunxit.

RUYSCHIIUS (z) reticularem in lingua membranam negavit se reperire.

Deinde aliter se in homine, & in animalibus hanc fabricam se habere monuit J. Benignus WINSLOW (a), neque homini reticularem in lingua membranam concessam esse; sed etiam in animalibus mucilaginosam limpidam substantiam inter papillas effusam dixit, & inter papillas, quæ cocta abeat in membranæ speciem. In homine tenuem esse, epidermidi similem (b). Ex Ill. viri schola J. R. C. GARENGEOTUS HEISTERUM, cum perforatam membranam reticularem describeret, acerbè reprehendit (c).

Postea, cum interim non desinerent anatomici scriptores (d) reticularem naturam, & ejus foramina, ex bestiis repetere, Ill. ALBINUS similia docuit, & Periglottidem (e) hanc epidermidem vocavit, veramque proposuit fabricam, tum discipuli viri Ill. (e\*), qui ante suum præceptoris ejus inventa ediderunt. Veriorem fabricam dudum & ipse proposui, & ex Ill. viri scholis, & a NATURA edoctus (e\*\*).

Ob epidermidem linguæ fit, ut ferrum candens lingere, carbonesve ignitos, vitrumve fusum (f) deglutire, ignemque vomere, non sit adeo ra-  
um

(t) L. III. c. 4.

(t\*) p. 161. ad finem crustæ villosæ ventriculi.

(u) Huic tribuo, quæ leguntur apud LAMY des sens P. I. p. 44.

(x) Anno 1687.

(y) Introduction.

(z) Thes. X. n. 18.

(a) n. 529.

(b) n. 506.

(c) In nov. edit. Splanchnologie.

(d) HEISTER compend. anat. f. 20. BOERHAAVE n. 1185. DUVERNEY posth. p. 253.

(e) In scholis suis, nuper vero in Adnotat. L. I. anno 1756. edito, & in Adnot. L. III. p. 92. 93.

(e\*) REVENHORST p. 50. 51. 52. seqq. LUCHTMANS p. 67. MORRS de gustu.

(e\*\*) In Comm. T. IV. p. 17. tum in utraque editione Prim. lin. Physiolog.

(f) Anc. Mem. X. p. 585. 586.



rum (*f*<sup>\*</sup>), five epidermidi (*g*) callum addiderit vitrioli spiritus (*h*), five sponte lingua insensilis fuerit.

§. VI. *Fabrica, quæ in quadrupedibus obtinet.*

In ovilla ergo, bubulave lingua, & plerorumque animalium quadrupedum, papillæ primo longe conspectiores, quam in homine sunt, tum veræ fungiformes (*k*) destinatæ gustui, nervisque animatæ (*l*), tum illæ pyramidales (*m*).

Hæ papillæ inveniunt verum, certe post coctionem, reticulum, per quod transeant: membranam nempe albam, mollem, perforatam tot foraminibus (*n*), quot papillæ de linguae cute exeunt, quas ipsas per sua foramina transmittit, five nunc exterior sit epidermis lamina, five peculiaris membrana.

Denique pulpofa, robusta epidermis (*o*) linguam operit, tot in cavas vaginas figurata, quot papillæ de cute linguae surgunt. In eas vaginas eæ papillæ longe (*p*) producuntur, ut in suam vaginam ensis solet. Ea involucra in pyramidalibus papillis cartilaginea (*q*) aliam utilitatem habere videntur; five ad os everrendum, five ad retinendum cibum, ne viva præda elabatur, dum contra suum pondus in gulam surgit (*r*).

Hanc

(*f*<sup>\*</sup>) PECHLIN L. III. *obs.* 9.

(*g*) *Journ. des Savans* 1677. & 1680. n. 213.

(*h*) *Ibid.*

(*k*) MALPIGHIUS *de ling.* f. 2. p. 56. BELLIN. p. 208. 209. BUFFON *Hist. nat.* T. V. p. 495.

(*l*) MALPIGH. *ibid.* Addo ad fabricam bestiarum DROVIN *du cerv.* tab. 5. LEEUWENHOECK *Phil. transf.* n. 315. HOFMANN *de gustu* p. 22. DUVERNEY p. 256. & in *icc.*

(*m*) MALPIGHIUS *ib.* f. 3. p. 57. BELLIN p. 183. 184.

(*n*) MALPIGH. p. 53. BELLIN. p. 191. 198. BOURGELAT II. P. 2. p. 319. LEEUWENHOECK l. c. f. 13.

(*o*) MALPIGH. p. 52.

(*p*) BELLIN. p. 199. 200.

(*q*) Cartilaginea in bove MALPIGH. p. 50. Cornea in leone BORRICH *hermet. aeg. Sap.* p. 250. ACT. HAFN l. *obs.* 17. PARISINI. COLLINS p. 228. PERRAULT T. III. p. 173. SBARAGLI p. 82. In lepore PARIS. In catopardo DUVERNOY *Com. Petrop.* T. I. In hystrice *Mem. avant.* 1699. tab. I. p. 403. In fele offeæ papillæ sunt BELLIN. p. 189. add. DUVERNEY p. 258. In porco habet LEEUWENHOECK *Phil. transf.* n. 315. Etiam in avibus reperiuntur, ut in aquila BORRICH *herm. sup. aegypt.* p. 258. in Phœnicoptero *Phil. transf.* n. 350. add. BLAS *anim.* p. 146. In cygno ALDROVAND L. 19. p. 15. In sepia offea sunt cornicula SWAMMERDAM *bibl. natur.* p. 883.

(*r*) BORRICH *ib.* MONROO *anat. compar.* p. 48.



Hanc fabricam a MALPIGHIO inventam, & a BELLINO, libentes receperunt scriptores anatomicorum, & physiologicorum operum (s), & iconibus etiam fictitiis expresse- runt (t). Ab hominis vero fabrica differunt, quod bestiis & reticulum perforatum sit, & epidermis in cavas vaginas producta.

§. VII. *Linguae glandulae & foramen cæcum.*

Lingua sicca non gustat, & sensus ejus squaloris adeo incommodus est, ut etiam æternas poenas eo ipso SERVATOR expresse- rit. Multis vero modis cavit NATURA, ne facile id vitium nasceretur. Nam & ipsa lingua perspirat (u), & saliva abunde variis ex fontibus in oris cavum confluit (x), & ipsum undique os totæque buccæ vaporem (y) halant humidum, & præterea lingua mucum sibi ipsi parat, durabile certe contra aeris siccitatem unguentum.

Pars adeo superior & posterior linguae, vicinior Epiglottidi, ad usque foramen cæcum, tum latera linguae, parsque radicis inferior, etiam ante id foramen, inter carnes, & involucrum exterius, copiosissimas habent glandulas (z) simplices, conspicuas, rotundas, sive oblongas, hemisphærico ab epidermide involu- cro, & fundo (a) ad cutem linguae pertinente. Eadem foramine uno pluribusve, in media convexitate conspicuæ sunt, quæ mucum (b) parare, retinere, & ad motum quemcunque linguae ex- cernere aptæ factæ sunt. Glandulam conglomeratam minus commode dixe- ris (c), cum cuilibet folliculo suus sit ductus.

O 2

Simpli-

(s) DIEMERBROECK p. 439. J. G. de BERGER *nat. hum.* p. 363. seqq. TAUVRY c. II. BOURDON *deser. anatom.* p. 238. LIEUTAUD p. 176. nempe corpus reticulare perforatum.

(t) BIDLOO *tab.* 10.

(u) p. 103.

(x) Vide interim *Prim. liaz.* n. 600. seqq.

(y) Ibid. p. 386. KAAUW n. III.

(z) Habet EUSTACHIUS. SCHRADER *Dec.* I. *obs.* 3. COLLINS *tab.* 2. g. g. f. inf. WHARTON p. 139. MORGAGN. *Adv.* I. *tab.* 1. add. *Adv.* VI. p. 129. COWPER *app.* f. 24. WALTHER *de lingua* t. 3. f. 1. n. 34. 35. Glandulæ bascos linguae PERRAULT *Ess.* III. p. 52. In Crocodilo PARISINI.

(a) In fundo minoribus foraminibus aliquando perforatæ MORG. *Adv.* VI.

(b) Habet WHARTON. MORGAGNUS VI. p. 124. & *Adv.* I. TREW. *ep.* *tab.* 3.

(c) Dixit VATERUS *de novo ductu salivali lingua* p. 22. 29. 31. 33. 34. &c. t. I. f. 3. t. 2. Corpus glandulosum linguae COLLINS p. 225.



Simplices dixi. Est tamen in linguæ medio illo modice depresso sulco ante epiglottidem foramen (*d*) antrorsum patens, retrorsum versus epiglottidem in linguæ propriam carnem productum, cæcum denique, modo longius, modo brevius, nonnunquam obscurum, ut vix adpareat (*e*). Primus descripsit J. *Fridericus* SCHRAEDER (*f*); figuramque dedit Samuel COLLINS (*g*); accuratius MORGAGNUS (*h*).

In eam cryptam, quæ mihi non verus ductus videtur (*i*), glandulæ simplices circumpositæ, tanquam in communem sinum, mucum suum (*k*) effundunt. In quarto quoque corpore ejusmodi ductum reperit MORGAGNUS.

In eodem fræquenter papilla truncata sedet, etiam plures una (*l*).

Membranaceos veros ductus fuisse (*m*), similes salivali (*n*) canali, duosve (*o*), sibi similes & parallelos, viri olim laude medica celebres viderunt, non nos, neque alii illustresque viri (*p*). Minus probabile est ad glandulam thyreoideam (*q*) pertinere. Quando aquam impulit, & expansionem glandulosam ad sublinguales glandulas, & tonsillas, & circa œsophagum, glottidemque late distendit VATERUS (*r*), in cellulosa utique telam suam aquam suam urfit.

#### §. VIII. Arteriæ linguæ.

Vasa linguæ, ut parum certe nota (*s*), liceat descripsisse. Arteria princeps

(*d*) WALTHER f. 1. VATER f. 2. MORGAGNUS *Adv.* I. tab. I. HALBER *duet. saliv.* COSCHWITZ *duet. saliv.* f. 3.

(*e*) VATER *cat. mus.* p. 89. In dimidia parte cadaverum MORG. *Adv.* VI. p. 121.

(*f*) *Dec.* I. obs. 3. ex Henrici MEIBOMII demonstratione.

(*g*) F. 2. inf.

(*h*) *Advers.* I. tab. I. l. p. 4. 5. *Advers.* VI. p. 121.

(*i*) Sinum potius, quam canalem esse MORGAGN. *Advers.* I. p. 4. Canalem non reperit TREW p. 10. neque WALTHER p. 34.

(*k*) HEISTER l. c. g. g. WALTHER l. c. DUVERNEY fig. 4.

(*l*) p. 101.

(*m*) Ductum vocat communem VATER *mus. prop.* p. 89. & de *ductu saliv.* f. 1. 2. p. 32. additque, etiam a Cl. SERRES repertum esse.

(*n*) Principem salivalium, unicum, VATER p. 22. 23. ann. 1720. in Progr. 5. Jul. in *Ed.* 3. p. 111. 112.

(*o*) HEISTER fig. 34. not. 56. addit alias unicum & bifidum esse.

(*p*) WALTHER de *lingua* p. 34. TREW ad HALB. p. 10. tab. 3.

(*q*) COSCHWITZ in *defensione duet. saliv.*

(*r*) p. 21. 29. 33. 34. & WALTHER p. 35.

(*s*) Vide descriptionem Cl. LUCHTMANS p. 67.



ceps ( *t* ), quam *lingualem* dico ( *t\** ), *sublingualem* alii ( *u* ) Cl. viri, plerumque proprio trunco ex Carotide externa provenit, supra thyreoideam superiorem ( *x* ), infra labialem, & in quinto quoque cadavere ex labiali ipsa ( *y* ).

Supra os hyoides flexuosa introrsum tendit ( *z* ), dat furculos minores, quorum aliquis arcum efficit hyoideum, ad musculos ceratoglossum, biventrem, mylohyoideum, sternohyoideum, Coracohyoideum, hyothyreoideum ( *a* ) absumtus: nonnunquam & alterum in glandulam maxillarem, hinc ad latera, & posteriora linguæ, qua styloglossus ad eam accedit ( *b* ).

Inde, tecta ceratoglossa, & basioglossa ( *c* ), his aliisque vicinis ossis hyoidis musculis furculos dat, ex quibus arcus in geniohyoideo nascitur; deinde dorsalem ( *d* ) linguæ generat, quæ ad styloglossum, & dorsum linguæ venit, & ad epiglottidem, linguæque vicinam radicem, rete efficit mistum venoso. Eadem aliquando etiam pharyngi proximo prospicit, & tonsillæ, & nonnunquam major palatum mobile adit.

Ad finem musculi basioglossi lingualis arteria edit plerumque ramum, quem *sublingualem* ( *e* ) vocare malo, quod longe inter eam glandulam, & geniohyoideum musculum, antrorsum ad mentum usque procurrat, & in eam glandulam, atque hunc musculum, denique in mylohyoidei, & biventris finem absumatur. In quinto fere quoque subjecto a submentali, labialis propagine, eadem oritur.

Quod superest, truncum nunc possis *raninum* ( *e\** ) dicere, a venæ sociæ nomine. Ea arteria inter genioglossum, & carnem linguæ lateralem; per vallem, flexuosa ( *f* ) procedit, demumque in apice linguæ subcutanea desinit ( *g* ), ut periculose vulnerari possit.

Maxima arteria est, potius major, quam labialis, ut vel ideo secretionem aliquam ab ea speres.

O 3

Mino-

( *t* ) Tertia FALLOPII p. 132. b.

( *t\** ) Icon anat. fasc. III. tab. pharyng. p. 5.

( *u* ) WINSLOW III. n. 53. GUNZ de gland. maxill. p. 14. LIEUTAUD p. 47.

( *x* ) Tab. art. Phar.

( *y* ) Fasc. III. p. 5. TREW l. 6. tab. I.

( *z* ) Tab. cit.

( *a* ) Fasc. III. p. 5.

( *b* ) Fasc. VIII.

( *c* ) Tab. art. phar.

( *d* ) Fasc. III. p. 5. TREW R.

( *e* ) G. Tab. art. phar. p. 6. TREW i.

( *e\** ) TREW g. g.

( *f* ) PETSCHE n. 40.

( *g* ) RUYSCH Thes. I. tab. 3. f. 4.



Minores arteriæ linguæ, ad ejus latera, dorsumque, duæ veniunt, a ramis arteriæ labialis, palatino (*b*), & tonsillari (*i*), etiam a furculis minoribus, in glandula maxillari natis (*k*).

§. IX. *Venæ linguæ.*

Multo istæ, quam sodales arteriæ difficiliiores, magisque compositæ, & in diversis corporibus variæ, tamen tenendæ sunt, cum inprimis pro alio, & celebriori vasorum genere habitæ fuerint. Prima *submentalis* a labiali, aut a thyreoidea, aut a linguali nata, repit ad exteriora musculi biventris, inter eum musculum, interque glandulam maxillarem, & maxillam: ei dat glandulæ, & musculo, & mylohyoideo, & ipsa quidem erepit ad finem inserti biventris, & mylohyoidei, & menti transversum cutemque; cæterum trunco notabili comitatur ductum WHARTONI, & ad latus genioglossi, & glandulæ sublingualis, datis utique ramis cum priori communicat (*l*).

Alia *superficialis vena* linguæ (*m*) oritur a trunco venoso superficiali jugularis internæ, qui ramos plerosque carotidis externæ comitatur, vario modo, vel uno, vel duobus truncis: alias tamen ex linguali (*n*), quæ proxima sequitur; alias eadem ab angulari discedit ad finem anteriorem ceratoglossi. Arcum notabilem sub genioglossi, & ceratoglossi cum compare facit (*o*), & porro inter genioglossum & glandulam sublingualem ad apicem erepit, comes nervi Quinti. Prope eum apicem cum venæ labialis (*p*) ramo communicat, quem diximus, & alio trunco sæpe superficialis erumpit in biventrem, & quadratum menti (*q*), alio in raninam cum sequente confluit.

Alius, ejusdem trunci aut sequentis furculus, aut thyreoideæ, altera *Ranina* vena, ante ceratoglossum (*r*), nervum noni paris comitatur, & ad apicem linguæ pervenit, interque genioglossum musculum & glandulam sublingualem multis musculosis ramis datis cum ranina communicat, cumque ea communem in truncum abit. Idem dat pharyngi.

Alias

(*b*) *Fasc.* III. p. 7.

(*i*) *Ibid.* An linguæ arteriæ ex faucibus venientes RUYSEN *Thes.* I. aff. 2. n. 15.

(*k*) *Fasc.* III. p. 6.

(*l*) *Fasc. nostr.* III. V.

(*m*) *Id.* nostr. III. T.

(*n*) *Ib.* TREW q. q.

(*o*) TREW. *Tab. nostr.* X.

(*p*) *Fasc. nostr.* V. TREW q. q. o. o.

(*q*) Nisi eum ea generat, quam modo dixi.

(*r*) TREW q. q.



Alias demum profunda vena, alias perexigua, alias verus truncus lingualis, a ranina, aut a pharyngea aliqua, arteriam comitatur, inter genioglossum & linguam. Ab ea etiam venit arcus ille pulcher ossis hyoidis.

Venæ dorsi linguæ nascuntur a linguali comite nervi Quinti, & a labiali, ad ingressum styloglossi, & a vena pharyngea; & a laryngea; variis modis.

Earum venarum furculi pulchrum rete (s), non solum arcum, inter foramen cæcum & epiglottidem efficiunt, id autem rete cum aliis nonnullis ramis venosis vacuis pro ductu salivali novo a *Georgio Daniel Coschwitz* habitum est, quod vir Cl. venas valvulosas, & inanes, & forte, ut in submerso cadavere, aqua plenas reperisset. Descripsit vero ductum, supra ceratoglossum (t) in glandulam sublingualem euntem (u), communicantem cum ductu maxillari, & cum vasis lymphaticis, cumque glandula thyreoidea (x), arcum facientem ante epiglottidem, & apertum in papillas linguæ. Repetiisse se in variis corporibus, per ductum cæcum linguæ inflasse (y) addit, ægrius quidem. Etsi vero defensionem novi inventi ipse molitus est, eumque ductum aliqui ex secta *STAHLII* viri adoptarunt (y\*), tamen mecum *HEISTERUS* (z), & *WALTHERUS* (a), & alii (b) Cl. viri consenserunt, venas esse; cum præterea *COSCHWITZ* IUS nunquam & venas, & ductus, provocatus seorsim potuisset exhibere, & ductus ipse manifestam fabricam venosam, ramos multos, ex trunco decrecentes, minimisque furculis terminatos habeat.

Ejusdem retis furculi per musculum thyreopalatinum, plexum cum pharyngæis efficiunt.

Vasa lymphatica linguæ vicina, in geniohyoideo hyopharyngæo, & alibi in linguæ vicinia (c), & vidimus in corpore humano, & alibi diximus, quæ non videantur, certa fide, ad linguam ipsam pertinere (d).

§. X.

(s) *IDEM* f. 2. *DUVERNOI* f. 2. *Tab. nostr.* 1. 2. *COSCHWITZ* f. 3. *defens.* f. 3.

(t) *Diff.* p. 8.

(u) *Ib.* p. 9.

(x) *Ib.* p. 11.

(y) *Defens.* p. 11. 12.

(y\*) *KULMUS* in *descr. monstr.* *JUNKER* *tab. physiol.* p. 87.

(z) *Not. ad compend.* p. 56.

(a) *L. c.* p. 38.

(b) *TREW* *epist. tot.* *DUVERNOI* *de ductu saliv.* *Coschwitz.* *BURMANN* *de hylopojesi* n. 6.

(c) *COSCHWITZ* *tab.* 1. 2. *DUVERNOI* f. 1.

(d) *L.* 11.



§. X. *Nervi lingua.*

Tres nervos linguæ descripsimus, posteriorem (*e*) ab octavo pare natum, medium (*f*) a nono, anteriorem (*g*) a Quinti paris ramo tertio. Inter eos nervos quis potissimum sensu gustus defungatur, quæri potest. Veteres nonum motui (*h*) destinarunt, a Quinto (*i*) sensum deduxerunt, quod Quinti paris rami in externam tunicam linguam pertexerentur, neque carnes adirent, nervi a pare nono educti in musculos dividerentur.

Contra PRÆCEPTOR noster (*k*) persuaserat sibi nonum nervum solum linguam adire, Quintum etiam ad alias corporis partes dividi, æquum ergo videri, officium linguæ proprium a nervo expectare, qui & ipse linguæ propius sit. ILL. viri placita, ut fieri solet, etiam alii secuti sunt (*l*).

Verum utrumque videtur Ill. viro negari posse. Nam & lingua non omnino sola gustu fungitur (*m*), & nervus noni paris ad multos alios, præter linguam, musculos dividitur (*n*). Æquum autem est, ab eo nervo gustum expectare, a quo rami ad partes linguæ maxime sentientes dividantur. Nunc Quintus solus ad apicem linguæ (*o*) pervenit, qua acerrimus gustus est, nonusque multo ceterior finitur. Ab eo etiam nervo solo, qui profunde linguam adit, in papillas usque ramulos deduxi.

Sed etiam morbi videntur pro nostra sententia facere. In spasmo cynico, quem vitio nervi quinti factum esse probabile sit, gustus sublatus est (*p*): a quo certe salivatio & spasmus cynicus natus sit (*q*). Nam ad musculos maxillæ ipse ramos dat, non nonus. In Lazaro vitrivoros nullus gustus (*r*), nullaque quarta conjugatio fuit, nempe nullus ramus tertius quinti paris: sed huic quidem narrationi non nimis tribuimus.

Nisi

(*e*) L. X. p. 232.(*f*) p. 235.(*g*) p. 217.(*h*) GALENUS *de us. part.* L. IX. c. 13. ORIBASIIUS p. 274. SERAPIO L. II.c. 14. MASSA *introduc.* p. 67. b. VESALIUS p. 307. PICCOLHOMINEUS p. 196.(*i*) IDEM *ibid.* VIEUSSENS p. 173.(*k*) I. R. M. n. 486.(*l*) MONROO apud CHESLETON p. 238. SCHLICHTING ad VERBRUGGE p. 150.(*m*) p. 99. 100.(*n*) L. X. p. 238. 239.(*o*) BIDLOO *tab.* 14. *fig.* 1. BERRIETINI *tab.* 10. 12. 13. *fig.* 2.(*p*) *Eph. Nat. Cur.* Vol. VIII. *obs.* 86.(*q*) MONROO *on nerves* p. 392.(*r*) COLUMB. p. 264. ROLFINK *diff.* p. 333.



Nisi forte & a nono, & a quinto pare gustum perfici malueris (s). Videtur apud Cl. HEUERMANNUM (t) gustum deletum fuisse, cum ramus Noni paris ob scirrhum glandulæ resectus fuisset.

§. XI. Organum gustus, præter linguam.

Siquidem in palato, buccis, faucibus, ambitu oris aliquis gustus exercetur, videtur analogia simile utcunque organum postulare, paresque papillas, a quibus similis sensus expectari possit.

In bestiis quidem omnino satis simile buccarum (u), palati (x), etiam faucium (y), tonsillarum (z), & œsophagi (a) in nonnullis speciebus, papillarum adest satellitium; & vaginæ adsunt epidermidis.

In homine res difficilior est. Papillosam equidem tunicam RUYSCHIUS genas etiam, & labia, & œsophagum vestire scripsit, & ventriculo demum, & intestinis (b), similem esse. IDEM papillas gustatorias, arenulis minores, in palato (c) vidit.

In buccis circa STENONIANI ductus ostium papillas villosas (d), & villos, ab injecta cera rigentes, Cl. KAAUW (e) memorat.

In his papillis buccarum & palati gustum exerceri nuperi persuadentur (f).

Multa hic obscura supersunt. Mirum videtur, eundem sensum, in organis diversæ fabricæ exerceri; neque forte satis certum, num illi in palato buccisque villi papillæ sint, num exhalantes flocculi, aut omnino papillæ quidem, sed tactiles.

Et

(s) WIELIS *anim. brut.* p. 115.

(t) *Physiolog.* T. II. p. 293. etsi non penitus liquide.

(u) Testudinis RUYSCH *Adv.* II. n. 9. Vituli *Mémoire. avant.* 1699. T. II. p. 245. Gazellæ PARISINI, bovis puto, aliorumque animalium MALPIGH. p. 58.

(x) RUYSCH. l. c. HOFMANN p. 24. in ove; Corpuscula mucronata, & pyramides habet LEEUWENHOEK *Phil. transf.* n. 320. & in bove MALPIGH. p. 58.

(y) J. M. HOFMANN *de gustu* p. 24. in vitulo. In pharynge suis p. 25.

(z) IDEM p. 24.

(a) In testudine RUYSCH l. c. & *Thef.* VIII. t. 2. f. 4. in piscibus FRACASSALUS p. 168.

(b) *Adv.* II. n. 9. p. 25. 25.

(c) *Thef.* II. aff. 4. n. 12.

(d) *Thef.* X. n. 136. tab. 1. f. 1. & ad microscopium f. 2.

(e) n. 113.

(f) LUCHTMANS p. 76.



Et tamen credas, animalia(*g*), quibus vix lingua ulla sit, neque evidentes papillæ, neque demum caput ullum, sensu tamen aliquo, gustus adfini, non destitui, cum cibos sibi aptos solos sequantur, & abstineant aliis. Ipsi polypi(*b*) animalia minus sibi grata, quæ ore receperunt, norant exspuere.

## S E C T I O II.

## G U S T U S.

§. I. *Tactus in lingua.*

**I**Nsignes hæ nervosæque papillæ, quas descripsimus, duplici sensu defunguntur; tactu nempe sunt acriori, quam ipsi digiti, cum perpetuo humectæ mollesque, molliori etiam involucro tectæ sint, & cum grandiores, & conicæ magnam superficiem corpori exponant, quod tangitur. Quare lingua irritata & erosa adprime dolet, ut memini intensissime me doluisse, cum linguae callosum vulnus vitriolo mihi tangeretur, cujus salis omnino in cute modicus sensus est. Multo etiam quam cutis ab eadem causa diutius lingua dolet, etsi vulnera non difficulter sanantur(*a*), ob humorem forte, quo perpetuo irrigatur.

§. II. *Gustus ipse.*

Verum præcipuum aliquid in lingua est, quo reliqua cutis destituitur. A corporibus enim nonnullis, ad id aptis, adque papillas humentes applicatis, & fluidis, inve saliva dissolutis, adficitur lingua, vario sensu, quem cutis ignorat, grato ingratoque, quem sensum non alia pars exercet, & quo, vel ad adsumendum cibum invitamur, potumve, aut vicissim absterremur.

Ut gustemus, conditiones aliquæ necessario postulantur. Oportet involucrum

(*g*) In avibus papillæ paucae SEARAGLI *vigil* p. 80. In piscibus nullæ IDEM *ibid*.

(*b*) ROESBL *insect*. T. III. p. 550.

(*a*) BAUSCH *proem. bematit*. p. 52. PURMANN *Lorbeerkrantz* p. 68. SCHOUTEN *Verwendter hoofd* p. 236. PALFYN *anat. Chir.* p. 121.



lucrum linguæ, epidermidi adfines, neque nimis crassum esse, neque sic-  
cum, neque nimis tenue molleve.

Nimis crassum si fuerit, non magis sapes percipientur, quam per  
callosam epidermidem qualitates tactiles. Credibile fuerit illis hominibus,  
qui fere absque discrimine omnia devorarent, aliquod hujus generis vi-  
tium fuisse.

Sicca lingua, ut in febribus non infrequenter sicca est, aut gustum  
nullum percipit, aut non suum, & a vero alienum. Siccitatem facit de-  
fectus salivæ, liquoris exhalantis faucium, linguæ, muci ipsius. Vide-  
tur in febribus materies crassior in ea vascula impelli, quæ per oscula  
exire nequeat. Certe flavissimam linguam sæpe vidi, alias fuscam, alias  
& vulgo albam: non mucum autem volo, quo lingua ægrota obducitur,  
sed omnino papillas.

Si idem involucrum linguæ sublatum fuerit, dolor loco (b) gustus per-  
cipitur, aut mistus cum gustu dolor, ut acere fuerit, quod admovetur  
corpus. Sæpe, cum linguam vulnuscule læderem, & tamen ex officii ra-  
tione longo sermone tenerer cathedræ præesse, incredibilem in edendo  
dolorem me percepisse memini, nisi blandissima essent, quibus vitam  
sustentarem.

Oportet salivam nostram naturali modo se habere. Poterit enim, si  
amara fuerit, suum saporem nobis substituere pro cibis: si dulcis (c),  
dulci pariter admisto sensu ciborum impressionem vitare, quod valde fre-  
quens malum est, post morbos acutos familiare, inque hypochondriacis,  
neque valde periculosum (d). Acida fuisse videtur, quæ fecit, ut etiam  
glycyrrhiza acida videretur (d\*). Poterit demum mucosa esse, ut omnia  
nobis insipida videantur.

An papillas necesse sit emitti & erigi (e)? Turgent aliquantum,  
quando gratus cibus ori offertur, idque amicus in amici lingua distin-  
guit. Minus ergo sapiunt, quæ mente non adtentata deglutimus, ut de-  
mum, qui inter prandendum cum studio legunt, vix saporum fiant consocii.

Denique corpus ipsum, cujus saporem gustus distinguit, necesse est,  
in fluidum statum reduci. Siccæ linguæ siccum saccharum sensum unice

P 2

tactus.

(b) CORBETTA apud MALPIGHIUM p. 74. ex ipso pipere.

(c) In scorbuticis AET. HUSN. T. IV n. 72. In hypochondriacis HOFMAN de saliv. insp. p. 26. in hystericis VIRIDET du bon Chyle p. 288.

(d) BENNETUS theat. tabid. p. 67.

(d\*) LANZON de saliv. p. 532.

(e) KUSTNER de lingua p. 12.



tactus, suamque imprimit asperitatem. Quamprimum idem solvitur (*e\**); ut possit per poros cuticulæ penetrare, jam dulcedinem percipimus. Hinc terræ in aqua non solubilis nullus sapor, neque ullius corporis, quod non colliquescit. Hinc forte phænomenon ab Ill. SECONDA T adnotatum. CrySTALLI nempe ex aqua minerali Bagneres nati, primum insipidæ, deinde [lentius penetrata linguæ epidermide] acres (*f*) sunt.

Verum non sufficit solvi in aqua fluidumve esse corpus, quod gustatur; necesse est falsum quid continere. Salem potissimum ex hac ipsa ad gustandum aptitudine dignoscimus, & videtur præter aquam terramque, ex qua non bene sales componunt (*g*), præcipuum elementum vegetum, & acre continere, quod ipsum, uti papillas nostras adficit, ita eadem penetrabili vi ad corpora solvenda aptum est. Id mobile principium creditur ab acre universali (*h*) pendere, & cum variis terris acidos sales, cum phlogisto & terra propria sales alcalinos, cum certa reliquorum elementorum temperie omne genus saporum constituere.

Non satis notum est, num spiritus rector ipse sit sapidus; num potius præter inflammabile tenuissimum elementum salini quid contineat, videoque, viros peritos in alcohole, adeoque in rectore spiritu, cujus species est alcohol, acorem subtilem (*i*) admittere. Ut ita sit, certe spiritus iste rector, sive oleum æthereum summe volatile plantarum, videtur nobis saporem habere proprium, in cinnamomo, in caryophyllis, in camphora, aliisque aromatibus. Tenue est, & volatile principium, quod absque ponderis diminutione exhalat (*k*).

### §. III. Sapoꝛes.

Colores oculus in classes dividit, quorum discrimen a quolibet mortali facillime percipitur, discriminis vero causa aut ad NEWTONI tempora latuit, aut etiam nunc latet. Perinde lingua in sapidis corporibus distinguit sapoꝛes, a toto genere humano similiter perceptos, sed quorum discrimina ignotas causas habent.

Horum

(*e\**) Sales sapiunt soluti BELLINUS c. 6. p. 3.

(*f*) *Obff. de physique* p. 50.

(*g*) STAHLIUS *von Saizen* p. 58. Sed, etsi iterata solutione sal marinus in terram insolubilem abit, amisit interim volatile illud acidum, propter quod sal fuit.

(*h*) L. VIII. p. 219.

(*i*) NEUMANN Vol. I. P. II. Vol. II. P. IV. p. 254.

(*k*) BOERHAAVE *Elem. Chem.* T. I. p. 74. 75.



Horum saporum alii aliis manifestius se efferunt, qualis est acidus; & dulcis; & amarus; & falsus; & acris, sed iste varii generis, ut in ranunculo, perficaria acris, muttellina, tot aliis plantis vario modo acris; demum *spirituosus* sapor.

Alii minus manifesta discrimina habent, & videntur cum priorum aliquo conjungi posse, ut cum genere species. Ejusmodi sunt acerbus, & austerus sapor, qui ad acidum pertinere videntur; urinosus, qui ad falsum; aromaticus, qui ad spirituosum. Alii relativi sunt, & saporum legitimorum diminutiones ( *l* ), ut fatuus; aut cum odore complicantur, ut putris, & nauseosus ( *m* ), & forte spirituosus ipse.

Hi porro sapores omnes apud alios & alios homines aliter percipiuntur, habentque aut gratiam, aut odium.

Aliquid huc facit nuditas papillæ. Inde fit, ut in universum infantes dulcia ament, senes ( *n* ), quibus hæc nimis languidiora callosos nervos parum emonent, in vino sibi placeant. Etiam in eodem homine lingua sapores præsentis cum paulo prius perceptis comparat. Hinc, qui dulcia sumit, vina acidissima experitur, grata idem, reperiet, qui blanda & fatua paulo prius edit. Hinc, neque aqua, neque saliva nobis falsa videtur, etsi saltem continent; sed, quæ plus, quam saliva nostra, salis continent, ea demum falsa nobis adparent.

Alia sunt, quæ vix explices, saporum desideria. Putrida ipsa ( *o* ) vorant passim aliqui homines, quæ videntur a natura nostra summe abhorre. Bengallos ova non amare, nisi incubata, & semiputrida AMATUS auctor est ( *p* ), & de Siamensibus idem lego. Picas terræ ( *q* ), ligni, calcis, carbonum, arenæ scriptoriæ ( *r* ), aranearum ( *s* ) quis enumeravit. Sic alia animalia alios cibos amant, neque desunt absinthio, piperi, galangæ, jalapæ, pyrrethro sua insecta, qui acerrimis istis radicibus delectantur ( *s\** ).

P 3

§. IV.

( *l* ) Sedecim facit NEHEMIAS GREW p. 288.

( *m* ) GREW ibid.

( *n* ) HARTLEY p. 162.

( *o* ) Exemplum habet HELMONTIUS, RZASZYNSKI p. 347.

( *p* ) Obj. p. 191

( *q* ) RZASZYNSKI l. c. p. 346.

( *r* ) REINES varior. p. 35.

( *s* ) JACOBI Problem. 61.

( *s\** ) HILL. Essays p. 92.



§. IV. *Corpora sapida.*

Acidus sapor habitat in genere vegetabili, & in eo dominatur. Fructus horaei, five pulposa conceptaculi feminalis in arboribus polystemonibus involucra, omnes & aliquo in stadio acidi fuerunt, & eorum succi in acorem redeunt. Sic baccarum plurimarum sapor aut sponte acidus est, aut per fermentationem in acidum transit. Farina plantarum cum aqua mista abit in acorem, & cerevisiam generat, & inde acetum. Etiam acres plantæ acidæ naturæ sunt participes, ut Sinapi, aliæque, quæ tamen sibi permixtæ putrescunt. Si de planta aliqua liquorem igne abegeris, ea omnino plus dabit, minusve, spiritus rufi, in quo acor est.

In regno animali parcius, superest tamen acor in eodem rufo spiritu (u) partium animalium, in adipe, & ejus liquore, in succis acribus (x) nonnullorum animalium, & imprimis in lacte, quod omnium liquorum primum acefcit, vel ex sola aeris mutata temperie, quæ a tonitru sequitur.

Inter sales primi generis est ille sal acidus, qui per aerem (y), & aquas plurimas oberrat, & cum variis terris acidæ naturæ sales facit, vitriolum, alumen, nitrum, salem marinum, ex quibus omnibus solus ignis acorem potentissimum exprimat. Idem sapore suo aquas minerales imprægnat, uti nunc, post Ill. olim SEIPPII demonstrationes, a CAROLO LUCA manifesto constitutum est. In Spadanis enim aquis halitus fummo mane exploratus syrupum violarum rubro colore imbuunt. Sed etiam in marina aqua idem acor percipitur (y\*).

Dulcis sapor, etsi linguæ plurimum videtur ab acido differre, re ipsa parum differt, neque absque conspicua aciditate facile reperitur. Dulces baccæ sunt fructusque horaei, in brevi suæ durationis stadio; nam ex acidissimo omphacio vinum dulcissimum a sole paratur, idemque in meracum acorem aceti sponte redit: eademque est sacchari, & mellis, & omnium verorum dulcium metamorphosis. Quamprimum ignis accessit, etiam de dulcissimis acidi liquores stillant (z).

Sed

(u) L. V. p. 102.

(x) p. 91. 92.

(y) L. VIII. p. 219. seqq.

(y\*) WALLER ad HIAERNE p. 64.

(z) BORRICH de natur. dulced. p. 69.



Sed etiam in mineralibus rara illa dulcedo, quæ est in saturninis; eaque, quæ est in oleo vitrioli dulci, debetur procul dubio acori. In alumine sponte dulcedo est (a), & potest repetita solutione, & avvocato phlegmate seorsim haberi. In animalibus dulcedo rarior est; tamen ex lacte sal dulcis excoquitur: cujus lactis natura tota acida est, & magis adhuc feri lactis, ex quo saccharum lactis paratur.

Solent ita hæc proponere, ut acidæ cuspides dulcedinem faciant, quamdiu quadam vagina continentur. Ea vagina frequenter oleum est; alias terra, aut calx metallica. Ab oleo vini in vitriolicum (b) acorem dulcedo introducitur.

Amarus sapor est potissimum plantarum, varius, ut tamen omnes consentiant ad eam classem pertinere, absinthii, gentianæ, gratiolæ, centaurii majoris, aloes, colocynthidis, lactis plantarum planipetalarum plerarumque, & gummi regionum calidarum, quæ fere sint ex genere umbellifero, galbani, myrrhæ, olei corrupti. In animalibus in bile exemplum amaroris est, & in cerumine.

In mineris, solutiones nonnullorum metallorum amaræ sunt (c), argenti potissimum in spiritu nitri dissoluti.

In animalibus cum oleo conjungi videtur amarum, non ita in metallis, neque satis manifesto in omnibus plantis. Tamen lac plantarum planipetalarum specierum, & exoticarum gummi in multis exemplis resinæ est particeps.

Salsus sapor mineralis est progeniei, exque eo genere in varias plantas (d) transit; nutritas multo fimo & urina, in quibus sal abundat, aut falsa maris aqua. Alkali tamen plussculæ fundunt, nitrum aliæ (e).

In animalibus sal marinus dominatur (f), ab ipso multo usu, tum sal proprius animalium, qui lixiviosam volatilem (g) classem constituit, quæ aut nunquam, aut perraro, absque animali vita nascitur.

Aere

(a) IDEM p. 74.

(b) IDEM de natur. dulced. p. 80.

(c) BOYLE de mechan. form. product. exp. 3. 5. BORRICH I. cap. 77.

(d) REDI op. T. II. p. 103. BELLIN. p. 69. FRACASSAT. p. 226. CAPPELLER t. 1. p. 17. MODEL de borace Ed. II. p. 27. LUCHTMANS. t. I. p. 77 16. 27.

(e) Pleraque, quæ plantarum sales habent prismaticos, & pyramides hexagonias BELLIN p. 68 69. 70. FRACASSATUS p. 225. seqq.

(f) L. V. p. 113.

(g) p. 104. 105.



Acre in plantis abundat: & in aquaticis quam maxime: tum in animalium genere minuto, insectis, inque venenis animalibus.

Sed etiam in minerali classe plurimum est ejus generis, quod ad nullum salem referas, venenata imprimis natura, quæ est in antimonio, in arsenico.

Sed ea mineralis acrimonia potius aliis effectibus, quam gustuprehenditur. Videtur enim DEUS ad ejusmodi corpora, quasi arbitrario demum hominum studio in medicamina recepta, nostrum gustus organum non contemperasse, cui unica cura data fuerit distinguendorum, in animali, & vegetabili genere, salibusque nativis, eorum quæ nostræ naturæ conveniunt.

§. V. *An a crystallorum salinarum figuris saporum discrimina.*

Quando sales in aqua natant, tunc quidem aqua inebriati visum fugiunt, integris tamen cum suis dotibus superstites, quantum ex sapore discimus, exque omni analysi. Quando vero ejus aquæ magna pars per calorem abacta est, ut non satis supersit liquoris, qui possit latentem salem suspensum tenere, tunc equidem sales ad latera vasorum adhærent, inque figuras conspicuas figurantur, quæ figuræ, angulosæ quidem omnes, cæterum in aliis aliisque salibus aliæ sunt.

Vulgo dicunt sales mariai cubicos esse crystallos: etsi hic subest non-nihil erroris: nitrum habet crystallos prismaticas hexagonias, truncatas, lateribus sæpe inæqualibus, sex cavis tubulis perforatas (*b*). Vitrioli figura est ex rhomboidea parallelepipedæ (*i*). Aluminis crystalli octaedræ sunt, vel aliarum figuram adamantinarum (*k*).

Spicula insignissima in mercurio sublimato (*l*), inque spiritu salis (*m*), & sulfuris (*n*), crystallisque lunæ (*o*) adparent.

Sic

(*b*) BAKER l. c. p. 64. cum ic. STAHL von Salzen p. 276. *Microsc. Belustigungen* &c.

(*i*) CAPPELER *crystallogr.* T. 3. f. 8. STAHL von Salzen p. 281. MARSIGLI G. di Parm. 1688. Anguli in vitriolo cyprio sunt 55. gr. in Romano supra 75.

(*k*) BAKER *employment for the microscope* Tab. 3. Trapezoides tamen facit CAPPELER t. 3. f. 10. p. 27.

(*l*) LUCHTMANN t. 2. f. 10. BAKER p. 126.

(*m*) LUCHTMANS f. 17.

(*n*) f. 18.

(*o*) f. 24.



Sic porro sales alcalini volatiles aliquid arbuscularum simile habent, & sal ammoniacus fere figuras refert, quas gelu facit (p).

Vapores aerei a solo gelu, in lineas rectas, ad angulos fere rectos repetito conjunctas, & sensim diminutas coguntur.

Si nunc posueris, cuique sali suam esse figuram, quam perpetuo recuperet: si præterea eandem figuram ita huic sali feceris propriam, ut non aliud corpus eandem repetat, promptum erit suspicari (q), naturam specificam salium, atque adeo etiam saporem proprium, ab iis angulis pendere, sub quibus sales in crystallos coeunt.

Et tamen erit hic facillima in errorem via (r). Et primum non est ab eodem sale perpetua crystallici figura. Character salis ab ejus acore (r\*), figura crystallosum sæpe a terra pendet (s), quæ acorem universalem recipit. Argumento nitrum est: id enim æque bonum, perque omnia sua signa perfectum, ex acore suo proprio (t), cum terra salis marini conjuncto habetur, quod nitrum vocatur cubicum (u). Acor specificus est nitri, terra, & figura salis marini.

Sal marinus, qui coctione paratur, abit in pyramides (x) cavas, ex planis quadratis gradatim sibi impositis fastigiatas. Idem, quando nostro more, cum insigni sumtuum compendio, ad solem paratur, abit in cubos solidos, plenosque, nulla nunc cum figura pyramidis (y).

Minimæ demum quæque causæ & circumstantiæ crystallosum figuram mutant, dum natura earum constanter eadem est (z). In experimentis nuperis mira est varietas figurarum, quæ ex eodem sale soluto natæ sunt

(p) *Microscop. Belustig.* t. 23.

(q) DEMOCRITUS sapores explicabat per figuras apud THEOPHRASTUM *caus. plant.* L. III. c. 2.

(r) NEUMANN p. 1634. ed ZIMM. WALLER.

(r\*) POTT *Sendschreib.* an JUSTI p. 10. &c.

(s) Not. ad STAHL *von Salpeter* p. 7. & in universum cum alcali fossili spiritus nitri verum nitrum facit. WALLER p. 260. *Ess. of a Societ. phys. and litter at Edimb.* T. I. p. 1318. & cum omni sale alcalino POTT l. c.

(t) STAHL *von Salzen* p. 287. *von Salpeter* p. 7. 66. MALQUER p. 135. 136. Solis, ait, repetitis solutionibus id fieri SCHELHAMMER c. 10.

(u) NEUMANN T. I. P. 2. p. 140. *Edit. KESSEL Vol. IV. P. 2. p. 293. 333.*

(x) Tales describit BAKER p. 51. CL. LUCHTMANS p. 28. negatque esse cubicos conf. *Microsc. Belustig.* f. 7.

(y) Addit STAHLIUS, duplo in altero latere longiores nasci *von Salzen* p. 276. & de sale gemmæ LUCHTMANS & *Microsc. Belustig.* f. 7. Id non vidi.

(z) WALLER *Chem. lat.* p. 252. Salium figuræ inconstantes SBARAGLI *Apo'og* p. 526.



sunt (a). Neque ullæ adfinitates ex figuris salium factitiorum erui possunt (b).

Si idem sal sub diversis figuris adparere potest, perinde eadem figura crystallorum cum diversissimis saporibus, & viribus medicis conjungetur.

Ita cubica figura reperitur in pyrethri (c) infuso, arsenico (d), saccharo (e), sale absinthii, lixivio cinerum clavellatorum (f), succo pomorum (g), vino aurelianensi (h), tartari emetici muria (i), salibus Valerianæ (k), acetosæ (l), zingiberis, capilli veneris (l\*).

Sic nitrosæ figuræ prismaticæ in endiviæ sale, & esulæ, & citrulli exstant: tum similes figuræ sunt salium brassicæ, lactucæ, roris marini, mechoacannæ, lauri albi, hellebori (m), iterumque malicorii, hellebori nigri (n).

Ita figura sphærica in succo citri, sed etiam in oleo adparet (o).

Iterum alio modo adfines virtutes sunt salium, ut purgent omnes, etsi alii cubicam figuram referunt, aliam alii (p).

Denique figuræ crystallorum certæ & perpetuæ in corporibus a salina (q) natura valde diversis reperiuntur: prismata pyramidibus coronata in crystallo montana, in amethysto (q\*): dodecaedrum in adamante (r), octaedrum in rubino (s), & sapphiro (t), in topasio rhomboideæ quadri-

(a) LUCHTMANS ubique.

(b) REDI opera T. II. p. 100.

(c) LUCHTMANS T. I. f. 7.

(d) F. 9.

(e) F. 27. & CAPPELER t. I. p. 17.

(f) LUCHTM. F. 21. 25.

(g) MODELL de borace Ed. II. p. 270.

(h) CAPPELER tab. 3. f. 11. p. 32.

(i) Tab. I. p. 17.

(k) Ibid.

(l) Ibid.

(l\*) FRACASSAT. p. 227.

(m) IDEM p. 226.

(n) IDEM p. 227.

(o) LUCHTMANS p. 34. 40.

(p) REDI l. c. p. 103.

(q) WALLERIUS Chem. lat. p. 258. 268.

(q\*) Memoir. della soc. columb. p. 18.

(r) CAPPELER t. 3. f. 14.

(s) F. 13.

(t) F. 16.



quadrilateræ cryſtalli (u), in ſmaragdo conſi hexagonii truncati (x). Hic manifeſto non ab acore aut a fale figura eſt.

Quare non a fale ipſo, ſed potius a proportione, & actione mutua ſalium, & liquorum, a quibus ſales ſolvuntur, cauſa figuræ cryſtallorum eſt; & adeo ſapores, qui ſunt a ſalibus, non ſunt ob diverſam figuram diverſi. Sed omnino a variis inter ſe compositis cauſis pendere videntur (y), figura, denſitate, motu, adtractione, elementis denique etiam potiſſimum, ex quibus corpora ſapida componuntur: aut demum, ut mihi ſimpliciſſimum videtur, partim ex elementorum componentium figura, denſitate, viribus aliis: partim ex compositione, ordine, portione, vi adtractili varia, qua ea elementa inter ſe in corpus ſapidum uniuntur.

### §. VI. *Gustus utilitas.*

Præcipua cauſa, quare NATURA animalibus hunc ſenſum impertiverit, procul dubio utique fuit, ut ad conſervandam vitam, cibosque labore parandos, a voluptate grati ſaporis invitaremur, uti a tormento famis cogimur. Vitæ enim facillimam jacturam CREATOR hac ſapientiſſima ratione evitavit, ut homo in conſervando ſe ipſo voluptatem percipiat, & in neglecta conſervatione intolerabilem dolorem.

Deinde credibile eſt, guſtum etiam datum eſſe ad dignoſcendas plantarum, aliorumque ciborum naturas, ut eas ſolas admitteremus, quæ mediocri uſu ſalubres eſſent: a reliquis alibilem naturam non continentibus, amarore, aliisve cauſis, fatuitate ipſa demum abſterreremur. Eas cum olfactu partitas vices guſtus habere videtur. Beſtiæ certe, quæ medias inter venenatas, & noxias herbas verſantur, raro ab iis læduntur, quas ne adtingant quidem. Immenſa vis Napelli per alpes lapidoſas creſcit, & major etiam in humilioribus ſubalpinis pratis hellebori albi, quorum utrumque nullum armentum adtingat.

Sed etiam medicas plantarum vires pleraſque ſapor fidelius prodit (z).

Q 2

Neque

(u) *Societ. columb. l. c.*

(x) *Ibidem.*

(y) *LUCHTMANS p. 39. 46.*

(z) *FLOYER in pharmacopæano toto libro.*



Neque tamen hæc nimis ornasse oportet (a). Non enim absque exemplo est, a necessitate, aut ab imperitia seductas bestias noxios sibi cibos devorare (a\*). Erucae propriam quidem sibi arborem eligunt, fame tamen coactæ etiam aliena folia ambedunt (b).

Insolitam sibi herbam, Napellum (c), capræ suecicæ cum sua perniciæ devorant, quam nostræ, quasi ex traditione doctiores, non tangunt.

Creditur a ranunculo lanceolato, a cicuta aquatica, a phellandryo passim labes in armenta diffundi: suntque inter alpes aliquæ, quas tanquam certo pestilentes futuras nemo vilissimo pretio locat.

Hominum facilius est error. Ab usu plantæ virginicæ in acetario (d) suntæ mortes nautarum. A nucibus moschatarum similibus in america morbus inter nautas, mortesque (e). Sed Mancenillæ, hyoscyami, belladonnæ, oenanthes succo viroso, cicutæ aquaticæ, stramonii, flagitia huc non pertinent, etiam vulgo nota.

Probabile est, vel ex selectu, quem animalia inter herbas instituunt, acriorem ipsis gustus sensum esse, uti majores in lingua papillas habent.

Inhalationem, quæ in lingua fit, & in ore spirituosum potissimum humoris, & utilitatem linguæ ad deglutiendum, alio loco rectius dicemus (f).

LIB.

(a) Jam monuit WALLERIUS in disp. de hist. natural. usu medico. p. 23.

(a\*) IDEM ibid

(b) De GEER Mém. pour servir à l'hist. des insectes p. 319.

(c) In actis Acad. suecicæ.

(d) Phil. transf. n. 454.

(e) Voyage de la flotte de Nassau p. 13.

(f) GREW Cosmolog. sacr. p. 26.



## LIBER XIV.

## O L F A C T U S.

## S E C T I O I.

## O R G A N U M E J U S S E N S U S.

§. I. *Nasus offens.*

R G A N I , quo odores distinguuntur , alia pars supra faciem se effert , vultusque nobilem particulam efficit : pars osseo cranio clauditur.

Pars conspicua , nasus est. Eum partes laterales efficiunt , & media alia ( *a* ) ; pars media superior duobus fit officulis , quæ ab ipsa re *nasalia* dicuntur. Oblonga ea , & pene parallelogramma sunt , ut tamen deorsum latebant ; robusta eadem , convexa ad faciem , sibi per levem lineam intus asperiores adplicantur , fineque suo latiori lacera sunt ( *b* ). Versus nares secundum totam longitudinem exteriorem processum exigunt , subasperum ( *c* ) , cui os maxillare adplicatur , & ad cujus interiora , & inferiora , sulcus subrotundus os excavat ( *d* ) , crenæque vasculares descendunt. Foraminibus nonnullis ea ossa perforantur , uno utrinque ( *e* ) , per quæ arteriolæ ( *f* ) a faciali trunco ad membranas narium se penetrant , longe deorsum tendentes.

Laterale fulciuntur & ipsa , processu valente , quem os maxillæ ( *g* ) proprie dictum sursum emittit , crassiores , curvulum , ad faciem parte interiori

Q 3

( *a* ) ALBINUS *de off. tab. 4. f. 6.* SUE in splendidis ossum tabulis , quæ sero ad nos proveniunt Tab. X.

( *b* ) MONRO p. 129. BERTIN. p. 132. ALBIN. T. I.

( *c* ) Conf. BERTIN. p. 133.

( *d* ) MONRO p. 129. BERTIN. p. 132. ALBIN. f. 37.

( *e* ) SUE l. c. MONRO p. 129. DUVERNEY *poss.* p. 297.

( *f* ) Venam ea parte transire PETIT apud BERTIN. p. 131. Sed arteriam eo loco esse sulci per os in parte nasali ducti confirmant , DUVERNEY puto t. 14. f. 3. 6. add. BERTIN. p. 132.

( *g* ) ALBIN. T. I. SUE. Processus nasalis WINSLOW l. n. 275. MONRO p. 134. add. BERTIN. p. 157.



riori pene planum, parte exteriori ad orbitam sinu leni exscissum: ad nares duobus obliquis, neque profundis alveis inæquale, quos media emi-  
nens linea dividit (*b*). In eo pariter foramina sunt (*i*), per quæ vasa  
labialia ad narium membranam penetrant.

Et nasi os, & maxillaris processus asperrima & denticulata parte in osse  
frontis fundatur (*k*).

## §. II. *Nasus cartilagineus.*

Ab ossis nasi fine imo, & a processus nasalis ossis maxillæ superioris li-  
mite interno, porro cartilago producitur, quæ nasum perficit, lateralem  
volo, quæ in universum speciem habet trianguli, cujus hypothenusæ pro-  
cessui, quem dixi, nasali continuatur, basis ad eadem antrorsum pro-  
venit, latus medium ad septum adplicatur, vertex demum truncatus est.

Sed ea cartilago in homine non simplex est, & varietatem omnino habet.

Superiores sunt cartilagines pene quadratæ, triangulares (*l*), alteriusve (*m*) fi-  
guræ, fovea separatæ, cum septo narium connatæ (*n*), quæ ossi nasali adhærent.  
Earum quælibet terminatur triangulari adpendice, quæ ad sagittæ modum  
paulo ultra mediam cartilaginem procurrit. Inter eam & os nasi arteriolæ  
etiam ad nares ab ophthalmica penetrant.

Porro utrinque claviculæ oblongæ figuræ, diffformes (*o*), inter superio-  
res & inferiores cartilaginrs ponuntur. Eo loco nuda pro cartilagine alias  
membrana est; alias nuclei cartilaginei (*p*) intercedunt.

Inferiores cartilagines gnomonem referunt (*p*\*). Crus aliud margini ossis na-  
salis parallelum proprie alam narium efficit (*q*). Incipit in imo mucrone nasi  
quasi globulo, latescit inde, & versus septum nasi in planam ovatam la-  
minam abit.

Inde

(*b*) BERTIN. p. 166.

(*i*) NESBIT p. 85. MONRO p. 138. BERTIN. p. 157. 165.

(*k*) ALBIN. T. I. &c.

(*l*) RUYSCH *Epist* 8 tab. 9. f. 4. A.

(*m*) TARIN figuram facit Epiglottidis Tab. 36. f. 1. 4. Parabolicam COWPER apud  
DRAKE tab. 17. f. 3. Quadratam VERHEYEN tab. 28. f. 4. A. Partes laterales vocat  
WINSLOW T. IV. n. 324.

(*n*) TARIN p. 117. SANTORIN c. 5. n. 1. p. 84. WINSLOW ibid.

(*o*) Habet SANTORINUS n. 4 p. 86. RUYSCH l. c. B. DUVERNEY p. 209.

(*p*) SANTORIN p. 86. RUYSCH [onam] C. VERHEYEN f. 4 D. f. 5. D. d.

(*p*\*) RUYSCH D. &c.

(*q*) TARIN f. 1. f. RUYSCH D. Est pars anterior WINSLOW n. 325. COWPER l. c. 1.  
VERHEYEN T. 28. f. 4. B.



Inde retrorsum it, & utrinque septum narium medium comprehendit; lata plana lamina, quæ demum ad partem septi narium posteriorem obtuso fine terminatur (*r*).

Ejus cartilaginis loco alias duæ adsunt, quarum altera mucronem efficit, altera septum utrinque comprehendit.

Denique septum narium cartilagineum, de quo proprio loco dicetur, a mucrone nasali ossium antrorsum descendit, inudumque nares dividit, aut connatum cum cartilaginibus inferioribus, aut certe brevi cellulosa tela conjunctum.

Multa cæterum in his cartilaginibus varietas est. Quinque vulgo numerant (*s*), septum, superiores, inferiores. Ad undecim usque S A N T O R I N U S.

### §. III. Musculi nasi.

Cartilaginea pars nasi in homine, inque quadrupedibus, musculis regitur, qui in respiratione intensiori, & in accuratiori olfactu operantur. Contra negantem SPIGELIUM eum motum in se ipso PLEMPIUS demonstravit (*t*), & ipse potissimum in ægris difficiliter aerem ducentibus vidi, etiam in ipsis ranis (*t*\*). Eorum princeps nares dilatat *Levator alæ nasi* (*u*), qui idem etiam labium superius elevat. Natus ex summo processu nasali ossis maxillaris, descendit, & lacertum quidem exteriorem in labium superius ejusque cutem dimittit (*x*), alias dicendum: interiori vero parte prope conjunctionem cartilaginis superioris cum inferiori (*y*) inseritur, tegitque Compressorem.

*Procerum* cum frontali dicemus (*z*), quem Cl. vir nasi cutem seorsum ducere credit, & corrugare.

Alii

(*r*) *b.* TARINI f. I. SANTORINI. p. 87. n. 5. RUYSCH E. Posteriores WINSLOW n. 326.

(*s*) La CHARRIERE n. 31. &c.

(*t*) Van den Spieren p. 67.

(*t*\*) Olim etiam J. MURALTUS *vademec. anat.* p. 590.

(*u*) ALBIN. c. 2. t. II. f. 10. C.

(*x*) *Pyramidalis socius* SANTORINI. c. I. n. 9. p. II. T. I. T. Minor WALTHER *anat. rep. t.* p. 5. Quinti fibræ insertæ pinnæ FALLOP. p. 67. *b.* *Dilatator Nasi* CANT. p. 1. Pars incisivi WINSLOW. n. 562. Oblique descendant LIEUTAUD. p. 164. VERDIER *Portion de l'incisif* PETIT II. p. 443. *Lateralis Nasi* WINSLOW n. 311. *The second* DOUGLAS p. 18. Habet EUSTACHIUS *tab.* 41. f. 1. RIOLANUS p. 310. DUVERNEY p. 211. &c.

(*y*) COWPER apud DRAKE *tab.* 17. f. 3. C.

(*z*) SANTORINUS n. 10. L. I. L. bb. &c. DUVERNEY *postb.* p. 211.



Alii contra nares comprimunt, dum mobilia latera nasi medium versus septum urgent.

*Compressor nasi* ALBINI (a), transversus SANTORINI (b), tenuis musculus, proxime muscoli levatoris modo dicti insertionem ex radice alæ nasi exterius (c) oritur, angustus, & cum depresso conjunctus (d). Latescit eundo, perque alæ nasi partem superiorem ad dorsum nasi curvus adscendit, & dorsum ipsum attingit, partim sodali (e) commixtus, partim frontali (f); ut tamen pars alia ceterior in imas alas terminetur (g). Sodalis depressoris, dum iste nasum retinet, deorsum tractum, ipse alas deprimit, & versus septum adducit: solus enim potius elevat.

*Depressor alæ nasi* (h) ab osse maxillæ superioris, & ab alveolis dentium incisivorum atque canini, origine semicirculari provenit, interius quam Compressor; adscendit, latescit curvulus (i), & in septum nasi, atque alæ imam radicem se inmittit, & nonnunquam fere circa pinnas circumducitur (k). Nasum deorsum ducit, & comprimit (l).

Aliquando fasciculus ab osse natus, inque os redeuns, adfinis isti (m), sed a naso distinctus adjacet.

*Nasalis labii superioris* (n) a mucrone nasi ultimo, aque proxima parte septi natus, descendit retrorsum ad labium superius, versus angulum oris, inque

(a) ALBIN. c. 7. p. 150. tab. XI. f. 7. COURCELLES t. 1. D. d. t. 2. D. d.

(b) n. XI. c. 15. T. I. a. a. WALTHER *an. t. repet.* p. 6. a. a. WINSLOW n. 332. Alius musculus carneus FALLOP. p. 67. b. Levator alæ nasi COWPER ed. 1724. c. 10.

(c) ALBINUS, COURCELLES.

(d) ALBINUS, WALTHER.

(e) SANTORIN. etiam WALTHER p. 7. ALBIN.

(f) COURCELLES.

(g) SANTORIN. n. 12. pars inferior transversæ.

(h) ALBIN. c. 18. T. XI. f. 8. COURCELLES t. 2. w. tab. 3. k. k. k. k. Pinnarum dilatator, aut myrtiformis SANTORIN. n. 14. c. c. *Incisif mitoyen* WINSLOW n. 565. *Constrictor alæ nasi* COWPER nyot. 1694. f. 3. ed. 1724 t. 25. f. 37. ARENT. CANT. p. 3. t. I. f. 1. *Myrtiformis* VERDIER p. 208. LIEUTAUD p. 158. Depressor proprius CHESELDEN p. 176. Habet EUSTACHIUS Tab. 41. f. 1. 3. & MORGAGNUS *Adv.* II. p. 29.

(i) BIDLOO T. 12. f. 4. EUSTACHIUS.

(k) SANTORIN. n. 16.

(l) RINÆUS DOUGLAS p. 17. utrumque complectitur, & myrtiformis LIEUTAUD p. 158. Communis utrique origo est WALTHER *musc. ten.* p. 610. & PETIT T. II. p. 444. Non potuit priorem distinctum reperire MORGAGN. *adv.* II. p. 29.

(m) Anomalous ALBIN. p. 167. Superior SANTORINI d. sive narium lateralis & rhomboides EJUSD. f.

(n) ALBIN. c. 15. p. 161. tab. XI. f. 10. 11. 12. SANTORINI tertius fibrarum ordo n. 20. l. l. *Fibra orbicularis labiorum* VERDIER p. 202. *Portio orbicularis nares deprimens* RIOLANI p. 310. *Musculus a sphinctere labiorum* MORGAGN. T. II. p. 29. *An the third* DOUGLAS p. 18.



inque orbicularem evanescit. Potest etiam nasi septum & mucronem deprimere. Labium superius narium ostio obducit, ut claudat.

Exiguum musculus ex ima ala versus dorsum dilatatum (o) alii habent.

§. IV. *Cava nares.*

Multiformis cavea, & dictu difficilis, tamen haftenus describi debet, ut olfactus organum innotescat. Ipse nempe nasus antè duobus ostiis in aerem patet, quæ conjuncta triangulum efficiunt, & a septo medio dividuntur: Nare reliqua angustiora sunt (o\*).

Sic posterius in pharyngem, supra os, idem narium cavum duobus pariter ostiis septo distinctis patet, sed ovatis, & ad perpendiculum longioribus.

Tota cavea ad utrumque septi latus simplex est, & a lacunare suo, ad imum meatum, ad perpendiculum descendit, satis quadratum, ut tamen angulus anterior in triangularem mucronem (p) procurrat, quem os nasi extremum finit; de posteriori portio resecetur.

Lacunar, reliquis lateribus brevius, fit a parte inferiori processus anterioris ossis multiformis (q); a laminae cribrosæ facie inferiori (r), vicinaque ossis frontis lamina; ab osse demum nasi (s), & frontis.

Lineam posteriorem superius terminat eminens in nares sinus sphenoidæi convexitas (t); infra eam nares ad utrumque latus vomeris in fauces patent.

Lineam anteriorem ossis frontis descendens processus cum septo narium commistus (u), tunc cava pars ossium nasi claudit (x), commissæque cum septo narium alæ, reliqua in facie aperta patet.

§. V.

(o) SANTORIN. n. 15. e. e. WALTHER p. 7. Possit videri musculus F. CASSEK *pentasthes. org. olf.* t. 2. f. 1 nisi is major esset.

(o\*) DUVERNEY p. 210.

(p) TARIN. *tab.* 7. t. u. ALBIN. t. 4. f. 1. 2. *Ic. nostr. narium* f. 1. 2. 4. [RUPPERT f. 3.

(q) ALBIN. T. I. f. 1. i *Ic. nostr. I. AURIVILLIUS de narib. intern.* p. 8.

(r) ALBIN. f. 1. m. *Ic. nostr. l. m.*

(s) ALBIN. *Ic. nostr. ibid.*

(t) TARIN. l. c. b. e. *tab.* 7. pone d. ALBIN. f. 1. 2. *Ic. nostr. 1. 2. 4.* [RUPPERT *de tunic. pituit.* f. 2. 3.

(u) ALBIN. f. 1. c. CHESELDEN t. 7. f. 2. *Ic. nostr. 1.*

(x) TARIN. *tab.* 7. ALBIN. f. 1. m. CHESELDEN *ibid* ad t. *Ic. nostr. 1.*



§. V. *Meatus narium Infimus, Medius, Supremus.*

Intima integri cavi pars, proxima septo, a summo cælo cribrosi ossis continuatur ad imum meatum, quem ossa maxillæ & palati efficiunt. Sed exterior pars cavi narium in tres partes ab eminentibus ossibus dividitur, quæ dicemus.

*Meatus imus* pene transversus (*y*) est, ut tamen & ad fauces leniter (*z*) descendat, & perinde in faciem. Per eum tamen meatum clavum in vivo animale, etiam homine, circulatores profunde transadigunt. In osse maxillæ superioris (*a*), deinde in osse palati (*b*) ad dimidiæ cylindri fere speciem excavatur (*c*). Pars magna nuda est, pars osse spongioso infimo protegitur (*d*).

A medio meatu eo osse distinguitur, lineaque transversa (*e*) inferiori, quæ est sub radice processus nasalis ossis maxillaris: posterius etiam, sed obscuriori linea, processu nasalis ossis palati dissepitur.

*Meatus Medius*, reliquis longior, inter duas transversas lineas asperas ossis (*g*) maxillæ superioris, & similes lineas ossis palati (*h*), medius intercipitur, ut ejus partem etiam os spongiosum superius teneat, recessumque tegat extimum (*i*). In fundum modice eminet os spongiosum infimum (*k*). Anterius ad hunc meatum adscenditur (*l*), inde fere transversus est. Os maxillæ proprie dictum processu suo nasali (*m*), tum os unguis (*n*), & lamina communicans inter duo ossa spongiosa (*o*), & processus adscendens ossis maxillæ posterior, & ossis palati processus nasalis (*p*), ei sunt pro parietibus.

Brevior

(*y*) *Ic. nostr.* I. III. TARIN. tab. 7. fig. 7.

(*z*) MORGAGNUS *Advers.* VI. anim. 51. p. 66.

(*a*) PALFYN f. 1. w. w. ALBIN. t. 4. f. 1. 2. T. T.

(*b*) PALFYN *ibid.* X. ALBIN. d.

(*c*) PALFYN. f. 1. w. w. x. in *ic. nostr.* 2. TARIN. tab. 6.

(*d*) *Ic. nostr.* cit. & f. 2. ALBIN. conf. f. 1. cum 2.

(*e*) ALBIN. f. 2. x.

(*f*) IDEM *ibid.* φ.

(*g*) TARIN. tab. 7. g. g. e. e. u. h. *Ic. nostr.* 1. C. x. 1. 4. 2. u. 2. x. 4. 1.

(*h*) ALBIN. T. IV. f. 1. 2.

(*i*) Id. l. c. f. 1. 2. *Ic. nostr.* I. β. 3. x.

(*k*) IDEM *ibid.* f. *nostr.* 1. λ.

(*l*) ALBIN. f. 1. 2.

(*m*) *Ic. nostr.* l. C. x.

(*n*) ALBIN. f. 1. 2. 1.

(*o*) *Ic. nostr.* f. 1. 2.

(*p*) ALBIN. l. c. *Ic. nostr.* 2. y.



Brevior est *Meatus Supremus*. Ei antèrius pro pariete ea pars ossis cribrosi (*q*) est, quæ continet sinus ethmoideos, postèrius sinu sphenoidæo terminatur (*r*), interque cum sinu, & os spongiosum superius, cæcus & obliquus, unus alterve, recessus est (*s*), quales in unum confluunt, & retrosum descendunt, ut se cum medio meatu pone os spongiosum superius conjungant.

§. VI. *Ossa spongiosa. Os cribrosum. Pars media.*

Perinde est, siue duo ossa spongiosa ad os cribrosum retuleris, siue quatuor, siue sex omnino, siue octo feceris (*s\**). Lamina, quæ os spongiosum medium cum inferiori nectit, non rarissime integra est, ut penitus a medio turbinato osse in imi ejus nominis ossis processum adscendentem descendat (*t*), & tunc quidem unius ossis cribrosi partes omnia ea ossa sunt, quæ spongiosa dicuntur. Est autem ubi eam inter laminam, & os spongiosum imum, membrana aliqua intercedit; est ubi futura inter easdem duas laminas inter est; ita quidem tria fiunt ossa, cribrosum & spongiosa inferiora duo. Si præterea cornicula sphenoidæa pro peculiaribus spongiosis offi-  
culis velis habere, erunt ossa spongiosa omnino octo.

Ossis cribrosi præcipua pars est, ob quam veteres (*u*) nomen toti ossi imposuerunt, naviculæ similis, cava ad cerebrum, tota perforata (*x*) omnis generis ductibus, qui a cranii cavea in narium cavum nervos & vascula dimittunt.

Ex ejus postrema sede colliculus adscendit osseus, in aciem extenuatus, qui continuo altior, in rotundum (*y*), & crassiusculum (*z*) montem abit. Eum inter & os frontis est foramen cæcum (*a*). Ad ejus la-

R 2

tera

(*q*) ALBIN. f. r. n. sc. nostr. IV. d. D.

(*r*) IDEM f. i. Ω. F. nostr. I. V. f. 4. S.

(*s*) ALBIN. fig. 1 F. nostr. I. s. t.

(*s\**) Quatuor vel sex SCHNEIDER *cribrif.* p. 17.

(*t*) HUMAULD *Mem. de l'Academie des sciences* 1730. n. 7. Ita PETIT ad PAUYEN p. 77. BERTIN. *osteolog.* T. II. p. 112. 119. qui Cl. vii eam fabricam pro frequentiori habet. Ita olim ossa spongiosa ethmoidi tribuebat Guilielmus CHESELDEN *osteogr.* c. 2. Sed is videtur unicum par ossium spongiosorum facere.

(*u*) *Hæmoides* RUFUS L. III. p. 67. ORIBASII p. 18. *Hæmos* pars nasi, per quam spiritus ducitur POLLUX p. 192.

(*x*) ALBIN. t. 5. f. 3. & 5. SUE t. 8. f. 3. BOEHMER t. 4. f. 5.

(*y*) BERTIN. p. 112. ALBIN. t. 5. f. 3. A. SUE t. 8. f. 4.

(*z*) Etiam cavum WINSLOW L. C.

(*a*) BERTIN. *ibid.*



tera utrinque minor colliculus semicircularis nascitur, & antrorsum elevatur, & hinc quidem in finem anteriorem montis abit, quem dixi; inde in septum narium. Hunc inter colliculum (*b*), & montem alia sunt foramina majora, & obscuriora.

Ex inferiori & media, & anteriori hujus ossis sede, nascitur lamina (*c*) parallelogramma utcunque, anterieus crassa, posterius tenuis, inferiori sub acie crassula (*d*), & spongiosa, quæ anterieus ossis frontis laminæ nasali (*e*), deinde inferius septo cartilagineo (*f*), & in parte posteriori vomeris fulco superiori conmittitur (*g*), cum isto quidem non raro in adultis cadaveribus connata (*h*). Posterior limes & ipse cum ossis sphenoidæi eminentia eum sinum anterieus dividente (*i*) conferruminatur (*i*\*).

### §. VII. *Partes laterales.*

Difficile est verbis hoc os describere, quod etiam penicillo difficulter imiteris. Una vero in universum utrinque lateralis ejus pars est, dextra similis sinistrae, quæ ex margine ossis cribrosi per totam ejus longitudinem prodit. Hujus superior pene medietas, utcunque parallelepipedo transversum longo similis, constituit os papiraceum (*k*), intus totum divisum in cellulas (*l*), diversi numeri, tres (*m*), quatuor (*n*) pluresve, nulla cum lege, neque certæ figuræ, quarum aliæ vulgo notæ interior-

res

(*b*) An fissuram vocat, nemini dictam BERTIN. T. II. p. 113.

(*c*) *Ic. nostr.* 4. F. TARIN. t. 5. f. 1. 2. tab. 7. f. 2. SUE.

(*d*) ALBIN. tab. 5. f. 1. Φ. Φ.

(*e*) IDEM T. 3. f. 2. *Ic. nostr.*

(*f*) *Ic. nostr.*

(*g*) ALBIN. T. 3.

(*h*) *Ic. nostr.* Hinc vomerem pro ossis Ethmoidis productione habet SANTORINUS p. 88. & LIEUTAUD p. 51. & olim VESALIUS exam. obs. FALLOP. p. 31. & LINDEN physiol. p. 378.

(*i*) ALBIN. f. 3. conf. *ic. nostr.* BOEHMER t. 4. f. 7.

(*i*\*) RUYSCH *Mus. var.* p. 115. not. *nostr.* 12.

(*k*) Dux partes spongiosæ INGRASSIAS p. 103. Habet etiam SCHNEIDER de oss. cribris. p. 85. *Labyrinthus* WINSLOW n. 248.

(*l*) Cellulas Ethmoideas habet ALBINUS t. 4. f. 10. t. 5. f. 3. SUE t. 8. f. 3. VERHEYEN p. 104. t. 28. f. 8. PALFYN t. 1. o. o. o. COWPER apud DRAKE t. 17. f. 4. G. L. III. c. 10. qui ossi frontis eas adscribit.

(*m*) Tres quatuorve facit RIOLAN tract. Isag. p. 36. 37. Tres utrinque VIEUSSENS p. 102. Quinque vel ultra BUDÆUS Misc. Ber. T. II. n. 14. Non constanter sex MORGAGN. Adv. I. p. 38. Septem utrinque SANTORINUS p. 89. 90. Ad undecim REININGER n. 13. de cav. off. cap.

(*n*) *Ic. nostr.* 1.



res & septo propiores sunt, aliæ minus cognitæ exteriores, inferiores, una vel altera ( *o* ) varie, tantum ut eæ cellulæ ostiis suis in supremum, quem diximus, narium meatum aperiantur.

Earum quasi tectum, paucis locis os ipsum, in quo effodiuntur, plerisque os frontis efficit ( *p* ), cujus utraque medietas secundum laminam cribrosam cellulis excavatur, quæ ethmoideas impositæ perficiunt. In anteriorem etiam cellularum ethmoidearum solet sinus frontalis aperiri, & per ejus ostium ( *q* ) in narium supremum meatum se inanire.

Facies anterior ab eo adeo osse frontis, & ab osse unguis perficitur.

Facies posterior a processu anteriori ossis palati ( *r* ) clausas habet cellulas, eaque sede non rarum est, os palati penitus cum spongioso osse conferruminari ( *r\** ).

Facies interior septum narium respicit, & in eam lamina ( *r\*\** ) aspera, reticulata, mytuli simili, protuberat ( *s* ).

Facies inferior papiracea tenuitate est, & ex ea id, quod sequitur, os spongiosum vulgo superius continuatur.

Facies exterior maxima parte plana est, satis quadrangula ( *t* ), & in orbita adparet, proque peculiari osse plano & olim descripta fuit & nuper ( *u* ). Brevior cum sit cellulis ethmoideis, id quod anterius ab osse plano non perficitur, id os unguis ( *x* ) complet, & sæpe adeo valide adhæret, ut pro ossis cribrosi parte numeratum sit ( *y* ).

R 3

Ante-

( *o* ) Not. nostr. 7.

( *p* ) ALBIN t. 5. f. 2. VID. VID. t. 4. f. 7. SIDREN de basi calv. n. 13. Syll. para corp. hum. t. 3. f. 4. SUE t. 6. f. 3.

( *q* ) CASSERIUS t. 18. p. 117. WINSLOW n. 202. BUDÆUS n. 12. 16.

( *r* ) BERTIN. T. II. p. 120. 204. JANKE de off. cap. c. XII. WINSLOW n. 249. MONRO p. 112.

( *r\** ) BERTIN. JANKE.

( *r\*\** ) Le premier cornet. BERTIN. p. 117. La face interne WINSLOW n. 248. Alia ossea squamula AURIVILLII p. 13. Supremum os turbinatum MORGAGN. Adv. VI. tab. 2 f. 3. q. q.

( *s* ) ALBIN. t. 4. f. 1. m. BOEHMER t. 4. f. 6. I. I. TARIN. T. 5. w. w. Ic nostr. f. 4.

( *t* ) ALBIN. t. 5. f. 3. t. 4. f. 10. SUE t. 8. f. 4. BERTIN. T. II. p. 116.

( *u* ) CORVINUS de organo olfact. p. 17.

( *x* ) WINSLOW n. 249. ROSEN p. 11. Ic. nostr. f. 1. Quare negat RUPPERT de membrana pituit. p. 15?

( *y* ) MONRO of the bones p. 113. INGRASSIAS p. 105.



Anteriores cellulae in secundum narium (z) meatum, posteriores in supremum, ejusque posteriorem recessum (a) aperiuntur, rotundis, saepe obliquis osculis.

Ex osse plano (b), nonnunquam, etiam ex cribriformis (c) laminae parte posteriori, exeunt ossae laminae (d), quae denique in ossiculum triangulare (e), partim paulum convexum, partim paulum concavum, tribus processibus auctum (f) abeunt, cujus planae interiores facieculae amplum hiatum sinus sphenoidi perficiunt (g), cumque ejus ossis anteriori spina eminente committuntur (h). Propria ossicula esse, & nomen mereri *corniculorum sphenoidiorum* alii Cl. viri (i) malunt, etsi per aetatem cum eo osse confundant (k), & cum osse nonnunquam palati (k\*). In eo osse vel solo ostium est sinus sphenoidi (l), vel certe pars ejus ostii. Defractas, & cum osse sphenoidi coalitas particulas pinxit CASSERIUS (l\*).

Integro in cranio necdum denudatum id os sub specie simplicis, duplicisve conchae ab ossis cribrosi corniculo supremo versus sinum sphenoidium emissi adparet (m).

Haec nuper nota, dudum vero cognita fuerunt ossa spongiosa, quae vulgo superiora (n) dicuntur, & rectius omnino media vocarentur, neque

(z) De una *ic. nostr.* f. 2. D. inter laminam descendente ossis spongiosi medii, & partem turbinatam add. BUDAËUS n. 15.

(a) *ic. nostr.* f. 1. BUDAËUS n. 15.

(b) BOEHMER t. 4. f. 5. 6. PETIT. tab. 12. f. 1. E.E. SUE t. 8. f. 3. 4. 5. 6.

(c) BOEHMER ibid.

(d) IDEM ibid. ALBIN. t. 4. f. 4. A. Z.

(e) ID. ib. & fig. 7. SUE.

(f) SUE. Adde JANKE p. XI.

(g) BOEHMER f. 7. SUE p. 93. BERTIN. *Mem. de l'Acad.* 1744. p. 298. 300. AURIVILLIUS p. 18.

(h) BOEHMER ib. BERTIN. *osteol.* T. II. p. 100. *Mem. de l'Acad.* 1744. p. 299. AURIVILL. p. 17. ALBIN. t. 5. f. 2. 6. CHESLDEN t. 8. f. 8.

(i) Habet etiam DUVERNEY *posthum* p. 219. BERTIN. *Mem. de l'Acad.* 1744. p. 298. SUE l. c. JANKE p. X. XI. Ad os ethmoides olim Cl. CASSEBOHM. BOEHMER. AURIVILLIUS p. 18.

(k) PALBYN *Anat. Chirurg.* p. 74. AURIVILL. p. 18. Habet cum osse Ethmoide SCHAAERSCHMIDT *osteol. tabul.* p. 35. Negat distincta ossa esse Cl. MONTAGNAT *lettre à M. Bertin.* p. 34.

(k\*) AURIVILL. p. 18.

(l) *Mem. de l'Acad.* 1744. p. 298. JANKE p. XI. *Not. nostr.* 2. LIEUTAUD p. 20. AURIVILL. p. 17.

(l\*) Lagenularum nomine intus cavarum t. 6. f. 6. monente AURIVILLIO.

(m) TARIN. T. VII. f. 1. 6. *ic. nostr.* f. 3.

(n) FALLOPIO.



que mytuli dissimilia sunt (o). Ea nempe ex parte cellulosa (p) cribrosi ossis cis ossa spongiosa suprema descendunt (q), ex longa teneraque lamina, inque (r) nares longe prominent, ab osse unguis ad ingressum truncorum arteriarum nasalium. Anterior ejusmodi os turbinatum obtusum (s), posterius fine acuto (t) versus finum sphenoidium producit, eumque finem linea aspera ossis palati (u) sustentat. Pars anterior crassa, aspera (x), reticulata; posterior tenera est, introrsum sursumque convexa, deorsum & antrorsum cava. Aciem inferiorem sulcus vasculosus (y) legit. Fovea plerumque est, quam pro sinu peculiari L L L. INCISOR descripsit (z).

Idem denique ex labyrinthi parte anteriori (a) os laminam variæ figuræ educit, teneram, fragilem, integris potius in naribus, quam in soluto osse conspicuam, oblique retrorsum descendentem, quæ ante finum maxillarem, cujus partem claudit, ad laminam adscendentem ossis spongiosi infimi descendit, & cum ea connectitur (b). Eam laminam vidi bifidam fuisse, & inter ejus discedentes partes finum maxillarem ostium suum habuisse (b\*). Vidi lineam membraneam intercessisse; vidi ossiculum proprium longum & angustum (b\*\*).

#### §. VIII. Ossa spongiosa infima (c).

Plerisque a scriptoribus propriis pro ossibus ista habentur, mytuli perinde similia, ut ea, quæ modo diximus; cæterum infra ea posita (d), longiora,

(o) *Concha superior* WINSLOW n. 250.

(p) *Ic. nostr.* I. ALBIN. T. 5. f. 1. T. 4. f. 1.

(q) BERTIN. *Osteolog.* T. II. 117.

(r) Cum membranis COWPER apud DRAKE t. 17. f. 4. L. I. *Ic. nostr.* 3. Nuda ossa TARIN. T. 7. f. 1. T. 5. *Ic. nostr.* 1.

(s) TABIN. t. 7. f. 1. *Ic. nostr.* ALBIN. t. 4. f. 1.

(t) TARIN. t. 7. f. 1. *Ic. nostr.* ALBIN. l. c.

(u) ALBIN. t. 4. f. 2.

(x) AURIVILLIUS p. 13. *Ic. nostr.* I. ALBIN. t. 4. f. 1.

(y) *Ic. nostr.* I. ALBIN. l. c.

(z) SANTORINUS p. 89.

(a) DUVERNEY p. 216. qui unum vocat. HUMAULD *Mem. de l'Acad.* 1730. BERTIN. p. 118. TARIN. t. 7. f. 1. ad e. *Ic. nostr.* I. & not. 8. BUDAUS n. 23. ALBIN. T. 4. f. 1.

(b) p. 136.

(b\*) *Not. nostr.* 8.

(b\*\*) An ossa turbinata minora COWPER apud DRAKE l. c.

(c) *Conchæ inferiores* WINSLOW n. 435. *Cornets inferieurs* BERTIN. p. 189.

(d) TARIN. tab. 7. f. 1. i. h. tab. *nostr.* f. 1. ALBIN. t. 4. f. 1.



longiora, & antèrius acuta, qua lineæ asperæ ossis maxillaris (*e*) insident, & postèrius, hic tamen longiori (*f*) rostro, ossis palati (*g*) asperæ lineæ inposita, cum qua aliquando confervent (*h*). Ultra eum quasi osseum nucleum processum mollem membranaceum, uvulæ similem retrorsum produci vidi (*i*). Superior facies aspera, reticulata, spongiosa (*k*) est; inferne intèrius similis, extèrius tenuior, in speciem mytuli cava, tamen subaspera (*l*). Longitudo pene tota aspera, postèrius sulco vasculoso percurritur, in quo arteria est (*m*). Situs non penitus constans est, ut ea ossa nonnunquam humiliora sint; alias ad septum propius accedant, alioque modo varie se habiant (*m*<sup>\*</sup>).

Sursùm idem os versùs sinum maxillarem processum latum brevemque oblique emittit, occurrentem processui, quem modo diximus, ex osse turbinato medio (*n*) descendere, & cum eo, uti diximus, frequenter satis connexum. Ejus sive pars anterior, sive similis est processus, quem sursum producit, & quem cum unco descendente ossis unguis coalescere vidi (*o*), & cum eo canalem nasalem efficere (*p*). Plura folia ossea viderunt alii (*p*<sup>\*</sup>).

Tertius denique ab ora extèriori latus, & partim reticulatus processus postèrior oritur; qui introrsum descendit, & cum prioribus caveam intercipit, idemque partem magnam ostii sinus maxillaris perficit, & ossiculum turbinatum sustinet (*q*). Leniter enim ad lineas, quas dixi asperas firmatum, maligne satis (*r*) locum suum tuetur.

Meatum

- (*e*) BERTIN. p. 192. ALBIN. ib. conf. Ic. f. 2. WINSLOW n. 441.  
 (*f*) TARIN. t. 7. f. 1. ad h. Ic. nostr. 1.  
 (*g*) BERTIN. p. 192. ALBIN. ib. conf. cum f. 2. WINSLOW n. 441.  
 (*h*) Ideo ossi palati totum os spongiosum infimum SANTORINUS accenset p. 88.  
 (*i*) Habet COWPER ap. DRAKE tab. 17. f. 4. 5.  
 (*k*) Ic. nostr. &c.  
 (*l*) BERTIN. p. 190. SUB. f. 9. tab. 10.  
 (*m*) Ic. nostr.  
 (*m*<sup>\*</sup>) Mem. de Chirurg. T. II. p. 179. 180.  
 (*n*) BERTIN. p. 119. 190. TARIN. tab. XI. f. 13. 4. G. tab. 7. f. 1. ad e. PETIT l. c. p. 77. 78. AURIVILLIUS p. 18. BAGET p. 106. ALBIN. t. 4. f. 1. 11. M. Syllab. part. corp. hum. t. 5. f. 6. 76. BUDÆUS n. 23.  
 (*o*) MONRO p. 146. WINSLOW, LIEUTAUD p. 58. HENSING. Hinc ad os ethmoides refert J. B. Cephalatom p. 168.  
 (*p*) MONRO p. 146. WINSLOW n. 442. BAGET p. 106. BERTIN. l. c. p. 190. 192. TARIN. l. c. b. t. XI. tab. 7 inter g. antèrius & k. Ic. nostr. f. 1. ALBIN. t. 4 f. 1. AURIVILLIUS p. 14. SCHAARSCHMIDT p. 45. Syllab. Russ. l. c. p. 73. HENSING. de off. apoph. p. 15. An non COWPER T. 17. f. 5. A.  
 (*p*<sup>\*</sup>) DUVERNEY p. 220.  
 (*q*) WINSLOW n. 441. BERTIN. p. 191. MONRO p. 146. PETIT p. 78. BAGET p. 104. SUB. t. 10. f. 9. C. ALBIN. ib. SCHAARSCHMIDT p. 45. Syllab. russ. t. 5. f. 3. 77.  
 (*r*) BERTIN. p. 193. 194.



Meatum imum narium protegit (s), & partem sinus high-mori.

§. IX. *Septum narium.*

Ex osse maxillæ superioris exit utrinque, qua cum sodali suo conmittitur, asper margo (t), qui cum alterni ossis simili margine crenam intercipit. Ejusmodi etiam crena de osse palatino utroque adscendit.

In eam nunc crenam demittitur longissimum latus vomeris (u), in quo ejus duæ laminæ conglutinantur (x). Media est acies, & ad latera utrinque sedes depressior (y).

Ejus ossis fere, quæ rhombi figura est, & duæ sunt laminæ, sibi simillimæ, quæ & superno in margine uniuntur, & in imo, cætera latitudine dissident (z). Aliquando natura ossea interrumpitur, ut sola membrana nuda supersit (a). Est etiam ubi totus vomer perforatus est, ut naris dextra in sinistram aperiatur (a\*).

Latus posterius ad pedis caprilli figuram (a\*\*) fissum est, atque a sede sinus sphenoidæi antrorsum descendit. Is pes caprillus spinam ossis cuneiformis recipit (b).

Latus superius breve cum septi ethmoidei facie inferiori conferruminatur (c), & cum eo (d) septum narium perficit.

Latus

(s) Cum membranis COWPER tab. 17. f. 4. K. f. 5. A. B. etsi vocatur superius. Tab. nostr. 4.

(t) ALBIN. tab. 4. f. 1. 2. 3. PALFYN tab. 1. f. 1. t. 2. f. 1.

(u) BERTIN. p. 186. WINSLOW n. 430. ALBIN. t. 3. f. 3.

(x) BERTIN. p. 184.

(y) MONRO f. 3. Z.

(z) BERTIN. p. 184. NESBIT p. 94. ALBIN. off. fet. f. 41. Syllab. Russ. tab. 5. f. 2. 8. MONRO Edimb. Ess. T. V. P. I. p. 221. tab. 2. f. 2. d. e.

(a) In Syllab. Russ. f. 2. 8.

(a\*) Not. nostr. 13.

(a\*\*) BERTIN. p. 186. WINSLOW n. 428. ALBIN. t. 3. f. 3. SUB t. 10. f. 13. E. MONRO f. 2. & 3.

(b) Cum sphenoidæ osse constanter connexum pinxit EUSTACHIUS t. 46. f. XI. 13. 16.

(c) Ic. nostr.

(d) ALBIN. ibid.



Latus anterior, ex acie sua in cartilaginem (*e*) innascitur, quam de lamina ethmoidea media, deque interiori facie ossium narium diximus descendere.

Ita fit id septum partim cartilagineum, partim osseum, quod narium cavitatem bipertit (*f*).

Dudum dictum est id interseptum sæpe nares oblique bipertire (*g*). Vidi dextrum narium meatum angustiores fuisse, cum eo versus septum convexum esset; vidi sinistram. Ejusmodi hominibus minus libera in altera nare aeris via est, & frequentior catarrhus (*h*). Sinistrorsum fere inclinari GUNZIUS (*i*), verum aliter utique vidi.

#### §. X. Sinus pituitarii. Frontales.

Ossis frontis inferior finis, qui naso & ossi ethmoidi conmittitur, totus cellulis excavatur, quæ sunt quædam quasi narium appendix. Earum aliquæ cum ethmoideis sinibus subjectis in unum coeunt (*k*), aliæ ossi frontis propriæ esse creduntur, & tamen etiam cum ethmoideis conjunguntur, tenentque magnam partem ejus latitudinis, quæ est super nasum, partemque super orbitam, ut omnino in cadaveribus maxima varietas sit, & alias tota orbitæ latitudo (*l*) cellulis effodiatur, alias dimidia (*m*), alias totum id os solidum sit (*n*), quale est in fetu (*o*), & quale in cranio adulto coram video. Neque intersepta hujus cavi aliquam legem sequuntur, eorumque & sedes, & numerus in diversis corporibus alius est, aliusque, & sinus alias simplex est alias septo longitudini sinus parallelo, plerumque imperfecto (*p*), in partem anteriorem &

(*e*) WINSLOW n. 429. *lc. nostr.* Sibi inventam tribuit CASSERIUS c. 10. In senibus offescit RUYSCH *Epist.* VIII. p. 9.

(*f*) *lc. nostr.*

(*g*) DUVERNEY *posth.* p. 214. BERTIN. p. 114. 187. MONRO. QUELMALZ *de septi narium curvat.* qui causas varias adducit. De vomere SCHNEIDER *catarrh.* L. VI. p. 373.

(*h*) GUNZ *Mem. des savans étrangers* T. I. *ibid.* p. 290.

(*i*) *Id. ibid.* p. 288.

(*k*) p. 133.

(*l*) AURIVILLIUS p. 15. RUYSCH in puella gigantea.

(*m*) ALBIN. t. 3. f. 1. 2. Etiam minor TARIN. t. 6. major REININGER n. 5.

(*n*) MONRO p. 83. BIERLING *advers.* p. 55. WINSLOW n. 203. PALFYN *ex edit. Boudou* p. 109. KERKRING *obs.* 63. HIGHMORE p. 203. SUE t. 9. BUDÆUS n. 9. Rarum esse ALBINUS *Adnot.* L. I. c. 11.

(*o*) FALLOPIUS. INGRASSIAS. BERTIN. p. 11. MONRO p. 84.

(*p*) LIEUTAUD p. 25.



& posteriorem, orbitæ inpositam, dividitur; alias plura sunt intersepta ( $p^*$ ). Ita modo duo sinus sunt, dexter, & sinister, plerumque tamen præter medium inique divisi ( $q$ ): alias tres ( $r$ ), quatuor ( $s$ ), plures ( $t$ ): demum etiam unicus sinus, septo imperfecto ( $u$ ) distinctus.

Ostium denique horum sinuum, unum utrinque, plerumque aperitur in cellulam ethmoideam ( $x$ ) maxime anteriorem, cumque ea in angulo patet, qui inter os unguis ( $y$ ), atque os spongiosum medium intercipitur, in recessum adeo obliquum, qui ducit in medium narium meatum. Oblique retrorsum descendit. Est ubi is excretorius ductus bifidus est, aut duplex, cum in duas cellulas ethmoideas aperiatur ( $z$ ). Est ubi unicum ostium est, & alter sinus cæcus ( $a$ ).

Anterior lamina ossis, quæ sinum claudit, diploen habet ( $a^*$ ), posterior, & tenuior, vix ullam. Ex dilatatis cellulis omnino hi sinus nascuntur ( $b$ ), & reliquæ narium, & mammillarium processuum cellulæ ( $b^*$ ).

In plerisque quadrupedibus ( $c$ ), aut omnibus, ejusmodi sinus reperiuntur, dudum noti, certe ante *Jacobum BERENGARIUM* ( $d$ ) *Carpensem*, deinde eo seculo omnibus fere incisoribus ( $e$ ). Non tamen desunt alii laude dignissimi viri, quibus ignoti fuisse videntur ( $f$ ).

S 2

§. XI.

( $p^*$ ) DUVERNEY *posth.* p. 220.

( $q$ ) MONRO p. 83. WINSLOW n. 202. AURIVILL. p. 16. REININGER n. 7. SCHNEIDER *demonstr. osteol.* p. 57. Sinister sinus non raro major est MORGAGN. p. 38.

( $r$ ) Adde AURIVILL. l. c. BUDÆUS.

( $s$ ) MORGAGN. *Adv.* l. p. 38.

( $t$ ) MONRO p. 84. CHESELDENC. l. SUR p. 54. BUDÆUS p. 7. n. 8.

( $u$ ) BUDÆUS n. 8. BERTIN. p. 11. WINSLOW n. 202. Le CLERC p. 35. Unum numerat MARCHETT. p. 103. SCHNEIDER *cribr.* p. 126. HIGHMORE t. 15. f. 1. t. 16. f. 3.

( $x$ ) BERTIN. p. 12. BUDÆUS n. 12.

( $y$ ) PALUYN. T. I. f. 1. MONRO p. 84. adde BUDÆUM n. 11.

( $z$ ) BERTIN. p. 12. BUDÆUS n. 11.

( $a$ ) Le CLERC.

( $a^*$ ) GAGEIARDI L. I. tr. 5. c. 4. c. 2. *obs.* 1. MORGAGN. *Adv.* VI. p. 116. BUDÆUS p. 6 n. 8. Inter laminas nempe laminæ vitreæ. Etiam in lamina anteriori vidit, cum diploe posterior esset, CORVINUS *org. olf.* p. 21.

( $b$ ) JANKER *de cavitat. cran.*

( $b^*$ ) Credas eas cellulas nasci ex actione corrugatoris superciliorum & proceri, aliorumque, qui laminam externam ab interna distrahant.

( $c$ ) Lynxi magni PARIS. Catopardo PARISINI. Civettæ sex sinus IIDEM. In Coaimondi IID. Vitulo WILLIS *anat. cerebr.* f. 6. COLLINS p. 961. Ovi PALUYN. SYLV. *Isag.* p. 73. Equo IIBIDEM. La FOSSE *de la morte.*

( $d$ ) p. CCCCX CCCXIV.

( $e$ ) Cl. STEPHANO p. 250. VESALIO p. 51. 63. L. I. c. 6. f. 6. 7. c. 12. f. 4. FALLOPIO *de offib.* INGRASSIÆ & C.

( $f$ ) La MORTE *obs.* 145.



## §. XI. Sinus sphenoides.

Perinde ut os frontis, ita os multiforme in fetu solidum, adulto in homine (g) ingente cellula excavatur. Ponitur ea in toto medio ossis quasi corpore (b), quod cum sella turcica comparatur, tum sub media eminentiore sede, tum intra latera, quæ inde ad alas descendunt, denique sub processu, qui est inter clinoides anteriores, & sub foraminibus (i) ophthalmicis (k), & sub spina, quæ ab osse multiformi ad os ethmoides producitur, supra medium umbonem, qui est ante finem sphenoidem & pone sellam; demum in processu cuneiformi, ad os occipitis protenso (l). Recessus, qui in ala minori hujus ossis effoditur, & mihi in majorem sinum aperiri videtur, solitarius cæcusque fuisse videtur in corpore, quod Cl. BERTINUS descripsit (l\*).

Sinus iste vel solitarius est (m), vel septo divisus (n), quod frequentius, plerumque inæquali (o), ut dexter sit, & sinister. Eorum quilibet præterea sæpissime imperfectis septis in alveolos varie deprimitur (p).

Cæcus undique, antèr unice patet, lato & difformi ostio (q), in nudo quidem osse, cujus autem partem magnam superiorem adplicatum claudit corniculum (r) illud sphenoidem ossis cribriformis, partem aliquam

(g) BERTIN. p. 101. &c.

(b) JANKE p. IX. ALBIN. T. 3. f. 3. tab. 4. f. 1. 2. In eo solo TARIN. tab. 7. f. 2. 3. VINK T. IV. f. 1.

(i) Ic. nostr. 3. 4. BAGET p. 74. PALFYN. t. 1. f. 1. P. WINSLOW n. 216. Etiam unice ante sellam poni vidit MORGAGNUS Adv. I. p. 38. Adv. VI. p. 110. & BUDÆUS n. 19. Antèr primum ii sinus in infante conspicui sunt JANKE p. IX.

(k) AURIVILL. p. 18. 19. BUDÆUS n. 18. ALBIN.

(l) Ic. nostr. prima, & quarta. ALBIN. de ossibus n. 39. AURIVILL. p. 18.

(l\*) II. p. 163.

(m) BUDÆUS n. 18. WINSLOW n. 236. CHESLEDEN. MORGAGN. l. c. REININGER. VIEUSSENS p. 9. Unus nonnunquam duo VIEUSS. p. 9.

(n) Ic. nostr. 3. PALFYN. t. 2. f. 3. BERTIN. p. 102. BUDÆUS. CHESLEDEN tab. 8. f. 31.

(o) MONRO p. 21. AURIVILLIUS p. 16. BERTIN. p. 102. BUDÆUS n. 18. WINSLOW n. 236. CHESLEDEN tab. 8. f. 7. SUB t. 8. f. 2. TARIN. t. 9. f. 1. Sinistram semper majorem esse ROLFINK.

(p) BAGET p. 74. Dexter quasi geminus SCHNEIDER de catarrh. p. 210.

(q) PALFYN. T. 2. f. 2. H. H. f. 3. M. M. SUE t. 8. f. 2.

(r) AURIVILL. p. 18. BOEHMER t. 4. f. 7. BERTIN. p. 102. ALBIN. t. 5. f. 2. 6. CHESLEDEN tab. 8. f. 8.



quam inferiorem etiam ossis palati (s) processus adscendens posterior, partem membrana perficit. Est ubi totum ostium est in corniculo (t).

Id ostium (u) utrinque unicum, rotundum, antrorsum & paulum deorsum patet, non penitus suprema in parte sinus, sub cellula ethmoideorum postrema, inque recessum meatus narium supremi aperitur, qui est inter eam cellulam ethmoideam, & inter corniculum inferius. Nullum etiam ostium fuisse testes exstant (z).

Etiam a cranii cavea, quæ cerebrum respicit, non rarissima foramina in eum sinum ducunt (a), quæ vasis patent. Est ubi omnino totus sinus deest (b), Pygmæo nullus (b\*).

Olim sinus in osse sphenoide noti fuerunt, etiam VESALIO (c), Jacobo SYLVIO (d), FALLOPIO (e), anatomicis ejus seculi omnibus, neque adeo boni RUYSCHII (f) sunt inventa, alienæ laudis non egentis.

## §. XII. Sinus maxillaris (g).

In ipso fetu primordia sinus maxillaris conspicua sunt (h), minora tamen (i), quo posterior tota illa convexitas ossis ejus nominis late excavatur,

S 3

(s) BERTIN. p. 102. 204. BUDÆUS n. 17. MONRO p. 123. AURIVILLE. p. 19. JANKE p. IX. WINSLOW n. 320.

(t) p. 134.

(u) *Id. nostr.* fig. 1. g. f. 3. k.

(z) BUDÆUS n. 22. INGRASSIAS p. 91. REININGER. SCHNEIDER & C.

(a) *Not. nostr.* II. J. BER. CARP. p. CCCCXXX. Jac. SYLV. *Vesal. calumn. depuls.* p. 11. A. LAURENT. *hist.* p. 77. BUDÆUS n. 22. CHARRIERE p. 117.

(b) *Id. nostr. not.* II. INGRASSIAS p. 93. SCHNEIDER l. c. VATER *Mus.* p. 9. WINSLOW n. 236. *Journ. de Medec.* 1757. Dec. BUDÆUS n. 20. sæpissime. ROLAN. *Enchirid.* p. 19. 20. *anthrop.* p. 470. CHESELDEN. MONRO n. 123. MORGAGN. l. c. Le CLERC. p. 74. *Materie spongiosa plenum dixit BORGARUCCI* p. 361. Bovibus & ovibus nullos ejusmodi sinus esse G. CUNÆUS n. 16. & brutis in universum VIEUSSSENS p. 9. In equis tamen habet BOURGELAT *hippiatr.* T. II. P. 2. p. 256. SCHNEIDER p. 211. & in bove IDEM.

(b\*) TYSON.

(c) L. IV. c. 1. & c.

(d) *Calumn. depuls.*

(e) *Obs. & de off.*

(f) Tribuit Cl. viro ERNDE. *It. angl.* p. 85.

(g) TARIN. *tab.* 6. COWPER. HIGHMOR & C. Nullum fuisse rarissimum est MORGAGN. *Adv.* I. p. 38. BUDÆUS n. 25.

(h) JANKE p. XIII. ALBIN. f. 29. NESBIT p. 90. Primus generatur ZIMMERMAN *physiol.* p. 314.

(i) JANKE *puer. septenn. off. max.* I. p. 40.



cavatur, ut sit omnium pituitariorum sinuum capacissimus (*k*). Orbitam habet incumbentem, subjectos dentes molares fere omnes, quorum alveoli in sinum, ad colliculorum (*l*) modum eminent. Res vetusta est (*m*), neque sinus in osse maxillari HIGHMORO debetur, etsi utiliter de ejus sinus morbo (*n*) monuit.

Posterior pars levis est, anterior imperfectis (*o*) septis in alveolos dividitur (*p*).

Ostia ad minimum duo in meis quidem calvis habet. Primum est difformis (*q*) hiatus, quo in medium narium meatum patet (*r*), idemque in rotundi foraminis speciem arctatur (*s*) a lamina descendente ossis spongiosi medii; a laminis duabus ossis spongiosi infimi; ab ossis palati anteriori processu (*t*); & ab osse unguis, quæ laminæ, cum aliqua membranæ (*u*) portione, maximam partem hujus ostii occupant (*x*). Idem caput coram est, ad quod iconem meam delineatam dedi (*y*). Ad anteriora laminæ ponitur id ostium, quæ ab osse turbinato infimo in os unguis adscendit (*z*).

Deinde *appendicem* (*a*) hujus sinus caveam dico, non penitus tamen ignoratam, oblongam (*b*), subjectam parti interiori orbitæ. Ea cavea intus alveolata est, & cum sinu maxillari conjungitur (*c*) ad sedem fere mediam

(*k*) *Ic. nostr.* f. 2. 3. &c.

(*l*) MONRO. BUDÆUS n. 23. HIGHMOR. Etiam in sinum penetrant BERTIN. T. II. p. 168.

(*m*) Habet VESALIUS L. I. c. 4. f. 1. EUSTACHIUS t. 47 f. 6. 7. FALLOP. *de oss.* INGRASSIAS p. 97. CASSERIUS t. 5. f. 2. 3.

(*n*) *Tab.* 16. f. 1. 2. 3. p. 226. Recentes ejusmodi historiæ passim reperiuntur COLLINS p. 212. PLATER *progr.* 1734 ZELLER. *de morb. ex strict. gland. Eff. of a Societ. at Edimb* V p. 403. seqq.

(*o*) *F. nostr.* 2. Totum sinum divisum fuisse HIGHMOR t. 15. f. 2. t. 16. f. 2. BUDÆUS n. 23. PALFYN. *anat. chir.* p. 91. Multas cellulas vidit le CLERC p. 96. DUVERNEY p. 220.

(*p*) BERTIN. T. II. p. 170.

(*q*) IDEM ibid MONRO p. 138. ALBIN. t. 4. f. 1. 2. 8. COWPER apud DRAKE t. 18. f. 1. 2. SUE T. 10. f. 4.

(*r*) WINSLOW n. 280. *Ic. nostr.*

(*s*) Conf. BERTIN. p. 169. 170 JANKE p. XII. BUDÆUS n. 23.

(*t*) DUVERNEY p. 218. MONRO p. 138. JANKE p. XIII EUSTACHIUS T. 47. f. 6. 7.

(*u*) MONRO BUDÆUS n. 26.

(*x*) Duo foramina habent MONRO. COWPER apud DRAKE t. 17. f. 6 CORVINUS. Plura WINSLOW n. 281.

(*y*) *F.* prope *θ* Calamo non major BERTIN. p. 170. etiam corvino MONRO.

(*z*) Hæc ad not. m. AURIVILLII p. 21.

(*a*) *Ic. nostr.* II. k k not. g.

(*b*) Conf. cum his nostris Cl. AURIVILLII p. 21. *Demicellules* BERTIN. T. II. p. 170.

(*c*) f. 2. V.



mediam ossis spongiosi infimi, paulum pone ostium ductus lacrumalis.

Parietes hujus cavæ efficiunt os unguis, & os planum, & ossis maxillaris paries orbitarius, & lamina paulum cellulata, quam os papiraceum ex aliqua cellularum anteriorum in os spongiosum infimum demittit. Cum cellulis ethmoideis anterioribus, & earum ope, cum ossis frontis sinu evidentissime conjungitur, ut hi ipsi sinus in maxillarem se deplere possint. Hic tortuosus sinus maxillaris exitus dictus est BUDÆO (*d*), & AURIVILLIO (*e*). Hujus ostium est, quod TARINUS (*f*) pingit. Hic aditus est, quem sinus maxillaris cellulis ethmoideis præbet (*g*). Hic canalis, quo sinus ethmoideus anterior (*h*) cum maxillari communicat VIEUSSENII. Et olim CASSERIUS (*i*) ejus rei mentionem fecit. Huc refero, quæ Cl. vir de sacci nasalis, utique proximi, aperto in sinum Highmori ostio scripsit (*k*).

Denique paries inferior, orbitæ a foramine orbitario anteriori ad finem usque laminæ orbitariæ ossis maxillaris, cellulis totus excavatur. Eæ numerosæ sunt (*l*), parum altæ, antrosum tamen majores (*m*), quas nemini, quantum novi, ante cognitæ, *orbitarias* dixi. Eæ exterius cæcæ, antrosum in cellulam aliquam ethmoideam aperiuntur, earum, quæ inter postremas & anteriores mediæ sunt (*n*).

In animalibus sinus maxillaris ingens est, & septis divisus numerosis (*o*).

### §. XIII. *Membrana pituitaria.*

Suum cuique horum ossium, quæ hætenus descripsimus, periosteum (*q*) est, inque cartilaginibus perichondrion. Sed præter id (*q*<sup>\*</sup>) invo-

(*d*) n. 26.

(*e*) p. 21.

(*f*) Tab. 6. b.

(*g*) WINSLOW n. 281. CORVIN. n. 11.

(*h*) p. 102. 103.

(*i*) p. 117. 118.

(*k*) VATER *Miscell. Berol. contin.* III. p. 331. 332. *Mus. propr.* p. 12.

(*l*) *Comm. Boerhaav.* t. 4. p. 43. n. 5. *Not. 10. ad iconem 2. Fascic. II. Ic. narium* O.O.O.

(*m*) F. 3. L. L. L.

(*n*) Habet Cl. JANKE p. XIII. XIV. Cellules sur le bord du sinus maxillaire BERTIN. p. 119.

(*o*) GIBSON *dis. of the hors.* p. 35. La Fosse de la morve cum ic.

(*q*) SBARAGL. *ocul. & ment. vigil.* p. XXXVI. RUYSCH *Epist.* VIII. f. 8. in vasculis.

(*q*<sup>\*</sup>) Distinctum a membrana pituitaria periosteum adest COWPER t. 18. f. 3. A. B. RUYSCH. *respons. Epist.* VIII. f. 8. Etiam in sinibus RUPPERT p. 23. Negat ibi de periosteo separari posse GUNZ p. 180. & fere AURIVILLIUS. Negat omnino pituitariam membranam sinus subire CORVINUS n. 28.



involucrum cutis a facie utrinque nares (r) subit, suamque naturam sensim mutat, ut emollita, pulposa, tamen tenacitatem suam conservet, eo vero tenuior fiat, & vulgari membranæ propior, uti longius ab origine in sinuum (t) recessus se abscondit, ut tamen & eo loco crassula sit, & rubeat: in medio vero septo (u), & ossibus turbinatis (x) crassior est. Suam habet sibi superjectam epidermidem, suam cellulofam (y) telam, qua cum periosteo cohæret. Manifesto, etiam absque injecto liquore, vasis abundat.

Per macerationem intumescit (z) aqua recepta, & pulcherrimo cocco nitet, quando gluten piscium tinctum per arterias impellitur, & in cellulosa spatula cuti subjecta effunditur. Per numerosas (a) arterias facile repletur, ut summa ejus rubedo sit.

Conradus Victor SCHNEIDER (b), refutato vetusto errore, meruit, ut nomen suum & membranæ inponeret, etsi neque veteribus ignota fuit, crassior, in naribus & faucibus, in linguam, laryngem, asperam arteriam, & gulam protensa (c).

#### §. XIV. Glandulæ ejus membranæ.

In vivo animale, & in cadavere, hæc membrana perpetuo uda (d) reperitur, & etiam a morte acu compuncta guttulam stillat (e), quales plusculæ in unam guttam confluunt (f). Mucus est gelatinæ similis (g), alias descriptus (h).

Unde.

(r) WINSLOW n. 334. seqq.

(t) RUPPERT p. 24. GUNZ de humor. p. 180. AURIVILL. p. 29. WINSLOW n. 336.

(u) RUPPERT. AURIVILLIUS p. 28. MORGAGN. Adv. VI. p. 114. WINSLOW n. 336.

(x) RUPPERT. WINSLOW.

(y) IDEM l. c. WINSLOW T. IV. n. 336.

(z) VIEUSSENS p. 98.

(a) SBARAGLI. In septo narium RUYSCH Ep. VIII. t. 9. f. 6. Thes. III. t. 4. f. 5.

(b) De catarrh. L. III. S. II. c. 2. 3.

(c) ORIBAS. p. 268 &c.

(d) SCHNEIDER L. III. Sect. 2. p. 504.

(e) IDEM ibid. add. p. 515. in piscibus

(f) IDEM p. 513.

(g) SLEVOGT de gurgul. n. 17.

(h) L. VII. p. 361. 362.



Unde hic mador sit, quæri potest, neque enim omnino adeo manifestæ (*i*) sunt in corporis humani naribus glandulæ, ut passim quidem in iconibus (*k*) pinguntur.

Primum facile ostenditur, arterias membranæ pituitariæ undique exhalare (*k*\*). Ex arteriis solis mucum deducebat SCHNEIDERUS (*k*\*\*), glandulas STENONIUS addidit. Porro pori in naribus passim agminati adparent in septo (*l*) narium, secundum basin, prope finem anteriorem, tum in parte interiori meatus medii (*m*), & infimi, in ossis spongiosi (*n*) medii parte anteriori.

Deinde etsi nunquam adeo magnæ sunt glandulæ, neque semper etiam exiguæ demonstrari possunt, adparent tamen nonnunquam (*o*), suntque de cryptarum genere, pulposi, crassuli, rotundi vel ovales folliculi, qui poro, qualem diximus, in nares patent. Vidi ejusmodi folliculos ad septi utrinque latera (*p*), ossa turbinata media & inferiora (*q*), narium meatum infimum, maxime in parte faucibus propiori (*r*). Anteriores, & cuti viciniore glandulæ sebaceæ sunt, & pilos emittunt (*s*). In sinibus folliculi nunquam (*t*) mihi visi sunt; si adsunt, perexiguos esse, & per morbos demum conspicuos reddi oportet (*u*).

Denique

(*i*) Conf. SANTORINUM p. 91. MORGAGN. *Adv.* VI. p. 114. Sæpe sola puncta adparente PALFYN ex edit BOVD. p. 405. Negat omnino glandulas membranæ pituitariæ LIEUTAUD p. 160. SENAC *Ess. de phys.* ed. nov. p. 729.

(*k*) Le CAT p. 400. f. 5. BONHOMME *cephal. obs.* 16.

(*k*\*) KAAUW n. 112.

(*k*\*\*) ROLFINK *diff.* p. 1256. 1257.

(*l*) SANTORIN. p. 90. MORGAGN. *Adv.* VI. p. 114. VIEUSSENS p. 100. 101. RUYSCH *Ep.* VIII. t. 9. f. 7. Sunt folliculi GUNZ *de hum.* p. 180.

(*m*) Infimi SANTORIN. GUNZ p. 180.

(*n*) Ad ossa turbinata SANTORINUS.

(*o*) Habet N. STENONIUS *gland. oris.* p. 105. COLLINS p. 368. WINSLOW n. 337. BOERHAAVE *de fabric. gland.* KAAUW n. 239. KEIL *abridgm.* p. 202. Addit N. STENONIUS, inventor, antè parvas esse, retrorsum majores fieri.

(*p*) SANTORIN. c. 5. n. 10. p. 90. unice. RUPPERT p. 24. Stratum ibi glandulosum habet MORGAGN. p. 115. & DUVERNEY t. 14. f. 1.

(*q*) RUPPERT. Corpuscula, quæ glandulæ audiunt RUYSCH. *Thes.* I. aff. I. n. 4. Vascularia agmina, quæ glandulæ *Thes.* VI. n. 3. loco hic non expresso.

(*r*) MORGAGN. l. c.

(*s*) GUNZ l. c.

(*t*) RUYSCH *Epist.* ad BOERHAAV. SANTORIN. p. 91. AURIVILL. p. 29. Minus intra sinus RUPPERT.

(*u*) Turgidas, & lentis mole, se vidisse VATER *polyp. nas.* p. 15. Habet eo loco cryptas KAAUW *perspirat.* n. 239.



Denique in anteriori parte septi vidi, & prior RUYSCHIUS ( $x$ ), finum grandem, multis folliculis communem, transversum, antrorsum apertum, quem & alii auctores viderunt ( $y$ ), aliosve similes sinus. Plures in vomere vidi ( $z$ ).

Aliqua iis similitudo est cum vasis mucosis narium, quæ in ovibus STENONII ( $z^*$ ) industria reperit, unum utrinque, communem multis glandulis ductum, circa extrema narium, in finum intra cartilaginofam alarum protuberationem conspicuum apertum, cujus ostium divisis alis patet.

Alia sunt iterum numerosa, recta, per arterias ceram recipientia, & tamen pressa mucum tenuem datura vascula arterioso mucosa, quæ in ostium spongiosorum ovis ( $z^{**}$ ) & vaccæ ( $a$ ) superficie RUYSCHIUS invenit. Credas, sed numerosiores, sinus mucosos esse.

#### §. XV. Villi membrana pituitaria.

Membranam pituitariam, potissimum etiam postquam vasa colorata li-  
quore repleta fuerint, in aqua sæpe renovata maceratam, flocculentam ( $b$ ) fieri, eosque villos esse papillas ( $c$ ), & præcipuum olfactus organum ( $d$ ) apud Cl. viros lego: cum alii potius pro vasculis exhalantibus habeant ( $e$ ). Papillas in naribus molliores ex vasculis tamen & nervulis etiam coalescere, ex ALBINO repetunt discipuli ( $f$ ). Hæc ego omnia non potui distincte videre, neque ante me ILL. MORGAGNUS ( $g$ ). Valde vereor, ne membranam in flosculos dissolutam Cl. viri viderint, omnino ut omnes in corpore humano cellulosæ telæ per aquæ vim in villos & spongiam dissolvuntur. Sed ea de ALBINO non dicta volo.

#### §. XVI.

( $x$ ) *Thes.* II. *aff.* 6. n. 7. *Thes.* III. n. 61. t. 4. f. 5. WINSLOW n. 337. ductus longos vocat. Multas glandulas, uno poro aperiri DUVERNEYUS *posth.* p. 222.

( $y$ ) In dextro latere vidit GUNZIUS p. 180. & RUPPERT p. 25.

( $z$ ) An hi sinuli VIEUSSENI p. 98. Sed in posteriori parte narium ponit.

( $z^*$ ) STENONIUS *de gland. oris* p. 105. 106. BARTHOLIN. *Cent.* III. *Epist.* 58. Habet etiam J. M. HOFMANN ad van HORNE p. 216. & COLLINS p. 869. & sibi inventa tribuit Gualtherus NEEDHAM *de format. fetu.* c. 4.

( $z^{**}$ ) *Thes.* VII. n. 63. *Tab.* 3. f. 2. ad BOERHAAVIUM p. 66. 67.

( $a$ ) *Thes.* VIII. n. 20.

( $b$ ) SANTORIN. c. 11. 12. p. 91. seqq. WINSLOW n. 338.

( $c$ ) Le CAT p. 231.

( $d$ ) SANTORIN. p. 92.

( $e$ ) RUPPERT p. 25.

( $f$ ) SPEISEGGER *de olfactu* p. 14. Microscopio conspici *Physiolog.* Amstel. 1<sup>re</sup> edit. p. 448. Proposuerat olim DIEMERBROECK p. 420. Negaverat reperiri SBARAGLI *vigil.* p. 99.

( $g$ ) p. 114.



§. XVI. *Arteriæ narium.*

Cum multiformis narium hætenus descriptarum figura sit, plurimis etiam diversis locis natura vasa ipsa submisit, quæ nondum omnia me credo enarrare posse, pluscula tamen expedii.

Princeps quidem truncus (*b*) est propago arteriæ maxillaris internæ, quæ duobus fere ramis, etiam tribus, sed sibi vicinis, inter laminam ossis palati nasalem anteriorem & posteriorem (*i*) adit partim supremum meatum, partim ad angulum venit, quo os spongiosum medium posterius terminatur. Distributionem aliam & aliam reperi (*k*). Trunci fuerunt duo superior, & inferior.

Ille *superior* alio ramo sinum sphenoidæum subit: alio ad cellulas ethmoidæas posteriores & partem septi narium posteriorem: alio in os spongiosum medium (*k*<sup>\*</sup>): alio per sulcum ejus ossis vasculosum in narium anteriora tendit, osque, quod dixi, & cum ethmoidæis arteriis anastomosis habet: alii, qui trunci nomen merentur, ad septi (*l*) narium partem posteriorem pertinentem, ad os ethmoidæ, & ad vomerem veniunt, qui & cum ethmoidæa arteria, & cum sequente nasali varie conjunguntur.

*Inferior* ramus (*l*<sup>\*</sup>) descendit per crenam ossis palati laminæ adscendenti in scriptam: adit idem os spongiosum medium, alioque ramo etiam imum ejus nominis os, & per sulcos vasculosos utriusque ossis utrinque antrorsum venit, datque & in imum narium meatum furculos, & in medium, exque eo trunculo rami etiam in sinum Highmori tendunt, inque saccum nasalem infimum, cujus membrana pulchre (*m*) vasculosa est.

T 2

Proxima

(*b*) Fasc. II. tab. art. max. not. a. a. tab. icon. p. GUNZ. de art. maxill. p. 36. AUBIVILLIUS p. 30.

(*i*) Trunc sphenopalatin BERTIN. T. II. p. 205. 423. Habet MONRO p. 122. Pinxit Cl. MEKEL nerv. Quint. par. p. 56. DUVERNEY postb. T. 14. f. 2. & 6.

(*k*) Fasc. VIII. p. 18. quo loco & aliam historiam dedi.

(*k*<sup>\*</sup>) DUVERNEY f. 6.

(*l*) RUPPERT T. I. f. 2. X. H. VINK T. 4. f. 1. C. RUYSCH Ep. VIII. t. 9. f. 6. duo trunculi posteriores. Sic DUVERNEY t. 14. f. 2.

(*l*<sup>\*</sup>) DUVERNEY f. 6.

(*m*) In sinibus maxillaribus pauca, in frontali & sphenoidæo vix ulla MONRO p. 139.



Proximæ dignitate sunt arteriæ *Ethmoideæ*, ab ophthalmica natæ. Anterior earum prodit de trunco ophthalmico, dum ad interiorē orbitæ parietem se adplicat (*n*). Canalem invenit, qui super cellulam *Ethmoideam* anteriorem, tanquam pontem incedit. Inde dividitur, & alio ramo in dura membrana manet, olim dicto (*o*): alio per foramina cribrosi ossis (*p*) furculos in septum narium dimittit, cum priori trunco varie inosculatos: & alios in cellulam *ethmoideam* anteriorem, & mediam, perque eam & in frontalem sinum, & in orbitarios, & in partem vicinam sinus maxillaris, & alios iterum in os spongiosum medium furculos dat (*p*<sup>\*</sup>).

*Posterior ethmoidea arteria* (*q*) fere minor, neque penitus perpetua, simili omnino foramine super cellulam *ethmoideam* posteriorem incedit, inque priorem & in proximum sinum sphenoidium dividitur (*r*).

Etiā ab ophthalmico trunco, ejusque ramo frontali profundo, sunt arteriolæ sinus frontalis, quæ ex orbita per aliquem exiguum canalem osseum, aut per plusculos, ad posteriora incisionis pro eo trunco ophthalmico & nervo ad frontem admittendo factæ, os frontis penetrant, eademque in cellulam *ethmoideam* anteriorem descendunt. Tum alia arteriola, ab ophthalmicæ ramo nasali nata, quæ in osse nasi foramen invenit, perque sulcum ejus ossis internum descendit, ad anteriora canalis nasalis, inque anteriori parte meatus medi, inosculatur cum arterioli præcipui trunci narium ex osse spongioso imo adscendentibus (*r*<sup>\*</sup>). Aliæ ab eodem trunculo cum sacco nasali ipso ad nares veniunt imas & anteriores. Alias arteriolas omitto, quæ a labialibus & ophthalmicis per exteriora narium in septum inumque meatum redeunt (*s*).

A carotide demum interna una utrinque exigua in cranio prodit arteriola, quæ, ex sulco pro trunco carotico exsculpto, in sinum sphenoidium penetrat (*t*).

Reli-

(*n*) Dicta FALLOPIO *obs.* p. 142. MONRO p. 80. PALFYN p. 81. GAUTIER t. 2. f. 2. AURIVILLIUS p. 30. BERTIN. p. 411. Vide *Fascic.* VII. p. 50. n. 7. *tab.* 6. f. 2. m. f. 3. Σ.

(*o*) L. X. p. 123

(*p*) DUVERNEY t. 14. f. 2. RUPPERT. T. I. f. 2. X. RUYSCH l. c. qui duos ramos habet, VINK t. 4. f. 1. ad D. DROUIN t. 3. f. 2. h. h.

(*p*<sup>\*</sup>) Add. DUVERNEY f. 6.

(*q*) *Fascic.* VII. p. 41. n. 2. Habet etiam WINSLOW. (Sed ab infraorbitali non bene) IV. n. 297. rectius MONRO p. 80. BERTIN. p. 411. AURIVILLIUS p. 30. Olim dixeram *Nasalem posteriorem Fascic.* III. *Descr. art. facia.* p. 16.

(*r*) Negat nares adire BERTINUS, sed coram video. An non f. 2. DUVERNEYI.

(*r*<sup>\*</sup>) DUVERNEY f. 6. & p. 207 foramen habet.

(*s*) Grindes duas facit RUPPERT l. c. ad I. Aliquas habet AURIVILLIUS p. 31.

(*t*) Habet arteriolam BERTINUS T. II. p. 363.



Reliquæ, mihi quidem notæ narium arteriæ sunt a diversis ramis arteriæ maxillaris internæ.

Primum ramus infraorbitalis, dum per canalem ossis maxillæ superioris incedit, ab ipso canalis ostio dat duos pluresve (*u*) ramos, propria per foramina in sinum maxillarem ituros. Eorum aliquis ad dentes anteriores usque descendit, inque sulco sub sinu Highmori cum dentali posteriori habet anastomosin (*x*). Ex eodem trunco etiam in cellulas ethmoideas medias alii rami per propria foramina ossis plani inque nares (*y*) veniunt. Alii furculi (*z*) ex facie ipsa in nares anteriores redeunt.

Alii rami ex dentali superiori posteriori, quæ & ipsa propago est arteriæ alveolaris, in sinum eundem maxillarem tendunt (*a*), exque ramo potissimum anteriori, qui super dentes per proprium ossis maxillæ ductum decurrit (*b*), rami oriuntur, in eum sinum euntes: & ipse demum is trunculus ad originem processus adscendentis ossis maxillæ per proprium foramen in narium imum meatum exit.

Ab arteria palatina & dum descendit per ossis palati canalem, furculi in HIGHMORI (*c*) sinum eunt, & ejus arteriæ trunculi anteriores in narium postrema subeunt (*d*).

Ex eadem arteria ortus ramus palatinus, antrorsum (*e*) per osseum palatum decurrens, cum sodali suo ad futuræ incisivæ sedem arcum facit (*f*), ex quo furculus per foramen incisivum primo simplex, inde duplex, inque duas nares fissile, in meatum narium infimum venit (*g*).

Etiam alibi inter narium caveam infimam, & inter palatum osseum multa est foraminum copia, per quæ a palato in nares vascula adscendunt.

His narium arteriis proprium est, ut facillime inter omnes corporis humani arteriolas aperiantur, & sanguinem dimittant, & paulo post absque

T 3

vitii

(*u*) Fascic. III. art. lab. p. 15. Fasc. II. tab. art. max. not. u. WINSLOW. III. n. 61. GUNZ p. 32. JANKE II. p. 34. Habet foramina f. 6. c. f. p. 33. 34.

(*x*) MEKEL n. 41. BERTIN. T. II. p. 413. 414. AURIVILLIUS p. 32.

(*y*) Fascic. III. l. c. Fasc. VIII. p. 17. not.

(*z*) Fascic. VIII. l. c.

(*a*) Tab. art. maxill. not t. AURIVILLIUS p. 32.

(*b*) Fascic. VIII. p. 18. in nares BERTIN. T. II. p. 419.

(*c*) MEKEL n. 45. JANKE II. p. 33. 34. AURIVILLIUS p. 32. Tab. art. maxill. l. c.

(*d*) AURIVILLIUS p. 31. An hi canales pterygo palatini BERTINI T. II. p. 425.

(*e*) Fascic. II. art. max. int. not. 7.

(*f*) Fasc. VIII. p. 18.

(*g*) AURIVILLIUS ibid.



vitii vestigio conserveant. Quoniam ex trunco arterioso veniat is sanguis, quem nares amittunt, non certus dixerim, ex supremis & plerumque anterioribus descendere probabile fit, adeoque ex arteriæ ophthalmicæ ramis, & potissimum ex ethmoidea anteriori. Quare, cum ea carotidis internæ sit propago, sanguinem per ejusmodi effluvium a cerebro potenter revelli adparet, neque obscurum est, cur adeo manifestum in summis morbis capitis interni a fortiori narium hæmorrhagia levamen percipiatur, quale ipse in gravissimo erysipelaceo capitis morbo, amissis pene quatuor intra biduum per nares libris, percepi, & gratus recordor. Non aliæ vero in corpore humano arteriæ pari facilitate sanguinem exhalant; nam etiam in utero aliquot septimanarum labor est, arterias ad dimittendum menstruum sanguinem præparare.

Uti vero facile, ita multum sanguinem hæ arteriæ amittunt, ut alias ostendimus (*b*). Venetus tonsor (*i*), cum pilos de naribus reseca- ret, tantam imperita manu hæmorrhagiam excitavit, ut miser perierit. Enormes sæpe sanguinis jacturas, in morbis miliaribus, & variolis salu- bres, in senio vero facile ad hydropem ducentes, sæpe vidi.

#### §. XVII. *Venæ narium.*

Earum historia pene destituimur. Trunci fere similes sunt, ut arteria- rum. Ab ophthalmica vena ethmoideos ramos vidi, aut proximos arteriis, aut communi ostio nares subeuntes. Magnæ arteriæ nasalis socia vena venit a trunco temporali, alioque, qui a jugularis venæ profundo ramo nascitur, vasa pharyngis, faucium, palati, linguæ postremæ edente, & cum di- verticulo S A N T O R I N I late communicante (*i*\*).

Alias narium venas, sed non satis definitas, sinum falciformem adire apud nonnullos Cl. viros lego (*k*).

Ex sinu sphenoideo in sinus duræ membranæ venæ veniunt (*k*\*).

#### §. XVIII.

(*b*) L. II. p. 224. Lib. V. p. 4.

(*i*) COLLADO *Advers.* II. 36.

(*i*\*) Puto venas posteriores narium arteriarum sodales, & anteriores ethmoideas, & alias, forte ab infraorbitalibus pingi apud DUVERNEYUM t. 14. f. 3. 5. incisivam vero f. 3.

(*k*) PETIT ad PALFYN *anat. Chirurg.* p. 50.

(*k*\*) VIRUSSENS p. 9.



§. XVIII. *Nervi narium. Nervi primi finis.*

Diximus in lamina cribrosa plurima esse foramina (*l*). Ea in animale integro & nuper mortuo plena reperiuntur infundibulis (*m*), a lamina exteriori duræ membranæ cerebri factis, ducentibus in septum narium, inque eo evanescentibus.

In ejusmodi nunc infundibulis, sed in recentibus potissimum cadaveribus, medulla (*n*) est nervi olfactorii, sua pia matre cincta, quæ adeo medulla in septum narium descendit vix mutata (*o*), & in eo ramosa finitur. Qui negarunt, medullam in iis tubulis reperiri (*p*), in rem difficilem in vetustiori cadavere videntur inquisivisse.

Ejusmodi nunc nervus, ex cerebri anteriori prominentia eductus, in omnibus animalibus reperitur, multipartitus in quadrupedibus, simplex in avibus (*q*), & in piscibus (*r*) demum fibrosus, cujus rami ex trunco paralleli, numerosi per organum olfactus diduntur (*s*).

Prægrandis nervus est in piscibus (*t*), etiam testudine (*u*), magni etiam trunci in avibus (*x*), quibus in ossa spongiosa descendunt (*y*), in membranam pituitariam manifesto divisi, & terminati. Sed etiam quadrupedibus, quam homini, plerumque ii nervi majores sunt (*z*); ut in alce (*a*),  
ursulo

(*l*) p. 131.

(*m*) *Lib. X. p. 206.*

(*n*) SCHNEIDER *de off. cribrifor.* p. 202. 230. & in *præf. RUYSCH Thes. IV. n. 3. Thes. V. n. 20. WINSLOW III. n. 12. L. X. p. 206. not t. DROUIN t. 3. f. 2. B. B. Capite sub aquammerso & concusso, & in vitulo melius apparet Physiolog. Amst. ed. p. 449.*

(*o*) In avibus SCHNEIDER p. 186. Rubellas invenio. Faciem pene corticosam vocat WRETBRECHT COMM. ACAD. PETR. T. 14. p. 283.

(*p*) *Mem. de l'Acad. de Berlin T. IX. p. 133. MERY progr. de la Med. p. 25. CHESSELDEN on nerves. p. 13. In testudine in nares deduxerunt PARISINI.*

(*q*) COLLINS t. 57. f. 1. t. 58. t. 59. f. 2. WILLIS p. 73. SCHNEIDER p. 186. 195. BOHN p. 279.

(*r*) COLLINS t. 61. 62. 63.

(*s*) IDEM p. 871. Vide n. 3. *Seç. III.*

(*t*) In iis fere cerebrum consumitur PERRAULT *Eff. T. III. p. 164. Vid. in piscibus COLLINS T. 61. 62. 63. STENONIUS l. c.*

(*u*) PARISINI. Add. CALDESI. t. 2. f. 5. Habent viperæ apud CHARAS p. 18. 19.

(*x*) SCHNEIDER p. 195. ed. 12. In falcone MURALT *vadem.* p. 341.

(*y*) SCHNEIDER p. 186.

(*z*) In ove quadrupli CARR. p. CCCCLI.

(*a*) PARIS.



ursulo, coatimondi (*b*), hystrice (*c*), talpa (*c*<sup>\*</sup>); & in universum eo grandiores sunt, quo animal sagacius (*d*).

§. XIX. *Nervi ab ophthalmico, a pterygoideo, a palatino, ab infraorbitali.*

Omnibus, quantum video, animalibus alii præter primum par nervi nares adeunt. In avibus anteriorem cellularem fabricam rostri longe percurrit albus peculiaris a quinto pare nervus (*e*). Sed etiam in piscibus duo (*f*) paria nares adeunt. In quadrupedibus quintum par alios ab olfactoriis ramos in nares dat (*g*). In homine idem par Quintum numerosos ad nares ramos edit.

Primum ramus primi rami quinti paris ejusque furculi inferioris (*b*), aut sodalis arteriæ ab ophthalmica (*i*) natæ, aut vicinus, trans cellulam ethmoideam, ex orbita in cranii caveam redit, & postquam antrorsum migravit, foramen cribrosum aliquod ex anterioribus reperit, per idem descendit, in septi narium anteriora (*k*), etiam in os spongiosum superius (*l*), inque sinum frontalem (*m*). Idem cum primo pare ex ILL. viri testimonio, anastomosi inosculatur (*m*<sup>\*</sup>). Etiam animalia ejusmodi nervum habent (*n*).

Deinde nervus secundus Quinti paris multis locis ramos ad nares dat. Præcipui sunt, quos ramus pterygoideus (*o*), ex ipsa sua radice, quæ de trunco prodit palatino, emittit, arteriæ præcipuæ nasalis socios, tres (*p*), pluresve

(*b*) IDEM.

(*c*) IDEM.

(*c*<sup>\*</sup>) MURALT *vadem.* p. 542.

(*d*) COITER p. 123.

(*e*) COLLINS t. 57. 58. 59. CLAYTON *misc. curios.* T. III. p. 328. DENHAM *phys. theol.* p. 206. WILLIS p. 73. 74.

(*f*) COLLINS p. 1043. in *pisce whitings. de aselli genere. Oeconom. Abbandl.* T. IX. p. 116. in harengo.

(*g*) SCHNEIDER *os cribrif.* p. 42.

(*h*) *Fasc. I. tab. art. cran.* 28. FALLOP. p. 142. WINSLOW T. III. n. 45. STÄHEL. *spec. anat. bot.* 1721. n. 22. Duos numerat BERTIN. p. 370.

(*i*) p. 148. Rete in Tursione habet KLEIN *miss.* I. p. 27.

(*k*) MEKEL n. 54. p. 42.

(*l*) IDEM p. 43.

(*m*) IDEM *ibid.*

(*m*<sup>\*</sup>) WINSLOW n. 13. 41. Non reperit MEKEL p. 43.

(*n*) In bove SCHNEIDER p. 116.

(*o*) L. X. p. 213. MEKEL. WINSLOW n. 53. RAV. p. 191.

(*p*) MEKEL *nerv. quint. par.* ☉. ☉. ☉. *Mem. de Berlin.* 1749. p. 87. o. o.



pluresve (*q*) per foramen, aut plura foramina, quæ palatino ossi vel propria, vel cum sphenoideo communia sunt. Ii nervi narium meatum supremum adeunt. Inde cum in naribus ipsis persequeretur, reperi septi (*r*) narium partem posteriorem adire, alios in os spongiosum superius, & in cellulas ethmoideas posteriores (*s*) venire, omnino uti arteriæ sociæ rami. In homine & ipsi hi nervi molles sunt, & quos nunc dicere propero.

Eos pariter Pterygoideus truncus edit, posteriori tamen, & aliquantum interiori loco, ex ipso canali, per ductus (*t*) inter radicem processus pterygoidei & os palati exsculptos, tres fere, ab ILL. MEKELIO (*u*) primum descriptos. Ii ad septi narium partem posteriorem veniunt.

Ad tubam euntes ramos primus videram (*x*).

Porro infraorbitalis nervus, uti sodalis arteria (*y*), sinui HIGHMORI duos tribuit furculos (*z*), quorum qui major (*a*) est, super dentium radices (*b*) retrorsum migrat, & occurrit (*c*) dentali posteriori.

Denique inter *alveolaris* nervi ramos dentales superiores numerosos, aliquis (*d*) anterior & major per canalem, cum arterioso (*e*) communem, vel proximum, supra dentes antrorsum incedit, & sinui HIGHMORI furculos dat, cumque eo, quem proxime dixi, habet anastomosis.

Sed etiam ex trunco *palatino anteriori* furculi ad nares, adque os imprimis spongiosum inferius tendunt (*f*), & in meatum medium narium, inque ossis spongiosi superioris partem faucibus propiorem.

Accuratiorem nervorum intra ipsas nares historiam ab industria ILL. MEKELII sperasse liceat.

S E C T.

(*q*) MEKEL p. 51.

(*r*) IDEM ibid.

(*s*) IDEM ibidem.

(*t*) AURIVILL p. 34. 35. not. I.

(*u*) *Diff. ct.* i. i i p 51 52. L. X. p. 213.

(*x*) *Comm.* BOERHAAV. T. IV. p. 63.

(*y*) p. 49.

(*z*) WINSLOW n 48. FALLOP. p 143. b. L. X. p. 215.

(*a*) MEKEL l. c. c. Tab. art. max. int k.

(*b*) WINSLOW ibid. BERTIN. T. 12. f. 1.

(*c*) MEKEL ꝑc. L. X. p. 215.

(*d*) IDEM n 72. p. 65. 66. WINSLOW n. 52. AURIVILLE. p. 35.

(*e*) MEKEL ꝑ.

(*f*) IDEM p. 61. n. 69. f. 1. r. L. X. p. 213. Annon pterygopalatini BERTINI p. 415.



## S E C T I O I I.

## C O R P U S C U L A O D O R A.

## §. I.

**N**escio quomodo factum sit, ut in salium figuras, lucis radios, aeris tremores, subtilissimis experimentis sit inquisitum, ad corpuscula vero, quæ odorem excitant, cognoscenda adeo exigua hominum fuerit curiositas, ut omnino fere & ordinem & systema noviter condere necesse sit. Ex phænomenis adeo, quæ passim collegi, aliqua ad explicandum hunc sensum elementa conjungere visum est. Nimirum & veritas undique utilis est, amoreque nostro dignissima, & sensus olfactus ad vitæ gratiam, & ad securitatem, adque pericula etiam vitanda mortemque momento non penitus caret, pariterque cum gustu & ciborum selectum adjuvat, & medicamentorum vires nos edocet.

§. II. *Effluvia corporum odorata.*

Pleraque corpora, forte omnia, corpuscula minima continuo amittunt, quæ in aerem dilapsa circa id corpus, a quo generantur, circumfunduntur, densiora, quo viciniora superficiei, & sensim in atmosphæram laxata (a). Ejusmodi *effluvia* ex plerisque, etiam quæ sicca & solida (b) videntur, corporibus exeunt, neque notum est, an sit aliquod corpus, a quo non exeant; quæ enim solidissima videntur, tamen a tritu, a calore, ab excitato torrente electrico, ab effervescencia contrariorum salium, a dissolutione per acres liquores, a combinatione cum aliis corporibus, effluvia sua dimittere coguntur. Per experimenta de iis omnibus constitit, quæ dixi.

Metalla pleraque (c), lapides plerique, plantæ omnes, ligna (d), animalia omnia ejusmodi effluvia perpetuo emittunt. Infinita sunt corpora, quæ fricta noctu lucere, atque adeo lucidam atmosphæram exhalarere

(a) BOYLE *de atmospher. corp. consist.* in princip. p. 33.

(b) IDEM l. c.

(c) Ferrum BOYLE p. 18. &c.

(d) IDEM p. 13. 14.



re Cl. BECCARIUS ostendit (*e*), & potissimum durissimi lapides, ipsique adamantes per tenebras, absorbta luce nitent. Tenuissima ea effluvia sunt, & ex parvo corpore nata magnum in spatium atmosphæræ disperguntur, ut absque ponderis jactura corpora varia ea effluvia amittant (*f*).

Horum nunc effluviolorum plurima odorata sunt. Metalla certe conficta odorem peculiarem edunt, plumbum, stannum, ferrum (*g*), cuprum (*h*). Aurum odorem non adeo sponte ostendit, quam in quibusdam solutionibus, in quibus roris marini (*i*), & moschi (*k*) gratum odorem induit, uti & antimonium (*l*), bismuthum (*m*), & arsenicum (*n*) sponte in odora, igne accedente, certaue cum miscela odores spargunt aut gratos, & efficaces, aut vicissim fætidissimos.

Lapides etiam durissimi, & purissimi, electrica vi pollent (*o*), & frigidi odorem dant, vehementem certe in scintillis, quas cum crystallo conflagens crystallus producit. Sed & marmora trita olent (*p*), etiam vehementer, & ingrate.

Animalia omnia, vegetabilia omnia, aut conspicue odora sunt, aut certe materiem odoratam continent, quam ignis, aliaque media demonstrant. Ipsi canes hanc odoratam atmosphæram & eminus percipiunt, & distinguunt subtilissime, ut & genus animalis ab alio, & individuum separent (*q*).

Quare ex corporum odoratorum classe non plurima oportebit excludere; ea primo, quæ perfecte fixa, nullo tritu, nullo igne in alia exhalationi apta elementa discedunt. Ita terra quidem pura sibi relicta & inodora est, & absque vaporibus persistit. Nam terrarum multarum ingratum odorem, suavem in nonnullis (*r*), alteri materiei admistæ tribuas. Sales

U 2

medii

(*e*) De quamplur. phosphor.

(*f*) BOYLE p. 36.

(*g*) IDEM l. c. p. 20. 26.

(*h*) IDEM p. 22.

(*i*) HENKEL flora saturniz. p. 387.

(*k*) In præparatione auri fulminantis BOYLE de orig. mechan. form. & qualit. p. 140. 141.

(*l*) In liquore filicium solutorum cum adfuso spiritu urinæ diu digesto GLAUBER furn. T II. p. 133. Ex eo odor moschi HENSING. Schwalb. Sauerbr. p. 27.

(*m*) MEAD. de venen. p. 144.

(*n*) Vulgo allium spirat, prunis injectum; ad summam tamen fragrantiam a TACHENIO perfectum fuisse testis est Hermannus BOERHAAVE de morb. nerv. p. 437.

(*o*) Crystallus, Adamas, Rubinus BOYLE p. 22. 40. 41.

(*p*) BOYLE p. 20.

(*q*) L. XII. p. 56.

(*r*) BIRCH. T. IV. p. 400.



medii ipsi inodori sunt, etsi sal marinus ad solem excoctus, aut sal fontium salforum mea methodo a solis radiis præparatus, violam redolet; & idem sal marinus cohobatus ambram spirat (*s*). Hæc enim ab admistis alienis particulis derives.

Deinde inodora sunt, quæ exhalant quidem & effluvia habent, sed ita mitia, ut nervos olfactiles non adficient. Ejusmodi effluvia sunt aquæ puræ, tum ea, quæ per summam hiemem de glacie (*t*), & de congelatis corporibus adscendunt (*u*).

Plerique scriptores in phlogisto, sive inflammabili parte corporum, odoris sedem ponunt. Et certe, quæ ignem alunt, omnia volatilia sunt, inque aerem spargi idonea, omniaque aut sponte olent, aut cum igne. Calces etiam animalium, vegetabilium, metallorum, ex quibus phlogiston a vi ignis ejectum est, eadem inodoræ sunt. Nescio tamen, an tutum sit, omnem præter phlogistum olfactilis materiei sedem rejicere. Sales acidi odorem habent, tum minerales, tum qui ex vegetante classe petuntur, & validum quidem odorem, qui cum sapore acido intime conjungitur, & pene in naribus gustum excitat, neque quidquam habet simile ei odori, quem eorum corporum pars phlogista habet, de quorum acore dicimus; alienus enim ab alcoholis odore est aceti vapor. Deinde vitrum videtur ultima corporum terrestrium metamorphosis (*x*) esse, quam porro nulla vis ignis mutet, neque facile fuerit, post tantam ignis torturam in vitro ex sale fixo & quarzo nato, phlogiston porro ullum demonstrare. Et tamen vitra adfricta vehementer (*y*), neque suaviter olent, ut modo experior.

Qui corpora *per se electrica* sola odorata esse scripserunt, metallorum, sola ex communicatione electricorum, odorem de memoria sibi passi sunt elabi. Scintilla electrica non est phlogiston, sed ignis ipse, cum phlogisto sæpe, non ideo necessario conjunctus, aque phlogisto sua natura longe diversus. Phlogiston enim est, quodcumque ab igne candet & dissipatur (*z*).

## §. III.

(*s*) HENKEL *Lauchstätter Brunn.* p. 74.

(*t*) Glacies exhalat BOYLE p. 17.

(*u*) Spiritus congelatus inodorus est, regelatus ad odorem redit JUNKER *consp. Chem.* T. VI. p. 156.

(*x*) WALLER. *Chem.* T. I.

(*y*) BOYLE p. 29.

(*z*) DELIUS apud MULLER *Nebenstunden* p. 67.



§. III. *Ad naturam elementi olfactilis.*

Difficile est id solum purumque sistere, sæpissime enim cum oleo, aliquando cum sale acido, aut alcalino volatili, certe cum elemento electrico, aut demum cum aqua conjunctum est. Aqueum enim est, quod spiritui summe odorato est pro vehiculo, qui vim totam odorem olei cinnamomi constituit ( $z^*$ ): aqua, quæ odorem hominis & animalium auram excipit.

Id certe primum innotuit, esse elementum summe tenue, sive particulas, quæ in corpore odore in spatium pene infinite parvum conprimantur, eadem spatium amplissimum aeris occupent, quando sibi permittuntur. Plurima in hanc rem habemus experimenta. Camphoræ grana duo soluta, repleverunt conclave odore suo, ut nulla pars aeris non odore esset repleta. Inde collectum est, particulam tamen naribus nostris sensibilem non majorem esse, quam  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{263}$ ,  $\frac{1}{584}$ ,  $\frac{1}{666}$  grani ( $a$ ). *Ambra*, quæ *grisea* dicitur, longe gratissimum odorem spirat, & tamen toto triduo nihil de pondere suo amisit, exiguum vero quid etiam longo tempore asa fætida ( $b$ ). Unico grano ambari memini magnam vim chartarum ( $c$ ) fuisse odore imbutam, quem quadraginta nunc annorum intervallum nondum delevit. Repende nunc animo, quadringentas fuisse disputationes, nam erant ejusmodi, donum olim *Johannis SALZMANNI*, paginarum 40. quæ, si semipedales feceris, 8000. adeo pedes chartæ efficient, eas esse eo ambrae odore imbutas. Eum exhalasse, diebus nunc 14600. replevisse atmosphæram certe alicujus crassitie, v. c. pedis unius; earum atmosphærarum in tanta volatilitate, maximam partem quotidie difflatam fuisse; pone superstitem fuisse partem centesimam, invenietur calculis positus, pollicem adeo chartæ a parte unius grani  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{263}$ ,  $\frac{1}{584}$ ,  $\frac{1}{666}$  ambrae odorem concepisse.

Multo subtilius id olfactile est, quod canis sagit. Fidelis ille ( $d$ ) canis, qui ex arce *Altenklingen* Parisios petiit, herumque in turba detexit, perspirabile Sanctorii secutus est, quod repleverat viam longam leucas 100.

U 3

five

( $z^*$ ) BOERHAAVE *morb. nerv.* p. 238. Ex oleo cinnamomi paratur spiritus fugacissimus, & acerrimus, quo sublato reliquum oleum piceum est PECHLIN. *de purgant.* p. 102. 103. Alcoholis incensi vapor aqua est BOERHAAVE.

( $a$ ) GRAVEL. *de aeolipila* p. 27.

( $b$ ) BOYLE p. 90.

( $c$ ) Chirothecas ambra infectas habet BOYLE p. 107

( $d$ ) L. XII. p. 56.



five pedes 1, 500, 000. latam, si placet pedes 10, lineam adeo pedum 15. 000. 000. quadratorum, pollicumque 2. 160. 000. 000. quos fumes 144ies, cum odor canis naribus sensum impressurus atmosphæræ altitudinem ad duorum minimum hominum staturam repleat; fient pedes cubici odore pleni 311. 040. 000. 000. Nunc perspirabile nostrum aqua fere est, subtili parcoque spiritu, quem homo ab aqua non distinguat, modice mista. Exhalaverat homo in itinere tridui (e), quo Parisios venerat, libras aquæ forte 12. grana forte odora 12. Ea de via detrita, dilapsa fuerant mille modis. Pone duodecimo die superfuisse partem millesimam, erit grani unius  $\frac{2}{523}$ ,  $\frac{600}{600}$ ,  $\frac{600}{600}$  modicis positis calculis, quæ aream pollici cubico æqualem, in via Parisios ducente, adeo efficaciter, implebat, ut ex eo odore dominum canis agnosceret (f).

Non ergo mirum est, aut incredibile, aut vultures ex Asia ad stragis Pharsalicæ cadavera raptanda convenisse, aut ululas sæviente peste domibus iis insidere, ex quibus odor natæ jam in ægris putredinis animal cadaveribus se pascens invitat (g): aut oram Hispaniæ (h), veterisque Arabiæ (i), aut Sumatræ (k), aut Ceyloniæ (l), eminus & ad quadraginta milliaria (m) odore aromatico se prodere. Femina fuit, quæ ante tempestatem odorem in aëre sulfureum sagiebat (m\*).

Utcunque tenuis est ea materies, crassio rem tamen credas esse, quam lumen, calor, magnetis vis, & electrica materia; hæc enim elementa per vitrum penetrant, odor vitro retinetur (n). Forte tamen & ipsa odora materies, nisi a sua cum aqua & oleo vi adtractili religaretur, eum carcerem superaret. Sal volatilis urinæ & spiritus nitri cum oleo vitrioli factus per vitrum penetrant (o).

## §. IV.

(e) p. 68.

(f) Conf. BOYLE p. 98. 134. 135.

(g) SHAW *travels* p. 182.(h) Ex odore Roris marini BARTHOLIN. *de comet.* p. 91.

(i) Diodor. SICUL. L. III. n. 46.

(k) *Rélations des voyages faits pour l'établissement de la compag. des Indes* T. I. p. 261. WURFBAIN *Reise* p. 21.(l) MANDELSLOH *itin.* p. 327. Negat Anonymus *Rélat. d'un voyage fait aux Indes orient.* T. II. p. 124. Sed nuperi exstant testes *Malab. miss. Bericht.* T. XII. p. 981. De insula Roquepaz *Saml. der Reisen* L. III. c. 1. De Insula Annobon OVINGTON T. I. p. 52. §3. De alia insula DAMPIER *travels* T. III p. 232.

(m) De Hispania BARTHOLINUS. Ad tres leucas OVINGTON.

(m\*) WOODWARD *cases* p. 341.(n) *Exp. Cement.* T. II. p. 181. BERGER *nat. bum.* p. 376.(o) MUSSCHENBROECK *essays* p. 46.



§. I V. *Summarum est virium.*

Commune fere est elementis, quorum tenuissimæ partes sunt, vires habere eo intensiores, quo sunt subtiliores molculæ: ignis exemplo, & electrici elementi. Ita etiam id elementum, quod odorem facit, vires summas possidet, & omnino corporum eorum vires proprias solum sibi habet, in quibus habitat, ut deletio eo elemento nulla earum vis peculiaris supersit. Exempla sunt in vi alvum ducente, convulsiones movente, in vi porro venenata, soporifera, aut analeptica, inque vi enecante, quæ subito ignoto quidem modo hominem enecat. De purgantibus auctor jam fuit J. Nicolaus PECHLINUS (p). Et certe nemo est, qui ingratum illum nidorem sennæ, rhei, jalapæ ipsius, hunc quidem subtiliorem, perhorrescat, quando vim ejus expertus fuerit. Vomitus quicumque subitus & vehementior fætor continuo cum nausea movet, tum ari et hyoscyami nidor (p\*). Solum autem odorem hellebori triti (q), rhei (r), tabaci (s), colocynthidis (t), antimonii (u), rosarum pallidarum (u\*), pilularum cochiarum (x), pharmacorum omnino variorum (x\*), alvum duxisse exempla prostant, eademque est ratio, quare scammonii, jalapæ, rhei pulveres repositi, exhalante eo elemento sensim privati, evadant inertes (y).

Quare cum subtilissimum id sit, quod vim eam peculiarem efficit, magnam efficaciam etiam repetito exercet, neque aut omnino pondere minuitur, aut certe exigua portione (z).

Con-

(p) L. c. c. 7. p. 93.

(p\*) FLOYER pharmacobas. p. 36.

(q) BOYLE de natur. determ. effluv. p. 163.

(r) PECHLIN. p. 99.

(s) IDEM ibid.

(t) BOYLE l. c.

(u) PECHLIN. p. 115.

(u\*) Hist. de l'Acad. 1699. p. 57.

(x) FALLOPIUS med. purg. simpl. p. 46. SALMUTH L. III. n. 14.

(x\*) De Pfeilio medico Lipsiensi SCHNEIDER l. c. SALMUTH L. III. n. 8. Habet exemplum Alexander BENEDICTUS de pestilentia; aliud BLANCARD Jaarreg. I C. I. n. 66.

(y) PECHLIN. p. 132. Adde similia apud SCHNEIDERUM de osse cribrif. p. 210.

(z) Non minui vitrum antimonii, quando repetito vinum materie emetica imbuit BOYLE p. 83. Minui tamen DODART Mem. avant. 1699. T. I. p. 28. Puto parum, & lente.



Convulsiones in teneris feminis, & nonnunquam in teneri systematis nervei viris (a), & animi deliquia ex odore alioquin grato ambrae, moschi, ipsarum rosarum sequi, nemo ignorat: neque finis esset sermoni, si idiosyncrasiarum illarum exempla vellem adducere, quæ faciunt, ut ab odore exoso totum corpus evertatur, ut rosæ (b), felis, etiam non visæ (c), casei (d), pomi (e), vespertilionis (f). Omitto quæ de lacte, melopepone, lepore, avibus (g), jalapa, carne gallinaceo, piscibus, haecibus (h); lacte ebutyrato, charta masticata (i), mure (i\*), violis (k), noctua (l), porcello, prunis (m), & innumeris aliis rebus legimus (n), in quibus, si quid ferii est, ad odorem certo pertinet.

Non in feminis, sed in robustissimo quoque homine acria odoramenta sternutationes immensas excitant (n\*).

De vi venenata pauca adducemus: celeberrimum est exemplum serpentis caudifoni, quem ajunt, communi consensu, itinerum in septentrionalem Americam scriptores, mures, sciuros, aviculas (n\*\*) cogere, ut in suum rictum, ipso quiescente, se conijciant. Fætores vehementem (o) exhalare scribunt; alii tamen moschum (p) olere, dum incantat. Non repugnat,

(a) HARDER *apiar.* p. 181. De moscho BIERLING *alv.* n. 54. De odore aquæ naphæ PANABOLUS *Pentec.* II. c. 38.

(b) SPIGEL. L. II. c. 3. de Cardinale CARAFFA. ULMUS de *occultis in re medica* propr. de Cardinale GONZAGA p. 65. tum porro DESSÉNIUS p. 281. BOYLE p. 213. SCALIGER *subtil. exerc.* 151. PORTIUS de odor. p. 18. BRUNACIUS de *Chir. Chin.* p. 96. Melchior ADAM de I. ECHTIO. SCHURIG *Chylolog.* p. 130. BINNINGER l. c. FABER ad HERNANDEZ p. 541. &c.

(c) BARTHOLIN. *Cent.* VI. *Hist.* 52. VIRIDET du bon chyle p. 141. pallor, rubor, sudor deliquium KAAUW *imp.* n. 409. STIEF de *somno* p. 20. MANITIUS de *idiosyncr.* p. 34. BOCCONE *osserv.* p. 88. VALISNER. *Galer. di minerv.* T. VII. n. IV. oper. T. I. p. 84. SANCTOR. *method. vitand. error.* p. 421. SCHULZE *moment. corp. hum. alter.*

(d) KAAUW. BRADLEY *ladies direct.* p. 86.

(e) De JAGELLONE RSASZYNSKI *Hist. nat. Polon.* p. 333. SCHULZE l. c.

(f) VALISNER T. I. p. 83. 84. nempe non viso.

(g) MARANGA *method.* p. 262.

(h) BIERLING *Advers.* n. 14.

(i) MENTZ de *antipath. phys.*

(i\*) MURATORI *forza della fantas.*

(k) BARTHOLIN. *Cent.* III. *Hist.* 28.

(l) VALISNER. *Gal. min.* l. c.

(m) Des LANDES T. I. p. 138.

(n) SACHS *gammarol.* p. 583. FRISCH *seltsame Händel* T. I. p. 56. SCHURIG *Chylolog.* p. 130. BIERLING l. c. &c. MARCELL. DONAT. p. 624. seqq. CAMER. *Cent. memor.* II. n. 26. 27. SCHOCK *aversat. casei* p. 225. &c.

(n\*) L. VIII. p. 302. 303. 304.

(n\*\*) Lusciniæ, mockingbird. KIRKPATRICK ed. II. p. 15.

(o) J. KALM in K. *Svensk. Acad. Handl.* 1752. trim. 4. 1753. trim. 1.

(p) KIRKPATRICK l. c.



gnat, si in ea historia aliquid est veri, vaporem cum odoratum vehementem misera animalia in similia mala conjicere, ut odoramenta illa, quæ modo excitavimus, homines conjiciunt. Solo fætores enormi mustela Maritacaca (q) deliquium facit, quæ eadem videtur esse cum putorio, a KALMIO (r) descripto. Odorem conculforum in tympano bufo-  
num & viperarum ad summam iram aere *baculis* concussio irritatarum, subito necuisse solebat BOERHAAVIUS (s) narrare, ex DELRIO (t), ut nunc reperi.

Etiam alii summi fætores subitam (u) mortem intulerunt, maxime, qui ex putredine nascuntur. Ex fætores putridi bovis (x), mors subita, & ex vapore cadaverum (y), sentinæ &c. (z). Faces veneno tinctas (a) effluvia fundere, quæ adstantes necant, vetus est persuasio, & posse literas aut chirothecas adeo penetrabili veneno imbui (b), plerique persuadentur. Ex arsenici (c) vapore naribus adtracto mors absque ullo sympto-  
mate supervenit, & ejusmodi fatum fuisse DIPPELII fertur, qui sibi *Christiani DEMOCRITI* nomen fecerat.

Vires sopientes sunt carbonum incensorum, vini, mandragoræ (d), etiam aromatum nonnullorum, potissimum croci (e), qui majori copia collectus passim legitur somnum fecisse, ipsis etiam clitellariis mulis (f). Nam etiam fragrantès odores molesti esse possunt, ut bitumine naves suffierint, qui Arabiæ oram prætervecti, nimium aromatum odorem (g) reformidabant. Occisos ab aromatum vi odore nautas (h) nuper legimus,

- (q) PRISO *Hist. natur. Brasil.* p. 124. *Voyag. aux terres australes* T. II. p. 174.  
(r) *In American. res.* T. II.  
(s) *Prælect.* T. IV. p. 77.  
(t) *Disquisit. magicar.*  
(u) *Add L VIII.* p. 214. 215.  
(x) *LANCIS. pest. bovill.* P. I. c. 8.  
(y) *Journ. de Medec.* 1759. m. Aug.  
(z) *ARCUDIO contemplat.* p. 5.  
(a) *SCALIGER de subtil. exerc.* p. 154. *HEUCHNER oper.* p. 429. *MEAD. of poisons.* p. 225. *Addit. se venenum nosse, esseque metallicum.*  
(b) *WERFER cicut.* Multis mensibus vix refocillatus.  
(c) *BARNSTORF de amput. membr.*  
(d) *Levin. LEMN. herb. bibl.* c. 2.  
(e) *CARDAN. variet. L. VIII. BORELLI Histor.* 15. *Cent. IV. v. L. XVII.*  
(f) *FABER ad HERNANDEZ* p. 755.  
(g) *DIODOR. SICUL. bibl. III.* n. 46. 47.  
(h) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 3. obs.* 155.



mus, & quam gravis sit aviculis, quamque celeriter eas enecet, etiam qui ex gratissimis plantis spirat, experimenta nuper a Cl. VIRO facta ostendunt (i).

Feliciores etiam vis est, sed perinde efficax, odorum, & subitam ad vitam revocandam in ejusmodi hominibus potestatem habet, qui mortuorum simillimi, & fere mortui forent, nisi ejusmodi auxilium accederet. Qui aquis submersi exanimes in arenam extrahuntur, eos acerrimo suo odore spiritus salis ammoniaci (k) ex profundissimo deliquio revocavit. Hystericas feminas ex syncope fœtidis (l) refocillari vulgare est experimentum.

Alere etiam odores vetustæ est observationis, uti quidem de DEMOCRITO legitur, quem soror, ne inter festos dies interiret, odore panis recentis sustentasse dicitur. Et in universum, qui celeri refectioe indiget, eum per olfactum refici jubet HIPPOCRATES (m).

Destructis Caryophyllis (n) Ternatam salubriorem factam esse, legitur.

#### §. V. *Classes odorum.*

Levem adumbrationem hujus divisionis hic adspargo, cui multa & ex chemicis, & ex animalibus non satis nota sint: & cui fit excusationi, quod, contra quam aliis in sensibus, odores fere, tamquam individua, nunquam sint in species collecti. Aliqua tamen spes est, aliquando classes & adfinitates aliquas odorum constitutum iri, cum etiam nunc nonnullis exemplis constet, dari odores aliquos, qui & ex metallis, & ex animalibus, & ex vegetabilibus fere iidem & simillimi obtineantur. Moschi odorem diximus in auri nonnullis solutionibus reperiri: reperitur certe & in animale, & in femine ex Malvæ genere, quem manifesto a jas genere convenire, ex diversis adeo regnis sumtum. Allii infensus odor & ex arsenico incenso spirat, & ex nonnullis animalibus. Geranii robertiani odorem, sed graviolem, exprimit putorius americanus KALMII: violæ odor est in sale marino, in lichene hecynico, & in urina a terebinthina mutata

(i) L. VIII. p. 216.

(k) In *Journal Helvétique* 1734. m. Jun. De ejus spiritus vi BOYLE *mir. subt. eff.* p. 188. add. de submersis L. VIII. p. 251.

(l) ARISTÆUS *Acut. pass.* L. II. c. XI. p. 124. edit. BOERHAAV.

(m) Περὶ τροφῆς 43.

(n) BOYLE *Histor. of air.* p. 242.



mutata. Croci odor est in floribus falis ammoniaci martialibus, Rosæ gratia in nonnullis infectis. Cimicis fætor in coriandro, in orchide: hirci in orchide; feminis masculi in julis castanæ, in orchidis flore, & radice; vulvæ & halecum in vulvaria; cadaveris in stapelia.

Ergo primus sit ambrosiacus odor moschi, cum quo zibethi odor similitudinem habet. Primario habitat in sebo animali, de suis glandulis in receptaculum effuso, retento, certo gradu putrido. Nam & ipse moschus ejusmodi pigmentum est, & in moschato (o) animale, & in fele zibethica, inque Crocodilo, marsupiali (p), mustela pisce (q) odoramentum ejusdem generis reperitur. Sed etiam finus per agros sparsus (r), imprimis, per primum hiemale frigus moschum redolet, & excrementa serpentum (s) & crocodili (t), & ulula, fordidissima avis (u), & urina vaccæ exhalatione aquæ inspissata (x), & vulva bubalina sicca (y), & bilis (z) aliquot mensibus digesta, tum ejusdem per putredinem in aqua præcipitatum sedimentum, & sanguis bubulus, & sudor fani hominis matutinus, etiam meus, & brassica digesta. Quare cum diminuta quasi ex putredine suaviter oleat, recens moschus ingrato odore est, ut sanguinem de naribus cieat (a): & ex putridis carnibus digestis in crocodilo (a\*) nascitur. Neque civettæ vivæ odor ferri potest (b). Olea animalia empyreumatica rectificata suavi sunt (c) odore. In animamoschi odor signum est imminentis morbi (d).

Ad eum moschi odorem accedunt grana hibisci, folia geranii moschati, rhapontici moschati, cardui nutantis, papaveris alpini, moschatellinæ, monotropæ, scabiosæ moschatae; etiam plusscularum malvarum, ut lusitanicæ, in sole micantis. Etiam in miscela sagapeni, galbani, opopanax

X 2

&amp;

(o) DENIS *Amer. septentr.* II. p. 279.

(p) TYSON *opossum* p. 16. De mustela quadrupede BUFFON. *Hist. natur.* T. VII. p. 165.

(q) BARTHOLIN. *Cent.* VI. *Hist.* 52. in humore atro vesicam replente.

(r) BOYLE *orig. form* p. 144.

(s) RHOD *obs.* 93. *Cent.* III.

(t) PLINIUS L. XXVIII. c. 27.

(u) *Histoir. natur. des anim.* T. III. p. 600.

(x) RUTTY *synops of miner. wat* T. I. p. 457.

(y) BARTHOLIN. *util. peregr.* p. 10.

(z) RAMSAY *de bile* p. 11 12. ALSTON *on quiklin.* p. 35.

(a) CHARDIN *Voyag. de Perse* T. IV. p. 46.

(a\*) BUFFON T. IX. p. 309. 313.

(b) CHARLEVOIX *St. Domingue* T. I. p. 22.

(c) MULLER in *Diff. de iis oleis* p. 39.

(d) PECHLIN L. II. *obs.* 50.



& bituminis judaici moschi odor exstitit (e). Quæ ex mineris moschi sint odore, diximus (f).

Ambari adfinis odor est in bituminis specie tum griseo, tum alio; quod memini succini nomine a BOERHAAVIO nobis ostendi, quod ex Africa repeteretur.

Similes odores sunt diosmæ, carpobalsami, pomorum putridorum, & ex mineris vitrioli hungarici, sæpius cum sale ammoniaco præcipitati (g).

Alius crocatus odor in minerali classe reperitur in floribus salis ammoniaci martialibus.

Alius resinofus varius est, in camphora, elemi, Pini resina, chamaepity, rore marino, volcameria, calendula africana, geraniorum nonnullis. Redit idem in auri solutione, de qua diximus (i).

Alius cardiacus est in salvia, mentha.

Alius balsamicus, varius, in benzoin, styrace, balsamo Peruviano.

Alius *lavandulatus* est, quo & hyssopum, thymum, majoranam, dictamnium, origanum, aliasque verticillatas stirpes refero.

Alius aromaticus, dulcis est in cinnamomo; igneus in caryophyllo, in tunicæ flore, & idem in orobanche tenuior superest.

Acris est in pipere, ejusque generibus, amomo, lauro, aristolochia, asaro. Stomachicus idem redit in acoro; pinguis in moschata nuce, mace-re; tener in cortice citri, cedri, melissa.

Alius in pomo, qui etiam in geranii africani coccinei, & rosæ eglanderiæ, & melampyri unctuosi foliis est; demum in conjunctione spiritus vini cum spiritu nitri (k).

Alius est fragi, rubi idæi.

Adfinis iterum, sed levior est odor Iridis florentinæ, violæ, theæ Chinenfis per Russiam advectæ, byssi rubri lapidum hercynicorum intesti-norum, scari (l), meloes (m), urinæ terebinthina imbutæ. Etiam sponte si urina violam oluerit, morbus imminet (n).

Alius & fortis odor est Aurantii, floris nempe, & fraxinellæ.

Alius

(e) *Histoire de l'Acad.* 1706. p. 6.

(f) HENSING. GLAUBER. & p. 155.

(g) JUNKER ed. Gall. T. IV. p. 145. 146.

(i) HENKEL *flor. sat.* p. 387.

(k) HENSING. *Schwalbacher Sauerbrunn.* p. 27.

(l) RONDELET p. 168.

(m) KOLREUTER *insect. coleopt.* p. 42.

(n) PECHLIN. l. c.



Alius dulcior odor est rosæ, radicis rhodiæ, ligni rhodii, lathyri rosei, salicis persicæ, verbasci, insecti ex genere ichneumonum (o).

Alius dulcis liliaceus lilii, tuberosæ, iridis, pruni, vitis. Alius, paulo intensior & subgravis, narcissi juncifolii, polyanthes tuberosæ, jasmini, nyctanthes, leucoii, genistarum quarundam, lathyri ficuli, heliotropii.

Alius blandus & tenuis alpinis stirpibus communis, primulæ, auriculæ, lilii convallium, polygonati odori, thymelæ, tiliæ, cyclamini, hyacinthi, & plurimorum aliorum florum.

Alius umbelliferarum, angelicæ, imperatoriæ, tragoselini, anisi, radicis laserpitii, oreoselini.

Alius gravis valerianæ, spicæ celticæ, mei, fikeris, anethi, cumini.

Alius artemisiacus achilleæ odoratæ, absynthii, abrotani, artemisiæ, chamæmeli odori.

Alius ficcus, modice gratus, gallii, ulmaricæ, sambuci, asperulæ odoræ.

Hæ classes aliæ simillimos, aliæ dissimiles quidem odores complectuntur, ut tamen communi aliqua in nota consentiant.

Oleum dominatur in ambrosiacis, aromaticis.

Refina in resinis, balsamis acutis.

Magis aquei sunt odores violaceus, rosaceus, croci, lilii, & ille, quem blandum dixi.

Animalium odores plerique ingrati sunt, præter ambrosiacos. Pauca insecta excipimus (p). De Alexandro M. de femina a Stephano BLANCAARD citata (q), deque alia CAMERARIO dicta (r), exempla exstant grati, ex homine spirantis, halitus.

Ex fossilibus gratissimus est odor ætheris, qui ex vegetabili alcohole, & ex fossilis vitrioli acore componitur. Reliquos, paucos, tetigimus.

### §. VI. Odores medii.

Medii generis, ut non possint ad suaveolentem classem referri, multi sunt, plerique gratiores, quam quidem ingrati.

X 3

Eo

(o) Car. de GEER Mém. pour servir à l'histoire des insectes p. 599.

(p) p. 164. 165. Adde alia insecta GABRIELLI ad R. PAROLINUM Exp. I. BIRCH. T. II. p. 483. &c. T. II. L. V. p. 95.

(q) Jaarregister Cent. VII. n. 62.

(r) Diff. taurin. p. 12.



Eo refero odorem spirituosum alcoholis; odorem acidum vini, aceti; nam mineralis aeor gravius olet.

Odorem empyreumaticum gratum, ut coffeæ tostæ, panis tosti;

Odorem leguminosum, in quo genere excellit fabæ flos, & pene suaveolentibus se miscet; magis fatua pisa sunt, & alia semina ex genere papilionaceo.

Odorem farinosum, quem fungi multi imitantur, in quo genere panis recens gratiam habet.

Odorem amarum absinthii.

Odorem emmenagogum pulegii, tum matricariæ, chamæmeli fætidii.

Odorem nasturciacum nasturtii, cochleariæ, ejusque universæ gentis: tum marchantiæ.

Odorem fatuum cucurbitaceum, cum quo melo ambratum miscet.

Odorem oleraceum betæ, bliti, atriplicis, borraginis, buglossi.

Odorem gramineum.

Odorem dulcem ficus, mellis, sacchari crudi, diversum, modice gratum.

Odorem cerevisiæ.

Odorem gravem Juglandis, hunc non ingratum.

Odorem aphrodisiacum orchidum, julorum castanæ, seminis masculini animalium.

Odorem fæni græci, meliloti.

Odorem gravem gales, ledi rubiginosi.

#### §. VII. Fætores.

Graves sunt & displicent omnium fere animalium perspirationes, etiam urina, lac, fæces, sudor; singula vero animalia fere suum proprium fæto-rem habent.

Graves sunt minerales odores fere omnes, aliqui etiam gravissimi, arsenici incensi, ferri dissoluti, sulfuris in alcali deliquentis.

Gravis, ut in species descendamus, est potissimum odor cadaverosus sive putridus, satis similis, sive ex animale corrupto, sive ex vegetabili contabescente nascatur. Inter viva vegetabilia adeo cadaveris similem odorem spirat stapelia, ut seductæ muscæ cæruleæ sua ova in florem, tamquam in cadaver ponant. Adfinis etiam est phalli odor.

Gravis est odor stercoreum, nondum putredinosus, & aliquanto potius acutior; maxime tamen stercoreum animalium carnivororum. Inter plantas eum odorem spirat Agarici genus, & aliqua in India ligna.

Gravis



Gravis est odor rancidus corrupti adipis balænæ, aliorumque animalium marinorum, & adipis avium piscibus se alentium; gravis etiam & nauseosus in alio adipe, qui per calorem & tempus vitium contraxit, inque fæcibus hominum male pingua concoquentium gravissimus.

Gravis est putridi ovi fætor.

In his, quos diximus, fætoribus veneni fere vis est, ut vomitum, & pertinacem quidem, moveant, & oculos inflamment (s).

Ingratus est casei odor, & adfinis ossium corruptorum, cui simile quid myrtillus habet.

Grave virus est inter animalia hirci, serpentum nonnullorum. Ad hircum accedit certa orchidis species, & gnaphalium fætidum.

Ad cimicis odorem coriandrum recens; orchis ab odore dicta.

Gravis est fætor alliatus, qui idem & in bufone repetitur, & in fossilium quibusdam degenerationibus; tum in alliaria, cicuta minori, lantana, chara, asa fætida (t). Adfinia sunt gummi fætida galbani, sagapeni. Huic odori peculiare est, vehementer & diu inhærere, etiam animæ, & perspirationi hominum iis plantis utentium.

Odor putorii, urinæ felinæ, qui est in geranio robertiano mitior, & qui idem adfinitatem habet cum ribe nigra, & thalictro fætido.

Lenior odor est hystericus ille Lamii, galeopsidis, salviarum quarundam, cattariarum, ballotes.

Tenue, sed efficax, venenum est pæoniæ, hellebori, veratri, cicutæ, aconiti, delphinii aconiti folio, capfici, asclepiadis, jalapæ, linariæ, melampyri, totiusque pene classis didynamiciæ diangiciæ.

Vehementius est virus in Tagete, lycopersico, fenna, cassia fætida, lilio reflexo rubro, fritillaria, corona imperiali. Etiam iste odor venenatam vim indicat.

Ingratam muriam spirant spongiæ, & pisces marini recentes multi, & adfinis halecis muria; tum in plantis chenopodium fætidum.

Narcoticus odor est cynoglossi, lithospermi offic. mandragoræ, graviorque hyoscyami, nicotianæ.

Et opiatus opii, lactucæ spinosæ.

Et bituminosus bituminis, naphthæ in lapides arenosos resumtæ, quali fabulosæ rupes circa Chavornay plenæ sunt. In quibusdam speciebus Passifloræ,

(s) BELLINI experimenta. De oleo balænario MARTENS: de foricis vulgo notum est.

(t) p. 162.



fifloræ, trifolii, solidaginis, anonidis aliquid simile est, & in castoreo. Neque placet uliginosus odor fuci, algæ, & plantarum palustrium, & phocæ.

Et acris ille rutæ; & fatuus fungi, mucoris, cadaveris recentis, animæ nonnunquam humanæ, vaporis pestilentis fodinarum.

#### §. VIII. *Causæ horum odorum.*

Valde exiguum est, quod de hac causa tenemus, neque quisquam *Roberti Boyle* industriam continuavit. In universum tamen, quando aut vegetabilium, aut animalium vitam & lentam perfectionem contemplamur, reperimus primordia utriusque generis fere fatuum, farinosum, aut certe aphrodisiacum odorem feminis masculini habere, qui cum farinoso acutum quid conjungit. Tenuis est, quem in avium rudimentis percepi, odor, cum earum formationem persequerer; tenuis est, aut omnino nullus in feminibus plerarumque stirpium, eorumque seminum germine.

Accedunt animalibus vitæ efficaces vicissitudines; plantis præter alimentum aqueum, & solem vix quidquam. Et tamen ex farina illa fatua feminis tunicæ, sensim herbaceo odore conspicua petala nascuntur, ut in simplicissimo exemplo maneamus. Sed in iis petalis grata caloris, & solis potissimum virtus sensim expedit ex viridi colore album, ex albo purpureum saturum, & una cum colore gratissimum aroma per petala spargitur, penitus novum, cujus nihil simile aut in femine fuit, aut in succo, quo planta nutrita convaluit, & quem possis mere aqueum adhibuisse. Vides ex aqua, & minuto omnino momento farinæ, posse per calorem generari particulas summe odoratas, etsi non alia causa accedit.

In homine non gratum quidem, sed validum tamen odorem inodoræ aquæ idem calor impertit; sudor, in exemplo in inguine recens, qui a femina sana & nitida nuper generatur, omnino vix nisi fatuum odorem habet, & aquæ subalbidæ, subopacæ faciem. Fac eum sudorem in plica inguinis residere, & colligi, ut fere solet, aut in alia plica: subnascitur & brevi, odor penetrans, ingratus, nulli similis, nescio quid cum scintilla electrica habens commune. Calor in hanc aquulam egit, evexit in volatilem naturam mites particulas, pungensque acumen ipsis addidit.



Sic ex inodora bile, ex fatuo per tenue intestinum stercore, putredo primo fætorem penetrantem, deinde gratissimum odorem eduxit; quorum uterque absque ulla nova materie admista subnascitur.

Videtur adeo particulas in aqua animali fatuas, inodoras, blandasque, dissipata parte aquæ, a caloris leni vi fovente naturam odorabilem consequi. Adtenuantur una, cum volatiles in aerem dissipentur. Natura nempe odorata in universum videtur in tenuitate partium poni, quæ per aerem avolant, inque acumine, quo possint nares adficere. Ipsa forte insuperabilis duritas particularum aquæ facit, ut odorem exhalando nullum concipiat; utraque vero proprietas ad odorem faciendum conjuncta (*u*), necessario requiritur. Sales medii acuti sunt, sed absque natura volatili: aqua volatilis, absque natura acri; sales volatiles odori, quia utramque proprietatem conjungunt. Neque ullum fere corpus est, aqua excepta, quod in igne volatile factum non una odorem spargat.

Uno verbo, communis odorum causa calor est, neque mirum adeo ab eo vires odorum intendi (*u*<sup>\*</sup>), aut ab æmulo ignis tritu, frictuque, qui perinde calorem generat (*x*).

Non ideo repugno, per alias causas, ut per dissolutionem, denique per commistionem odores varie mutari, & augeri. De miscela ex fætidis gummatibus suaveolente diximus (*y*). Aquam meliloti parum odoram omnium fragrantium corporum odores augere CÆSALPINUS vidit; Ambræ (*z*) veræ debilem odorem addito momento moschi, & zibethi mire perfici BOYLEUS. Ex oleo vitrioli fætido, & non valde grate olente spiritu vini, suaveolens omnino æther nascitur (*a*). Contra urinolus odor ex commista cum sale ammoniaco calce continuo adscendit (*b*), & sulfuris fætor ex oleo terebinthinæ (*c*) cum oleo vitrioli commisto.

Dissolu-

(*u*) In sola tenuitate HERACLITUS. Omnia, inquit, quæ fumus sunt, possunt odoratu percipi ARISTOTELES *de sensu* n. 5.

(*u*<sup>\*</sup>) PRIVATI *refleffioni* p. 29.

(*x*) Lignum faginum sub ferro torneatoris gratum odorem acquirit BOYLE *de mecbaz. orig. form. & qual.* p. 135.

(*y*) p. 163. 164.

(*z*) BOYLE p. 147.

(*a*) Add BOYLE p. 120. 136. 137.

(*b*) IDEM *Exp.* I. p. 131.

(*c*) IDEM *Exp.* III. p. 132. 133.



Diffolutions perinde fortes odores nascuntur, ut ferri ab acore minerali, sulfuris a sale lixivo erosi exemplo, aliisque innumeris tenemus, grati etiam, si BOYLEI experimento fidem non negas, qui gemmis in spiritu vitrioli dissolutis suavem odorem produxit (*d*).

Satis vero intelligitur, posse elementa demum corporum ita inter se colligari vi adtractili, ut nihil suarum particularum dimittant. Deinde si tertium corpus adjectum priorum alterum fortiori vinculo adstrinxerit, liberari posse, & suæ volatili indoli alterum restitui.

#### §. IX. *Gratiæ causa.*

Est aliquid in gratia odorum arbitrarii, aliquid puto magis sibi constat. Primum ad utilitatem suam animalia fere odores reputant, eosque grata accipiunt, qui sibi commoda corpora, & ad cibum apta adnunciant. Hinc canis ad sagienda animalia adeo peritus, rosæ odorem unice spernit, & violæ, neque eum odorem percipere videtur (*e*).

Gratus hinc Groenlandiæ incolis odor olei balænarum, & phocarum; quibus populis in ea ultimæ terræ habitabilis infecunditate nihil, præter eos pisces, natura reliquit præsidii. Eos ergo rancidissimos adipēs eadem cum voluptate potant, cum qua Europæi calyces falerni siccant. Gratus odor ovorum incubatorum fiamensibus, qui ejusmodi ovis vescuntur: gratus casei odor iis, qui hoc cibi genus amant. Africani cadaveribus putridis Elephantorum pascuntur. Romani fetidissimum garum, putridorum nempe hepatum piscium liquamen, habebant in deliciis.

Est tamen procul dubio etiam sua insita, & toti generi humano communis propensio, qua violam, rosam, cinnamomum amant, detestantur cadaveris humani, fæcum alvinarum, putorii Americani pædorem.

Ea gratia videtur esse in quadam mediocritate naturæ odoriferæ. Nimis debiles odores nos vix feriunt, nimii offendunt. Diximus (*f*) moschum recentem ingratum olere, paulatim debilitatum eundem, amissa virium parte, nunc placere. Idem ovi putridi odor est & boni, nuper cocti; sed ille fortior displicet, hic gratus est & acceptus. Tenuis odor urinæ felinæ est in vino mosellano, in uvis moschatis, sed quia tenuis, gratus. Tuberosi, hyacin-

(*d*) p. 140. *Exp. X.*

(*e*) PERRAULT *Ess. de physiq.* T. III. p. 60. Non ideo dixerim alium ab humano esse brutorum animalium olfactum.

(*f*) p. 163.



hyacinthi odor, & Apocyni syriaci, ipsa sua gravitate molestus est. Contra nimis debiles odores egent causis augmentibus, ut placeant. Hinc lignum faginum vix odoratum, ut modo diximus, sub tornatoris ferro gratus olet (g). Hinc carnes, quæ fatuo sunt odore, assæ sunt gratissimo.

Intelligitur ut homini odor placere possit, qui alteri displiceat. Seve-rior erit in rejiciendis fortioribus odoribus, quicumque olfactu gaudebit acutiori. Quare, qui eo sensu valeam, caseum, carnes vel leviter putri-  
das, allia, & quidquid est odorum paulo intensiorum detestor. Qui vero nicotianæ pulvere, vini potu, organa narium obtundunt, ii ejus-  
modi odores facile ferunt.

§. X. *Num eadem odorifera materies, & sapida.*

Magna certe in utroque sensu analogia est, & olim veteribus per-  
cepta (b), & nuperis (i). Aiebat ARISTOTELES omne quod humi-  
dum una est, una & sapidum, id siccatum odoratum fieri (k), ut exstite-  
rint Cl. viri, qui commune utrique sensui destinatum elementum fa-  
ciant, ipsum nempe rectorem spiritum (l). Dantur certe corpora, quo-  
rum odores sapes suos naribus repræsentant, ut amara aliqua, tum vinum,  
acetum, acidus guajaci liquor (l\*), carnes assæ. Deletis particulis illis vo-  
latilibus, quæ odorem faciunt, deletus est sapor. Nam cinnamomum, de quo  
oleum stillavit, cum gustu etiam saporem amittit, & in universum  
herbæ odoriferæ, de quibus & spirituosum extractum sumtum est, & aquo-  
sum, solent in vase fatuæ, & exsicæ, & pariter inodoræ residere. De-  
nique in catarrho (m\*) una gustus perit, & olfactus. Additum est, simi-  
les esse membranas, quæ utrique sensui serviant (n).

Est tamen manifestissima in utroque elemento diversitas (o). Dantur  
enim utique vehementer odorata, sapore vix ullo: vehementer sapida,  
nullo odore. Odor eximius florum caryophylli est, sapor exiguus: sic

(g) p. 169.

(b) THEOPHRASTUS *caus. pl. t. L. VI. c. 12.*

(i) Le CAT p. 230.

(k) *De sensu* n. 5.

(l) BOERHAAVE *Prælect. T. IV. n. 507. p. 72.*

(l\*) IDEM *morb. nerv. p. 735.*

(m\*) HARTLEY p. 180. etiam in polypo apud LEVRET *des polyp. p. 259.*

(n) Le CAT l. c.

(o) Conf. P. G. ANDREA MULLER *rationes in l. Nebenstunden p. 68.*



lilii, sic violæ, sic rosæ, sic florum plerorumque, sic santali, & aliorum lignorum odoratorum, byssique violacei.

Contra sales medii, sales lixiviosi odore destituuntur, sapore eminent.

Etiam grati sunt odores, quando sapor ingratus est & contra. Gratus odor lilii & corticis citri, sapor amarissimus. Gratissimum odorem spirat oleum Cayeput, in ore displicet: neque ulla ad saporem gratia est in odoramentis ambrosiacis, quæ de animalibus repetuntur. Dum putredo odorem auget, saporem destruit, & confundit, fatuaque reddit, quæ fuerunt acceptissima.

Contra ingratus odor est durionis (*p*), & cape putridorum similis, sapor gratus lactis amygdalini; ingratus odor casei, carnis avium & quadrupedum subputridæ, gratia in sapore magna.

Non ergo unice a subtilioribus organis & nervis magnis nudis in olfactu discrimen naturæ sapidæ & odoratæ repeto; tunc enim, quæ sensum obtusiores, gustum moverent, excitarent etiam sensum acriorem, odoratum. Nunc non excitant.

Videtur potius sapor a sale fere unice pendere, nihilque adtinere, an sit ejus elementum volatile. Odoris contra elementum necessario exhalabile est, particulæ multo tenuiores, cum rectore spiritu, phlogistove per calorem, putredinem summe adtenuato, quod idem ignis pabulum est, & electricæ lucis (*q*) materies. In eo convenit uterque sensus, quod acumen nervos emovens requirant, reliqua possunt esse diversissima.

Leve specimen viris naturæ gnaris, & majori in otio viventibus emendandum & augendum commendo.

### S E C T I O III.

## S E N S U S I P S E O L F A C T U S.

### §. I. *Ut homo olfaciat.*

**A** Er odoratis vaporibus plenus vel sponte in nares venit, per inspirationis vires; vel ab homine de industria & accuratius de natura corporis

(*p*) RUMPF *berbar. Amboin.* L. I. c. 24.

(*q*) p. 156.



corporis alicujus inquituro, adtrahitur, crebris, exiguis & repetitis inspirationibus, cum quibus narium dilatantes (r) vires, & vicissim contrahentes conjunguntur (s), ut alternis vicibus elevari nasi alas & subsidere videas.

Qui absque inspiratione, & per expirandum (t) odores percipi scripserunt, ii neque phænomena ipsa recte observarunt, neque antiquitatis dogmata retinuerunt. GALENUS enim dudum, per experimenta doctus, negavit (u) odores præter inspirationem percipi.

Deinde, cum polypus liberum aeris per nares iter impediret, nullus olfactus fuit (x); & canis (y), cui vulnere incisa est aspera arteria, ut aer per vulnus ducatur, omnino non olfacit.

Denique facillimum est expertu, posse nos per loca graviora effluviis fætidissimis, mediasque per latrinas progredi, neque quidquam ab eo putore lædi, dum eo toto tempore absque inspiratione esse possimus.

§. II. Quonam particula odoræ veniant.

Particulæ odoratæ, volatiles cum sint, per universas procul dubio nares se continuo diffundunt. Id enim peculiare odoriferi vaporis ingenium est, ut per omnia foramina in recessus omnes subrepat. Nares ergo replebit, sinusque pituitarios.

Num etiam ad cerebrum veniat quæri poterit, etsi de aere jam negavimus (z).

Veterum constans fuit theoria, aerem (a) per foramina ossis cribrosi in ventriculum anteriorem venire, cumque eo odores (b); inque eo ventriculo sensum olfactus exerceri (c), ipsum cerebrum ventriculis dilatatis ex naribus aerem trahere, ideo partem ventriculorum inferiorem ossibus

Y 3

cribrosis

(r) p. 127.

(s) p. 128.

(t) PERRAULT *de l'Odorat* p. 151. CASSERIUS.

(u) Apud ORIBASIIUM p. 48. adde p. 18. tum VAROLIUS.

(x) LEVRET *des polyp.* p. 359. HARTLEY p. 180.

(y) LOWER apud NEEDHAM *de form. fet.* p. 165. PERRAULT *Ess. de Phys.* T. III. p. 29.

(z) L. X. p. 174. 175.

(a) GALENUS *de util. respirat. fin.* &c.

(b) AVICENNA p. 9. b.

(c) GALEN. *instrum. odor.* c. 4. ORIBAS. p. 48. 52.



cribrosis incumbere (d). Et ideo intricata esse ossa cribrosa, ne crudus aer ad cerebrum veniat (e).

Eam aeris viam dudum SCHNEIDERUS (f) refutavit, totaque posteritas, quæ vias ossis cribrosi (g) cæcas, & medulla nervea plenas; deinde ab iis foraminibus nullum in ventriculos meatum in homine reperit. Nimis certe potens foret odorum efficacia, si ad cerebri medullam nudam pertingerent; cum etiam nunc, quando nervi narium multa membrana, mucos multo tecti sunt, tantas convulsiones cieant.

Superfluum fuerit varia addidisse argumenta, uti illud, sagacissima animalia (h) longo esse capite, atque adeo longam odorum ad cerebrum viam habere; obtusius olfacere hominem, felemve, cui caput rotundum, & odoramenta cominus ad cerebrum admoventur.

### §. III. Organum proximum olfactus.

Id porro organum esse in membrana pulposa (i) narium, inque nervis, qui per eam membranam diduntur, satis quidem consentitur.

De sede vero quæritur narium peculiari, in qua olfactus exerceatur. Vulgo video vix ullam partem excludi. Alii tamen sinus pituitarios negant (k) ad hoc organum pertinere; cæterum ossa spongiosa primo loco nominant (l); septum (m) narium alii; sunt demum, qui partes supremas narium, & cribrosæ laminæ subjectas, pro ejus sensus organo habent (n).

Sed etiam de nervo quæritur. Vulgo quidem omnes nervi narium admittuntur ad partes exercendi olfactus. Excludant tamen primum (o) par aliqui, quod ii nervi in homine bene olfaciente callosi & destructi fuerint; solos ergo nervos a Quinto pare huic sensui exercendo sufficere.

Contra

(d) ORIBASIIUS p. 52.

(e) IDEM p. 18.

(f) De catarrh. L. II. c. 2. Ad sinum frontalem venire etiam negat, in eo nimius L. II. f. 2. c. 1. p. 257.

(g) L. X. p. 175.

(h) PERRAULT de l'Odor. p. 152.

(i) SCHNEIDER toto pene opere. PERRAULT de l'Odorat. p. 153.

(k) SCHNEIDER de catarrh. p. 216. AURIVILLIUS p. 40.

(l) SCHNEIDER de off. cribrif. p. 245.

(m) GUNZ de hum. p. 180.

(n) AURIVILLIUS l. c. p. 38.

(o) MERY progrès de la Medec. p. 25.



Contra nuper Cl. AURIVILLIUS excludit Quintum ( *p* ), & solum primum admittit, qui partes acutius olfacientes adeat, qui in animalibus sagacioribus multo fit major.

Ex his dubiis ergo tentare oportet, ut nos expediamus. Experimentis enim non datur ita uti, ut aliquas partes narium aut admittamus, aut excludamus.

Videtur, ut aliqua narium pars olfactus organum sit, debere eam in diversis animalium classibus constanter reperiri, quibus olfaciendi est facultas.

Videtur requiri, ut ea pars peculiarem aliquam, & a communi viarum aerearum & cibariarum fabrica diversam fabricam habeat.

Videtur consentire, ut ea pars hanc fabricam habeat perfectiorem, & plenior, & in universum major sit in animalibus sagacibus; minoremque aream, & minus distinctam fabricam, in animalibus minus olfactu pollentibus nacta sit ( *p*\* ).

Addi potest, læsa ea parte, aut intercepto aeris itinere, & averfa ab ea via effluviorum odororum, olfactum minui debere, & demum evanescere; neque non probabile est, eam partem, quæ nervis abundet, pro organo olfactus facilius admitti posse.

His positis: in septo quidem narium superiori situm reperimus effluviis aëriis expositum, nervos numerosos, membranam pulposam, & crassior, cæterum fabricæ peculiaris nihil quidquam.

In sinibus pituitariis invenimus, nullos esse infantibus, quibus acris odoratus est, & desiderari etiam in nonnullis adultis hominibus, recte eo sensu utentibus ( *q* ); & membranam habere tenuiorem; & nervos minus evidentes, & osseam fabricam ad recipiendum potius mucum aptam, quam ad peculiarem sensum coercendum.

In ossibus vero spongiosis reperimus conjunctas fere dotes, quas a principio requisivimus. Adsunt in piscibus, avibus, quadrupedibus. Habent fabricam peculiarem, lamellatam, in piscibus factam laminis rectis ( *r* ), sibi parallelis, numerosis, ut in tursione ( *s* ), pilce de canum genere ( *t* ),  
cyprino

( *p* ) p. 37.

( *p*\* ) DUVERNEY *Phil. transf.* n. 139.

( *q* ) SCHNEIDER *de Catbarr.* L. I. c. 6.

( *r* ) PERRAULT *Eff. de Phys.* T. III. p. 264. tab. 9. f. 3.

( *s* ) TYSON p. 37.

( *t* ) STENON. *myolog. spec.* tab. 7. f. 1.



cyprino (*u*), Ruja (*x*), testudine (*y*). Ræ laminæ in proprio sinu cranii continentur. In avibus fiunt ex ossiculis variis turbinatis, mirifice convolutis (*z*). Quadrupeda pleraque olfactu excellent (*a*), quo rapacia animalia prædam eminus odorantur; mitia vero & herbivora inter plantas noxias quasque mira cum subtilitate feligunt. Adjuvantur ergo in universum naribus longioribus, ut in urso, sue (*b*), cane odorisequo (*b\**). Deinde ossicula spongiosa evidentiora, numerosiora, pulchrius structa (*c*), majora, mire gyrata videas in animalibus acriter olfacientibus. Et primo in cane leporario (*d*) plura ossa spongiosa esse, & mirifice intorta: Et hanc unicam esse in eo animale prærogativam; nervos enim mammillares nihilo habere majores (*e*), uti dudum animadvertum sit. Egregius etiam eorum ossiculorum apparatus est in leone (*f*), fele (*g*), urso (*h*), mustela (*i*); etiam in bove (*k*), ove (*l*), equo (*m*), porco (*n*), lepore (*o*), hystrice (*p*), cervo, capreolo, elephanto (*q*). Miram pulchritudinem ejus fabricæ in capreolo admiratus sum.

Simplex denique tubulosa fabrica est in homine (*r*), qui quidem a plerisque bestiis subtilitate hujus sensus superatur. Simplex in torpedine

- (*u*) COLLINS *tab.* 64. f. 1.  
 (*x*) IDEM *tab.* 61. f. 1. 2. t. 62. f. 1. p. 1043.  
 (*y*) CALDESI p. 14.  
 (*z*) SCHNEIDER *de off. cribrif.* p. 184. 186. 712. BORRICH *hermet. Aegypt. sapient.* p. 264. 267.  
 (*a*) BUFFON *Hist. natur.* T. IV. p. 71.  
 (*b*) SCHNEIDER p. 341. apud MANGET.  
 (*b\**) BARTHOLIN. *org. olfactus* p. 16. f. 3. 4. laminæ ramosæ, parallelæ, longæ.  
 (*c*) BOHN p. 339. 340. DUVERNEY apud du HAMEL *Hist. de l'Acad.* p. 169. *Mem. avant.* 1699. p. 248. *Phil. transf.* n. 139. De cane & bove INGRASSIAS.  
 (*d*) SCHNEIDER *de off. cribrif.* p. 158. vel 312. 327. BARTHOLIN. *spec.* f. 5. 6. *Act. Hafn.* T. V. *obs.* 6. p. 68. 69. CASSERIUS *tab.* 5. f. 12. DERHAM *theol. phys.* L. IV. c. 4.  
 (*e*) SCHNEIDER l. c. p. 327.  
 (*f*) PARISINI p. 26. & in fig. R.  
 (*g*) CASSER. *tab.* 5. f. XI. CHESELDEN *osteograph.* c. 6.  
 (*h*) Triginta in quatuor seriebus laminæ LORENZINI p. 9. add. BUFFON T. VIII. p. 262.  
 (*i*) PEYER *Obs.* p. 53.  
 (*k*) MORAND *Mem. de l'Acad.* 1724. p. 406. in ove BARTHOLIN. f. 3. 4.  
 (*l*) BARTHOLIN. l. c. f. 4. 1. 2. p. 13. 15. CASSER. *tab.* 5. f. 1.  
 (*m*) MORAND l. c. p. 407. 408. SNAPE t. 24. p. 119. BOURGELAT T. II. P. 2. p. 257.  
 (*n*) SCHNEIDER l. c. p. 341. DUVERNEY. COLLINS t. 54. Laminas rectas habet.  
 (*o*) SCHNEIDER l. c. p. 288. 296. ed. MANGET. CASSER. *tab.* 6. f. 8. 9. COLLINS p. 866 PEYER *obs.* 14.  
 (*p*) DUVERNEY l. c.  
 (*q*) BLAIR *Phil. transf.* n. 327.  
 (*r*) MORAND l. c. p. 407.



dine (s), ægre mobili animale, & quod tactum prædæ suæ pigrum expectat.

Num ideo septum narium de organi hujus sensus dignitate excludere oporteat, & laminæ cribrosæ faciem inferiorem, & meatum narium medium & infimum, & sinus reliquos, de ea quidem quæstione non facile fuerit definire. Ubique eadem membrana est, fabricæ ejusdem, nervi numerosi ubique, & in septo quidem narium ex eodem primo pare (t), cui Cl. vir peculiariter olfactum tribuit. Sed etiam sinus pituitarii gradibus continuis cum cellulis ethmoideis cohærent: in quibus, ut ossis spongiosi partibus, olfactum non exerceri durum videtur dictu. Denique nullam in ipsa fabrica causam reperio, cur cis certum limitem olfactus exerceatur, trans eundem non ita.

Id facile dederim; dari alias narium partes aliis magis sentientes; plurimum sensum esse in iis, quæ anteriores, superiores, odoratis effluviis propius exponuntur; quæ nervorum ramos habent uberiores (u); quæ propius truncis nervos accipiunt; quæ nudiores, molliores, & tenuiores. Debiliorem olfactum crediderim esse in narium paribus posterioribus, inferioribus, sinu frontali (x), sinu maxillari, sinu sphenoido, quibus in narium partibus nervi pauciores, minores, magis a truncis remoti sunt, ubi etiam majori copia muci teguntur.

#### §. IV. *Nervus proprie olfactui destinatus.*

Primum par pro nervo olfactorio admisimus (y). An ideo excludendus Quintus?

Non videtur, sive septum narium, sive ossicula turbinata pro præcipuis olfactus organis acceperis. Habet & septum, & os spongiosum quodcunque, uti a primo, ita a quinto suos ramos. Etsi enim credas in nervis diversitatem esse, & ambrae odorem a primo quidem distingui, non æque

(s) Absque laminis LORENZINI p. 8.

(t) p. 151.

(u) In suis naribus nervi multi SCHNEIDER l. c.

(x) Non excludit Cl. ROEDERER thes. l. n. 5.

(y) L. X. p. 206.



æque ab alio nervo ( *y*\* ), & primum credas mollem esse, & quintum duriorum, non ita tamen se habere reperiēs, naturam accurate scrutatus. Nam & quinti rami in homine molles sunt omnino, & nihil quidquam habitu suo a primo differunt, quem in avibus apprime olfactu instructis in nares in cerebro sum persecutus. Non repeto fuisse, qui in sagacibus ( *z* ) animalibus minime in nervis prærogativam esse, & qui æque multos per cribrosum os in homine quam in equo nervos transire, conexa receptam sententiam adfirmarunt ( *a* ).

Cur vero ii nervi in naribus potius olfactui præficientur, quam in ore, palatove, aut alia parte corporis, non penitus facile fuerit respondere. Id equidem videmus, nervos in naribus numerosos, molles omnes & teneros, per membranam pulposam spargi, quæ tenerrima epidermide ab actione corpusculorum odororum defendatur, neque ullo conspicuo reticulo tegatur, cum in æthiopibus minime alius narium color sit. Gustus papillas videmus duriores esse, multum habere cellulosa telæ, multum vasorum. Sic intestinorum flocculi maxima parte vasculosi sunt, nervi multo minus numerosi, multo duriores.

Ab hac ipsa & mollitie nervorum & nuditate repetimus, quod non alibi in corpore humano admota corpuscula acria vehementius operentur. Hellebori pulvis modicus ad mortem usque sternutare cogit ( *c* ), qui in ore, præter ardorem modicum, nihil produxisset, oculos nudos ne irritasset quidem. Lux ipsa subita homini ex tenebris advenienti adfulgens sternutationem facit ( *d* ).

Ab hac etiam nuditate videtur sequi, ut adeo facile paulo rudior tactus, aut odor aliquis, etiam rosæ ( *e* ) moschive recentis ( *f* ) sanguinem eliciat, & denique sponte ex aucto aliquantum sanguinis in caput impetu sanguis de naribus stillet. Animalibus hætenus communis est cum homine fabrica, ut equi dentur, non vulgares quidem, quibus sanguis de naribus stillat. Apertas esse in corpore venas exsanguies olim vidit EMTEDOCLES.

Cæterum

( *y*\* ) BOERHAAVE.

( *z* ) SCHNEIDER. & p. 276.

( *a* ) CHARLETON *propr. cerebr. hum* p. 107.

( *e* ) L. VIII. p. 303.

( *d* ) BOYLE *effects of languid motion* p. 264.

( *e* ) CHARDIN. L. IV. p. 46.

( *f* ) RHOD *Cent. III. obs.* 99.



Cæterum alios homines aliis nudiores nervos, & magis sensiles habere, valde consentit, sive quod tenerrimi nervi a nicotiana destruantur; aut a camphora (g), sive ex vitio aliquo organico (h), aut ab ignota causa (i), quam suspiceris, in nervis melius tectis, aut paucioribus latere.

Passim certe legas de hominibus, qui olfactus facultatem nullam habuerunt (k).

Contra alii vel integri populi, vel singuli mortales, sagacitate sua bruta animalia pene adtingunt. Semper se aliquid olfacere CARDANUS (l) de se ipso refert. Feminam, quæ sulfuris odorem in aere ante tempestatem distinguebat, citat Cl. WOODWARD (m), ut non dudum descripsimus. Alios passim reperias (n). Integræ etiam gentes sunt, quæ majori olfactus acumine pollent. Inimicos eo sensu duce indi Americæ septentrionalis sequuntur (o). Dari nigritas in antillis insulis, qui olfactu vestigium nigritæ a galli vestigia distinguunt (p), apud idoneos auctores legas.

Simplicitas fere cibi videtur facere, ut puriori olfactu aliqui homines polleant, uti de indis modo diximus (q). Nam iidem mutato victu prærogativam amiserunt (q\*). Homo, qui inter bestias (r) educatus fuerat, perinde alimenta distinguebat odore, ut oves solent, & memini in alpiibus de puero stupido, & inter bestias educato, similia mihi narrata fuisse, graminis nempe manipulum decerptum sagiendo percurriffe, ut seligeret, quæ ipsi odor consuleret.

Ut alii nervi, ita olfactorii, per morbos nimis acuti fiunt sensus. Cum hydrophobia sagacitas canina conjuncta fuit (s).

Z 2

§. V.

(g) BARTHOLIN. Cent. IV. hist. 91.

(h) SCHNEIDER de off. cribrif. p. 113. lege p. 213. Alex. BENEDICTUS anat. p. 44 b.

(i) BORELL. Cent. II. obs. 68.

(k) RIVIN. de morb. a vestitu p. 18. Alexander BENEDICTUS p. 58.

(l) Variet. p. 16. etiam corpus ipsum proprium.

(m) Cases p. 341.

(n) Vide Cephalatom p. 170. CHARLETON l. c. Qui infantes eminus olfaceret Idem WOLF p. 80.; qui lustras LEHMANN Chronic. p. 612. qui vestes distingueret a siccis humidis VIRIDET du bon chyle p. 659. qui viam in Arabiæ deserto BAVA BATHRA.

(o) v. RECK Reise der Salzburg. T. I. p. 862.

(p) Le CAT p. 256.

(q) Lettres sur la physionom. p. 190.

(q\*) VERDUC.

(r) TULPIUS L. IV. c. 10. Du HAMEL de corp. affect. p. 204. VERDUC usag. des part. T. II. p. 151.

(s) BORELL. Cent. III. obs. 68.



§. V. *Muci necessitas.*

Si nervi in naribus numerosi sunt, & male teguntur, & aeri exponuntur acutissimis effluviis gravi, sapiente causa dignum videtur naturæ consilium, si super eos pene nudos nervos unguen molle effudit. Aer enim vel solus, siccitate sua membranas humanæ fabricæ continuo corrumpit, & in aere sicco male olfacinus. Humidæ nares solæ recte sagiunt (t).

lis ergo nervis providet exhalans vapor, deinde copiosissimus mucus, quo non soli sinus pituitarii, sed universæ nares abundant. Etsi enim video, contra (u) hoc nobile muci officium varie disputari, etsi lego abundare eum, qua nullus olfactus exerceatur, ut in sinibus, tamen analogia naturæ non finit hic, admissam a scholis sententiam relinquere. Minime enim dubium videtur, quin in aerea, & cibaria via tota, mucus a natura ob defendendos nervos paretur, & symptomata id cogunt fateri, quæ post amissum mucum iis in viis sequuntur. Similis autem fabricæ in naribus similem fuisse finem plus est, quam probabile.

Nunc eum mucum, *κορυζαν* veteribus atticis (x) dictum, utique in sinibus reperio, inque maxillari potissimum, tum in sphenoideo (y), tunc quidem facillime, quando circumjecta ossa sensim demolior, ut sola membrana sinus suo turgida mucosuper sit. Absque ejusmodi mucosinus fuisse, credo Cl. viris (z), ut tamen nihil inde concludant contra experimenta mea, qui eum mucum toties in homine viderim.

Evacuatur facile mucus de frontali, & ethmoideis sinibus, quibus sua excernicula descendunt, antrorsum tamen & retrorsum obliqua (a). Sphenoideus sinus (b) capite antrorsum cernuo facilius evacuatur, maxillaris capite in latus reclinato (c) alternum ejus in quo sinus est. Tamen hunc sinum difficilius inaniri frequentiora ulcera & polyporum sedes

(t) VANDERMONDE *art. de perfect. l'espèce humaine* T. II. p. 356.

(u) Cl. AURIVILLIUS p. 42.

(x) RUFUS *appell. part.* p. 25.

(y) Vidit dudum in sphenoideo, & maxillari INGRASSIAS p. 100. In frontali nullum  
IDEM. N mpe facilius depletur.

(z) SCHNEIDER *off. cribrif. pref. & de animalibus* p. 180. 181. 184.

(a) p. 139.

(b) p. 140.

(c) p. 142. 143.



des (d) docet. In frontali animalium, & hominum forte, frequentia insecta (e), varii generis colliguntur, non sine maximo & dolore, & incommodo. Causa in obliquo itinere, & a tumidis membranis etiam angustiori videtur repeti debere.

In eodem muco credas inviscari corpuscula odora, & fætida (f) imprimis, quæ diutissime naribus inhærent, ad dies 20. (g), & ad mortem usque (h).

Ex naribus ut facilius mucus effluat, utimur emunctione, five vehementer aeris torrente, quem inspiravimus, & nunc expirando cogimus se per nares præcipitare. Natura sternutationem (h\*) eodem fine movet. Diluitur aliquantum in ipsis naribus adfluente lacruma (i).

Pars humoris narium per venas bibulas reforbetur, etiam experimento facto. Aqua enim in venas canis impulsæ nares replevit (k).

### §. VI. *Mucus non est a cerebro.*

Liceat in libello, tironibus potissimum destinato, adnotasse, vetustatem, quæ viam a cerebro ad nares apertam credidit (l), per eam viam ipsam

Z 3

(d) Polypi RUYSCH obs. 77. Vermes in iis sinibus SCHAARSCHMIDT Berl. relat. 1738. n. 25. Pus Hist. de l'Acad. 1725 p. 18. & ROSA HIGHMORE. COWPER l. c. RUYSCH l. c. ZELLER de morbis ex stricture glandular. præ nat.

(e) HENKEL Saml. V. p. 28. 29. Bresl. Saml. 1725. M. Jun. Giorn di Parma 1688. p. 66. FULVIUS ANGELINUS. TULP. L. IV. c. 12. KRAZENSTEIN Würmer p. 27. TRINCAVELL. & alii ap. DONAT. p. 485. CROUNE ap. BIRCH T. III. p. 379. Ulcus, in quo centum vermes in naso Comm. Nor. 1740. b. 17. Vermes caseariorum similes ZACUTUS Hist. med. mirab. obs. 68. pedati HARDER apiar. obs. 98. Similes ovillorum VANDERMONDE Journ. 1758 p. 72. de erucarum genere BIANCHI gener. p. 320. tab. 1. f. 23. SALZMANN. verm. nar. excuss. Muscam, a qua hi vermes ponuntur, habet VALISNERI in propria diff. Intestinalium similes IDEM Gal. Min. T. VI. p. 256. Ab his vertigo BOERHAAVE morb. nerv. p. 634. VERHEYEN p. 262. cephalæa & delirium (a centipede) Hist. de l'Acad. 1707. p. 42. 43. cephalæa FEHR absinth. p. 79. KERKRING. obs. 43. SALZMANN, de MOOR instaur. T. III. f. 2. 3. 4. Add. Act. Lit. Suec. 1721. p. 180. HARDER ap. FELICE p. 39. Journ. de Medec. 1758. p. 72. Zod. Gall. T. I. p. 73. HILD. p. 8. BARTH med. poet. p. 25. Mem. de Trev. 1707. Sept. Inde mors VALISNER obs. p. 137. 118. Mortes ovium LINNÆONSKA resa. p. 128. Phil. transf. n. 295. In cane WEPFER cicut. p. 252. PEYER c. 13. MURALT p. c. 2. REAUMUR T. IV. p. 52. LESSER p. 211. In naribus ovium DERHAM phys. theol. p. 386. equorum BOURGELAT Mem. des savans étrangers T. III. p. 415.

(f) BINNINGER. Cent. II. obs. 86.

(g) Fætor morbosorum corporum SCHNEIDER off. cribrif. p. 123.

(h) KIRKPATRICK analys. of inocul. p. 12.

(h\*) L. VIII. p. 303.

(i) TAUVRY anat. rais. p. 368. Bresl. Nachricht. 1740. n. 44.

(k) HALES hæmorrh. p. 117.

(l) L. X. p. 175. L. XIV. p. 173. 174.



ipsam mucum ad nares duxisse, ut esset quoddam cerebri excrementum, eoque aquam in ventriculis cerebri obviam traxisse (*m*). Nuperorum pauci, tubulos ejus ossis muco patere putarunt (*n*). Vermiculum cum muco excretum pro cerebri verme habuit *Bernardus VERZASCHA* (*o*).

Deinde cum cribrosi ossis foramina nimis evidenter viderent clausa (*o*<sup>\*</sup>), & plena, & muco transmittendo inepta, alias & alias vias muco a cerebro adventura quæsierunt. Rimam utrinque laceram, & hiatum inter os petrosum & sphenoides prope carotidis foramina *VESALIUS* (*p*). Inter nasi colatoria & os palati fungosas carunculas, quæ humoribus (*q*) a cerebro viam concedant *C. STEPHANUS*.

Facile vero *HELMONTIUS* (*r*) olim, deinde vir certe doctissimus *Conradus Victor SCHNEIDER* (*s*) eum latissime per pathologiam regnantem errorem evertit. *VESALIUS* etiam cloacas ostendit fictitias esse (*t*), quæ in osseo cranio pateant, in calva integra a dura matre claudantur, & multa repleantur cartilagine. Nunc error olim ab omnibus receptus denique obsolevit.

#### §. VII. Olfactus utilitas.

Utilitas olfactus non dubia videtur. Homo quidem prædam suam non sagit, de noxia cæterum, & de innocua ciborum potestate ex odoratu certior redditur; magna naturæ providentia, cum gustus serius & tunc demum inimicam cibi naturam prodat, quando manducatus nocere potuit. Sibi commissus homo cibos suos odore distinguit, ut solent animalia.

Mihi quidem est quam persuasissimum, nullum cibum salubrem esse, qui fæteat. Admixta putredo fætores facit casei, carniū, pisciumque non recentium. Eam putredinem necessitas aliquando, alias teneritudo carnis in sua jam elementa dilabentis excusat. Cæterum uti naturam humanam

(*m*) L. X. p. 45

(*n*) *DIEMERBROECK* p. 359. Per involucria nervorum plena vasis lymphaticis *G. E. CRENDAL* tr. de quelques maladies de poitrine Paris 1739. p. 12.

(*o*) *Obs.* 6.

(*o*<sup>\*</sup>) *VESAL.* p. 795. & prior *CARPENSIS* p. CCCCXXXIX. conf. L. X. p. 175.

(*p*) p. 794. 795.

(*q*) *C. STEPHANUS* L. I. c. 84.

(*r*) *Catarrh. delir.* p. 360. Consentit *ROLFINK diff.* p. 304. *LOWER* p. 247. *MAJOR anat.* I. p. 13.

(*s*) *De off. cribrif.* p. 404. de *catarrh.* L. I. c. 6.



nam putredo destruit, ita cibos reddit feбри, scorbuto, dysenteriaē generandæ aptissimos. Paulo major putredo ova carnesque reddit emeticas. Infalubris fuit homini caseus, quem nauseans sumserat (u), & periculosa inde febris successit, fatisque memini, cum juveni similiter caseum averfanti inlulso joco caseum cognati obtruderent, difficillime, longissimo tempore post nidorosam corruptionem demum eum cibum superasse. Durio fructus, cujus saporem ajunt gratum esse, fætorem ingratum, periculose editur. Uti enim putridum quid olet, ita dysenterias & alia mala facit (u\*).

Contra non facile infalubrem credam cibum reperiri, cui gratus odor sit. Venena quidem mineralia omitto, quæ vel careant odore (x), vel etiam placeant (y). Nam ad id venenorum genus, a se non datum, natura nos non instruxit. Denique gustus olfactui subvenit, si quando deficit ejus custodia. Mezereon florem habet grati odoris, sed acrimonia fructus noxam avertit. De Mancenilla (z) lego, colorem, odorem, saporem gratum esse, sed de eo quidem pomo dubito, cum exurens illa acrimonia, os & labia ulceribus depascens, non videatur gustum effugere posse.

Carnes certe recentes, & fructus horaei non infalubres, & quidquid est dapium nobis a natura paratarum, placet olfactui, & famem invitat, & videtur ea gratia pariter, ut saporis delectamentum (a) hominem ad cibum sumendum persuadere; uti fames sumere cogit. CREATOR enim poenis nos regit & præmiis.

Vicina priori utilitati est altera, qua vires medicatas olfactus detegit. Multas certe, ut aroma, spiritum rectorem, acorem vegetabilem, amarorem, virus, gustus una cum olfactu, & nonnunquam iste quidem solus detegit. Vis enim odorata nonnunquam absque sapore est.

Bruta animalia institutione carent, & bestia sibi ipsi soli discit curatque, nihil profutura posteris. Hinc sagacitatis major necessitas. Ea dote

(t) *Catarrh. L. II. c. 17. p. 559. &c.* Adde de rima ossis cuneiformis PLATER p. 75.

(u) BRADLEY *ladies direct* p. 86.

(u\*) RUMPF *herbar. Amborn. L. I. c. 24.*

(x) Aqua insipida, inodora, sed funesta fuit, inter venena veneficæ BRINVILLIERS *Mem. avant. 1699. P. II. p. 183.*

(y) Arsenici gratissimus, tamen venenatus odor, arte TACHENIANA paratus BOERHAAVE *morb. n. vv. p. 437.*

(z) *Phil. transf. T. 50. P. 2. p. 772. 773.*

(a) HARTLEY p. 180.



dote naturæ alia quidem prædam eminus detegunt, vultures, canes, ipsa, ut continuo dicemus, insecta.

Eodem etiam sensu vires rerum sibi noxias aut utiles unice distinguunt. Sedulam videas pascentis ovis solertiam, qua per pascua gramina excutit, sibi que ea seligit, quæ sunt salubriora. Ingentia in alpibus helieboreta, & vim napelli in lapidosis viis immensam videas, quorum neutrum ulla armenta tangunt. Homines quidem in remota solitudine destituti aliorum hominum monitis, facile errant, & plantis insalubribus sibi nocent, acetariis (*b*) fructibus (*c*), melle (*d*), herbis aliis (*e*). Quare solent id sibi sumere indicium peregrinatores, ut eos fructus solos degustent, quos a simiis, aut ab avibus in cibum recipi viderint.

Ob eam rem etiam omnibus animalibus communem olfactum esse persuademur. Pisces (*f*) & sagiunt, & vires odorum easdem, quas nos patiuntur. Cannabis semine in aquam projecto emergunt, & vertiginosi manus captantium cessant fugere (*g*). Capiuntur etiam adhibitis certis odoribus per aquam sparsis (*h*), vermesque non visu, sed odoratu sequuntur, quibus (*i*), ad hamum adlici solent.

Ipsa insecta (*k*) manifesto olfactu pollent. Mirum est, quam eminus, quam celeriter, quanta cum cupiditate vespæ & apes ad prædandum mel, ad caseum cochleæ (*l*), ad carnes putridas muscæ carnivoræ, ad ipsam cadaverosam jumentum (*m*) morbose atmosphæram eadem convolent, adque stapeliam, quam ex odore habent pro cadavere. Sed etiam accuratius plantas sibi utiles apes distinguunt, noxiasque evitant & narcoticas (*n*). Organum, quo utuntur, ignoratur (*n*\*). Barbulas, quas ad latus oris sui habere solent, eo pertinere conjectura est Cl. viri (*o*).

Aerem

(*b*) In virginia *Phil. trans.* n. 454.

(*c*) Moschatarum nucum similibus *Voyage de la flotte de Nassau* p. 13.

(*d*) Græci illi  $\kappa\kappa\lambda\omicron\omicron$ , quos XENOPHON in patriam reduxit.

(*e*) ANTONII Triumviri milites.

(*f*) ARISTOTELES *Part. anim.* L. II. c. 10. RONDELET p. 107. MONRO *Compar. anat.* p. 133. CHESELDEN.

(*g*) RICHTER *Ichthyothéol.* p. 271.

(*h*) RONDELET p. 107.

(*i*) MONRO *ibid* p. 134.

(*k*) ARISTOT. *Hist.* L. IV. c. 8.

(*k*\*) Insecta nares non habent LINN *Syst. nat.* X. p. 339.

(*l*) SWAMMERDAM *bibl.* p. 110. LISTER *cochl.* p. 152.

(*m*) ROESSEL *insect.* T. III. p. 599.

(*n*) PURCHAS *of the bees* p. 93.

(*o*) LYONNET *insect. théol.*



Aerem infalubrem nonnunquam ex fœtore adgnosci & vitari, adnotatum est (p).

§. VIII. *Secundariæ utilitates.*

Non quidem olfactus est utilitas, sed narium tamen, quod ad refo-cillandos homines submersos, aut semianimes, hæc proxima arti medicæ via fit (q). Acria enim medicamenta hic nervis pene nudis, numero-fis, mollibus, & cerebro vicinissimis adplicantur.

Viam aeris per nares patere non repetimus, ut tamen moneamus, hanc viam magis naturæ convenire, quam via per os, & vitio aliquo ore aperto respirari, cumque superventura ingrata siccitate. Hinc mulis suis, ut in fervida regione facilius aerem capiant, nares findunt (r). Neque repeto vocis resonitum augeri, dum aer per nares transit, & sus-pensa leviter ossa, tremefacit, inque sinubus pituitariis se in resonan-tes (s) cavernas diffundit. Clausis certe naribus maligne & ingrate lo-quimur (t), fuscaque vox est iis, quibus mala veneris dona palatum, aut nares corruerunt. Non ideo tamen sinus pituitarios factos esse, aut cornicula narium, vel ex anatome comparata certum est, quæ in mutis piscibus, & cavas cellulas fecit, & laminas corniculorum nostro-rum similes.

L I B.

(p) HARTLEY *propof.* 51.

(q) L. VIII. p. 251.

(r) RAY *topogr. obs.* p. 312.

(s) ROEDERER l. c.

(t) AURIVILLIUS p. 81.



## LIBER XV.

## AUDITUS.

## SECT. I.

## FABRICA ORGANI.

## §. I.



Apores aliquos in aere obvolitantes organum olfactus percipit, aeris ipsius tremores auditus. Eum sensum ut explicemus, ab anatome, ut alias ordimur. Tres vero sunt ejus organi quasi regiones: Extima, five auricula & auditorius meatus: media, five tympanum: intima, five labyrinthus.

§. II. *Auricula.*

Hac particula pleraque animalia carent, insecta (*a*), pisces, etiam calidi (*b*), quadrupeda frigida (*c*), aves (*d*), quarum cæteroquin acutus auditus est. Nempe nulla dicitur, quia perbrevis est, neque eminet (*d*\*). Habet homo; tum animalia quadrupeda calidi sanguinis, paucis, si ullis quidem, exceptis (*e*), quibus tamen adest obscurior.

In homine, & fere in simia (*f*), figura ovata est, ad caput convexa, & simplex, ad anteriora & post artificiosam complicationem ad exteriora cava, & varie figurata.

Natura

(*a*) Aure carent LINNÆUS *System. natur. Edit. X.* p. 339.

(*b*) KLEIN *mantiss.* p. 19. De phoca ARISTOTELES. FABER apud HERNAND. p. 825. HARTMANN *anat. phocæ.*

(*c*) ARISTOTELES *Part. anim.* L. II. c. 12. CASSER T. 8. f. 1. Lacertæ COITER p. 120.

(*d*) COITER ib. ARISTOTELES. PLINIUS L. XI. c. 39 Omnia vivipara præter cetacea ARISTOTEL. *Hist.* I. c. 11. PARISINI *de delphino & cetis.*

(*d*\*) Habet in anseri CASSERIUS T. 8. f. r. in turione LYSER *de auditu.* In oto grandior est, & auriculæ quadrupedum similis ALDROVAND *ornitholog.* L. I. p. 527.

(*e*) Talpa DERNHAM *physic. theol.* p. 117.

(*f*) Orang Outang apud TYSON p. 10. Hystriçi auricula fere humanæ similis PARISINI.



Natura totius auriculæ cartilaginea est, & eam elasticam adprime naturam cellulosa tela, deinde cutis tenera satis, & stricta, & vix mobilis investit, ut pene perinde ac cartilago ipsa tensa sit. Raro, nisi inferius, pinguedo accedit. Vidit tamen Clar. DUVERNEY (g). In cellulosa tela folliculi sebacei abundant, qui in parte capiti obversa butyraceum unguentum separant, in valleculis vero depressæ auriculæ verum sebum (h), quod in albam & squamosam lemam lentescit, expressum vero vermiculos refert (i) inventum amstelodamensium (k) amicorum.

In brutis animalibus auriculæ radix humanæ fere similis est, & pariter anfractuosa. Sursum vero in conum (l) plerumque educitur, erectum, in animalibus inprimis fortibus, & ferocibus; timida enim auriculas demittunt. Observatum est leporem (m), & cuniculum (m\*), fugax animal, auriculam retrorsum patulam habere, ut sonos persecutorum exaudiat; leonem (n), felemque, qui præda vivat, antrorsum, ut prædam ex auditu sequi possint; Mustelam & putorium, qui secundum humum prædantur, antrorsum & secundum horizontem (n\*) inclinatam; vulpem, quæ de arboribus & nidis avium cibum sperat, sursum conversam (n\*\*); ululam, quæ ex alto despiciat, antrorsum, deorsum (n†) cernuam. Equus mobilissimos conos auriculæ habet, quos facillime ad eam sedem obvertat, a qua sonus advenit (o). Dorcas (p), in quam desuper lynces & alii hostes infiliunt, sursum habet patentes. Cicuris animalis & servi signum esse demissam auriculam nuper dictum est. Dantur tamen capræ in Syria *mambrinæ*, auriculis promissis & pendentibus: & elephantum auricula pendet, etiam fero, nisi quando irascitur.

A a 2

Auricu-

(g) De l'Organe de l'ouïe p. 2.

(h) BOERHAAVE de fabr. gland. p. 8. WINSLOW Expos. L. IV. tr. de la tête n. 380.

(i) VALSALV. de aur. hum. L. I. c. I. n. 3. p. 3. a quo nomen est. Tuetur eas glandulas III. MORGAGNUS, Epist. anat. III.

(k) In cane coll. priv. amst. obs. p. 31.

(l) Vide passim CASSERIUM.

(m) Compar. anat. p. 53. etiam de osseo tubo DERHAM phys. theol. p. 119.

(m\*) BIRCH T. III. p. 385.

(n) Compar. anat. l. c.

(n\*) BIRCH ibid. DERHAM ib.

(n\*\*) Ibidem ibid.

(n†) BIRCH ibid. Artificioseus KLEINIUS, dextram aurem deorsum cavam esse, sinistram sursum, ut descendentes sonos percipiat, &amp; adscendentes Vogel p. 54.

(o) GIBSON p. 44. 45.

(p) Gazella SEVERIN Zootom. Democrit. p. 284.



Auriculas homini natura laxas fecit, & a capite remotas (*q*), & antrosum converfas. Consuetudo, & fasciarum potissimum perpetuus in Europæis usus, eas ita ad caput appressit, ut firma cellulosa tela plurima ex convexa conchæ, & ex meatu auditorio nata, ad galeam aponeuroticam cranii, adque temporalis musculi tegmen revinciantur (*r*).

Deinde ligamentum compositum, supra processum mammillarem ortum, insertum radici meatus auditorii circa ejus aditum, ad eum ipsum in propriam fossam innatum (*s*), sublato musculo posteriori sequitur.

Alterum VALSALVIANUM ligamentum, *anterius* (*t*) oritur ad radicem processus jugalis, super articulationem maxillæ inferioris, ad radicem tragi, & ad helicis tragique connexionem, & inseritur tum meatui cartilagineo, anterieus, tum acuto processui cartilagineo auriculæ. Vidi utrumque distinctum, vidi etiam præter fibras cellulosas nihil adfuisse (*u*).

Denique lamina cartilaginea ultima, quæ meatum auditorium efficit, in lingulas terminatum, utroque in fine membrana brevi & celluloso nexu in alperimum osseum meatus auditorii ambitum innectitur (*x*).

Europæis parvæ sunt auriculæ, aliis hominibus fere grandiores, ut Siamici regni (*y*) incolis, malabaris (*z*), americanis (*a*) variis, quibus lobi ad quinque uncias extensi pendent. Sed ea monstrifica amplitudo inferto forte ponderi debetur.

### §. III. *Eminentia & fovea auriculæ.*

Homini in universum auricula bracteati nummi similis est, cujus duæ sint facies, & ea in facie interiori cava sint, quæ in exteriori convexa, atque vicissim.

Deinde

(*q*) TYSON p. 10. DUVERNEY *postb.* p. 171. Afris aures patulæ PECHLIN *de color. æthiop.* inde *Physiologia* Amst. ed. p. 462. Pygmæo auriculæ sunt, quales homini a natura sunt destinatæ TYSON *ibid.*

(*r*) VALSALV. n. 8. WEITBRECHT p. 205.

(*s*) PERRAULT *du bruit.* p. 190. DUVERNEY p. 9. *tab.* 3. f. 2. E. *tab.* 4. f. 1. C. *Ligament posterior* VIEUSSENS p. 13. *tab.* 1. f. 2. H. WINSLOW n. 371. BERTIN T. II. p. 78.

(*t*) VALSALV. p. 9. n. 8. MORGAGN. *Epist.* IV. n. 9. p. 73. 74. *Ligament anterieur* VIEUSSENS *de l'oreille* p. 12. WINSLOW n. 370. BERTIN. T. II. p. 78.

(*u*) Etiam WEITBRECHT p. 205.

(*x*) IDEM f. 78. b. c.

(*y*) LA LOUBERE *Voy. au Siam* T. I. p. 82.

(*z*) PIBARD *Voyage* p. 274. ad mammas usque.



Deinde ab ipsa antiquitate eminentes aliquæ lineæ, & particulæ cartilagineæ, & interpositi his utrisque fulci, sua nomina acceperunt, etsi accuratior descriptio nuperioris ævi est.

*Helix* ( *b* ) ambitum superiorem auriculæ solus finit, convexus, & contra auriculam replicatus ( *c* ). Finis anterior latus est, planior ( *d* ), ex eminentia concham bipartiente ( *e* ). Finis posterior partim in concham dilatatur, partim cum anthelice in lingulam parabolicam, liberam, deorsum producit, sive in *processum helicis* ( *f* ), ad quem tamen anthelix majorem portionem confert ( *g* ). Eum processum primus habet FABRICIUS ( *g*<sup>\*</sup> ), deinde J. MERY ( *b* ) excisum, & quasi bifidum ( *i* ), tum similiter fere SANTORINUS. Et eo modo vidi, & acutum ( *k* ).

*Anthelix* ( *l* ) duplici crure ( *m* ) incipit antè, tectus prima & latiori helicis particula. Ea crura ad angulum acutum antrorsum patentem uniuntur. Conjunctus colliculus retrorsum descendit, & partim in concham & nascentem antitragum terminatur, partim in helicis, ut diximus, processum.

Uti hæ eminentiæ nomina habent, ita interpositæ vallecule. *Scapha* ( *n* ) est, quæ radicem helicis ubique circumit, & ad posteriora descendens sensim explanatur, & evanescit.

*Innominata*, exigua vallecule, est inter crura anthelicis ( *o* ).

*Concha* ( *p* ) demum, media eminentia ( *q* ) ex helice nata ( *r* ) dividitur, ut renis figuram habeat, cujus hilus antrorsum respicit, eademque

A a 3

intror-

( *a* ) CONDAMINE *Relat.* p. 85. 249.

( *b* ) ΕΛΞ RUFUS appellat L. I. p. 26. 49. POLLUX p. 195.

( *c* ) TARIN. t. 35. B. f. 3.

( *d* ) VALSALV. TARIN. SANTORIN.

( *e* ) VALSALV. *tab.* 1. f. 2. D. SANTORINUS.

( *f* ) VALSALV. l. c. TARINI c. d.

( *g* ) Add. figuram TARINI.

( *g*<sup>\*</sup> ) F. 2. bis.

( *b* ) Ad LAMY *des sens* t. 1. f. A. h.

( *i* ) *Tab.* 3. f. 4. h. & TARIN. f. 4. c.

( *k* ) U. VALSALVA.

( *l* ) ΑθηλΞ RUF. l. c. POLLUX.

( *m* ) TARIN. f. 3. paulo obscurius. VALSALVA l. c.

( *n* ) In aure integra VALSALV. f. 1. F. F. VIEUSSENS *tab.* 2. f. 1. In nuda cartilaginea obscurius f. 2.

( *o* ) VALSALV. f. 1. G. f. 2 inter A. & A.

( *p* ) Nomen habet RUFUS L. I. p. 49.

( *q* ) WINSLOW n. 355.

( *r* ) VALSALV. f. 1. H. H. f. 2.



introrsum (s) connexa est. In eam & helix terminatur, & anthelix. Pars superior inter helicis originem, & anthelicem posita minor est. Pars inferior major, profundior, in meatum auditorium continuatur, eo modo, quem continuo dicam.

*Tragus* (t) est eminentia pene rotunde quadrata (u), cartilaginea, latiuscula, quæ adscendit anterior, & meatus auditorii initio præponitur (u\*), & ex concha nata ad radicem pene helicis sursum venit, ut tamen ab eo membranacea parte separetur. Interrumpitur incisura (x) semilunari.

*Antitragus* (y) ab anthelice & a parte cava conchæ formatur similis, sed minor, semiovalis (z) eminentia cartilaginea, conchæ superiori præposita, & posterior.

Sub utraque, subque origine meatus auditorii, *lobus* est, particula mere cutanea, multo farta adipe, quam ornamentis onerare a prima fere antiquitate moris fuit.

#### §. IV. *Musculi auriculæ.*

Solus, inquit ARISTOTELES (a), homo auriculas immobiles habet. Ita certe plerumque ex vestitus forte vitio, & ex consuetudine primæ ætatis se habet. Non desunt tamen passim homines, qui auriculas erigunt (b), aut alio modo movent (c), inter quos illustre exemplum est *Johannis* MERY (d), atque BOURDELINI (d\*), MURETI (d\*\*), JUSTINIANI (d†). Mobiles, ut optimæ sint, requirit BROUZET (e). Optime

(s) TARIN f. 4. 5.

(t) RUFUS p. 49.

(u) VALSALV. tab. I. f. 2. C. B. TARIN. . 3. o.

(u\*) TARIN.

(x) VALSALV. C. DUVERNEY t. 3. f. 3.

(y) RUFUS ibid.

(z) VALSALVA, cum cute f. 4. C. D. Nimis exiguus TARINUS, m.

(a) L. c. XI. Rarum esse, neque sibi visum PLEMP. l. c.

(b) VANDENBROECK *Voyage* p. 446. Puer auriculas erigens *Phil. transf.* n. 233.

(c) Stultus ducis Aurelianensis PLEMP *van spieren* p. 71. Alii CASSEBOHM *Tr.* II. n. 23. KRUGER *physiol.* p. 693. PAULINUS *de asino* p. 42. BORELLUS *Cent.* II. obs. 16. LINDEN *Physiol.* p. 25. FRANCUS *satyr.* XI. p. 204.

(d) PALFYN *osteolog. nouv.* p. 130. *Anat. Chir.* T. I p. 101. FANTON *diff. Anat.* XII.

(d\*) PALFYN *Anat. Chir.* ed. I. T. I. p. 103.

(d\*\*) SCHELHAMMER p. 15.

(d†) Ex PROCOPIO.

(e) *Educat* T. II. p. 145.



Optime audiebat, cui erant mobiles (*e\**). Multos esse, qui auriculam moveant ESTEVE (*e\*\**).

Musculi certe auriculæ, etsi tenues, manifesti (*f*) tamen sunt in homine, potissimum robusto, & in ejusmodi homine cutem per occiput tendi, quando horum musculorum functio requiritur, & caput tonsum est, exstat Cl. viri auctoritas (*g*).

Animalibus utique, uti manifestus aurium motus est, ita musculi evidentes & carnei, in equo (*h*), porco (*i*), fole (*k*), capreolo (*k\**), bove (*l*) aliis.

§. V. *Musculi majores. Retractor. Elevator.*

Primarius, & reliquis robore superior est *Retractor*, sive *Posterior* (*m*) musculus; unicum enim nomen imponunt viri principes, etsi plerumque in duos (*n*), tres (*o*), quatuor (*p*), aliquando etiam plures fasciculos (*q*) dividitur. Duos certe, tres & quatuor vidi.

Carnei sunt & rubelli, & crassuli musculares fasciculi, qui & a processus mammillaris radice, membranis nempe os obducentibus, & musculorum

(*e\**) *Anecd. de mēdes.* p. 156.

(*e\*\**) *De l'ouie* p. 16.

(*f*) In decem cadaveribus ne semel quidem musculos auriculæ se reperisse SCHELHAMMER *Analect. Sect* 13. n. 3. Auriculæ superiores & posteriores musculos mallet omittere DISDIER *sarcolog.* p. 222.

(*g*) LUDWIG *de membran. epicran.* p. IX.

(*h*) Undecim RUINO *Anat. del Cavallo* L. I. c. 24. L. II. tab. II. Quatuor BOURGELAT T. II. p. 196

(*i*) CASSER T. I. f. 3.

(*k*) *Tab* 8. f. 10.

(*k\**) T. I. f. 6.

(*l*) IDEM T. 5. 6.

(*m*) Unum COLUMBUS L. V. c. 10. p. 25. valde parvum. Unum EUSTACHIUS *tab.* 31. 32. 34. 35. Unum RIOLANUS *Encbir.* p. 336. Unum MERY *tab.* 1. B. c. rejectis reliquis. Trifidum unicum FALLOPIUS p. 63. & ALBINUS *in icon.* potius, quam tres *tab.* 5. & *tab.* 11. f. 3.

(*n*) Duos WALTHERUS *Anat. musc. ten.* VERDIER *myolog.* Duos nempe posteriorem VIEUSSENII p. 9. & medium alterum ibid. Duos posticos, nempe superiorem & inferiorem GARENGEOT T. II. p. 157. Duos, [nam abducentem huc refero] MOULIN. p. 12. Duos BARTHOLIN. p. 523. duos GAUTIER T. I. & in *ic.* 1. *tab.* 12. *postb.* DUVERNEY

(*o*) Tres facit CASSERIUS *Pentastibef.* *tab.* 2. f. 1. A. B. C. *tab.* 4 f. 1. C. E. G. tres VALSALVA *tab.* 1. f. 3. C. C. C. & SANTORINUS p. 45. & ALBINUS c. 4. p. 144. & WEITBRECHT *Comm. Petr.* T. VII. p. 336. & COWPER *tab.* 25. f. 3. 39. Tres, vel quatuor D. de MARCHETTIS p. 136.

(*p*) Duos & tres ILL. LUDWIG l. c. p. VII. MORGAGNUS *Epist.* IV. n. 4.

(*q*) Multos fasciculos pingit DUVERNEY *tab.* 1. C.



sculorum cervicis superficiem tegentibus, & magis ad interiora superiora eo processu (*r*), nascuntur sub occipitali, parte sui eo musculo protecti, fibrasque habent a musculo occipitali secum communicatas. Transversi sunt, vel ad aurem descendunt. Initium & finis tendinescit (*s*), & in partem convexam conchæ se inmittit, qua antè media eminentia (*t*) conchæ valleculam bipertit, etiam supra eam sedem.

Concham dum retrahit, hic musculus una aditum ad meatum auditorium aperit.

Inventores contemporanei sunt COLUMBUS, FALLOPIUS & EUSTACHIUS, restitutor CASSERIUS.

Musculus *superior* (*u*), s. *attollens auriculum* (*x*) latior quidem, sed tenuis, qualis fere frontalis est, innatat temporalis musculi tegumento celluloso, fibrasque ex ambitu radiatas (*y*) ab aponeurosi cranii colligit, ut tamen magis retrorsum descendant (*z*). Tegitur ex parte aponeurosi, quæ a musculo occipitali venit, decussat ad angulum rectum utrumque anthelicis crus, inque caveam innominatam auriculæ venit (*a*), inve vicinum anthelicem, aut in helicis partem superiorem (*b*). Antè cum frontali musculo conjungitur, postè fibras habet ab occipitalis tendine. Auriculam elevat, & meatum aperit.

*Anterior auriculæ* musculus (*c*), similis sed minor (*d*), innatat etiam membranis temporalem musculum tegentibus, & similem habet originem, fibrisque retrorsum leniter descendit, & partim ad superiorem accedit, partim inferitur

(*r*) FALLOPIUS. MERY p. 420.

(*s*) CASSERIUS.

(*t*) ALBINUS, tum depressor septi conchæ FRANCI NICHOLLS p. 36.

(*u*) WINSLOW n. 372. PRIMUS FALLOPII p. 62. b. 63 *Premier mitoyen* VIEUSSENS p. 9.

(*x*) ALBIN. p. 142. t. XI. f. 3. COURCELLES t. I. V. V.

(*y*) ALBINUS & C.

(*z*) SANTORIN. l. c. B. Variabilem esse fibrarum inclinationem MORGAGNUS *Epist. Anat.* p. 63. Rectas fibras habent CASSERIUS t. 3. f. 1. 2. VALSALVA DUVERNEY. EUSTACHIUS *tab.* 21. 23. 28. 30. 31. 32. 34. 35. 41. f. 1. COWPER. T. 25. f. 7.

(*a*) ALBIN. p. 142. f. 3. *tab.* XI.

(*b*) In concham & scapham SANTORINUS p. 39. VALSALVA p. 6. WINSLOW. MORGAGN. p. 63.

(*c*) Antérieur VALSALV. f. 3. E. p. 7. VIEUSSENS p. 8. t. 1. f. 2. tum ALBINUS p. 143. DUVERNEY *postb.* p. 172. & *tab.* 12. f. 1. n. *myotomol.* p. 11. WINSLOW n. 373. COURCELLES ib. d. GAUTIER T. I. GARENGEOT *myolog* p. 68. *Musculus conchæ novus*, etiam distinguit, SANTORINI p. 40. *Adducens auriculæ ad anteriora* MOULINS p. 12.

(*d*) Majorem facit COURCELLES & ALBINUS f. 3. & VIEUSSENS valde; parvum EUSTACHIUS.



ritur processui Helicis, & vicinæ conchæ (*e*). A Cl. viris cum superiori conjungitur (*f*), ab aliis rejicitur (*g*), aut certe subinde eum deesse notatur (*h*). Vidi tamen aliquot lineis infimis (*i*) fibris musculi superioris inferiorem, atque adeo singularem fuisse musculum. Duos vidit I L L. WALTHER (*k*), quorum ad scapham prior, alter ad concham abibat; duos MORGAGNUS (*l*). Et ipse, quoad ejus fieri potest, meatum auditorium aperit.

Occipitalem musculum tamen etiam ad tendendam auriculam, sonosque accuratius exaudiendos conferre Cl. viri est sententia, qui diligenter in iis partibus describendis versatus est (*m*). Alios denique a vulgaribus fasciculos ab occipite ad concham dilatandam advenire auctores exstant (*n*).

Fibras a latissimo colli (*o*) ad auriculam aberrare etiam Cl. testes sunt, & detractorem, radici auriculæ (*p*) insertum lego; aliumque musculum, vermis similem, sub parotide a processu styloformi natum, inque meatum auditorium insertum (*q*). Ea omnia ad rariora exempla referas.

#### S. VI. Musculi parvi cartilaginum auriculæ proprii.

Ex minimis corporis humani musculis sunt, aque non paucis recentissimis, & præcipuis Anatomicis omittuntur (*r*). Cum vero eorum plerosque ipse invenerim, liceat paucis tetigisse.

*Antitra-*

(*e*) Concham & scapham VALSALVA. Eminentiam, quæ concham distinguit ALBINUS p. 144. t. cit. f. 3. Anteriorem partem conchæ WINSLOW.

(*f*) LUDWIG. l. c.

(*g*) MERY l. c.

(*h*) MORGAGN. *Epist.* p. 68. 69.

(*i*) Vidit etiam MORGAGNUS p. 69.

(*k*) *Anat. musc. tenuior.* p. 64.

(*l*) p. 69.

(*m*) LUDWIG l. c. p. 1X. Eo ducebat RIOLANUS *Enchir.* p. 335.

(*n*) *Occipitales minores* SANTORINI p. 6. WEITBRECHT *Comm. Acad. Petrop.* T. VII. p. 336.

(*o*) CARP. *Ifag.* p. 42. FALLOPIUS p. 63. RIOLANUS l. c. MOULINS p. 12. VALSALVA p. 7. COWPER *Myot.* 1724. *tab.* 18. 21. ALBINUS, ad priorem partem lobi, & inferiorem cartilaginis, quæ facit ima conchæ p. 194. *Physiologia Stukje* VII.

(*p*) DIONIS *Cours d'anat.* p. 573.

(*q*) DUVERNEY *myotomol.* GARENGNOT. *myotomia* p. 68.

(*r*) Jacobo DRAKE, VIEUSSENIO. Parvi facit, nec nomina dat WINSLOW n. 375.



*Antitragicum* ( *s* ) plerumque ( *t* ) tamen vidi, non minimum, rubentem. Hinc ab antitragi parte suprema, ubi ex helice nascitur, conicus ( *u* ) retrorsum it, & sursum ( *x* ); inde radici ( *y* ) anthelicis inferitur, in gyrum sub helicis tubere transverso dividente concham ( *y*\* ).

Videtur antitragum sursum retrorsum ducere, & conchæ aditum paulum arctare.

*Tragicus* ( *z* ) a Trago nomen habet, cui incumbit. Ad marginem Tragi, latus, pene quadratus ( *a* ) oritur, versus principium meatus auditorii coit angustior, & in ipso Trago manet; alias tamen a concha juxta Tragum nascitur ( *b* ), ut etiam vidi. Obscuriorem fuisse vidi ( *c* ), cum Antitragicus conspicuus esset.

Tragum ajunt complanare ( *d* ), & concham dilatare.

Musculus Helicis SANTORINI ( *e* ), quem ILL. ALBINUS ( *f* ) *majorem* dicit, sæpe abest, neque VALSALVÆ dicitur. Satis longus, rectus, oritur ab originis latæ helicis parte inferiori, & adscendit in marginem exteriorem helicis supra Tragum ( *g* ). Vix & raro reperit MORGAGNUS ( *h* ), obscurius pingit WALTHERUS ( *i* ). Inter mea adversaria non reperio.

Musculus *helicis minor* ALBINI ( *k* ): ILL. viro auctore in helice manet, atque hinc ortus a margine incisuræ helicis inferiori, qua ejus origo dividitur, adscendit ( *l* ), per faciem anteriorem nascentis helicis, in que marginem heli-

licis.

( *s* ) VALSALVA t. I. f. 4. C. D. ALBINUS. Brevissime tangit SIEVERT coroll. 7.

( *t* ) MORGAGN. *Epist.* IV. n. 7 p. 71.

( *u* ) VALSALVA p. 8 & in *loc.* ALBIN.

( *x* ) SANTORIN t. 3. f. 4. 9. rectius ALBINUS.

( *y* ) ALBINUS p. 184. t. XI. f. 4. h. k. k.

( *y*\* ) Ita fere VALSALVA p. 8. Super lobum WALTHER n. 10.

( *z* ) VALSALV. t. I. f. 4. B. ALBIN. p. 183. GAUTIER T. I. SANTORIN. f. 1. 8.

( *a* ) WALTER *anat. musc. tenuior* 8. Circularem facit VALSALVA p. 8. Ovale pene ALBINUS l. c. f. triangularem SANTORINUS f. 1. 8. & cum triangulo curvilineo comparat p. 42.

( *b* ) ALBINUS p. 183.

( *c* ) Frequenter tamen MORGAGNUS reperit l. c.

( *d* ) SANTORINUS.

( *e* ) p. 41.

( *f* ) p. 184. 185.

( *g* ) SANTORIN. t. 3. f. 4. b. & t. I. 5. ALBIN. f. 4. a. b.

( *h* ) *Epist.* IV. n. 8. p. 73.

( *i* ) WALTHER. 5.

( *k* ) L. c. Fibræ musculares in plana helicis facie SANTORIN. p. 42.

( *l* ) IDEM f. c. c. ALBIN. l. c. c.



licis abit. Ego ter vidi, sed ortum a parte conchæ fere media, supra originem anteriorem helicis se inferuisse: neque repugnat ALBINI icon (m), aut WALTHERI (n). Vix reperiri MORGAGNUS (o).

Musculus *transversus auriculæ* a VALSALVA (p) hætenus dictus, constitutus ab ALBINO (q), & eleganter depictus, in auriculæ parte convexa, & capiti opposita solus ponitur, longus, si de perpendiculari (r) linea quæras, parum latus, si de transversa, hinc a concha ortus, inde ab anthelicis cavo dorso (s), & eminenti scaphæ insertus. Has fibras semel in adversariis reperio.

*Musculus novus Incisuræ* non potest describi, quin dictus sit *meatus auditorius*.

### § VII. *Meatus auditorius cartilagineus.*

Fetui, & infanti (t) nuper nato, meatus auditorius totus aut cartilagineus est, aut membranaceus: per ætatem eidem ex productio anulo ossea lamina adnascitur (u), quæ totius meatus partem tenet propiorem tympano & posteriorem (x), cum pars anterior & exterior mollis sit. Ossea pars, aspero fine terminata, adnatam partem mollem recipit. Pars ejus meatus superior, quæ nuda fuerat in fetu, inter radicem zygomatis, & processum mamillarem intercepta, leviter cava, nunc propter objectam, quam dixi, laminam, totius meatus mediam, sed minorem partem efficit (x\*).

Pars mollis, etiam in adulto homine, partim cartilaginea est, & partim membranacea. Mera membrana est in parte intima, sive proxima membranæ tympani, deinde qua subest cartilago, in parte totius meatus superiori posteriori.

B b 2

Cartila-

(m) L. c.

(n) L. c. 7.

(o) L. c.

(p) Fibræ carneæ transversæ a gibbo conchæ in anthelicem f. 3. D. D.

(q) p. 186.

(r) ALBINUS f. 5.

(s) IDEM. Paulo aliter SANTORINUS p. 44. n. 9.

(t) CASSEBOHM t. 1. f. 1. WINSLOW. n. 496.

(u) CASSEBOHM n. 68. MERY de l'oreille p. 423. add. RIOLAN. Isag. tract. p. 100.

(x) DUVERNEY T. 4. D.

(x\*) Vide CASSEBOHM tab. I. f. 2.



Cartilaginea portio accedit in parte meatus totius inferiori. Ea aliquid cum anulis asperæ arteriæ commune habet, qua vel ex larynge nascitur, vel in secessione ramorum pulmonalium difformius dividitur. In perfectioribus exemplis hoc modo reperi.

Ex trago ( $y$ ), quem incisura semilunaris interrumpit, retrorsum recurrente, fit lamina parallelogramma, imperfecta, quæ proximæ cartilagini se adjungit ( $y^*$ ). Ea, late a conchæ fine nata ( $y^{**}$ ), inferior in meatu, minor, & minus lata, undulata, gracilescit, ut a concha recedit. Anterius aliquando in lingulam procurrit ( $y†$ ), quæ sub trago se subducit, huic, & anulo intimo interjecta.

Eadem ex unione cum ea, quam primam dixi, ipsa posterius & tragus antè, cartilaginem generat tertiam ( $y††$ ), inferiorem bifurcatam, processu ad imum mamillarem educto auctam, ultimam & tympano proximam.

Inter eas cartilagines membranacea portio intercedit, ut sint *incisuræ* duæ ( $z$ ) prima inter tragus, & processum conchæ ( $a$ ). Altera inter anulum communem, & tertium ( $a^*$ ).

Nunc a mediâ cartilagine in tertiam transeunt fibræ musculosæ, minime obscuræ, quæ duos anulos conjungunt, & agendo meatus auditorii partem mollem minorem, elasticamque majorem faciunt. Est *musculus incisuræ majoris* SANTORINI ( $b$ ), quem ALBINUS & MORGAGNUS ( $c$ ) omiserunt. Vidit etiam ex fide codicis nostri M. S. præstantissimus CASSEBOHMIUS, & vidi aliquoties.

#### §. VIII. *Meatus auditorius osseus.*

Universus meatus auditorius osseus ex terete compressus est, introrsum inclinatus, & paulum antrosum, & qua ex concha incipit amplior ( $d$ ), &

( $y$ ) TARIN l. c. f. 3. DUVERNEY t. 3. f. 1. a C. per B. ad 2.

( $y^*$ ) ALBIN. t. XI. f. 3. 5. DUVERNEY prope 2.

( $y^{**}$ ) ALBIN. ibid. DUVERNEY inter 2. & 3.

( $y†$ ) DUVERNEY. l. c. f. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

( $y††$ ) DUVERNEY 3.

( $z$ ) Varietates incisuræ primæ habet MORGAGNI *Epist.* IV. n. 10. p. 75. tum VALSALVA n. 10. p. 10. Duas tamen facit, tum MERY t. 1. f. A. f. f. Duas aut tres WINSLOW n. 369.

( $a$ ) TARIN l. c. q. ALBIN l. c. DUVERNEY 2.

( $a^*$ ) ALBIN. ib. DUVERNEY supra 3.

( $b$ ) n. 8. t. 1. 9. t. 3. f. 4. e. obscure. Breviter WALTHER f. cit. 9. & n. 9. *Museus meatus auditorii* DOUGLAS p. 29.

( $c$ ) L. c. p. 76.

( $d$ ) WINSLOW ib. VIEUSSENS p. 15.



& qua ad tympani membranam (*e*) adaptatur. In medio angustior, flectitur (*f*), & qui ex principio suo paulum adscendebat, nunc rectius antrotrorsum fertur (*g*).

Denique finitur oblique truncatus, & anterieus & inferius longius procurrit (*h*); posterius & superius brevius terminatur, ut sectionem habeat, quæ cum canali ipso angulum obliquum intercipiat (*i*).

Omnia animalia aliquem meatum auditorium habent, etiam cete (*k*), pisces (*l*), quadrupeda ovipara (*m*); longiorem tamen calida quadrupeda. In cetis (*o*), & in universum in piscibus (*p*), aurium foramina sive meatus auditorii ostia angustissima sunt; serpentibus (*q*), & lacertis cute teguntur (*r*), & sunt quasi clausa.

Ejus nunc auditorii meatus osseam laminam diximus, & cartilagineos anulos. His demolitis canalis membranaceus superest, quem cutis vera constituit, etiam pilorum ad medium usque meatum (*s*) ferax, vehementissimi sensus, ut dolores aurium & ægre tolerantur (*s\**), & facile mentem emoveant (*t*). Sed etiam Chineses inter præcipuas voluptates vitæ humanæ numerant titillationem, quam proprio instrumento in gyrum acto in aure excitant (*u*). Causa acerrimi sensus in tenuitate epidermidis esse videtur. Introrsum cutis gracilior fit, & demum ita te-

B b 3

nuis

(*e*) Ibid.

(*f*) WINSLOW *Expos.* T. I. n. 495. VALSALVA *tab.* 3. f. 1. 3. t. 7. f. 5. *tab.* 10. f. 1. 2. p. 9. VIEUSSENS p. 15. DUVERNEY *postb.* p. 174.

(*g*) VALSALVA *ibid.* VIEUSSENS p. 15. Descendere PERRAULT p. 194. MERY p. 412. LAMY *ame sensit* p. 59. Is descensus est a parte inferiori longius producta.

(*h*) DUVERNEY t. 4. f. 1. 2. WINSLOW n. 496. VALSALVA p. 9.

(*i*) DUVERNEY *ibid.*

(*k*) Angustissimum quidem FABER ad HERNANDEZ p. 825. KLEIN *mantiss.* p. 19. BARTHOLIN. *Cent.* II. *Hist.* 25. In Phoca RONDELET p. 50 454.

(*l*) RONDELET *ib.* DUVERNEY *anc. mem.* I. p. 280.

(*m*) *Mem. des savans étrang.* T. II. p. 191. [ & de Crocodilo PARISINI ]. Alius in palato meatus est prope articulationem maxillæ inferioris VALISNER *oper.* T. II. p. 197.

(*o*) Turfis BARTHOLIN. *Cent.* I. *hist.* 25. phoca RONDELET p. 50. FABER ad HERNANDEZ p. 825. In universum KLEIN *mantiss.* p. 19.

(*p*) RONDELET l. c.

(*q*) CHARAS *de la vipère* p. 13.

(*r*) PERRAULT *Essays* T. III. p. 63. In testudine, chamæleonte; etiam in talpa IDEM.

(*s*) VALSALVA p. 11.

(*s\**) A blatta in meatum irrepente KALM T. II. p. 561.

(*t*) Magna inde symptomata & brachii stupor HILDAN *Cent.* I. *obs.* 4. A vermibus pene infania *Journ. de Med.* 1758. febr. *Eph. Nat. Cur.* Dec. I ann. 6. 7. *obs.* 82. Inde convulsio *Journ.* *ib.* Aug. ACCELL. *Händels* p. 99. 100. Verrigo a musca, & quasi ebrietas BINNINGER L. IV n. 81. Juvenes facile ex otalgia pereunt *Alex.* TRALLIAN L. III. c. 2.

(*u*) *Phil. trans.* n. 246.



nuis, ut ipsa cuticula tenuior sit, eademque membranam tympani obducit ( $\alpha$ ).

Hanc cutem intus epidermis velat, quæ cum sebo collecto & adhærente penitus cohærens in fetu ( $\gamma$ ) propriam pulposam ( $\gamma^*$ ) membranam efficit, quam nonnulli pro muco ( $z$ ) habuerunt, & quæ tympani membranam oblinat. Rugis enim, ut reliqua epidermis exaratur, & cum ea continuatur ( $a$ ). Est ubi aures in recens natis pueris omnino imperforatæ sunt ( $b$ ). Eadem membrana crassior facta ( $c$ ), surditatem fecit, ut pelliculæ de ea detractæ ( $d$ ), aut ipsa tota sublata, morbo finem fecerit ( $d^*$ ).

### §. IX. Glandulæ ceruminosæ.

Exterior superficies cutis, ut alibi in humano corpore, circumpositam habet telam cellulosam ( $e$ ), hic macram, in alveolos ( $f$ ) utcumque rhomboideos ordinatam.

In areis horum alveolorum glandulæ ( $g$ ) sedent, rotundæ & ovales ( $h$ ), ex flavis fuscæ, firma factæ membranæ, quæ & in nuda parte membranosa ( $i$ ) conspicuæ adparent, & in incisuris, & in parte anteriori meatus ossei

( $\alpha$ ) WINSLOW n. 394. BOEHMER *osteolog.* p. 84.

( $\gamma$ ) DUVERNEY *tab.* 15. f. 9. DRAKE T. II. p. 38. HOFMANN *idea pathol.* p. 233. GORTER *Chir.* n. 945. 969. KERKRING *Osteogen.* c. 5. RUYSCH *Tbes Anat.* III. n. 76. & prius *Ep.* VIII. WALTHER *membran. tympan.* p. 18 19. TREW *Eph. Nat. Cur.* Vol. II. obs. 56. *Commerc. Litt. Nor.* 1731. *Spec.* 2. p. 13.

( $\gamma^*$ ) VALSALVA p. 13.

( $z$ ) MUCUS CHESELDEN WELSCH *de sono* n. 15. NESBIT p. 70. *Toile mucilagineuse très épaisse* WINSLOW. Sic DUVERNEY *Gelatina* SCHELHAMMER p. 191. Mucus amnii BOEHMER *osteol.* p. 86.

( $a$ ) Pro epidermide agnovit KERKRINGIUS & TREWIUS, & VERDIER T. II. p. 5. tum MONRO *Ed.* III. p. 117. NESBIT p. 70. BOEHMER p. 84. & RUYSCHIUS, & MORGAGNUS *Ep.* V. p. 87. & CASSEBOHM p. 31. n. 77. [nempe pro vero simili opinione].

( $b$ ) DIONIS *cours. d'Anat.* p. 431.

( $c$ ) FABRIC. P. I. l. c. 4. p. 4. *Chir. oper. de aur.* Chir.

( $d$ ) SCHROETER *de auditu* p. 8. 9.

( $d^*$ ) DRAKE L. III. c. 12.

( $e$ ) Carneæ fibras vocat VALSALVA p. 12. Hinc emphysema ex ulcere meatus auditorii ASTRUC *des tûm.* II. p. 233.

( $f$ ) VALS. t. 3. f. 3.

( $g$ ) VIEUSSSENS p. 14. VALSALV. t. 3. f. 3. BOERHAAVE *de fabr. glandul.* DUVERNEY p. 7.

( $h$ ) Has plures esse VALSALV. p. 12. Rotundas facit DUVERNEY t. 3. f. 2. 3. 4.

( $i$ ) DUVERNEY *ibid.* p. 2.



offei (*i*\*) & in portione cartilaginea. Inventor est STENONIUS (*k*), deinde etiam DRELINCOURTIUS habet (*l*).

Ex quaque glandula ductus exit brevis (*l*\*), cylindricus, qui perforata cute & epidermide in cavum tubum meatus auditorii aperitur.

Ex iis glandulis succus flavus, oleo tenui similis (*m*), effunditur, qui in meatu, calido loco, & aeri accessu, abit in unguinis flavam speciem, amarissimam, in igne ardentem (*n*), *Cerumen* vocant. Id stagnans, collectum, sæpissime in cylindros solidos figuratur (*o*), quæ meatum auditorium obstruunt, & vulgo surdos (*o*\*) faciunt, aut surdastrors, quos facile sapone in aqua dissoluto, & in meatum auditorium injecto, sanes, ut sæpe vidi (*p*). Morituris passim legimus cerumen dulce fieri (*q*).

Creditur cerumen & inviscare insecta, maximo tormini futura, & nimis fortium sonorum violentiam frangere (*r*). Deinde, ut alibi sebum, cutem ab aeris violentia defendit, mollemque servat & sensilem (*s*). Eadem utilitas est mucosæ in fetu membranæ (*s*\*).

Aves nullum habent cerumen, sed animalia, quibus meatus auditorius longus est (*t*).

Glandulæ TRAGI (*u*) sunt de genere conglobatarum, quales plurimæ per parotidem glandulam disperguntur.

§. X. *Anulus, qui membranam tympani continet.*

In fetu proprium ossiculum est, quod facile a reliquis ossis petrosi partibus

(*i*\*) Ad medium MORGAGN. *Epist.* p. 147.

(*k*) *De glandul. oris* p. 87.

(*l*) *Prelud. Anat.* p. 197. & PERRAULT *tr. du bruit.* p. 191.

(*l*\*) DUVERNEY p. 7 8. VIEUSSSENS p. 15. add. KAAUW n. 238.

§ *m*) BOERHAAVE *de fabr. glandul.* p. 8.

(*n*) IDEM, *ibid.* Spumam sanguinis dissolvere ex vena missi du HAMEL *corp. anim.* L. II. c. 4. Cum castoreo comparat PECHLINUS.

(*o*) VALSALVA p. 12. DUVERNEY p. 72. 157. PECHLIN. *obs.* L. II. c. 46.

(*o*\*) IDEM. KENNEDY *ophthalm.* p. 103.

(*p*) PECHLIN. *ibid.*

(*q*) *Eph. Nat. Cur.* Dec. II. ann. 3. *obs.* 91. LISTER p. 370. ex GALENO.

(*r*) BOURGELAT *hippiatr.* L. II. P. 2. p. 211.

(*s*) IDEM *ibid.* p. 209.

(*s*\*) GORTER l. c.

(*t*) DERHAM l. c. p. 121.

(*u*) VALSALVA t. I. f. 1.



tibus separe. Id ( $x$ ) in universum ovale ( $y$ ), anulique simile, fulco ( $z$ ) exsculpitur, in quem membrana tympani adaptatur.

Accessorios processulos exigit ( $a$ ) idem in exteriori superficie, cui meatus auditorius adhæret. Superius deliquium ( $b$ ) habet, in quo anuli ossei pars deficit, & quæ deliquio vicinissima est, ea antè in processum difformem abit, qui & ipse suum sulcum habet ( $d$ ) inscriptum, & ad radicem zygomaticis firmiter adnascitur. Pars anuli huic opposita, posterior ( $e$ ), in gracilitatem adtenuatur, & sinui inter radices processus mamillaris adhæret.

Per ætatem is anulus cum reliquo osse petroso coalescit & confunditur, & una membrana tympani ab osseo fulco firmiter comprehenditur ( $f$ ).

### §. XI. Membrana Tympani.

Rectius hoc modo, quam *Tympanum* ( $g$ ) dicitur, & analogia cum ipsa re verior ita jubet.

Membrana in universum ovalis ( $h$ ), tamen ut processum ( $h^*$ ) in deliquium anuli superiorem emittat, in fetu magis conspicuum & longiusculum, ad perpendiculum longior, obliqua, ita disponitur, ut antrorsum descendat, & cum parte superiori auditorii meatus angulum obtusum, cum inferiori acutum ( $i$ ) intercipiat. Ita nempe in adulto homine, nam fetui, uti rotundior membrana ( $k$ ) ita magis plana & horizontalis est. Planum non tenet rectilineum, & duobus modis in convexitatem a malleo educitur & impellitur. Major quidem convexitas est in umbonis speciem, extrorsum

( $x$ ) ALBIN. *ic. off. fet.* 16. 17. CASSEBOHM t. 2. f. 5. 6. t. 3. f. 21. 22. 23. p. 24. 25. quem lege DUVERNEY *tab.* 15. f. 4.

( $y$ ) Fetui rotundior, puero adultiori ovalis.

( $z$ ) ALBIN f. 17 g. CASSEBOHM e. e. DUVERNEY l. c.

( $a$ ) MERY F. O. In nuper nato homine postè jam aliquos vidi processus.

( $b$ ) ALBIN f. 16. 17. a. b. c. CASSEBOHM a. b.

( $d$ ) CASSEBOHM t. 1. f. 5. 6. ALBIN. *Adnot.* L. IV. t. 6. f. 6. ad e.

( $e$ ) ALBIN h. CASSEBOHM c.

( $f$ ) CASSEBOHM p. 30. n. 73. BOEHMER t. 4. f. 2. 3.

( $g$ ) Dicebat ita EUSTACHIUS *de audit. organ.* p. 160. ed. 1561.

( $h$ ) Ita ubique CASSERIUS t. 9 & BOEHMER *tab.* 4. f. var & VALSALVA p. 17. t. 3. f. 1. t. 7. f. 5. t. 10. f. 1. 2. Nimis circularem facit DUVERNEY *tab.* 5. f. 1. & VIEUSSENS p. 18.

( $h^*$ ) Habet fere ALBINUS *Adnot.* L. IV. f. 1.

( $i$ ) VALSALVA p. 17. t. 3. f. 3. *tab.* 10. f. 1. 2. WINSLOW n. 394.

( $k$ ) WALTHER p. 19.



extrorsum cavi, ad tympani sedem introrsum convexi (*l*). Hæc umbo-  
nis species propius finem inferiorem est.

Minor (*m*) eminentia est, qua membrana, a processu brevi mallei, extror-  
sum leviter inpellitur, ut eo promineat, interius cava sit. Hæc superior  
est, & anterior.

In hac membrana non difficillime quatuor laminæ (*n*) distinguuntur,  
epidermis, quæ macerando secedit, cutis meatus auditorii, periosteum  
meatus auditorii, periosteum tympani (*o*). Inter secundam & tertiam  
conspicua cellulosa tela est (*p*), cum vasculis (*q*) illis elegantibus, ar-  
busculam referentibus; alia similis inter tertiam & quartam, inter quas (*r*)  
etiam processus mallei major est, sive manubrium. Duram membranam  
nisi per remotas aliquas conjunctiones eo non duxerim (*s*). Periosteum  
utrumque siccescendo in tensam, & squalentem membranam abit, cum in  
recente cadavere mollis sit & uvida (*t*). Qui duas tantum laminas (*u*)  
numerarunt, aut tres, ii vel cutem omiserunt ex eo numero, vel epi-  
dermidem. MORGAGNUS (*x*) etsi dissentire videtur, vere tamen eun-  
dem laminarum numerum habet; si viri ILL. sensa recta perceperis.

Cæterum in quadrupedibus (*y*), etiam frigidis plerisque, ut in testudine (*z*),  
serpente

(*l*) VALSALVA p. 17. MERY f. C. ad d. & p. 428. WINSLOW n. 393. 395.  
ALBIN. l. c.

(*m*) WINSLOW n. 393.

(*n*) Ita WINSLOW n. 394. CASSEBOHM p. 32. n. 78. BOEHMER *osteolog.* p. 84.

(*o*) NESBIT *osteog.* p. 69.

(*p*) ALBINO demonstrata tribuitur a Cl. PYLE *de auditu* p. 7. Habet etiam MON-  
RO *Eff. of a societ. at Edimb.* T. III. p. 117.

(*q*) MONRO *ibid.* Pinguntur a RUYSCHIO *Epist.* VIII. t. 9. f. 9. Vidit SCHELL-  
HAMMERUS c. 3. n. 3.

(*r*) LIEUTAUD p. 144. An *duplicatura* WINSLOWO dicta n. 395.

(*s*) VALSALVA p. 18. A pericranio VIEUSSENS p. 16. 17. SCHNEIDER *eff.*  
*temp.* GEASER *de cerebr.* p. 71. KENNEDY p. 48. 100.

(*t*) CASSEBOHM p. 31. n. 75. 76.

(*u*) VALSALVA. VIEUSSENS. WALTHER. RUYSCH *Theff.* III. *aff.* 2. n. 36.  
Tres habet *Epist.* VIII. p. 10. & *Mus. petrop.* T. I. p. 70.

(*x*) *Epistol.* V. n. 10. II. tum LIEUTAUD p. 144.

(*y*) In hystrice jam ALDROVANDUS *paralip.* p. 178. Vidi in fele, ove, aliis

(*z*) PARISINI. FEUILLER T. II. CALDESI p. 11. GAUTIER T. III.  
p. 390. PLUMIER *Journ. de Trév.* 1703. m. Aug.



serpente (a), crocodilo (b), lacerta (c), rana (d), in avibus (e); inque cetis (f) reperitur. Pisces frigidi non habent (g).

Membrana eadem vetusta res est, cognita HIPPOCRATICO auctori (g\*), & alteri, cujus opus ARISTOTELI tributum est (g\*\*). Sub prima tempora instauratæ anatomes CARPENSI innotuit, & ACHILLINO (g†). Duas fuisse & spatio distantes membranas, observationes exstant (h), nisi ex forte ad membranulas tympani pertinent: aut ad laminas nostræ membranæ diductas. In osseam naturam subinde abiit (i).

Cutem cum obductam habeat, sentit omnino. A scalpta tympani membrana tussis (k), & vomitus (l).

### §. XII. Foramen ejus membranæ.

Antiquior hæc via est, etsi vulgo RIVINO tribui solet. Dudum J. COLLE foramen tympani inter nuperos statuerat (m), Dudum J. Henricus GLASER scripserat (n) in vitulo anulum exiguum foramen relinquere inter membranam tympani, & auditorium meatum, eaque sede pericranium quidem advenire, ut membranam faciat, quam diximus, liquorem vero a tympano ad meatum auditorium transmitti, neque contra, adeoque videri in eo foramine valvulosam fabricam obtinere. Deinde

*Emæ-*

(a) *Memoir des Savans étrang.* T. II. p. 179.

(b) *Obs. de mathem. & physiq.* JESUIT SIAM p. 46. PARISINI. Duas dicit FEUILLLET *Journal de son Voyage* T. II. Duas etiam *Memoir. des sav. étrang.* p. 168.

(c) JACOBÆUS p. 39. In Chamæleonte habet VALISNERI T. II. p. 424. In majori lacerta umbonaram reperi. Salaman draenegatur *Mem. prés.* 185.

(d) DERHAM *Phys. theol.* p. 344. ex duabus laminis facta.

(e) Cartilaginea GEORROI *Mem. des Savans étrang.* T. II. p. 171. De vipera negat IDEM *Mem. prés.* 181. deque bufone p. 176.

(f) In balæna AMBERSON *Grönland* p. 192 in phoca HARTMANN p. 17.

(g) In raja *Memoir. des Savans étrang.* T. II. p. 187.

(g\*) Περὶ σαρκῶν n. 10.

(g\*\*) *Ug anat.* c. 54.

(g†) p. XV.

(h) KÖHLER apud LÖESEKE *Obs. Anat. Med. Chir.* p. 24. t. 2. f. 4. & pridem BUYTEN apud PLUMPIUM *fund. med.* p. 108. Communiter ita se habere in fetu ante quintum mensem NESBIT p. 71.

(i) LÖESEKE p. 25. POHL *de fibra senili* p. 16.

(k) CARROL. *Alphab. anat.* p. 74. PECHLIN. L. II. *obs.* 45.

(l) PECHLIN *ibid.*

(m) MAPPUS *de Ceruming.*

(n) *De cerebro* p. 71. 72.



*Emanuel KOENIG* (o) ab *AMMANNO* eam viam demonstratam esse scripsit, per quam pus in cephalalgia & aurium dolore, de auricula exeat.

Dudum enim in vulneribus capitis & cerebri saniem (p) vel pus (p\*), vel sanguinem (q) per aures exire adnotatum fuerat. Eademque via in apoplexia sanguinem prodire (r), inque stangulatis (s). Etiam aqua in cephalaea ea via exivit uberrime (t), vermesque per meatum auditorium in sinum frontalem venisse (u) legitur, & saporem amari olei, in eum meatum injecti, ad palatum penetravisse (x). Porro, quæ in aurem illapsa fuissent, sternutando ejici posse scriptum fuerat (y). Etiam *V. EUSSENIUS* (z) vapores meatui auditorio inmissos ad tympanum & labyrinthum subire viderat, & *RAVIUS* (a) argentum vivum per tubam *EUSTACHIANAM* infusum, quasi per corium, membranam tympani penetrare, & aquam tubæ injectam per eandem redire (b). Porro Philosophi vetustissimis temporibus capras per aures spirare scripserant (c), & hominem fuisse, qui spiritu suo plumulas auri admotas commoveret (d) legitur, & fuisse, qui ea via respirarent (e), aeremque compresso ore naribusque per aurem efflarent (f), unaque pus (g); nuperi de-

C c 2

mum

(o) *Regn. anim.* p. 163.

(p) *SAVIARD obs. 1. Comm. Nor. 1736. hist. 23. VAESALV. p. 20. G. V. SWIETEN p. 733. SCHRADER Dec. III. obs. 10.*

(p\*) *Hist. de l'Acad. 1754. n. 2.*

(q) *WEPFER apoplex p. 205. 299 VIGIER Chir. p. 169 VAESALV p. 20. BINNINGER C V. obs. 35 (cum tympanum plenum esset cerebro) HOMER med. judic. G. V. SWIETEN l. c.*

(r) *BINNINGER Cent. III. obs. i.*

(s) *LITTELL Histoir. de l'Acad. 1704. hist. 2. cum sanguis in cerebro effusus esset*

(t) *MARCELL. DONAT. hist. med. p. 229.*

(u) *Hist. de l'Acad. 1733. p. 16. Vermis in tuba, tympano, & labyrintho Journ. des Savans. 1692. n. 33.*

(x) *HILBAN. Nuz der Anat.*

(y) *RHAZES ad ALM. L. IX. c. 36. KULMUS p. 61.*

(z) *De l'oreille p. 30.*

(a) *Apud ERNDL. iter angl. Eat. p. 117.*

(b) *MANGET. Theatr. p. 388.*

(c) *Apud ARISTOTELEM hist. anim. L. I. c. II. PLIN L. VIII. c. 10. Confirmat de capra, & negat eas per nares spirare BRADLEY farmers direct. p. 174.*

(d) *PALFYN Osteol. L. II. c. 5.*

(e) *TULP. L. I. obs. 35. CHESLEDEN. L. IV. c. 5. p. 305.*

(f) *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. VI. VII. obs. 85. HILBAN. Nuz der Anat.*

(g) *VALSALVA p. 21.*



mun, fere a principio seculi XVI. ( *b* ), fumum tabaci ore haustum per aures efflari numerosi tradiderant, non absque recentissimorum scriptorum consensu ( *i* ).

Deinde accuratius RIVINUS ( *k* ) anno 1689. scribit, se invenisse foramen ad latus posterius fere supremi manubrii, prope caput mallei, sub tympani chorda; id sphinctere aliquo muniri ( *l* ), aut valvula ( *m* ), & adfusa aqua adparere ( *n* ). RIVINI porro foramen inter nuperos plurimi agnoverunt ( *o* ), aliqui etiam experimento adducti. Bis se vidisse auctor est Cl. MALOET ( *p* ), & aliquando, sed singulis fere in exemplis, alii Cl. viri ( *q* ) ajunt sibi occurrisse.

### §. XIII. Quæ contra id foramen dicantur.

Verum, rotundum, circumscriptum foramen in particula corporis humani non ampla, non poterat diu latere. Cum adeo ejusmodi nihil invenirent nuperi Cl. ANATOMICI, rejecerunt inventum, fere eo firmitus, quo quisque erat peritior, negaruntque ejusmodi foramen aut in fetu reperiri, aut in adulto homine. Primi fere collegæ RIVINI ( )

novum

*b*) HIEDAN. *Cent.* III. *obs.* 2.3. COLLER. C. LINDEN *Med. Physiol.* p. 523. VESLING. p. 21. SCHNEIDER *de off. temp.* SCHEER. *de audit.* p. 256. add. MAPPUM I. C.

( *i* ) PLUMIER *Mém. de Trév.* 1703 m. Aug. p. 119. VITALI *dialogh.* IV. p. 103. MILWARD *in Tralliano revivisc.* p. 58. COWPER *append.* f. 8. CHESSELDEN p. 105.

( *k* ) Post *diff. de auditus vitiis* Ic. I. 2.

( *l* ) RIVIN *ibid.*

( *m* ) ALL. TEICHMEYERUS *socer noster, discipulus RIVINI anthropol.* p. 221. *Vindic. Anat.* p. 25. f. 7. Similia habet HAMBERGER *physiol.* p. 565. CHESSELDEN I. C. Non admittere introsum setam MUNNICKS I. C.

( *n* ) RIVIN. *ibid.*

( *o* ) MUNNICKS *de re anatom.* p. 195. WELSCH T. 59. KULMUS p. 61. COWPER I. C. DRAPER p. 567. DISDIER *splanchnolog.* T. II. p. 205. HOFMANN *de auditu* (in vitulis), MAZINUS *Inst.* p. 121.

( *p* ) *Histoire de l'Acad.* 1733. p. 36.

( *q* ) VALSALVA *prope processum brevissimum* p. 19. RESPINGER *thes. anat. bot.* LEPROTTUS *Comm. Bonon.* T. I. p. 350. NICOLAI *Dec. obs.* n. 11. eodem loco, ubi VALSALVA. LORSEKER p. 75.

( *r* ) J. Guil. PAULI *pref. ad J. v. HORNE microcos.* Martinus NABOTH *organ. audit.* n. 10.



novum meatum refutarunt, deinde alii, & eo ævo (s), & nostro viri Cl. (t).

Experimenta etiam protulerunt, Argentum vivum infusum meatui tympanum subire negarunt (u).

Fumum tabaci per aures emitti ad fraudes retulit, qui accurate in ea quæstione veratus est, Salvator (x) MORAND, negavitque eum promissum fumi com meatum Bernoulli aut a peritissimis viris potuisse conspici MORGAGNUS, aut a se ipso (y).

Denique omnium primus M. Aurelius SEVERINUS (z) aut pus, aut aerem per foramen aliquod tympani prodire negavit, & par fuit SCHNEIDERI judicium.

Quare si quando in cerebri malis eam viam sanguis legit, potuit is per foramina & vias præter naturam natas prodire, ut in variis exemplis certum est, potuit os petrosum cariosum (a) aut fractum (b) fuisse, fissumve (c), & ipsa tympani membrana rupta (d). Ruptam etiam fuisse, quando vere tabaci fumus per aurem exit, vetusta est insignis viri suspicio (e). Ulcere erosa fuerat in exemplo, quod WALTHERUS vidit (f), maleque audivit homo, in quo LEPROTTUS foramen viderat.

Denique non absque exemplo fuerit, aut hiatus anuli non penitus perfici, aut ea forte sede, qua tympani chorda subit (g), & qua exit musculus longissimus mallei, aliquam intercapedinem superfuisse: alio quidem, quam in RIVINIANA descriptione loco.

C c 3

§. XIV.

(s) DERRHAM *physic theol.* p. 124. *Fridericus RUYSCH Thes.* II. aff. 6. n. 4. *Thes.* VI. n. 1. 4. *Thes.* VIII. n. 6. HEISTER *Compend anat.* n. 6. CASSEBOHM *Tr.* III. n. 80. NESBIT p. 70. WALTHER n. 17. 18. 19.

(t) Jos. BENEVENTUS *de epidemica febre Domini Luccensis* p. 27. FLURANT II. p. 483. B. S. ALBINUS apud de la CONSEILLERE *de audit.* BOEHMER *Osteogr.* p. 87. GORTER *Chirurg.* n. 105. & imprimis III. MORGAGNUS *Epist.* V. n. 14. 15. 16.

(u) PAULI L. C. NATHOLIC MORGAGNUS p. 95.

(x) Apud NOLLE *Leçons de Phys.* T. III. p. 450.

(y) p. 94. 95.

(z) *Noviss. obs. abscess.* c. 15.

(a) *Hist. de l'Acad.* 1754.

(b) HOME *med. fast.* p. 179.

(c) FABRICIUS *Syngraph* p. 46.

(d) SCHNEIDER *de catarib.* L. III. p. 403.

(e) IDEM *ibid.*

(f) n. 13.

(g) BOERHAAVE *prælect.* p. 427.



§. XIV. *Tympanum.*

A similitudine nomen habet a FALLOPIO (*b*) impositum, & a BOERHAAVIO (*i*) confirmatum.

Cavum est in temporum osse petroso insculptum, utcunque rotundum (*k*), tamen ab anterioribus ad posteriora latius, quam a superioribus ad inferiora, superius etiam longius, brevius inferius (*l*): Superne imminens squama ossis petrosi pene extrema tympanum protegit, & posterior.

Interior adjacet labyrinthus, cujus vestibulum, ad promontorii modum, inter duas fenestras, in tympani pene medium cavum, rotunde eminet (*m*).

Posterior adfidet, & vix continuatur, processus mammillaris cellula (*n*).

Anterius superius tuba ossea in tympanum aperitur (*o*).

Sub tuba canalis est, per quem carotis arteria subit (*p*), eaque sede, tum superiori, & posteriori, tympanum totum cellulis, areolis, & trabeculis asperum est (*q*). Inter duas etiam fenestras, posteriori loco, non raram est, promontorium una trabecula ossea, aut etiam duabus, aut cum processu mammillari conjungi, aut cum stapedis pyramide (*r*).

Officula in tympano superiorem (*s*) exteriorem sedem tenent; internam, & secundum altitudinem mediam stapes (*t*) cum ovali fenestra (*u*); promontorium inferiorem posteriorem (*x*), imam fenestra rotunda (*y*).

Totum

(*b*) *Observ.* p. 24. b.

(*i*) I. R. M. n. 554. BARTHOLINUS *in anat.* &c.

(*k*) Hemisphaericam WINSLOW T. I. n. 499. Nimis rotundam pingit DUVERNEY t. 6. f. 1. t. 8. f. 1. 2.

(*l*) CASSEBOHM n. 85.

(*m*) ALBIN f. 3. b. f. 4. d. DUVERNEY t. 8. f. 1. B. CASSEBOHM tab. 2. f. 3. t. f. 4. o. Jam habet VESALIUS *exam obs. fall.* p. 25. & PLATER p. 32.

(*n*) WINSLOW n. 502. CASSEBOHM n. 92.

(*o*) WINSLOW n. 503. DUVERNEY tab. 6. f. 1. H. tab. 7. f. 2. T. tab. 8. f. 1. 2. tab. 9. f. 1.

(*p*) CASSEBOHM t. 3. f. 23.

(*q*) Vide MORGAGN. *Epist.* 7. n. 6. p. 179. 180.

(*r*) WINSLOW l. n. 500. CASSEBOHM n. 98. Tab. I. f. 1. 2.

(*s*) ALBIN. f. 2. CASSEBOHM t. 2. f. 6. tab. 3. f. 23. DUVERNEY t. 7. f. 1.

(*t*) ALBIN. *ibid.*

(*u*) CASSEBOHM tab. 2. f. 3. 4. tab. 3. f. 23.

(*x*) CASSEBOHM t. 3. f. 22. 23. WINSLOW n. 500.

(*y*) ALBIN. CASSEBOHM *ibid.*



Totum cavum a periosteo (z) obducitur, quod vasculis pingitur (z\*), & sponte adparentibus, & quando trunci repleti fuerunt; idemque cum faucium (a) membrana per tubam EUSTACHII subeunte continuatur, inde cum dura membrana cerebri (b). Idem periosteum in ossicula se diffundit, & ea operit (c).

In fetu fere tympanum aqua rubella (d) viscida plenum reperitur: in adulto homine non infrequenter muco (d\*).

### §. XV. *Malleus.*

In animalibus & quadrupedibus (e), & marinis (f) calidi sanguinis tria fere majora ossicula tympano continentur, & quartum minus. In avibus eorum ossiculorum loco fere unicum est (g), & in frigidis quadrupedibus nonnullis testudine (h), lacerta (h\*), chamæleonte (i), serpente (k), vipera (l), bufone (m), satis simile illi avium. Id unicum ossiculum, si placuerit, etiam pro duobus haberi potest, & ita factum est, ut in aliis frigidis quadrupedibus duo ossicula numerentur, ut

(z) PERRAULT *du bruit* p. 198. CASSEBOHM n. 102. MORGAGN. *Epist.* VI. n. 46. DUVERNEY *tab.* 9. f. 1.

(z\*) DUVERNEY in *icone posth.* p. 175. In cane adeo magna vascula sunt, ut sanguis ex iis fractis effusus caveam repleverit PERRAULT p. 199.

(a) CASSEBOHM n. 102.

(b) IDEM *ibid.*

(c) IDEM *ibid.*

(d) MORGAGNUS *Epistol.* 7. n. 15. p. 191. 195. GORTER *Chirurg.* I. n. 969.

(d\*) In pueris H. FABRICIUS *de aure* L. 3. c. XI. p. 37. Pure saepe plenum est DUVERNEY p. 184.

(e) Simia malleum habet SCHNEIDER *os temp.* Le CAT p. 278. Elephas BLAIR *Phil. transf.* n. 358. Camelus *Comm. Petrop.* T. X. p. 355. Equus CASSER t. XI. Virulus ROLFINK p. 285. Ovis CASSERIUS *ibid.* Canis *ibid.* Felis *ibid.* Lepus *ibid.* Porcus *ibid.* Leo SCHNEIDER *os temp.* Mustela PEYER *obs.* p. 61. Talpa DERHAM p. 117. Mus *länner* BARTHOLIN. *Cent.* II. h. 73. Mus vulgaris CASSERIUS *ibid.*

(f) Phoca HARTMANN *anat. phoc.* p. 17. add. RONDELET p. 454. Turfis KLEIN T. V.

(g) BIRCH T. IV. p. 273. *Phil. transf.* n. 199. PERRAULT *du bruit.* *tab.* 8. f. 2. SALZMANN *obs.* 12. PEYER *obs.* p. 45. 50. in gallo, in gallo indico, noctua, corvo &c. Duo ossicula facit DERHAM p. 343. 344. & in oto ALDROVANDUS *ornithol.* T. I. p. 526. 527.

(h) PLUMIER *Mém. de Trév.* 1703. m. Aug. PARIS. FEUILLERE. CALDESI p. 11. 12. GAUTIER T. III. p. 390. 391.

(h\*) Ossiculum ramosum reperio, sine bicorni, longa cylindro sustinente laminam ovalem.

(i) VALISNER T. II. p. 424.

(k) *Mém. des savans étrang.* T. II. p. 185. duo tamen habet ossicula.

(l) *Ibid.* p. 181.

(m) *Ibid.* p. 177. t. 2.



ut in lacerta (*n*), crocodilo (*o*), rana (*p*), colubre (*p*<sup>\*</sup>); omnino denique absque officulo salamandra est (*q*). Ea fere ei, quæ in avibua forma est, ut ex gracili petiolo in amplitudinem fibrosam dilatetur, & adhæreat ovali fenestræ, altera, ramosa, fere tympani membranæ (*m*<sup>\*</sup>).

Eadem est piscium frigidorum natura. Variis enim officulis carent (*r*), calculorum vero duo (*s*), vel tria (*t*) paria in proprio cavo habent (*u*), alio omnino modo facta, quæ tamen Clar. viri pro officulis auditus recensent (*x*).

Quadrupedibus vera ossicula sunt, suo donata periosteo (*y*), intus subtiliter cellulosa. In modo nato homine perfecte jam formata sunt (*z*), & in pullo æque ac in equo grandia (*z*<sup>\*</sup>).

Id ossiculum, quod tympani membranæ adhæret, & nonnullis animalibus unicum est, uti dixi, id *mallei* nomen a crassiori capite accepit; quod superius est. Circa ultimam partem seculi XV. innotuit (*a*), non quidem inventore *Jacobo BERENGARIO* Carpenfi, sed teste (*b*). In homine nescio quomodo & ipsum, & reliqua ossicula auditus, concinniori, quam in bestiis figura esse reperio.

Longum ossiculum, pene ad perpendicularum suspenditur, ut tamen obliquitatem membranæ sequatur, in anuli deliquio positum, secundum plus quam

(*m*<sup>\*</sup>) PERRAULT l. c.

(*n*) *Mém. des savans étrang. tab. I. p. 168. 169. GAUTIER l. c. PLUMIER l. c.*

(*o*) PARISINI.

(*p*) *Mém. des savans étrang. p. 171. 172. JACOBÆUS p. 79. & COITER p. 120.*

(*p*<sup>\*</sup>) *Mem. & op. 185. alterum ossiculum avium simile, tum in cæcilia ibid. p. 179.*

(*q*) *Ibid. t. 2. p. p. 185.*

(*r*) *In Raja ibid p. 187.*

(*s*) RICHTER. CHARLETON. SCHÆFFER *pisc. bavar. p. 27. in capsula peculiari.*

(*t*) KLEIN.

(*u*) RONDELET p. 26. LINDEN *select. p. 412. LOCHNER ad BESLER gæzophylac. p. 107. RICHTER. ichtbyolog p. 155. [duo paria] SACHS *gammamol. p. 308. Act. Litt. Suec. 1725. p. 64. SEVERIN. antiperipat. p. 95.**

(*x*) KLEIN *miss. I. RICHTER. CHARLETON mantiss. p. 81.*

(*y*) *Epist. VIII. t. 9. SCHMIDT de periost. org. audit. FABRIC. anat. præf. p. 20. MULLER de ancylofi. CASSEBOHMIO cur tribuit J. GLASS. inflavum off. p. 257. In Camelo Mus. Petrop. l. c. Negaverat olim periosteum esse in iis ossiculis DUVERNEY, & VALSALVA, & GOUVEY.*

(*z*) RUYSCH *mus. p. 106.*

(*z*<sup>\*</sup>) BOURGELAT T. II. n. 2. p. 224.

(*a*) MASSA *Epistol. V. p. 556. nempe malleus & incus ACHILLINI tempore inventi sunt. ACHILLINUS ipse non habet p. XV.*

(*b*) *In MUNDINUM p. CCCCLXXVII. Isag. anat. p. 60.*



quam mediam partem longitudinis membranæ tympani, cui longo manubrio adhæret (c).

Pars superior crassa, capiti similis, antèrè pene sphærica, levis, ponitur in ossis petrosi recessu (d), proxime finem crassiorè anuli. Ad posteriora exigua parte sui articularibus duabus lineis in medio eminentibus (e) medioque sulco antrorsum latiori, posterius planiori, oblique divisus percurritur, quæ omnia oblique antrorsum descendunt.

Sub capite angustior paulo cervix (f) est, quæ extrorsum brevem & crassiusculum firmumque processum emittit. Is membranam tympani impellit (g), inque tumorem extrorsum elevat.

Antrorsum vero & paulum deorsum ex eadem cervice processus longissimus, plerumque planus, cis finem in spathulæ speciem sæpe dilatatus, non semper ejusdem latitudinis & figuræ (h), sæpe falcatus (i), latior figuris, in sulcum (k) proprium subit anuli, alias enumeratum, hinc in crenam fini posteriori superiori tubæ EUSTACHIANÆ exterius insidentem.

Non nova res est, sed adumbrata a VESALIO (l), aque PLATERO (m); ab Hieronymo FABRICIO depicta (n), & magis de industria a Cæcilio FOLIO (o). Sed etiam VESLINGIUS hunc mallei processum depinxit (p), &

(c) ALBIN. L-IV. t. 2. f. 6. DUVERNEY t. 7. f. 1. NESBIT f. 15.

(d) CASSEBOHM t. 2. f. 6. DUVERNEY p. 21.

(e) DUVERNEY p. 21. t. 6. f. 3. 1. 2. 3. utrinque. MERY p. 431. BERTIN; T. IV. p. 324.

(f) CASSEBOHM n. 121.

(g) WINSLOW n. 516. DUVERNEY p. 21. BERTIN. p. 326.

(h) Rectus, sine solo curvulo NICHOLLS tab. 6. C. Rectus LOESEKE f. 1. t. 2. CASSEBOHM t. 2. f. 6. ALBIN. t. 2. f. 6. COWPER myolog. t. 26. f. 5. SUE t. 7. f. 8. BERTIN. p. 325. quantum videtur, BONHOMME t. 17. f. 7. 8. DUVERNEY postb. T. 12. f. 6. b.

(i) Ita FABRICIUS. FOLIUS de aure intern. f. 3. b. TARIN. t. 30. f. 1. MORGAGNUS p. 135. MEKEL t. 1. α. VESLING. SCHMIDT periost. & NESBIT p. 15. & fere etiam ALBIN. Ic. off. fet. f. 49. adnot. t. 1. f. 2. off. ic. t. XI. f. 30. 32. 33. CASSEBOHM t. 3. f. 5. 9. BOEHMER t. 4. f. 1. TARIN. t. 10. f. 5 h. CANT. fig. 5. 6. 7. 8. Quasi infractus ALBIN. Ic. off. fet. 46. TARIN. t. 10. f. 5. i. HEISTER t. 1. f. CHESLIDENT. 4. f. 3.

(k) CASSEBOHM n. 126. T. 2. f. 6. BOEHMER. ALBIN. t. 2. f. 6. WINSLOW n. 518. NESBIT osteogr. f. 7. a.

(l) L II. c. 8. fig. N.

(m) Processus elatior p. 33.

(n) De aure f. 16.

(o) De aure intern. f. 3. & apud BARTHOLINUM in Epist. p. 257. f. 7. t. 5.

(p) Syntagm. c. 8. t. 1. f. 6.



& Samuel COLLINS certe nominavit ( $p^*$ ); & inter nuperos prior fere RAVIUS ( $q$ ), a quo nomen habet.

Non difficillime præparatur, & servatur integer, ut tamen totum omitant ( $r$ ) alii, alii sola vestigia ( $s$ ) abrupti processus depingant, alii ILL. viri serius eum receperint ( $t$ ), & in ipsis RAVII officulis idem sæpe desit ( $u$ ). In senio nempe ad sulcum adhærescit ( $x$ ), & ad membranas, quæ musculi aliqui tendinem obvolvunt ( $x^*$ ).

Denique manubrium leniter introrsum descendit, inter laminae membranæ tympani, longe ad eam membranam, & super medium, firmatum, fineque extrorsum ( $y$ ) antrorsum curvulo ( $z$ ), & latiori denique, finitur ( $a$ ).

Celeriter offescit totus malleus, vidi tamen in fetu processum brevem crassumque & manubrium cartilagineum, ut alias solum caput mallei offeum esset, alias præterea processus longissimus. Quare ex tendine induisse, atque in fibras potuisse dividi, ut tendo solet, non valde videtur probabile ( $b$ ).

#### §. XVI. Incus.

Incus cum malleo innotuerat, neque fere aliter fieri potuit, in tanta utriusque officuli vicinia. Cum dente molari non inepte comparatur, nisi duo crura aliquanto magis divaricata haberet.

Sedet

( $p^*$ ) p. 932. figuram quidem t. 12. f. 4. non reperio.

( $q$ ) Nempe apud discipulos, neque enim ipse de eo processu scripsit.

( $r$ ) Non habet DUVERNEY, nisi in posthumis voces eo trahas p. . . . *apophyse plus grele & plus deliée*, neque PERRAULT *du bruit*. t. 4. p. 207. PETIT ad PALFYN tab. 14. & PALFYN *van de beendern* t. 1. f. 3. Le CAT ad p. 276. VIEUSSENS t. 3. f. 1. RUYSCH *Epist.* t. 9. u. MERRY f. k.

( $s$ ) MinimUS VALSALV. p. 33.

( $t$ ) MORGAGN. *Epist.* VI. n. 16. 17. p. 135. 136.

( $u$ ) ALBIN. *Catalog musc.* p. 28. 29.

( $x$ ) CASSEBOHM n. 126. MORGAGNUS p. 136. BOEHMER p. 94. 95.

( $x^*$ ) WALTHER *anat. musc. ten.* p. 616.

( $y$ ) MORGAGN. *Epist.* VI. n. 9 p. 124. Antrorsum CASSEBOHM n. 127 t. 2. f. 6. BOEHMER t. 4. f. 1. ALBIN. t. 2. f. 6. DUVERNEY t. 7. f. 1. NESBIT f. 8.

( $z$ ) NICHOLIS. SUB. BERTIN. p. 327.

( $a$ ) Bifidum MERRY k.

( $b$ ) HEISTER l. c. p. 160.



Sedet in tympani universi parte superiori, exteriori, posteriori (c). Pars latior, similis coronæ dentis, exsculpitur, & sulco medio dividitur, in partem superiorem & inferiorem, utramque linea curvula depressam (d), medioque jugo eminente divisam, quibus lineis antrorsum converfis cum malleo committitur, non sine tenera in utroque officulo cartilaginea crusta, & ejusmodi capsula articulari, qualem officulorum exilitas admittit.

Ex hac latitudine in duo cruscula finditur. Brevius (e), solidius, conicum superiori linea oblique retrorsum descendit, inferiori ad horizontem parallelum est (f), & in apicem incisum sine fisso terminatur (g), atque in cellulam aliquam innititur, quales ibi plurimæ incipiunt in osse exsculpi, cumque cellulis mastoideis confundi (h). In fetu cartilagineum fuisse vidi.

Crus gracile, paulo longius, manubrio mallei pene parallelum, ad aliquam a tympani membrana distantiam (i) descendit, non quidem ad medium, sineque dilatato, introrsum curvulo (k) ab ea membrana introrsum avertitur, exigua fovea eo in fine exsculptum (l). Extremus hujus musculi finis convexus stapedem attingit (m), & ad eum minimo omnium articularum committitur.

In quadrupedibus calidis (n) incus reperitur, & in cetis (o), non perinde in reliquis classibus animalium.

D d 2

§. XVII.

(c) ALBIN. L. IV. t. 2. f. 6. & t. *musc.* XI. f. 28. 29. DUVERNEY *tab.* 6. f. 1. etc.

(d) MERY p. 431. ALBIN. p. 17. DUVERNEY t. 6. f. 2. p. 22. *postb.* p. 178. Conf. CASSEBOHM t. 3. f. 12. 13. Obscure inscribi BERTIN. p. 331.

(e) WINSLOW n. 511. &c.

(f) MERY f. k. NICHOLLS l. c. VALSALV. t. 3. f. 7. t. 10. f. 1. DUVERNEY t. 7. f. 1. t. 6. f. 1. MEKEL *ic.* CORTES *miscell.* f. 12 satis bene.

(g) CASSEBOHM n. 129. In adulto homine evanescere IDEM. Foramen habet ALBINUS f. 47.

(h) Mastoideæ cellulæ VALSALV. p. 28. in aditu MORG. *Epist.* VI. p. 153. DUVERNEY p. 23. WINSLOW n. 512.

(i) DUVERNEY t. 7. f. 1.

(k) BERTIN. p. 332. NESBIT f. 17. ALBIN. *Adnot.* L. IV. t. 1. f. 2. t. 2. f. 6. MEKEL. VALSALV. p. 28. DUVERNEY p. 23. SUE t. 7. f. 9. 9\*. CHESLDEN t. 4. f. 3. Nimis curvus BOEHMER t. 4. f. 1.

(l) WINSLOW n. 512. &c.

(m) RUYSCH *Epist.* VII. t. 9. f. 1. 2. 3.

(n) Elephas BLAIR *Phil. Transf.* n. 358. Bos CASSEB t. XI. Equus *ibid.* Ovis *ibid.* Porcus *ibid.* Canis *ibid.* Felis *ibid.* Talpa DERHAM p. 117. Lepus CASSEB. *ibid.* Mus BARTHOLIN. *Cent.* II. *Hist.* 73. CASSEB *ibid.*

(o) RONDELET p. 49.



§. XVII. *Stapes.*

Stapes ut minor est, ita serius innotuit, ejusque inventi decus æquitas jubet EUSTACHIO (*p*) tribuere. Etsi enim sibi vindicat *Realdus COLUMBUS* (*q*), & J. *Philippo INGRASSIAS* (*r*) tribuit *FALLOPIUS* (*s*), & *VESALIUS* (*s\**), tamen cum alia etiam in auditus organo invenerit *EUSTACHIUS*, nihil autem vel *COLUMBUS* vel *INGRASSIAS*, veri certe simile videtur, ab eo esse inventum, qui in his particulis rimandis diligentius versatus sit.

Id ossiculum in media fere, sed una posteriori, tympani sede ponitur super promontorium, ut fere horizonti parallelum (*t*) capitulo extrorsum respiciat, basi introrsum. Stapedem recentiorum, ignoratum Romanis equitum adminiculum, satis apte refert. Capitulum (*u*) rotundum, extrorsum modice cavum, recipit incudis longius crusculum.

Cruscula stapedis a vetustioribus Anatomicis fere nimis recta pinguntur (*x*), ut os triangulare fiat, aliter ac in vero stapede, cui curvula sunt, & eorum quidem, quod anterius, idem & brevius est & rectius, longius autem magisque curvum quod posterius (*y*). Utrumque, ut membranam innatam reciperet, sulco (*y\**) exaratur, qua quodque sodalium alterum respicit. Figura utique non semper eadem est (*y\*\**); vidi pene trian-

(*p*) *Organ. audit.* p. 154.

(*q*) *De re anat.* p. 27.

(*r*) *De ossibus* p. 7. & p. 52. f. 5. Ait se anno 1546. invenisse.

(*s*) *Obs anat.* p. 26.

(*s\**) *Exam. obs.* p. 24.

(*t*) *WINSLOW* n. 523. *ALBIN.* L. 4. t. 1. f. 2. t. 2. f. 6. & f. *musc.* t. XI. f. 28. 29. *DUVERNEY* t. 4. f. 9. 10. t. 6. f. 1.

(*u*) *DUVERNEY* L. 4. f. 5. *LINDEN phys. ref.* p. 527.

(*x*) Monente *MORGAGNO* ex brutis animalibus depinxerunt, ut *CASSERIUS Epist.* VI. p. 155. Sunt tamen & animalia, quibus rotunda stapedis crura sunt, ut *MUS BARTHOLIN.* Correxerit *CASSERIUS. PAREUS* L. V. c. 10. *PAVV. de off.* p. 54. & pridem *VIDIUS* p. 322. tum *PLATERUS* & *LINDEN* p. 527. & *RIOLANUS* p. 225.

(*y*) Etiam in icone *CASSERII, VRSLINGII* l. c. *RUYSCHII* t. 9. f. 3. *TARINI* t. 10. f. 7. *LOESEKE* t. 2. f. 1. *ALBINI* f. 48. 51. & apud *WINSLOW* p. 523. *MORGAGN. Epist.* VI. p. 157. Introrsum curva esse dudum de *MARCHETTIS* p. 225. Invertit. preli forte vitio, crurum rationes & discrimina *J. EXUPERIUS BERTIN.* t. IV. p. 339. & olim *CASSERIUS* t. XI.

(*y\**) *CASSERIUS* t. 26. f. 4. *VALSALV.* t. 3. f. 8. 9. 10. 11. *WINSLOW* p. 521. *BERTIN.* p. 340. *MANFREDUS. SUB. COWPER.*

(*y\*\**) Vide etiam *TARIN. ic.* & *MORGAGN.* p. 157.



triangularem stapedem, longis rectisque crurculis, vidi valde curvis rotundum, difformem.

*Basis* denique latior, ovata (*z*), extrorsum leniter ad tympani membranam cavula (*a*), ad fenestram ovalem convexa (*b*), ambitum superiorem habet, magis curvum, inferiorem rectiorem (*c*); solida cæterum, neque cribri similis lamina (*d*).

In sulcum proprium ossis petrosi recipitur, sibi aptatum, non absque mobilitate.

Totum cruribus stapedis, & basi & capite interceptum intervallum vasculosa membranula (*e*) in sulcos crurum innata obducitur, quam aliqui duplicem (*f*) cum spatio intermedio fecerunt, neque repugno, etsi id non vidi. Eam membranam in osseam naturam transiisse vidit vir Cl. (*f*<sup>\*</sup>).

In iisdem pariter animalibus (*g*) stapes reperitur, in quibus & incus. Avibus idem ossiculum & tympani membranæ adaptatur & fenestræ ovali. Cartilago est, cujus pars exterior triangulum refert, cavum, inæquale: ejus hypotenusa inter membranæ tympani laminas continetur, duo crura conveniunt in apice longioris pedicelli, cujus finis intimus inseritur in ovalem utrinque cavam laminam, quæ in foramen simile fenestræ ovalis adaptatur.

D d 3

§. XVIII.

(*z*) VALSALV. f. XI. DUVERNEY &c.

(*a*) Curvum J. v. d. LINDEN p. 527.

(*b*) MORGAGN. p. 160. VALSALVA p. 29. CASSEBOHM n. 130. BERTIN. p. 341. MERY p. 435.

(*c*) CASSEBOHM t. 3. f. 17. 18. 19. n. 130. ALBIN. t. 2. f. 6. BERTIN. p. 341. HEUCHER p. 536. Finem anteriorem crassiores esse BERTIN. p. 340.

(*d*) Ut COITER & MANFREDI. Negat VALSALVA p. 29. & MORGAGNUS. Perforatum esse, superne, inferne & transversim, sed ea foramina membrana claudi HERVARD *hippoteolog* p. 5.

(*e*) DUVERNEY ubique t. 5. f. 4. 6. 8. 9. & apud du HAMEL *corp anim* L. IV. c. 2. & *posth.* p. 178. MERY f. K. M. p. 436. VIRUSSENST. 3. BERTIN. p. 340. LAMY *ane sensit.* p. 64. MOLINETT. *diff.* p. 168. MANFREDUS in MANGETI *Bibl.* II. p. 273. DRELINCOURT in *prælud.* p. 199. MORGAGN. p. 162. PALFYN. l. c. COWPER, ADAMS *Phil. Trans* n. 311.

(*f*) MORGAGN. *Ep.* VI. n. 40. p. 161. 162. 163. TRICHMEYER *Anthrop.* p. 229. & prior COWPER apud DRAKE T. II. p. 334. t. 19. f. 3. ILL. etiam MORGAGNUS ex cruribus deducit.

(*f*<sup>\*</sup>) LOESKE p. 16.

(*g*) Elephas BLAIR l. c. animalia CASSERIANA jam citata: mus ibid. & apud BARTHOLINUM Talpa apud DERHAM, etiam simia RIO LANUS *osteol. sim.* p. 511.



§. XVIII. *Officulum subrotundum.*

*Officuli subrotundi* (*b*) aliqua vestigia apud ARANTIIUM (*i*) sagacitas MORGAGNI (*k*) invenit, cæterum vulgo *Francisco Sylvio* (*l*) de *le Boë* tribuitur, adeo minutum, ut non mirum sit, ultimum inter ossa corporis humani innotuisse.

Ovale est (*m*), utrinque leniter cavum (*n*), inpositum, hinc superficie interiori, paulum cavæ, cruris longioris incudis (*o*), inde capituli stapedis parti interiori, neque enim incudi interponitur (*p*) & stapedi. Verum & constans adest, etsi a nonnullis Cl. viris (*q*) non admittitur, neque est aut incudis (*r*) apophysis, aut stapedis (*s*). Eo enim remoto tamen subrotundum illud officulum incudi porro infidet; adhærescere autem per siccationem non recusaverim (*t*). Ideo credam pro epiphyssi habitum fuisse (*t*\*).

Præter hæc perpetua officula sunt nonnulla subinde a Cl. viris aut in homine reperta (*u*), aut certe in brutis animalibus. Primum rarius, in homine tamen visum est officulum, quasi sesamoides, malleum inter & incudem positum, ILL. olim socero nostro (*x*) dictum.

Deinde SCHELHAMMERUS (*y*, cum de auditus organo peculiari-  
ter scriberet, officulum dixit in musculo interno mallei, a nemine repe-  
titum,

(*b*) Lenticulare MERY p. 430. LAMY *sensit.* p. 66. Vulgo orbiculare.

(*i*) *Anat. obs.* c. 17.

(*k*) *Epist.* VI. n. 8. p. 122.

(*l*) Apud LINDANUM *Physiolog. ref.* p. 526. C. BARTHOLINUM *instit. anat.* p. 458. T. BARTHOLINUM *Anat. renov.* p. 714. VESLINGIUM *Syntagn.* p. 214. etsi ejus viri officulum credas ad aliud pertinere, de quo continuo dicemus.

(*m*) VALSALVA p. 28. MORGAGNI *Epist.* VI. n. 30. p. 154. *Scaphiforme* DUVERNEY t. 4. f. 5.

(*n*) Utrinque convexum dixit MERY l. c. quod etiam dici potest, ut tamen in convexitate sit vallecula. Tres processus LINDENII p. 527. nemo repetiit.

(*o*) ALBIN. *ic. off. fet.* f. 47 50. SUBT. 9. f. 9. 9\*. CASSEBOHM *tab.* 3. f. 13. b. VALSALVA t. 3 f. 7. R. MERY k.

(*p*) Ut LAMY l. c. MERY p. 430 CASSEBOHM n. 131. VALSALVA l. c. VERHEYEN. BERTIN. p. 334. DUVERNEY l. c. f. 4 5. TARIN. t. 10. f. 3. WINSLOW n. 524.

(*q*) D. de MARCHETT. p. 138. KERKRING *osteogen* p. 223.

(*r*) Ut in *icone* COWPERI t. 26. ff. 6. & apud RAVIUM.

(*s*) Monet HENSINGI *de apophys.* p. 10.

(*t*) WINSLOW. l. c.

(*t*\*) DUVERNEY *postb.* p. 179.

(*u*) CASSEBOHM n. 123. Semel NICOLAI *obs.* 13.

(*x*) TRICHMEYER *vind.* p. 21. f. 2. f. 6 b. *Instit. pathol. pract.* p. 169. *anthropol.* p. 222. Habet etiam SCHELHAMMER c. 3. n. 5.

(*y*) p. 45. 47. Glandulam carneam habet, sed ex bestia EUSTACHIUS t. 7. f. inf.



titum, quod forte uncus fuerit offeus (*y*<sup>\*</sup>), circa quem ejus musculi tendo reflectitur.

Aliud est in stapedis musculo, quod credas a VESLINGIO (*z*) intelligi, etsi is quidem vir Cl. SYLVIVM auctorem nominat: itemque & ROLFINKIUS (*a*), & FOLIUS (*b*) volunt, & SCHELHAMMERUS (*c*), & T. BARTHOLINUS (*d*), & BILSIUS (*e*). Nuperiores viri idem subinde reppererunt (*f*), sed in bestiis (*g*).

Aliud denique ossiculum dicitur subjectum fuisse cruri incudis (*h*) breviori, qua incipienti sinui mastoideo nititur. Et istud in brutis animalibus solis vitum est.

§. XIX. *Ligamenta ossiculorum auditus.*

Hæ membranulæ, neque enim crassiores sunt membranulis, non constanter eodem modo se habent, etsi eas manifesto in nonnullis junioribus potissimum tympanis vidi.

In malleo quidem duo ligamenta reperi. *Posterius* (*i*) quidem, trianguli curvilinei specie sustinuit inferius quidem crus longius incudis, & exterius mallei manubrium, inque musculo stapedis sui finem fecit, & continuo ductu ex tympani ambitu fere transversum antrorsum tetendit, supra chordam tympani.

*Anterius* prope processum mallei longissimum, eum inter & stapedem ex tympano natum, deorsum redivit, & mallei manubrio se pariter inmisit; & cum priori ad septi modum partem cavi tympani superiorem ab inferiori separavit (*k*).

Incus

(*y*<sup>\*</sup>) DOUGLAS p. 27.

(*z*) Not. I. p. 213.

(*a*) Diff. p. 285.

(*b*) F. 3 g. f. 2. l.

(*c*) SCHELHAMMER p. 47.

(*d*) Anat. p. 714. etsi & ipse citat SYLVIVM, tamen est hujus ossiculi descriptio.

(*e*) Aud. organ. anat. f. 3. L.

(*f*) ADAIR apud COWPER myot. min. f. 9. p. 70. TEICHMEYER p. 16. f. 2. add. f. 8. k. anthrop. p. 223. Conf. HEISTERUM not. 61.

(*g*) CASSEBOHM n. 132.

(*h*) TEICHMEYER f. 5 a. p. 22. Inst. Path. l. c.

(*i*) Quartum CASSEBOHM n. 128. Cum sequente habet N. HABICOT, & duo ad malleum & stapedem pertinentia ligamenta dicit D. V. leet. o.

(*k*) Secundum puto CASSEBOHMII, Accessoire LIEUTAUD p. 146.



Incus ( *l* ) manifestam membranulam habet, quæ in crus brevius, inque ejus sulcum se inmittit, nata ex aditu ad cellulas mastoideas, cui id cruscum insidet.

Stapes, cum suo, quem tenet, quasi recessu tympani, iterum membranulæ ope a majori tympani cavo separatur, quæ finitur ad ejus stapedis musculum.

Alia ligamenta vidit accuratissimus CASSEBOHMUS ( *m* ), quorum unum a margine inter incudis crura se extendit ad tuber, sub quo canalis semicircularis externus latet. Addit utique sæpe unum vel alterum deesse. Aliter etiam vidi se habuisse, quam hic descripsi.

#### §. XX. *Musculi ossiculorum auditus.*

Duo horum ossiculorum musculi reguntur. Et Malleo quidem proprius, non parvus, multoque toto ossiculo suo major, musculus internus, vel *tensor tympani* ( *n* ), in sulco ( *o* ) ponitur, qui tubæ EUSTACHIANÆ superior adjacet & exterior ( *p* ). In eo sulco continetur, & oritur, multo antè inter transitum carotidis cerebialis, & foramen arteriæ meningæ, a parte processus ossis multiformis, quæ cum ala incisuram facit, in quam cartilago tubæ recipitur; tum longe a tubæ cartilaginea sede ( *q* ).

Ita antè & postè tendineus, media parte carneus, tectus ( *r* ) quasi vagina, pergat retrorsum ( *s* ), paulum extrorsum, ad tympanum usque, in quod ipsum pars sulci huic musculo destinati producitur ( *t* ). Ibi circa sui sulci finem osseum ( *u* ) nonnunquam in trochleæ speciem ligamento

( *l* ) PLATER p. 33. WINSLOW T. IV. n. 398. MORGAGN. n. 30. MERY de l'oreille p. 432. Duo ligamenta ad pedes incudis habet N. HABICOT l. c.

( *m* ) Tertium n. 138.

( *n* ) ALBINI. p. 189. *Internus* CASSERII & plerorumque. *Musculus processus majoris*. VALSALVA p. 24. *Quatrieme muscle*. MERY p. 440.

( *o* ) DUVERNEY t. 8. f. 1. H. t. 9. f. 1. t. 6. f. 1. 5. ALBIN. t. XI. f. 29.

( *p* ) MORGAGN. p. 141.

( *q* ) VALSALV. MORGAGN. p. 141. ALBIN. p. 189. 190.

( *r* ) MORG. p. 141. DUVERN. p. 29. WINSLOW n. 401. ALBIN. p. 190.

( *s* ) NICHOLLS t. 6. Utcunque VALSALV. t. 10. f. 2. CASSEBOHM t. 2. f. 4. LIEU-  
TAUD p. 144. COWPER t. 26. f. 3. n. 42. ALBIN. t. XI. f. 29.

( *t* ) DUVERNEY. CASSEBOHM n. 87. 89. WINSLOW L. IV. n. 402.

( *u* ) DUVERNEY p. 29. VIEUSSSENS t. 2. f. 3. COWPER t. 26. f. 3. 4. b. *Bec de cuillere* WINSLOW n. 500.



gamento perfectam, alias solo osse ( $x$ ), tendinem suum circumflectit. Inde mutato ductu ( $y$ ) deorsum extrorsum inclinatur, una cum sua vagina ( $z$ ), inque malleum inseritur, sub capite, ex opposito processus brevioris, in manubrii principium, sub processu longissimo ( $a$ ). Oportet aliquando aliam esse fabricam, ut cum musculo externo mallei conjungatur, abeatque in monogastricum ( $b$ ) musculus, cujus quatuor sint crura. Proximos esse nonnunquam WINSLOW. Sed etiam duos tendines ( $c$ ) huic musculo pliusculi veterum tribuerunt. Ego constanter simplicem vidi. Membranam Cl. viris creditum est imposuisse ( $d$ ).

Pro tensore membranæ tympani solet haberi ( $e$ ), ut eum malleum, & cum mallei manubrio conjunctam membranam, introrsum ducat, umbonem introrsum magis cogat ( $e^*$ ) prominere, atque adeo cum angulus duarum quarumcunque linearum rectarum umboni impositarum fiat acutior, eam membranam faciat longiorem. Resecto eo musculo membrana laxatur ( $f$ ). Quare non bene pro laxatore datus est; is enim membranæ status nascitur eo musculo non agente, sed destructo.

Verus musculus est, cujus & caro manifesta sit, & tendo, neque adeo pro ligamento, aut nervo ( $g$ ) debet haberi. EUSTACHIO inventus debetur ( $g^*$ ), etsi eum, sed ex vitulo, ante annum 1561. VESALIUS obscure descripsit ( $b$ ), ut tamen ante VESALIUM EUSTACHIUM musculum suum invenisse putem. Totum enim auditus organum, longi

( $x$ ) CASSEBOHM n. 89. ut in icone, NICHOLLS t. 6. MORGAGN. p. 142.

( $y$ ) DUVERNEY t. 6. f. 5. WINSLOW n. 402. Non satis mutato ductu ALBIN. t. XI. f. 31. 32.

( $z$ ) LIEUTAUD p. 45.

( $a$ ) MORGAGN. p. 145. DUVERNEY t. 6. f. 4. 5. EUSTACH. t. 7. ALBIN. t. 32. 33. p. 190.

( $b$ ) VIEUSSSENS p. 40. t. 2. f. 3. WINSLOW IV. n. 402.

( $c$ ) CASSER t. 9. f. XI. & c. 13. VESLING p. 213. (bifido fini). COLLINS p. 932. Vidit etiam Cl. BOEHMER, sed ut eodem loco infererentur *Fascic. I. pref. p. VII. osteolog. p. 99.* ut etiam tres viderit. In equo duos esse tendines GIBSON p. 45.

( $d$ ) CASSEBOHM n. 150. Rejicit etiam MORGAGNUS p. 146.

( $e$ ) MORGAGNUS p. 144. &c.

( $e^*$ ) Laxare, non bene, ARANTIUS c. 14. p. 59.

( $f$ ) VALSALVA.

( $g$ ) Nervos esse Cl. VAROLIUS *de nerv. opt.* ed. Francf. p. 139. 140.

( $g^*$ ) *De audit. org.* p. 157. 158.

( $h$ ) Bulbi nomine *exam. obs. Fallop.* p. 25.



longi laboris opus, vir ILL. in eo libro, non certe intra annum nato describit. VESALIUS nuperrima fere, & post lectum FALLOPII opus a. 1561. editum, factas adnotationes enarrat.

§. XXI. *Musculi mallei reliqui.*

Non perinde in reliquis mallei musculis consentitur. *Externus* (i) quidem *Cacilii FOLII*, aliorum *anterior* (k), aut *obliquus* (l), oritur ex anteriori fine acuti processus, quem os multiforme inter os squamosum & petrosum interserit (l\*). Subit in fissuram (m), articulationis temporum cum maxillæ inferiori commissuræ, per quam eandem chorda tympani (n) exit, & in ea fissura teres, fere rectus, retrorsum tendit, paulumque extrorsum, & longissimo processui mallei undique circumnascitur (o).

Summi viri hunc musculum tuentur, & malleum antrorsum ab incude diducere persuadentur (p), ut fragoris alicujus majoris effectus non tota vi ad intima organi auditus perveniat.

Fuere autem & dudum (q), & nuper Cl. viri (r), qui de veris ejus musculi fibris carneis dubitarunt (s), cum multam quidem membranam, a periosteo (t) propagatam, fulcum maxillæ replere viderent, & processui longissimo circumnasci, cæterum carneam in ea naturam non deprehenderent. Neque mea experimenta rem expediunt. Musculum quoties volui, ostendi, num veras fibras viderem, plerumque dubius hæsi.

Alius

- (i) *Musculus externus alter FOLII* f. 2. §. *Externus DUVERNEY* p. 27. t. 6. f. 4. §.  
 (k) *Anterieur WINSLOW* n. 400. *Troisième MERY* p. 440. f. k f.  
 (l) *Obliquus COWPER* t. 26. f. 3. 4. *DOUGLAS Musculus processus minimi VALSALV.*  
 T 3 f. 5. p. 26. *Minimus MORGAGN.* p. 150. *Première tête du muscle monogastrique VIEUSSENS* p. 41. Sed separat *MORGAGNUS* p. 151.  
 (l\*) *ALBIN.* p. 187. add. t. XI. f. 28.  
 (m) *DUVERNEY* t. 7. f. 2. *WINSLOW* n. 400. *ALBIN.* f. 28.  
 (n) *WINSLOW* n. 400.  
 (o) *CASSEBOHM* t. 3. f. 6. *NICHOLLS* k.  
 (p) Etiam *ALBINUS* p. 187. *NICHOLLS* p. 38. *THOMSON of senses.*  
 (q) *SCHELHAMMER.*  
 (r) *LIEUTAUD, MEKEL* p. 93. 94.  
 (s) Non æque semper ejus fibras adparere *CASSEBOHM* n. 149. *VALSALV.* p. 20. & *MORGAGNUS* p. 150. Ambigit *DISDIER splanchnol* II. p. 216.  
 (t) *Ligament interne LIEUTAUD* p. 146. & olim *SCHELHAMMER* p. 41.



Alius musculus *externus* inventori CASSERIO (*u*) olim dictus, & Hieronymo FABRICIO (*x*), etiam minor (*y*) & obscurior, dicitur ab osseo meatu auditorio nasci, qua cum membrana committitur, in parte superiori & posteriori (*z*), tegi membrana interna, quæ cerumen separat, arctari sensim, ire introrsum per sulcum interrupti anuli (*a*) supra membranam tympani in tendinem abire, seque juxta radicem processus brevioris crassique mallei inmittere (*b*).

Si musculus est, laxat utique tympanum, & ducit ad exteriora. Verum dudum de eo musculo dubitatum est (*c*), eumque alii quidem ante nos illustres viri non reppererunt (*d*), alii, etsi reppererunt, & descripserunt, manifesto tamen parum ei tribuerunt (*e*).

Glandulas esse VIEUSSENIUS, mihi membranam meatus auditorii videtur (*f*). Ligamentum vocat, & externum, Cl. LIEUTAUD (*f*<sup>\*</sup>).

Ego quidem nunquam satis certas fibras vidi, neque MORGAGNUS, cum lente vitrea armatus inquireret (*g*). Sed etiam CASSERIUS ægre fibras tenuissimas viderat, & ita pingit FABRICIUS (*b*), ut non credas verum musculum fuisse, quem pictor exprimit. CASSEBOHMIIUS in plerisque auribus vix distingui posse fatetur (*i*).

E e 2

§. XXII.

[*u*] *Pentasthes.* p. 226. *de aure* p. 79.

(*x*) *De aure* L. I. c. 6. p. 7. Ait ann. 1599. se invenisse, & in membranam tympani dicit inferi. Ex eo VESLINGII *tabula* c. 16. f. 5.

(*y*) Grandem pingit COWPER t. 26. f. 4. grandem CASSERIUS *tab.* IX. f. 1. 2. 3. Sed recte minorem CASSEBOHM t. 3. f. 6.

(*z*) ALBIN. in situ COWPER t. 26. f. 1.

(*a*) CASSER p. 220. WINSLOW n. 399.

(*b*) ALBIN. l. c. & *tab.* XI. f. 28 30. WINSLOW n. 399. Correxit jam FABRICIUM CASSERIUS. In ipsum processum NICHOLLS I DUVERNEY *myotamol.* VALSALV. p. 25, CASSEBOHM t. 3. f. 6. In spinosum processum & longissimum SCHELHAMMER p. 43.

(*c*) ROLFINK p. 528.

(*d*) DUVERNEYUS, MERYUS, VIEUSSENIUS. In *posthumis* ligamentosas fibras vocat DUVERNEY p. 180.

(*e*) VALSALVA, p. 25. Fatetur sæpe vix adparere, tum WINSLOW n. 399. Non magni momenti esse WALTHER *musc. tener.* ed. nostr. p. 600. 615. Etiam cum dubio describit ALBINUS p. 188.

(*f*) p. 17.

(*f*<sup>\*</sup>) p. 145. 146. 154.

(*g*) *Epist.* VI. n. 25. p. 148.

(*h*) F. 17. r.

(*i*) n. 148.



§. XXII. *Stapedius.*

Certus & indubiæ fidei, etsi minimus in corpore humano, musculus est, a VARGLIO (*k*) inventus (*l*), a CASSERIO (*m*), aliisque (*n*) pro ligamento habitus (*n*); ab aliis pro osseo globulo (*o*), nunc quidem satis notus.

Conus est osseus (*p*) in parte inferiori posteriori tympani, qui antrosum prominet, & osculo ad stapedem obverso aperitur.

Is conus intus cavus est, totusque repletur musculo vero (*q*), carneo, cujus tendo ex foramine (*r*) coni prodit, fertur antrosum (*s*), & stapedis capituli parti posteriori (*t*), sub articulatione cum incude inferitur (*u*).

Stapedem ita ad se trahit, ut pars posterior altius adacta foramen ovale pulset, pars anterior de eo foramine exeat (*x*).

Incus musculum nullum habet, neque enim in id ossiculum monogastrici musculi alter tendo se inmittit (*y*), neque musculus, quem RUYSCHIIUS (*z*) sibi sivit elabi, nuper cuiquam visus est. Quem vero etiam bifidum

(*k*) *Anat. L. I. c. 5. p. 28. edit. Francf.*

(*l*) Olivare corpus VESALII *Exam. p. 29. 105. 106.* huc refert CASSEBOHMIUS. Sed id perobscurum est, cum & in mallei & in stapedis musculo ejusmodi glandulæ imago sit.

(*m*) CASSER. *p. 80.* Ventrem tamen in equo vidit *t. 10. p. 224* & in cane *t. 9. f. 15.*

(*n*) RIOLANO, quando quartum ossiculum ligamentum esse scribit *p. 225.* VESLINGIO *p. 214* FABRICIO *L. 3. c. 5. C. BAUHINO, MANFREDO, WILLISIO, PERRAULT dicitur p. 103. SCHELHAMMER p. 46.* Vindicat musculosam ejus naturam MERY *p. 438.*

(*o*) BARTHOLINUS, apud FOLIUM *f. 2. 3.* VESLING *c. 8. tab. 5. f. 6. d. c. 16 f. 7.* Manifesto musculus est, quem pingit FOLIUS *f. 2. 1.* & filamentum tendinis vice habuit VESLINGIUS.

(*p*) CASSEBOHM *n. 97. 152. t. 2. f. 3. g. f. 4. n. n. ALBIN. t. XI. f. 28. o. DUVERNEY t. 8. f. 1.*

(*q*) DUVERNEY *p. 30. VALSALV. p. 32. ALBIN. p. 191. NICHOLLS l. c. WINSLOW n. 405.*

(*r*) CASSEBOHM *tab. 2. f. 39. f. 4. f. DUVERNEY, NICHOLLS, ALBIN. f. 28. WINSLOW. Expeditus de sinu osseo ALBINUS f. 29.*

(*s*) Sursum CASSEBOHM *n. 152. VALSALV. l. c. BRENDEN f. 1. ALBIN p. 129.* Deorsum MORGAGNUS *p. 167. rectius, si ex meis judico.*

(*t*) Qua crux longius est WINSLOW.

(*u*) CASSEBOHM *t. 3. f. 23. ALBIN. f. 28. f. 29. 24.* In membranam abire, quæ articulum cum incude ambeat VIEUSSENS *p. 48. Contra MORGAGNUS p. 166. 167.*

(*x*) Ita etiam ALBINUS *p. 192. LIEUTAUD p. 147.*

(*y*) VIEUSSENS *p. 43.*

(*z*) *Thes. II. aff. 4. n. 17. forte errore aliquo preli.*



bifidum & malleo inseruit, & incudi Cl. MERY (a), is quidem manifesto chorda est tympani, in qua vir cæterum sua laude dignissimus omnino erravit.

§. XXIII. *Cellulæ mastoideæ.*

*Chordam* Tympani alias descripsimus (b). Præter eam nihil memorabile in tympano reperitur; superest, ut exitus varii, qui in tympanum ducunt, a nobis describantur. Et primum supra malleum & incudem, & pone hujus ossiculi crus posterius, cellula quædam (c), & appendix quasi tympani est, gnomonis utcumque figura, quam superius lamina cranium finiens operit, posterius in promontorii gibbam speciem eminens osseus colliculus limitat.

Pone hanc cellulam incipit os petrosum, dudum super processum mammillarem, cellulis excavari, quæ deinde, ut cum adultiori vita is processus producitur, ita & ipsæ una descendunt, & producantur. Majores fiunt variæque (d), magæ (e), parvæque (f), patentes in se invicem.

Quæ cellulæ supra processum sunt (g), iis neque fetus destituitur, in quo tamen lego, ex adversariis meis, me sæpe, unicam grandem cellulam reperisse (h).

Quæ sunt in processu, eæ utique cum eo ipso nascuntur (i), dum lamina ossis exterior a musculo biventre detracta, ab interiori, per duram matrem revincta, & firmiori abducitur, mediæque inter utramque diploes cellulæ in longitudinem exporriguntur.

Versus eum processum posterior pars tympani etiam cellulis aspera est (i\*).

E e 3

Anima-

(a) p. 437. f. K. *Progr. de la Médec.* 1697. p. 27. 28. 105. apud DIONIS p. 576.

(b) L. X. p. 226. 227.

(c) ALBIN. *adnot.* L. IV. tab. 2. f. 6 c. Antrum vocat VALSALVA p. 22. MORGAGNUS Ep. V. n. 24. p. 106. Sinusitas mastoidea est CASSEBOHM T. 2. f. 3. Q. f. 4. l. Habet etiam DUVERNEY t. 7. f. 1. F. f. 2. G. *Embouchure mastoïdienne* WINSLOW IV. n. 397.

(d) MORGAGN. l. c. p. 106.

(e) Parvæ CASSEBOHM t. 2. f. 4. DUVERNEY t. 9. f. 1.

(f) Grandiores DUVERNEY t. 7. f. 2. Multo etiam majores coram video.

(g) CASSEBOHM n. 92.

(h) Etiam ibid. CASSEBOHM. Insigne foramen SCHELHAMMER c. 3. n. 2. An simile quid est cavum peculiare, in Fele, septo osseo a tympano sejunctum Cl. LOESEKE *obss.* p. 6. & in fele & in cane dictum CLAUDIO PERFAULT *du bruit.* p. 195.

(i) FALLOPIUS, BERTINUS *osteol.* 1. II. p. 74. MORGAGN. l. c. p. 106.

(i\*) WALTHER *membr. tymp.* n. 7.



Animalia, quæ acute audiunt, alia & alia antra resonabilia in cranio habent (*k*), idemque totum cellulofum (*l*) est docili bellux elephanto. In avibus, quibus musica auris est, supra & infra cerebrum utraque auris interne cum altera communicat (*m*), & alioquin cellulæ inter duas cranii laminæ (*n*) interruptæ abundant.

In iis, quas descripsi, cellulis membrana vasculosa est, & succus ruber, ut in ossibus ubique, neque hic quidquam peculiariter glandulosum reperio, aut magis analogum pituitariis sinibus (*o*). Mucos utique rubro, ut tympanum, totas repletas vidi, neque dubium est, viam inter eas, tympanumque patere (*p*).

In ima parte squamosa ossis temporum cellulæ sunt, quæ & ipsæ cum mastoideis communicant (*q*).

#### §. XXIV. *Tuba Eustachiana.*

Anterior & grandior alia via est, quæ ex tympano ducit. Incipit in tympano dimidiato canali, conspicuo (*r*), ante promontorium, indeque antrosum pergit, & una paulum introrsum. Effoditur in ossis petrosi foras (*s*) parte interiori, & demum scabro & difformi ostio hiat, inter spinam ossis multiformis & ductum arteriæ carotidis (*t*). Eundo angustior fit, ut pars lacera, quæ ex osse petroso prodit, angustior sit, quam aditus ex tympano (*u*). Sectio inæqualis est, ellipticam Cl. viri dixerant (*x*).

Ea

(*k*) VESALIUS *exam* p. 20. Amplior est cavitas tympani, quando processus mastoideus deficit LOESEKE *obss* p. 16.

(*l*) Tympani in eo animale cavum cellulofum est BLAIR, & totum cranium cellulofum IDEM *Phil. Transf.* n. 326. 327. & MOULINS p. 38. & PARISINI, & STUKELEY *Phil. transf.* n. 358.

(*m*) BIRCH. T. IV. p. 273. 546. *Phil. transf.* n. 206. it. 199. CLAYTON *miscell.* III. p. 331.

(*n*) NEBEL *de curat. electr.* p. 20. *Anat. Compar.* p. 112

(*o*) WINSLOW T. IV. n. 397. VIEUSSENS. Inter sinus octo capitis quarto loco numerabat VIGIER *Enchir. anat.* l. c. 8.

(*p*) SCHNEIDER *de off. temp.* BERTIN. T. II. p. 72 74. Inanes semper esse MORGAGNUS *Ep.* V. p. 107. neque communicationem admittit IDEM p. 107. 108. 109. Ita tamen vidi, ut descripsi; aliter procul dubio vidit vir ILL.

(*q*) BERTIN. *Osteol.* T. II. p. 73.

(*r*) Vide ALBIN. t. XI. f. 29. DUVERNEY *tab.* 9. f. 1. B. hic per amplum pingit.

(*s*) MORGAGNI *Epistol.* VII n. 12 p. 190.

(*t*) Conf. EUSTACHIUM p. 162. WINSLOW. T. IV. p. 388.

(*u*) CASSEBOHM n. 88. VALSALVA p. 41. t. 3. f. 3. H. f. 14. C. *tab.* 10. f. 1. ad d. f. 2. b. VIEUSSENS t. 3. f. 3.

(*x*) VALSALVA p. 41.



Ea in sede secunda tuba huic osseo canali adaptatur, quæ & ipsa de conï genere est, & cundo dilatatur (*y*), donec in faucibus, supra mobile palatum, proxime radicem alæ pterygoideæ internæ (*z*), paulo posteriorius, quam aditus a naribus (*a*), ad fauces aperiatur, & ostio peramplo, exterius longius procurrente (*b*), superius breviori, introrsum antrorsum aperto pateat. Tumidus anulus (*c*) membranaceus ostium ambit, in quo glandulæ mucosæ sunt. Hæc pars tubæ compositæ naturæ est. Suprema pars ossea est aspera, inæqualis, ex osse temporum composita & multiforini (*d*), mista membrana. Mediæ se cartilago vomeris specie (*e*) adaptat, quæ minorem partem tenet & latera. Finis membranaceus est.

Vidi eam cartilaginem trifidam fuisse in fine suo, & sulcum inferius habuisse, in quem stylus exhibat osseus. Vidi etiam duas fuisse cartilagineas, superiorem, ex ipso osse continuatam (*f*), & inferiorem, quæ ostium (*g*) confirmaret. Vidi ejus loco osseam quasi cylindrum inferiorem, mediam, sedem cartilagineæ partis confirmasse. Aliter VALSALVA descripsit, ut cartilago superiorem dimidiam partem canalıs teneret (*h*), & anuli partem faceret (*i*). Aliter iterum Cl. LIEUTAUD (*k*) duas numerat cartilagineas, posteriorem majorem, triangularem, crassam, ossibus nexam, ex quibus tuba prodit: alteram minorem, neque adtingentem tubæ ostium.

Latera compressa habet (*m*), & sectio ellipsin refert.

In fetu tota (*n*) membranæa est, absque cartilagine.

Membrana

(*y*) VALSALVA p. 47. t. 3. f. 3. G. f. 14. D. D. tab. 10. f. 2. ad c. t. 4. K. L. p. 55. & t. 3. f. 3. ab A. medio ad imum VIEUSSENS. WINSLOW. n. 391. ALBIN. tab. XI. f. 29. ad x y.

(*z*) EUSTACH. p. 162. WINSLOW n. 387. In osse integro DUVERNEY t. 9. f. 2. C. Phil. trans. vol. 49 P. I. tab. 1.

(*a*) ALBINUS tab. 10. f. 16.

(*b*) VIEUSSENS.

(*c*) MORGAGN. n. 13. p. 191. DUVERNEY p. 16. WINSLOW T. IV. n. 391.

(*d*) WINSLOW T. IV. n. 390.

(*e*) Ita fere TARIN. tab. 35. b. l. m. n. nisi quod in parte superiori tubæ eam ponit. Inferiorem WINSLOW T. IV. n. 390. posteriorem DUVERNEY p. 15. Compara ALBINI iconem musc. t. XI. f. 29. u w v.

(*f*) Ita etiam MORGAGNUS l. c. p. 190. EUSTACHIUS p. 162.

(*g*) Semicircularem MORGAGN. n. 13. p. 191.

(*h*) p. 43. f. 14. D. D. tab. 10. f. 2. c.

(*i*) Ibid. EUSTACHIUS ibid.

(*k*) p. 148.

(*m*) EUSTACHIUS t. 162.

(*n*) HIRSCHEL de differ. fet. p. 22.



Membrana interna tubæ in principio ad fauces mollis, mucosa, glandulosa, sensim in tenuitatem periostei degenerat (*n*<sup>\*</sup>).

ALCMÆONI hætenus nota fuisse creditur, ut certe aurem inter & vias respirationis iter liberum esse nosset (*o*). Rectius viam ab aure ad palatum descripsit ARISTOTELES, per quam vena descenderet (*p*). VESALIUS tubam notam habuit, ut tamen pariter pro aere admittendo, & pro nervo Quinti paris emittendo inservire diceret (*q*). Sed & J. Philippus INGRASSIAS (*r*) eam viam demonstravit. Multo tamen accuratius in ea describenda EUSTACHIUS (*s*) versatus est. Recentiores aliqui (*t*), neque soli galli (*u*), *aquæductus* nomine descripserunt, dum ideo increpati, quod id nomen proprium sit canali, qui durum nervum ex calva educit.

In quadrupedibus calidis (*x*), & in avibus (*y*) etiam constanter reperitur, & in frigidis nonnullis tuba (*z*) primaria via est sonorum. Negat in colubre adesse Cl. GÉOFROI (*a*). Ranae magna est, & patula (*a*<sup>\*</sup>).

#### §. XXV. Quomodo ea tuba in aurem pateat.

Tuba perpetuo patet, & meatui narium, quem diximus infimum (*b*); ita obvertitur, ut aer ea via adveniens tubam necessario fubeat (*c*), non solum

- (*n*<sup>\*</sup>) VALSALVA p. 42.  
 (*o*) Capras per aures spirare apud ARISTOTELEM *hister. anim.* L. I. c. II.  
 (*p*) Ibid.  
 (*q*) *Examen obs. Fallop.* p. 28. ita PLATER p. 31. INGRASSIAS l. c. Procul dubio chordam tympani viderunt, cujus sulcus tubæ proximus adjacet.  
 (*r*) C. I. *Comm.* 8. p. 97.  
 (*s*) *Audit. org. exam.* p. 162.  
 (*t*) DUVERNEY p. 14. *posth.* p. 175. DIONIS. I. la CHARRIÈRE, DROVIN p. 115. VIEUSSSENS p. 55.  
 (*u*) BOHN BLAIR. WELSCH *tab.* 30. 54. WOLF *von den Absichten* p. 14. Ante eos JESSEN *Anat. Prag.* SCHNEIDER *de off. temp.* BARTHOLINI, Thomas & Casp. RIOLANUS, SCHENK *schol. part.* c. 40. Emendant errorem SCHELHAMMERUS p. 57. MORGAGNUS, WINSLOW n. 186.  
 (*x*) Elephantis *Phil. transf.* n. 358.  
 (*y*) MOULIN. *Phil. transf.* n. 199.  
 (*z*) CALDESI p. 13. in testudine. Habet etiam GAUTIER *obs. period.* III. p. 391. & VALISNER. T. II. p. 397 in chamæleonte.  
 (*a*) *Mém. prés.* T. II. p. 185.  
 (*a*<sup>\*</sup>) Etiam in bufone americano *Verhandel van de Holl. maatschapp.* T. VI. p. 277.  
 (*b*) p. 130.  
 (*c*) DUVERNEY p. 88 *posth.* p. 176. VIEUSSSENS p. 55. LAMY *ame sensit* p. 89. MERY *ibid.* p. 428. DEIDIER *Anat.* p. 307.



solum dum deglutimus (*d*), sed in naturali inspiratione, quæ per nares fit, Quando spiritus retinetur, videtur depressum velum palati viam in tubam facere liberiores, ut aurem cum strepitu subeat (*e*), & visum sit, retentum aerem membranam tympani rupisse (*f*).

Ea adeo via etiam per sternutationem (*g*) tympanum repurgari dictum est, globulosque auri infixos per os ejectos esse (*h*), quo in casu necesse est, membranam tympani ampliori foramine patuisse.

Chirurgi etiam nuperi instrumenta sua (*i*) per os in tubam immittere didicerunt, perque eam viam in morbis aurium medicatos liquores injicere; & liquores medicati in ulcus circa processus (*k*) mammillares impulsus in os utique descenderunt.

Ob cartilagineam suam naturam perpetuo aperta manet, neque ulla eo in itinere valvula (*l*), neque ejus aliqua necessitas est (*m*), cum ex ore ad tubam via in deglutiendo nulla sit; ea enim in actione palatum mobile depressum, & ad linguam adductum, nullum omnino ad tubam EUSTACHII accessum admittit (*n*). In vomitu, quando turpi spectaculo cibi per nares redduntur, aliquid subire possit, etsi etiam tunc angustia ostii ossei, quo tuba ex cranio exit, est pro custodia.

A musculis Tubam dilatari, & vicissim comprimi conjectura est, cum circumflexus quidem palati mollis aliqua parte a cartilagine tubæ nascatur (*o*), eam deorsum ducturus, dum ad hamulum pterygoideum, tanquam ad firmam sedem, descendit. Ita hætenus tuba EUSTACHIANA dilatatur

(*d*) SCHELHAMMER p. 256.

(*e*) EUSTACHIUS p. 163.

(*f*) DUVERNEY p. 177.

(*g*) MORGAGN *Ep.* VII. n. 14. p. 192. RHazes ad MANSOR. L. IX. c. 36. CAMER. *Mém. Cent.* II. n. 51.

(*h*) SCHELHAMMER l. c. NABOTH *de audit. diffic.* n. 8. & SCHNEIDER *de off. cribrif.* p. 455.

(*i*) GUYOT *Hist. de l'Acad.* 1724. p. 53. WATHEN *Phil. trans.* vol. 49. P. I. Commodius per nares injici PETIT ad PALFYN T. II. p. 472.

(*k*) VALSALVA p. 114.

(*l*) COITER c. 13. LAURENTIUS, BAUHINUS, WILLISIUS.

(*m*) Refutat KEMPER *de valvul.* n. 37. MORGAGNUS *Epist.* VII. n. 14. p. 192.

(*n*) Vide in L. XVIII. Sect. III.

(*o*) MORGAGN. *Ep.* VII. n. 26. p. 212. VALSALVA p. 43. 44. 117. t. 4. ALBIN. p. 246. WINSLOW t. IV. n. 498.



retur (p). Contra ILL. ALBINUS mavult tubam ab eo musculo tantillum conprimi (q), & junior DUVERNEYUS negavit dilatari (r). Mihi, cui cartilago inferiorem partem tubæ tenet, eam a musculo secundam hamulum pterygoideum circumflexo probabile fit dilatari. Vicissim eandem inter musculum, interque levatorem palati molliis, pars tubæ mobilis media interponitur (s), & a musculo levatore tumente hæctenus urgeri potest, ut vel mucus ex ea exprimatur, vel id, quod præter naturam impactum fuerit.

### §. XXVI. *Fenestræ. Ovalis & rotunda.*

Ex tympano in aurem intimam duplex potissimum via est. Prior, major, magis conspicua, medio fere in tympano (t), posterius inter promontorium (u) & aquæductum est; ovalis, aut renis similis (x), nempe ut ambitus inferior & anterior, perinde ut in stapedis basi, rectior sit, superior & posterior magis curvus (x\*). Versus vestibulum ora eminente (y) ambitur. Versus tympanum canalis fundum perficit, qui satis profundus (z) inter eundem aquæductum, & promontorium intercipitur. In eo canale stapes ponitur. Non penitus a stapede fenestram repleri Cl. viri est observatio (a), vera, si de perfectissima repletionem sermo est.

Membrana nulla in hac fenestra est, quam video eo loco a Cl. viris (b) poni, quem basis stapedis occupat: Quam dicit membranam ILL. MORGAGNUS (c), ego intelligo periosteum esse vestibuli.

Fenestra

- (p) MORGAGN. VALSALVA p. 43. WINSLOW.  
 (q) p. 247.  
 (r) *Myotomol.* p. 128.  
 (s) Jam EUSTACHIO monente. Conf. VALSALVA t. 4. ALBIN. t. 10. f. 13. 14. 15. COWPER t. 29. f. 1.  
 (t) FALLOP. ALBIN. *Adnot.* L. IV. t. 1. f. 3. 4.  
 (u) CASSEBOHM t. 2. f. 3. f. 4. o. DUVERNEY t. 3. f. 1. 2. Conf. ALBIN. t. XI. f. 28. 29.  
 (x) FOLIUS f. 6. COTUGNUS t. 1. f. 6. Hilus inferior est.  
 (x\*) CASSEBOHM l. c. n. 94.  
 (y) Habet WINSLOW T. I. n. 505.  
 (z) Sinum vocat MORGAGNUS p. 176. ovalem pelvim COTUGNUS *aquad. aur. intern.* p. 2.  
 (a) WALTHER l. c. n. 3.  
 (b) GORTER *Chir.* n. 976. TEICHMEYER *antropolog.* p. 229. LIEUTAUD p. 149.  
 (c) *Epist.* VII. n. 1. f. 174.



Fenestra rotunda molestiori loco ponitur, inferior (*d*) priori, in promontorii recessu posteriori & imo exsculpta, ut oblique posteriora & exteriora respiciat (*e*), & ipsa ex ovali figura (*f*) in acumen deorsum procurrat, & eo ductu longior sit (*g*).

Ea quidem fenestra in proprio sulco (*b*) membranam (*i*) continet, qua a tympani scala separatur, ad cochleam rotunda est (*k*); canalis enim est potius, quam foramen, cujus duo sunt ostia.

Utraque fenestra debetur FALLOPIO (*l*). Ovalis æmulam fenestram ea omnia animalia habent, quibus mallei genus est in tubæ speciem dilatatum, præter quadrupeda adeo, & aves, & frigida animalia aliqua (*m*).

Minus late patet fenestra rotunda, neque præter quadrupeda calida reperitur.

§. XXVII. Minora foramina tympani.

Ea quidem nominasse suffecerit, cum alioquin ea oporteat repetere. Huc ergo faciunt aditus nervuli, qui chorda tympani dicitur (*n*), ejus exitus ex tympano: nervuli multo minoris in stapedium (*o*) musculum iter; arteriolæ ex stylomastoidea ad tympanum (*p*) via: particula aperta aquæductus (*q*), qua nervus ad cellulas mastoideas nudus eminet.

Inprimis autem, qua sede petrosa pars ossis temporum cum squamosa committitur, ea sede tres fere arteriolæ (*r*) a ramo carotidis externæ meningeo in tympanum descendunt, quas suo loco dicemus. In sceletto nuda foramina supersunt. Ea creditur esse via, per quam sanguis (*s*),

F f 2

&

(*d*) CASSEBOHM l. c. i. & e. ALBIN. l. c.

(*e*) MORGAGN. l. c. n. 4. p. 178. WINSLOW n. 506.

(*f*) FOLIUS f. 6.

(*g*) ALBIN. l. c. CASSEBOHM l. c. Parabolicam vocat COTUGNUS p. 7.

(*b*) DUVERNEY p. 20. CASSEBOHM n. 95.

(*i*) VALSALV. p. 34. DUVERNEY l. c.

(*k*) MORGAGN. *Epist.* XII. n. 63. p. 469.

(*l*) *Obj.* p. 27.

(*m*) Testudo PLUMIER *Journ. de Trév.* 1703. m. Aug. CALDESI p. 11. 12. PARSINI, GAUTIER l. c. Coluber GEOPROI *Mém prés.* T. II. p. 185.

(*n*) LIEUTAUD p. 151. ZINN. p. 38. &c.

(*o*) ZINN *Epist.* ad WERLH p. 38. LOESEKE f. i. &c.

(*p*) *Fascic.* III. T. I. n. 16. ZINN.

(*q*) BERTIN T. II. p. 405.

(*r*) Sensit WALTHERUS l. c. n. 16. p. 29.

(*s*) WEPFER *apopl.* p. 105. 299. VALSALV. FABRIC. *selegr.* p. 46. VICIER p. 169.



& pus (*t*), & ichor (*u*), & cerebrum (*x*) ex cranii cavea in tympanum, hinc, si via aliqua est ex tympano in meatum, porro tot in exemplis de meatu externo effluxit; & ipsum nativum tympani humorem eadem via credunt Cl. viri a dura membrana cerebri advenire (*y*). Contra aerem alii per eam ipsam viam ad duram membranam penetrare putant (*z*). Addunt inmissum per tubam EUSTACHII liquorem per eandem viam in cranium penetrare.

Viæ adfunt utique in sceleto (*z*<sup>\*</sup>); fed in vivo plenæ suis vasculis, nihil quidquam transmissuræ, nisi violentia aliqua eas laxaverit. Aliquoties in ejusmodi gravioribus malis ipsa ossa petrosa rupta vidi; potest & alio præter calvæ loco arteria rupta fuisse (*a*).

### §. XXVIII. Vestibulum.

Intima pars organi auditus superest, quam communi vocabulo dicunt *labyrinthum*, quod ante declaratam anatomen innumerabiles ea in sede canales veteres posuerint (*a*<sup>\*</sup>). *Vestibulum* sedem ejus labyrinthi (*b*) mediam tenet. Rotundula est cavea, in sede media petrosi ossis, quæ tympanum respicit, & promontorium facit.

Minutius si inspexeris, in hac exigua camera duos invenies, aut tres, recessus.

Eorum inferior orbicularis (*c*), vel hemisphæricus (*d*) est.

Iterum superior dimidii ovi similis, ellipticusve (*e*), ad sedem ossis canalis semicircularis medii proprii ponitur.

Tertius

(*t*) *Comm. Nor.* 1736. *hebd.* 23. VALSALVA.

(*u*) VALSALV. p. 36. 37. 38. 39. ut croceus liquor, qui duram matrem vitiaverat, in tympano reperiretur p. 39. SAVIARD *obs.* I. VIGUIER l. c.

(*x*) BINNINGER *Cent.* V. *obs.* 35.

(*y*) VALSALV. p. 40.

(*z*) IDEM p. 35. Habet etiam ejusmodi experimenta PACCHIONUS *Opuscul. Scientif.* T. III. p. 135.

(*z*<sup>\*</sup>) VALSALV. p. 34. seqq. CASSEBOHM *Tab.* I. f. 3. n. & n. 22. Addit in adulto raro reperiri. Habet etiam la CHARRIERE p. 118. ni fallor, & VAUGUYON p. 321. neque enim hos libros nunc coram habeo.

(*a*) G. de la MOTTE *Chir. compl.* II. p. 335. & WEPFER l. c.

(*a*<sup>\*</sup>) FABRIC. c. 1.

(*b*) CASSEBOHM t. 4. f. 2. e. f. 9. VALSALV. t. 8. f. 1. 2. 4. 5. t. 10. f. 12. MERY p. 426. ALBIN. *adnotat.* L. I. t. 1. f. 6.

(*c*) CASSEBOHM t. 4. f. 8. f. fig. 11. h. f. 12 k.

(*d*) MORGAGN. *Epist.* XII. n. 5. p. 383. 384. ALBIN. t. 1. f. 6. n. COTUGNUS p. 3. T. I. f. 1 h.

(*e*) CASSEBOHM t. 4. f. 8. 9 t. 5. f. 1. e. Semiovalis MORGAGN. n. 5. p. 384. ALBIN. t. 1. f. 6. m. COTUGNUS p. 3. T. 1. f. 3. g.



Tertius *fulciformis*, recessus (*f*) locum tenet, qua ostium est canalis communis ex duobus semicircularibus coalescentis.

Eos recessus lineæ eminentes osseæ dirimunt (*g*). Earum præcipua pyramidi similis apice denticulis exasperato conspicuo terminatur (*b*).

In eo vestibulo reperitur pulpa nervea (*i*), quæ periosteo (*k*) continetur. Eam inter pulpam & parietes osseos aliquis vapor est, qui in humorem (*l*) colligitur. Quare aerem ibi contineri, etiam si omnes auctores consentirent, non potest accurate admitti (*l*<sup>\*</sup>).

In id vestibulum multa patent foramina, grandiora quidem,, ostium scalæ cochleæ alterius (*m*); ostium canalis semicircularis superioris superius (*n*); ostium canalis semicircularis inferioris inferius (*o*); ostium canalis semicircularis superioris & inferioris commune (*p*); ostium superius (*q*), & inferius (*r*), canalis semicircularis externi; foramen ovale, ad tympanum patens (*s*); ductus exigui nervei, qui pulpam nervi molles admittunt (*t*), maculæve minores simili itineri destinatae (*u*); & arteriolarum, non valde mihi notarum (*x*), ex acustica natarum, venarumque (*y*) itinera.

Per foramen ovale aer & humor ex tympano in vestibulum aditum habere (*z*) creditur.

F f 3

Secunda

- (*f*) MORGAGN. n. 5. p. 385. ALBIN t. I. f. 6 o.  
 (*g*) COTUGNUS p. 4.  
 (*b*) IDEM p. 4. t. I. f. 3. k.  
 (*i*) Mucilaginem vocavit in piscibus & in lacertis GEOFROI p. 186. 188. De ea alias, sed confer CASSEBOHM n. 231. 232. 233. 234. VALSALVA p. 72. Houpe DUVERNEY p. 48. VIEUSSENS p. 70. Add. LIEUTAUD p. 149.  
 (*k*) CASSEBOHM n. 237. MORGAGN. Ep. XII. n. 54. VALSALV. p. 79.  
 (*l*) CASSEBOHM n. 234. MORGAGN. n. 64. VIEUSSENS p. 71. COTUGNUS p. 22.  
 (*l*<sup>\*</sup>) VIEUSSENS, VALSALVA, MUSSCHENBROECK, LAMY *des sens* p. 76. &c.  
 (*m*) CASSEBOHM. f. 9. i. conf. ALBIN. f. 6. T. I. t. II. f. 3. 5.  
 (*n*) CASSEBOHM t. 4. f. 8. a. f. 9. a. ALBIN. t. I. f. 6. i. conf. & t. 2. f. 5.  
 (*o*) CASSEBOHM f. 8. b. f. 9. b. ALBIN. t. I. f. 6. i.  
 (*p*) CASSEB. f. 9. c. ALBIN. t. I. f. 6. l.  
 (*q*) CASSEB. f. 8. 9. d. ALBIN. t. I. f. 6. d.  
 (*r*) CASSEB. f. 8. 9. e. ALBIN. t. I. f. 6. c.  
 (*s*) CASSEB. f. 9. g. ALBIN. t. 2. f. 5. i. cum stapede.  
 (*t*) Quinque CASSEB. n. 217. 229. 230. VALSALV. t. 9 f. 2. t. 10 f. 2. Duo, tria MORGAGN. *Epist.* XII n. 41.  
 (*u*) MORGAGN. n. 48.  
 (*x*) CASSEB. n. 14.  
 (*y*) n. 212.  
 (*z*) VIEUSSENS p. 30. add. LAMY *prefat.*



Secunda cavitas est FALLOPII (a), & forum metallicum VESALII (b). Habent & aves (b\*), & quadrupeda frigida.

§. XXIX. Canales semicirculares in universum.

In fetu os petrosum sub tenui crusta, levique (c), multam cellulofam fabricam, mollem, ebriamque succo continet. In eo celluloso textu osseo veri diversissimæ naturæ canales, fragilissimo osse facti, distincti, continentur, jam tunc perfecti, quando homo in lucem editur. Ea in ætate hos tubos nudos, aque celluloso textu liberos, non difficile est parare, & primus FOLIUS (d) eos nudatos pinxit, deinde JOHANNES MERY (e). Dum adolefcit idem os, cellulofus quidem textus durefcit, & arctiores fiunt ejus areolæ, & demum cum testa canalium semicircularium inseparabili nexu conjunguntur, neque tunc nisi ex arbitrio artis eos tubulos restituere integrum est (f). Tenent sedem ossis petrosi posteriorem (g), superiorem, anteriorem. In fetu sponte, ut tenui osse tecti, se efferunt (h), in adulto homine minus (i).

Om nibus commune est, paulum ultra semicirculorum flexu (k) suo absolvere, omnibus etiam ostiola habere in vestibulo, eaque pleraque (l), latiora aliquantum (m), quam est medius quisque canalis, cæterum partim elliptica (n), partim rotunda (o), uti ipsius canalium sectio partim ellipsis

(a) *Observ.* p. 29. a. b.

(b) *Exam. obs. Fallop.* p. 26.

(b\*) ALDROVANDUS in oto, I. p. 527. PARISINI, & CALEDESI in testudine, qui & nervos ibi viderunt.

(c) Eburneam ait HEBENSTREIT *de diploe.*

(d) F. 1.

(e) L. c. f. E. tunc CASSEBOHM t. 4. f. 4. 5. 6. 12. WINSLOW n. 531.

(f) WINSLOW l. c.

(g) CASSEBOHM n. 171. ALBINUS *l. c. cit.* VALSALV. t. 10. f. 1. 2. &c. COTUGNUS t. 1. f. 3.

(h) *l. c. off. fet.* t. 3. f. 19. BERTIN. T. II. p. 89. COTUGNUS t. 1. f. 4.

(i) Infantis ALBIN. t. 2. f. 1. tum talpæ DERHAM.

(k) VALSALV. t. 8. MORGAGN. p. 390. 391.

(l) Non omnia MORGAGN. p. 390.

(m) PLATER p. 32. CASSEBOHM n. 173. VALSALV. t. 4. f. 5. 10. VIEUSSENS p. 75. DUVERNEY t. 8. f. 9. p. 35.

(n) CASSEBOHM n. 174. VALSALV. p. 62. MORGAGN. p. 386. DUVERNEY p. 35.

(o) CASSEBOHM *ib.* VALSALV. p. 61. MORGAGN. *ib.* DUVERNEY. l. c.



elliptis est, & partim circulus (*p*). Omnibus etiam intus est suum periorsteum (*q*), vasculosum; fuscque, ut in vestibulo, humor (*q*<sup>\*</sup>).

Late per regnum animale dominantur, in quadrupedibus calidis (*r*), frigidis (*s*), avibus (*s*<sup>\*</sup>), etiam piscibus (*t*). In solis serpentibus (*u*) dicuntur desiderari. Numerus plerumque, & in homine pene constatur (*x*), trium est, nonnunquam duorum (*y*), plurium nunquam.

§. XXX. *Canales semicirculares sigillatim. Perpendicularis superior, inferior, horizontalis.*

Varia nomina his canalibus imposita fuerunt, & inter ea *maximi* (*a*), *medii*, *minimi* ad laboriosas, & omni laude dignissimas mensuras (*b*). Cum tamen a situ facilius discrimen repetatur, ab eo etiam omnino sumemus.

Canalis *superior* (*c*), & *verticalis* (*d*), idem *anterior*, & *minor* (*e*) oblique ponitur, ad angulos cum ductu ossis petrosi pene rectos, aque anterioribus & exterioribus ad posteriora & interiora (*f*). Ostia duo habet,

(*p*) Sectio elliptica aut rotunda VALSALV. p. 60.

(*q*) Non bene negat LAMY *ame sensit.* p. 75.

(*q*<sup>\*</sup>) COTUGNUS p. 23.

(*r*) Elephantis BLAIR *Phil. transf.* n. 358. etsi negabat n. 327. Talpæ DERHAM p. 117.

(*s*) In crocodilo PARISINI. *Mém. des anim.* T. III. P. 3. Tres in lacerto GEOFFROI l. c. p. 17. nisi, quod canales pene recti sunt. Tres in rana GEOFFROI p. 173. 178.

(*s*<sup>\*</sup>) De avibus in universum PERRAULT *du bruit.* In anseris DERHAM p. 344. in corvo tres PEYER *obs.* 45. In oto anfractus tres ALDROVANDUS I. p. 527.

(*t*) In calida classe tursioni KLEIN T. I. Inter frigidos in raja canales varios vidit GEOFFROI p. 187. In galeo tres STENON. *Act. hafn.* T. II p. 221. Multi in piscibus DUVERNEY *Mém. avant.* 1699. l. p. 280. In piscibus universis duo, aut tres PERRAULT p. 215.

(*u*) De vipera GEOFFROI p. 181. de cæcilia p. 179. de colubre p. 185. De serpentibus in universum p. 195.

(*x*) FALLOP p. 29. CASSER. *de audit. organ.* p. 59. tab. 10. f. 24.

(*y*) Duos salamandria GEOFFROI p. 186.

(*a*) Multis hæc nomina defendit MORGAGNUS *Epist.* XII. n. 7. 8. p. 387. 388. 389.

(*b*) Constantes rationes esse VALSALVA p. 64. Negabat tamen, multa hic experius CASSE-ROHM n. 176. & varia excipit WINSLOW T. I. n. 530.

(*c*) *Superior* DUVERNEY p. 33. VIEUSSENS p. 58. COTUGNI p. 4. CASSEROHM n. 172.

(*d*) *Verticalis superior* WINSLOW n. 529.

(*e*) *Minor* VALSALV. p. 59. ALBINI.

(*f*) Conf. ALBIN, t. 2. f. 3. q. f. 4. a f. 5. a. MERY f. F. G.



bet, inferius utrumque. Eorum exterius proprium est (*g*), & ovale (*h*); interius cum inferiori commune (*i*), circulare (*k*). Sed etiam prius uterque canalis confluit, & facit cylindricum fere, communem canalem (*l*)

Alter *inferior* (*m*) *posterior* (*n*) etiam *verticalis* (*o*) canalis, & *major* (*p*) humiliori loco positus (*q*) ad angulum cum priori pene rectum, idem posterior est, & ex longitudinis ratione plerumque major, & ostia duo habet, inferius, posterius proprium (*r*), circulare (*s*), aut ellipticum (*t*); nam varium reperitur (*u*); superius, anterius, cum superiori canale commune rotundum (*x*).

Aliquando non major est priori (*y*); aliquando etiam minor (*z*).

Tertius porro *horizontalis* (*a*), *inferior* (*b*), *externus* (*c*), *minimus* (*d*), declivis tamen extrorsum (*d*<sup>\*</sup>) prioribus duobus interpositus, inferius positus & posterius & exterius (*e*). Ostia duo habet exterius circulare (*f*), & interius ovale (*g*).

## §. XXXI.

- (*g*) ALBIN. t. 2. f. 5. n.  
 (*h*) MORGAGN. p. 385. COTUGNUS p. 5. VALSALV. p. 62. CASSEBOHM n. 174. t. 4. f. 8. 9. a. f. 13. h.  
 (*i*) ALBIN. t. 2. f. 5. m.  
 (*k*) MORGAGN. p. 385. CASSEB. n. 174.  
 (*l*) VALSALVA t. 8. f. 1. 2. 3. 4. 5. 10. FOLIUS f. 4. DUVERNEY p. 34. t. 10. f. 9  
 (*m*) *Inferior* CASSEBOHM n. 172. DUVERNEY p. 34. VALSALVA t. 10.  
 (*n*) *Posterior* VIRUSSENS. COTUGNUS.  
 (*o*) *Verticalis posterior* WINSLOW n. 529.  
 (*p*) *Major* VALSALVA p. 59. ALBIN.  
 (*q*) *In situ* ALBIN. t. 2. f. 2. 3. 4. 5. MERRY F. G.  
 (*r*) ALBIN. f. 5. c.  
 (*s*) MORGAGN. p. 385. VALSALV. p. 61.  
 (*t*) COTUGNUS p. 5.  
 (*u*) CASSEBOHM n. 174.  
 (*x*) MORGAGN. p. 385. COTUGNUS p. 6. VALSALVA p. 61.  
 (*y*) MORGAGN. p. 389 WINSLOW n. 330. Semel VALSALVA p. 65.  
 (*z*) WINSLOW n. 530.  
 (*a*) Habet etiam PLATER p. 32. etiam VESLING. c. 8. t. 1. f. 7. 8. tum VALSALVA t. 10. f. 2. ALBIN. t. 2. f. 3. 4. 5. MERRY f. 3. G.  
 (*b*) *Inferior* VIRUSSENS. *Horizontalis* PERRAULT tab. 5. f. 2. WINSLOW n. 529.  
 (*c*) COTUGNI. CASSEBOHM n. 172.  
 (*d*) VALSALV. p. 59. Medius DUVERNEY p. 34. 35.  
 (*d*<sup>\*</sup>) COTUGNUS p. 6  
 (*e*) Vide figuras VALSALVÆ, ALBINI, MERRYI, VESLINGII &c.  
 (*f*) MORGAGN. p. 385. COTUGNUS p. 7. VALSALV. p. 63. CASSEBOHM n. 174.  
 (*g*) MORGAGN. ib. COTUGNUS p. 7. CASSEBOHM n. 174.



## §. XXXI. Cochlea.

Hæc in corpore humano machinula mihi dudum artificiosissima videtur omnium.

*Cochlea* [ *b* ] a summa similitudine dicitur, antiquissimis jam temporibus non penitus ignota [ *i* ].

In quadrupedibus solis [ *k* ], & adfini genere cetorum [ *l* ] reperitur, avibus [ *l*<sup>\*</sup> ] nulla, & serpentibus [ *m* ], frigidisque piscibus [ *n* ].

In fetu melius innotescit, crusta enim, ut non dudum diximus, intima ossis petrosi remota, adparet vera, & fragilissimo [ *o* ] osse composita cochlea, quæ petrosi ossis sedem tenet anteriorem [ *p* ], paulo ante finem anteriorem canalis semicircularis superioris [ *q* ].

Ita ponitur, pene transversa, ut basis respiciat canalem nervorum auditoriorum, apex versus sedem paulo posteriorem canalis muscoli EUSTACHII [ *r* ], ante malleum, paulum extrorsum, & antrorsum, & imprimis deorsum inclinetur [ *s* ]. In adulto homine cum textu ossis celluloso confervet, & tunc potest dici canalem esse, insculptum ossi petroso [ *s*<sup>\*</sup> ].

In ea cochlea spirarum duo pleni gyri sunt, cum dimidio tertio [ *t* ],

con-

[ *b* ] Ita vocare recte jubet FALLOPIUS p. 30.

[ *i* ] EMPEDOCLES dicit auditum fieri ab illapso spiritus εν τω κοχλιαδει, in aure PLEUTARCHUS περι των αρεσκοντων 15. L. 8. Pars auris οιον εν στρομβω *Isag. anat* c. 54. Pars interior auris cochleæ similis ARISTOTEL. *Hist. anim.* L. I. c. 11. Restituit EUSTACHIUS, & primam dedit iconem *tab.* 45.

[ *k* ] Multa vide ap. CASSERIUM *tab.* 10. In elephanto BLAIR *Phil. transf.* n. 358.

[ *l* ] KERIN *Miss.* I. *tab.* 5. in tursione. Obscure dixerat TYSON p. 41.

[ *l*<sup>\*</sup> ] Nempe canales tamen in gyrum ducti *Phil. transf.* n. 199. DERHAM p. 344. SCHELLHAMMER c. 2. n. 4.

[ *m* ] Vide GROFROI.

[ *n* ] Aliquid tamen cochleæ simile habet STEWONIUS in Galeo *Act. Hafn.* Vol. II. p. 211.

[ *o* ] Adgnoscat VALSÆVA p. 66. qui de canalibus negat.

[ *p* ] VESLING. c. 8. *tab.* 1. f. 7. CAECILIUS FOLIUS f. 1. &c.

[ *q* ] ALBIN. t. 2. f. 4. t. 1. f. 5.

[ *r* ] Vide ALBIN. t. 2. f. 5 6.

[ *s* ] MORGAGN. *Epist.* XII. n. 10. p. 391. WINSLOW n. 533.

[ *s*<sup>\*</sup> ] WINSLOW n. 166.

[ *t* ] CASSER. t. 10. f. 24. 25. tum in variis animalibus. C. FOLIUS f. 6. MERY f. E. CASSEBOHM *tab.* 4. 5. ubique n. 180. COTUGNUS t. 1. f. 3. VALSÆV. t. 8. ubique,



conjuncti, absque medio [u], ut in testaceo animale solent, & pariter versus apicem diminuti [x].

§. XXXII. *Modiolus.*

In particula composita & obscura sola spes dilucidi sermonis est a divisione.

Ergo cochleæ hujus volumina circa *modiolum* convolvuntur, conum [y] nempe osseum, inclinatum, ut tota cochlea, basi ad sinum auditorium obversa, mucrone ad fulcum musculi interni mallei respiciat. Non abolvit totam cochleæ longitudinem [z], sed ad medium secundi gyri in infundibulum apice suo definit. Is conus medio sulco exiguo a basi ad apicem excavatur [a], quem minores pori ambiunt [b]. Sectio de ellipsi habet [b\*].

Basis ejus nuclei utcunque cava, numerosis foraminibus perforatur [b\*\*], unumque ex tribus trunculis nervi mollis recipit [c], qui porro, & una cum eo sanguinea vasa [d], per eum sulcum, non quidem ad apicem usque, pergit.

Exterior etiam modioli superficies, quæ ad cavum cochleæ pertinet, tota minutis foraminibus perforatur [e], duplici serie dispositis [e\*], in scala tympani numerosioribus [e\*\*].

Finis

[u] Non bene separat VALSALV. t. 8. f. 2. 4. 5. t. 10. f. 1. Nam neque natura separavit, neque ars facile separat.

[x] CASSEBOHM n. 180. MERY. &c.

[y] VALSALVA p. 66. BRENDL *de auditu in apice cochleæ*. f. 1. 2. 3. CASSEBOHM t. 5. f. 6. 7. 8. 9. 10. & auctus mole DUVERNÉY t. 10. f. 5. Inventor est EUSTACHIUS p. 160. Habet SAL. ALBERTI *Orat. de discipl. anat.* p. 90. & VIEUSSENS p. 66.

[z] COTUGNUS p. 8. 9. ZINN *Epist.* ad ILL. WERREHOF. p. 32. BRENDL f. 1. 2.

[a] MORGAGN. p. 406. BRENDL p. 402. CASSEBOHM t. 5. f. 9.

[b] WINSLOW n. 534.

[b\*] BRENDL p. 401.

[b\*\*] MORGAGN. *Epist.* XII. n. 20. p. 405. n. 44. 45. p. 441. 442. WINSLOW T. I. n. 534. VALSALV. p. 76.

[c] MORGAGN. n. 44. BRENDL p. 402. ed. nostr. VIEUSSENS p. 71. CASSEBOHM t. 5. f.

[d] MORGAGN. n. 62. 63. p. 466. 467.

[e] IDEM p. 406. CASSEBOHM t. 5. f. 7. 10. VIEUSSENS p. 66. DUVERNÉY p. 39. t. 10. f. 5. ZINN p. 30.

[e\*] ZINN *ibid.*

[e\*\*] CASSEBOHM n. 198. t. 5. f. 7. n. 10.



Finis modioli demum interior, iterum ex parte angustissima dilatatur, abitque in conum cavum [f], dilatatum ad sedem canalis musculi EUSTACHIANI, quem apto nomine recentiores scriptores *infundibulum* dixerunt. In eum scyphum de modiolo unum majus [g], & alia minutissima foraminula hiant [h].

§. XXXIII. *Canalis cochleæ. Septum.*

Circa hunc modiolum, tanquam circa fulcrum convolutus, canalis [i] circumvolvitur, qui proprie cochlea est, & quem possis [k] aliter inspectum pro unico tubo, in gyrum redeunte, habere.

Sed ex modiolo exque lamina ejus superficiem terminante (k\*), exit in cavum cochleæ processus osseus in spiram ductus, qui planus, transversus, cochleatus, tenuior, uti procedit, cochleæ scalas dividit [k\*\*]. Est *lamina spiralis* auctorum [l]. Pars ejus septi interior, nucleo propior, major, EUSTACHIO dicta [n], ossea est, ex osse tenuissimo & pene flexilis facta [o]. Facies, quæ ad scalam vestibuli respicit, inæqualis est granulis & tuberculis [p]; facies, quæ ad tympani scalam pertinet, lineis exstantibus ex modiolo exeuntibus exaratur [q]. Pars exterior, a nucleo remotior, tenuior, levis est, & simplex [r], subtilissime tamen lineata.

G g 2

Quod

[f] *Coupe du nerf auditif* VIEUSSSENS t. 4. f. 1. 7. p. 72. qui eam particulam invenit. Post eum rem dixi Præl. Boerb. T. IV. p. 399. *Prim. lin.* n. 487. tum BRENDL p. 402. 403. 409. f. 1. 2. 3. *Cucullus* est ZINN p. 33. Paulo aliter descripsit COTUGNUS p. 9. & f. 7. t. I.

[g] BRENDL p. 403. VIEUSSSENS p. 72.

[h] BRENDL p. 403. n. 4. *Prim. lin.* n. 487.

[i] ZINN p. 31. CASSEBOHM t. I. f. 6. 7. 8. 10. Semiovaem dicit VIEUSSSENS p. 37.

[k] PERRAULT *du bruit*. t. 6. quem refutat MERY p. 451. Credit se primum invenisse BARTOLUS p. 318.

[k\*] Corticem dicit BRENDLIUS p. 402.

[k\*\*] WINSLOW n. 535. 536. BRENDL f. 1. 2. 3. CASSEB. t. 5. f. 6. 7. 8. DUVERNEY t. 10. f. 6.

[l] DUVERNEY p. 38. PERRAULT, etsi alii eam dividunt, & solam laminam osseam ita vocant, ut WINSLOW n. 536. LIBUTAUD p. 150.

[n] p. 160.

[o] MORGAGN. p. 411. Cartilaginis similem facit VALSALVA p. 67. flexilem PERRAULT p. 211.

[p] ZINN p. 31.

[q] Ib. MORGAGN. p. 401. LIBUTAUD p. 149. ALBIN. t. I. f. 6.

[r] ZINN ibid. COTUGNUS p. 10.



Quod de septo reliquum est membranaceum, primum dictum CASSE-  
RIO [s], zona VALSALVÆ [t], multo minus [u], vasculosum est  
periosteum cochleæ [x], ipsum perinde, ut pars [y] ossea, duplex,  
cum intercepto spatiolo, in quo spatiolo nervi & vascula decurrunt.  
Penitus in duo cava cavum cochleæ tubulum separat, cum ad ambitum  
exteriolem ejus cavi adnascatur. Eorum vasculorum foramina, quibus  
ex modiollo prodeunt, inter utramque laminam ossei septi apparent [z].  
Idem involucri laminam osseam primo continet, deinde, quando  
ea nunc finem fecit, solum pergit.

Qua vero sede nunc non est modiolus, sed scyphus sive infundibulum,  
ea lamina spiralis multo nunc angustior; sola sua parte levi [a] etiam circa  
infundibulum convolvitur [b], inque ejus latera terminatur, ossea pri-  
mum, denique membranacea, ut tamen prope basin infundibuli [c], hia-  
tu quodam distet, quem pars membranacea laminæ ita dividit, ut ab  
utraque, quam continuo dicemus, scala, in cavum infundibulum aditus  
pateat [d]. Ipsa ea lamina summo fornici cochleæ adhærens finem facit  
sui [e], hamuli in modum, in partem lateri, a quo ultimus gyrus in-  
cipit, opposito inmissa [f]. Ad infundibulum desinere COTUGNUS [g].

Aliter hæc descripsit diligentissimus CASSEBOHMIUS [h], aliter ipse  
MERGAGNUS [i], qui tamen non penitus sibi satisfecit; aliter CO-  
TUGNUS [k]. In centro, sive vertice cochleæ scalas communicare ex  
BARTOLI [l] verbis colligas, ut aeri daretur in circulum via: & fo-  
ramen

[s] p. 59. tum SCHELHAMMERO p. 62. DUVERNEY, p. 38. t. 10. f. 4. 5.  
WINSLOWO n. 536. &c.

[t] p. 76. LIEUTAUD p. 150.

[u] ALBIN. t. 2. f. 5. X. VALSALV. t. 8. f. 7.

[x] LIEUTAUD, MERY p. 444. PERRAULT p. 262. ed. belg.

[y] ZINN p. 32.

[z] COTUGNUS p. 10.

[a] COTUGNUS p. 11.

[b] BRENDÉL p. 403. 410. ZINN p. 32. COTUGNUS p. 11.

[c] BRENDÉL p. 403.

[d] IDEM p. 410. f. 2. ad utrumque latus b. ZINN p. 33.

[e] BRENDÉL f. 3. b.

[f] ZINN p. 33.

[g] p. 11.

[h] Hamulum describit n. 185. 197. & duo foramina n. 193. & canalem scalarum  
communem n. 194. Habet BOEHMER de offib. p. 104. Emendavit ZINNIIUS p. 34.

[i] p. 414. 415. 416.

[k] p. 9. 13. Solam tympani scalam per foramen triangulare cum infundibulo communi-  
care COTUGNUS p. 14. &c.

[l] p. 318. 320.



ramen rotundum, quo scalæ communicant, MERYUS [ *m* ] primus evidenti-  
us dixit; nam etiam WILLISIUS scripserat septum cochleæ for-  
amine interrumpi [ *n* ].

§. XXXIV. *Scala vestibuli. Scala tympani.*

Lamina ea in spiram ducta cochleæ gyratum cavum in duo adeo cava  
dividit. Ea optime ab initio suo [ *o* ] nomina accipiunt, nam a situ nihil  
aut certi definitur, aut facile conspici [ *p* ].

*Scala vestibuli* [ *q* ] in ejus [ *r* ] fori inferiori parte incipit, latiori  
ostio [ *s* ], exterior [ *t* ], & anterior [ *u* ], & inferior [ *x* ] eadem, quam  
fodalis sua, & angustior [ *y* ], & longior [ *z* ], & sectionem ellipti-  
cam [ *a* ] nata.

Aperitur in scyphum, inter hamulum laminæ spiralis ZINNIANUM, &  
fornicem cochleæ [ *b* ].

*Scala tympani* [ *c* ] a fenestra rotunda [ *d* ], initium sui facit, mi-  
nori orificio, interior [ *e* ], posterior [ *f* ], eademque ampliori [ *g* ] se-  
ctione. Pariter in scyphum se aperit, inter hamulum eundem, & pa-  
rietem cochleæ internum [ *b* ].

G g 3

Intus

[ *m* ] p. 446. f. G. f. Inde puto DIONYS. p. 579. & LAMY *des sens* p. 76. & WINS-  
LOW n. 540. & T. IV. n. 406. Habet etiam *Physiologia* batava p. 481. pro re probabili, &  
*Progrès de la Médec.* 1697. p. 28.

[ *n* ] *Anim. brut.* c. 14. Citari video, nam mea editio non habet.

[ *o* ] VALSALVA p. 68.

[ *p* ] MORGAGN. l. c. p. 393. 394. 395.

[ *q* ] CASSEBOHM t. 2. f. 6. c. c. f. 8. d. e.

[ *r* ] VALSALV. t. 8. f. 5. r. CASSEBOHM t. 4. f. 9. i. f. 11. h. f. 12. n.  
t. 1. f. 6. t. 2. f. 5. l. FOLIUS f. 6. g.

[ *s* ] CASSEBOHM n. 190.

[ *t* ] WINSLOW n. 537. CASSEBOHM n. 191.

[ *u* ] MERY p. 445. COTUGNUS p. 12.

[ *x* ] VALSALVA p. 68. Superiorem sed alio sensu vocat. DUV.

[ *y* ] COTUGNUS p. 13. VALSALV. p. 68. T. 8. f. b.

[ *z* ] COTUGNUS p. 13.

[ *a* ] VALSALVA p. 69.

[ *b* ] ZINN p. 33. 34.

[ *c* ] CASSEBOHM t. 2. f. 6. 7. o.


[ *d* ] ALBIN. t. 1. f. 6. v. t. 2. f. 5. u. FOLIUS c.

[ *e* ] CASSEBOHM n. 191.

[ *f* ] COTUGNUS. MERY p. 429. 444. 445.

[ *g* ] COTUGNUS p. 13. VALSALV. p. 68. t. 8. f. 6. CASSEBOHM in prin-  
cipio latiore, deinde angustiore esse n. 206.

[ *b* ] ZINN p. 33.





Intus utraque periosteo [i] vestitur, cum membrana vestibuli vasculosa continuo [k].

Præterea in cochlea, ut in vestibulo, frequenter aquula reperitur [l], sæpe rubra, & viscosa.

§. XXXV. *Antrum nervi septimi.*

Nervi organi auditus alii interni sunt, alii externi. Illi, & horum non exigua portio, sunt a nervo septimi paris [m]. Eorum truncum in *sinum auditorium* antrumve ossis petrosi deduximus: eos inde, oportet suos ad fines deducere.

In ossis petrosi hedra posteriori, medio fere inter fines ossis anteriores & posteriores loco, superno angulo plano propius est quasi foramen, quod oblique antrorsum ducit, & anterieus levi sulco nervos subituros admittit, posterius arcu terminatur in aciem educto [n].

Finis cæcus exterius hoc antrum terminat. In eo duo sunt *recessus*. *Superior* [o], minor, nervum durum accipit, inque aquæductum emit, quem porro nervum cum reliquis descripsimus.

Ex eodem recessu foramen paulo minus aquæductu in vestibuli cavum semi ellipticum ducit [p]. Nervulum ex duro trunco in unum canalem semicircularium per proprium aquæductus foramen BERTINUS, hætenus solus docet [p\*].

*Recessus* inferior major [q], a priori eminente linea separatur [q\*], per eminentem lineam & ipse in duos etiam saccos cæcos divisus [q\*\*], multisque viis patet, per quas rami nervi mollis, ex septimo pare, transeunt.

Anterior

[i] FALLOP. p. 30. COTUGNUS p. 11. DUVERNEY p. 39. MERY p. 444. 445. 460. 461.

[k] CASSEBOHM t. 5. f. 8.

[l] COTUGNUS p. 23.

[m] L. X p. 129.

[n] *Trou auditif interne* WINSLOW n. 541. ALBIN. t. 4. f. 1. LYSER p. 122.

[o] WINSLOW n. 541. ALBIN. t. 2. f. 3. c. BRENDÉL f. 4. 5. 6. c.

[p] CASSEBOHM n. 209. tab. 4. f. 3 & t. 5. f. 15. b. f. 12. i. An macula major MORGAGN. p. 445. 446. Habet etiam COTUGNUS p. 20. & ALBIN. t. 2. f. 3. m. f. 4. n. t. 1. f. 6. r. Est *Première branche* DUVERNEY p. 47. t. 11. f. 10. a.

[p\*] *Osteolog.* T. II. p. 64. 5.

[q] CASSEBOHM t. 4. f. 3. a.

[q\*] WINSLOW n. 542. ALBIN. t. 2. f. 3. h. i.

[q\*\*] BRENDÉL f. 4. 5. 6.



*Anterior* [r] quidem fundus cochleæ respondet, & ejus modiolus, & foramine sæpe aliquo majusculo in eum hiat [s], tum aliis minoribus [t]. Majus foramen præter nervum etiam arteriam ducit [u]. Alia foramina plura, vel unum [x], ad scalam tympani pertinent.

*Posterior* recessus vestibulo propior [y] duo præcipua foramina habet, aut foraminum fasciculos [z], in eam caveam patentes. Eorum primum in cavitatem semiorbicularem [a] ducit, & arteriæ (a\*), & nervo destinatum. Alterum in orificium inferius canalis semicircularis inferioris aperitur.

Tertium & quartum perminuta [c], etiam in vestibulum videntur ducere. Quinque numerat VALSALVA [d], tria, quatuor FALLOPIUS [e], aliquot ALBINUS [f], duo DUVERNEYUS [g], neque res constantem regulam sequitur [i].

### §. XXXVI. *Nervi acustici.*

Ex eo ergo antro, postquam ablegatus est nervus durus, *molles* nervi *acustici* porro in vestibulum, & cochleam, & semicirculares canales se penetrant. Difficilis adeo eorum nervorum expediendorum labor est, ut etiam narrantis sermo sit difficilis futurus; eo obscurior, quod non propria hic experimenta profero, sed aliorum, postquam opportunitate omni ad propriam indaginem ex vitæ meæ mutato genere sum exclusus.

In

[r] Sinuositas MORGAGN. Ep. XII. n. 11. 29. una VALSALV. p. 70.

[s] BRENDL p. 408. CASSEBOHM p. 215. t. 5. f. 15. c. t. 4. f. 2. f. add. MORGAGN. p. 440.

[t] CASSEBOHM t. 5. f. 15. d. MORGAGN. p. 439. 440. 441. n. 43. 44. 45. VALSALV. p. 76. t. 10. f. 2. COTUGNUS p. 19. DUVERNEY p. 46.

[u] CASSEBOHM n. 243.

[x] BRENDL ibid. COTUGNUS p. 18.

[y] BRENDL ibid.

[z] Foramina CASSEBOHMIIUS, DUVERNEYUS. Fasciculos reticulorum foraminum MORGAGNUS, COTUGNUS.

[a] CASSEBOHM t. 5. f. 15. e. t. 4. f. 8. f. f. 11. h. f. 12. k. COTUGNUS p. 21. An macula minor MORGAGN. p. 446. [a\*] CASSEB. n. 241.

[b] CASSEBOHM t. 5. f. 15. f. t. 4. f. 8. b. f. 12. m. An non MORGAGN. n. 42. p. 438. 439. aut macula tertia MORGAGN. p. 447. Habet COTUGNUS p. 22. An non *seconde branche* DUVERNEY p. 48. l. c. b. Negat tamen CASSEBOHM n. 230.

[c] CASSEB. t. 5. f. 15. g. h. f. 8. i. h. f. 12. l.

[d] p. 72. t. 8. f. 2. g. t. 10. f. 1. 2.

[e] p. 30.

[f] n. 2. f. 3. o. p.

[g] p. 47. 48.

[i] MORGAGN. Epist. XII. n. 41. p. 438. 444. ALBINUS l. c.



In ipso ergo fundo sinus auditorius in ramos cochleæ finditur, nervosque vestibuli [k]. Pars major [l] vestibulum subit, eaque via fila nervi mollis duo perpetua, alia minus constanter subeunt.

Perpetuum quidem est, quod ex sinu cæco superiori fossæ auditoriæ advenit [m].

Alterum pene perpetuum, quod subit per foramen recessus posterioris sinus inferioris, & in cavum semiorbiculare penetrat [n].

Aut adest aut abest ramus tertius, qui foramen habet in principio foraminis proprii canalis semicircularis majoris [o]. Tum duo alii [p], qui per foramina minus constantia vestibulum subeunt. Eorum, qui ultimo loco dicitur, venit a ramo nerveo cochleæ [q].

Quinque adeo, ubi multi [r], trunci molles sunt. Alias duo [s], ubi pauci.

Atque iterum hic redit observatio, alias has nervi mollis fibras integro fasciculo [t] per continua foramina trajici, alias per cribrosarum laminarum poros minutissimos [u], ut cum nervulis os cribrosum terebrantibus comparentur.

#### §. XXXVII. *Nervi in vestibulo.*

Perobscura sunt, quæ nunc sequuntur; si enim nervos molles in olfactus organo difficile est sequi, longi qui sint, & a dura membrana vaginas proprias habeant; tunc brevissimos, mollissimosque nervos, per durissima omnium ossium, sequi omnino intelligitur difficillimi laboris esse.

Nervus

[k] VALSALVA p. 71.

[l] IDEM t. 8. f. 8 9. 10.

[m] CASSEBOHM n. 229. ramus secundus t. 5. f. 15. m. DUVERNEY t. 10. f. 10. a. p. 47. (la plus considerable). COTUGNUS p. 20.

[n] CASSEBOHM n. 229. t. 5. f. 15. n. ramus tertius COTUGNO p. 21. n. 28. Num hæc potius *seconde branche* DUVERNEY p. 48.

[o] CASSEBOHM n. 229. Cui ramus quartus est.

[p] IDEM ibid. Cui quintus t. 5. f. 15. p. & sextus t. 5. f. 15. q.

[q] IDEM n. 224. 229.

[r] IDEM n. 230. VALSALVA p. 72.

[s] EUSTACH. p. 159. COTUGNUS p. 18. t. 2. f. 1. 2. 3. VIEUSSENS p. 69. DUVERNEY n. 45. t. 11. f. 3. demto nempe cochleæ nervo.

[t] Ita sumit DUVERNEY. CASSEBOHM. VALSALVA.

[u] Ita MORGAGNUS p. 444. COTUGNUS p. 20.



Nervus quidem vestibuli, quem primo loco diximus [x], in vestibulo in tuberculum [y] mollissimum abit, ad foraminis ovalis finem anteriorem.

Alter ramus, quem secundo loco diximus [z], unice perioestio vestibuli sub membranæ crassæ specie incumbit [a].

Ramus tertius, minus perpetuus, & ipse eminentiam minorem [b] efficit, in orificio proprio canalis semicircularis inferioris.

Ab aliquo reliquorum nervulorum nascitur minus perpetua eminentia tertia [c], minima, inter id orificium & cavum semiorbiculare posita: reliqua pulpa nervea cum perioesteo vestibuli confunditur [d].

Ab istis nerveis pulpis, aque utraque meninge, formatur membrana in vestibulo expansa [e], adhærens parti superiori pyramidis COTUGNI, deinde in ambitu vestibuli, & vestibulum separans in partem inferiorem [e\*], & superiorem [f].

Ab ea membrana in canales semicirculares continuata pulpa subit [g], quæ minus commode funiculus nerveus vocatur.

Quæ filamenta nervea & MORGAGNUS [i], & SIMONCELLIUS [k], & VIEUSSENIUS [l], & DUVERNEYUS [m], & CASSEBOHMIUS [n], & MERYUS [o] in canalibus semicircularibus

[x] p. 240.

[y] CASSEBOHM n. 231. tab. 5. f. 1. 2. f. 3. a. Une boupe DUVERNEY t. 10. f. 10. p. 47. VIEUSSENS p. 70. Habet MORGAGNUS n. 54.

[z] p. 240.

[a] CASSEBOHM n. 231. t. 4. f. 12. u.

[b] IDEM ibid. t. 4. f. 9. b. tab. 5. f. 3. b. Eo refert Cl. vir Eminence seconde DUVERNEY l. c. p. 48. Sed priori nervo eandem tribuit.

[c] CASSEBOHM n. 231. t. 5. f. 1. 2. g.

[d] IDEM n. 231. fin.

[e] IDEM n. 234. t. 5. f. 1. 2. h. f. 3. c g. Membrane nerveuse VIEUSSENS p. 70. Habet VALSALVA p. 72. MORGAGN. Epist. XII. n. 52. p. 452. 453.

[e\*] MORGAGN. p. 453. Anteriorem & posteriorem COTUGNUS p. 20.

[f] Septum nervosum vestibuli vocat COTUGNUS n. 26. 27. p. 20. 21. Etiam animalia habent p. 41.

[g] VALSALVA p. 72. 73. 74. 75. t. 8. f. 8. 9. 10. t. 10. f. 3. cui sunt zona sonora CASSEBOHM. n. 234. 240. t. 5. f. 1. 2. i. k. f. 3. d. e. f.

[i] n. 55. p. 457.

[k] Apud DESNOUES sæpe dicto loco, in literis ad Gulielmum.

[l] De l'orcille p. 70. Neurograph. p. 198.

[m] p. 48. t. 10. f. 10.

[n] n. 238.

[o] p. 457. Item LAMY præf.



bus viderunt, ea mihi videntur vasa (*p*) potius fuisse. Zonas denique in mediis canalium semicircularium diametris quasi suspensas (*q*), VALSALVA dixit (*q*<sup>\*</sup>); ex aut sicci periostei videntur esse reliquæ (*r*), aut pulposæ membranæ, quam diximus (*s*), portiones, aut denique vavorum (*t*). Neque WINSLOWIUS ejusmodi zonas reperit (*u*), neque etiam in ovibus ALBINUS, in quibus VALSALVA invenerat.

A pulpa nervea in vestibulum recepta etiam per scalam vestibuli subeuntem propaginem VALSALVA hætenus solus describit (*x*), ut tamen ipsi dubium de suo invento superfit.

### §. XXXVIII. *Nervi cochleæ.*

Diximus nervi mollis alium præcipuum truncum cochleæ destinari (*y*). Grandis ergo truncus (*z*) idemque anterior nervi mollis, præcipua quidem parte sua subit sinuositatem; quæ basi cochleæ subest (*a*). Videtur (*b*) modioli subire sulcum, perque eum ad scyphum usque adscendere, neque enim ars ulla per id iter nervum profequatur (*c*). Alii furculi per exigua foramina versus cochleam subeunt (*d*), & porro videntur cum modiolo pergere.

Nervum autem aliquem conspicua filamentum specie per cochleæ spiras circumduci (*e*), nunquam vidi.

Sed

- (*p*) Eriam MORGAGNO.  
 (*q*) VALSALVA p. 75. jam dixerat suspensos nervos MERRY in LAMY præf.  
 (*q*<sup>\*</sup>) p. 72. 73. 74. 75.  
 (*r*) CASSEBOHM n. 240.  
 (*s*) p. 241.  
 (*t*) MORGAGNUS n. 56. p. 458.  
 (*u*) T. IV. n. 405.  
 (*x*) T. 8 f. 8. h.  
 (*y*) p. 240.  
 (*z*) CASSEBOHM t. 5. f. 15. l. VIEUSSENS t. 6. f. 1. 2. g. DUVERNEY t. XI. f. 2. d. & olim EUSTACHIUS p. 159. & FALLOPIUS p. 30.  
 (*a*) MORGAGN. n. 44. p. 440. VALSALVA p. 71. 76.  
 (*b*) CASSEBOHM n. 224. t. 5. f. 15. c. etiam MORGAGNUS l. c. p. 441. Sal. ALBERTI l. c. VIEUSSENS p. 71. 72.  
 (*c*) Num subeat, dubitabat EUSTACHIUS p. 159. Negat MERRY p. 457. & ex eo LAMY in præf. & p. 78. In elephanto evidentius videtur Phil. transf. n. 358.  
 (*d*) CASSEBOHM t. 5. f. 15. d. MORGAGN. n. 45. p. 441. 442. 443. DUVERNEY p. 46. VALSALVA p. 76. VIEUSSENS p. 71. WINSLOW n. 409. Tractum spiralem foraminosum vocat COTUGNUS p. 18. 19.  
 (*e*) Uti pingit VALSALVA tab. 8. f. 8. 9. t. 10. f. 3. SIMONCELLI l. c.



Sed nequidem manus anatomicæ etiam summa industria nervulos ex modiololo per foramina, jam a nobis expofita, aut in fcalam cochleæ alterutram (*f*), aut in duplicis, laminæque spiralis (*g*) membranaceum complementum efficientis, perioftei intervallum duxerit, etfi eo ire ratio fatis probabilis (*h*) fuadet. Ex molliffimo vero nervo durum offeumque fcyphum formari (*i*), qui eft in modiololi fine exteriori, id quidem minime probabile eft, neque magis credas ex eo nervo laminam fpiralem nafci. (*k*).

### §. XXXIX. *Nervi reliqui auris.*

Præter eos, quos diximus, furculos, intimæ auri impenfes, eosque, quos a nervo duro (*l*) ad tympanum mediumque auditus organi cavum dixi impendi. Superfunt tangendi ii, qui ad extimam auris regionem, ad auriculam, & meatum auditorium, tendunt.

Primus nervus durus, paulo poftquam ex aquæductus oftio prodit, furculum dat, qui circa auriculam reflexus, pofterioribus ejus mufculis, & ipfi auriculæ, & trago & antitrago ramos exhibet (*l*\*). In eum profundus ramus nervi tertii cervicalium inferitur (*m*).

Altera Quinti (*n*), & quidem tertii ejus rami propago, auricularis eadem, quæ aliquot furculis fecundum maxillam inferiorem in duri nervi ramos fe inmittit, ramos etiam dat ad auriculam, helicem, tragum, antitragum, anthelicem, fcapam, conchæ convexam fedem; aliosque profundiores furculos in meatum auditorium emittit. Ab hocce nervo ufto ad anthelicem, prope Tragum, odontalgia tolli dicitur (*n*\*).

Tertius auriculæ nervus a tertio cervicalium pare nascitur, qui cum fecundo conjungitur, ejusque primus furculus *nervus* eft *pofterior auricula*

H h 2

(*f*) Tympani COTUGNUS p. 18.

(*g*) Certiffime eo ire, eo certe fe tendere vidiffe, COTUGNUS p. 29. EO VIEUSSENS p. 71.

(*h*) MORGAGNUS p. 442. 443. COTUGNUS p. 19. ALBINUS. 2p. Du Bois de auditu n. 40. Etiam VALSALVA unice conjectura eft p. 76.

(*i*) VIEUSSENS p. 72.

(*k*) Ibid. p. 75.

(*l*) L. X. p. 227. feqq.

(*l*\*) Ibid. p. 228. MEKEL. Mem. de Berlin. T. IX. ann. 1752. p. 75. feqq. n. 75. VALSALV. tab. 2. O. DUVERNEY p. 50.

(*m*) WINSLOW n. 183. ILL. MEKEL. &c. p. 99. n. 1.

(*n*) L. X. p. 219. 220.

(*n*\*) BARTHOLIN. Cent. IV. Hist. 80. CHESELDEN Anat. VI. edit. p. 214. DIEMERBROECK p. 412.



*culæ* (o), idemque ramum profundum emittit duro nervo insertum. Deinde ab eo pare furculus nascitur, qui trans muscolum mastoideum in conchæ sedem (p) venit, & ad summum auriculæ apicem in cartilagine innotinam, & helicem (q) tendit. Cum aliis sui trunci ramis occipitalibus etiam communicat. In aliis cadaveribus ad tertium cervicis pertinet.

Porro tertii cervicalium ramus est *auricularis anterior*, qui & ipse per glandulam parotidem cum nervo duro communicat. Is alias in eum nervum, quasi evanescit (r). Alias eo major, ut ipse trunci dignitatem tueatur, per tragus, antitragum, lobulum, anthelicem, scapham dividitur, uti omnino vidi.

Ad musculos auris posteriores a nervorum cervicis pari secundo furculi veniunt (s).

#### §. XL. *Arteriæ organi auditus.*

Multæ & exiguæ sunt hujus organi arteriæ, neque hætenus omnes innotuerunt, parvæ cum sint, & cum eas per durissima ossa necesse sit persequi. Quæ tamen nunc dicentur, vera erunt, etsi non omnino plena.

Auricularem posteriorem arteriam diximus (t), quæ vel propria est arteriæ carotidis externi propago, vel ex occipitali nascitur. Ejus truncus in plica inter caput & aurem adscendit ramosque emittit inferiores ad lobulum, tragus, antitragum, meatum auditorium, hos inosculatos temporalis arteriæ profundis ramulis: porro superiores alios ad concham, helicem, anthelicem, & reliquam auriculam, inosculatos anterioribus (u). Ab ea plerumque arteria *stylomastoidea* (x) nascitur comes nervi duri, quæ meatui auditorio dat ramum, & furculum, a quo corona illa membranæ

(o) MERKEL p. 100. n. 103. EUSTACHIUS Tab. 21. 23. BERRETTIN t. 16. f. 1. DUVERNEY p. 53 t. 12. f. 3. WINSLOW T. III. n. 184. nam secundum ipsi par est, quod nobis tertium. VALSALVA t. 2. B. Descripsit olim Job. a MERKEL C. 55.

(p) MERKEL n. 268. 272.

(q) IDEM n. 270. 276.

(r) Ita ILL. MERKELIUS.

(s) Primo VIEUSSSENS *neurogr.* p. 212. sed aliter numerat.

(t) L. X. p. 113. DUVERNEY t. 2. f. 1. 2. B. p. 4. VALSALVA tab. 2. ubi resecta indicatur.

(u) Fascic. VIII. Tab. corp. post. e. & L. X. p. cit.

(x) L. X. p. 113.



membranæ tympani nascitur. Ea nempe circumlegens anuli sedem exteriorem, auditorio meatui obversam, plerumque cum furculo primo arteriæ a temporali natæ, & articulationem maxillæ adeunte, coronam facit, a qua a. buscula ( $y$ ) illa arteriosa per membranam tympani descendit, parallela manubrio.

Alter ejusdem trunculi furculus super membranam tympani antè in tympanum subit ( $y^*$ ) per anuli hiatum.

Arteria *temporalis*, uti secundum auriculam antè ad tempora prope- rat, multos ad auriculam ramos edit. Eorum primus, articulationi datus maxillæ, furculum emittit per fissuram articulationis, comitem chordæ tympani, & musculi mallei anterioris. Ab eo furculo est is, qui tympanicam edit, aut cum auriculari, aut solus.

Imi adeunt meatum auditorium, & rete faciunt cum ramis arteriæ auricularis posterioris ( $z$ ).

Sequentes adeunt tragus, & initium meatus, & incisuram primam ( $a$ ); tum alii helicem, scapham, anthelicem, partem meatus superiorem, helicem iterum, & anthelicem, & concham, majori anastomosi cum posteriori commissi, & alius circa helicem circumflexus ( $b$ ).

Ab occipitali, stylomastoidea, vel auriculari postica, prodeunt minuti in cellulas mastoideas furculi ( $c$ ).

A maxillari interna supra ligamentum transversale maxillæ, furculus oritur ad tubæ musculum, tubam ipsam mollem, & meatum auditorium.

Interioris auris multi sunt trunculi. A stylomastoidea ramuli ex aquæductu FALLOPII adeunt cellulas mastoideas ( $d$ ), musculum stapedium, & canalem semicircularem anteriorem, qua aquæductui est vicinissimus; & ramulus in partem posteriorem superiorem cavi tympani venit, ei inosculatus, quem proxime dicam. Hos, aliosque ramos, rectius meningæ tribuas.

A meningea furculus prodit, cujus prima ( $e$ ) propago tympani cavum adit, ad fenestram ovalem usque, & incudis sedem, per periosteum divisus.

H h 3

Alia

( $y$ ) R U Y S C H *Epist.* 8. t. 9. f. 9. & p. 201. D U V E R N E Y *postb.* T. 12. f. 2. 5.

( $y^*$ ) Nonne is, quem cum musculo externo advenire R U Y S C H I U S auctor est *Ep.* 8. p. 11. & C A S S E R O H M n. 79. Habet D U V E R N E Y *postb.* tab. cit. f. 4.

( $z$ ) Ibid. 2. p. 18.

( $a$ ) Vide *Fasc.* V II. tab. corp. ant. B. C. E. F. G. D U V E R N E Y t. 2. f. 1. ad C. D. p. 4. 5. V A L S A L V A tab. 2. t. t.

( $b$ ) n. 23.

( $c$ ) Z I N N p. 39.

( $d$ ) L. c. p. 8.

( $e$ ) *Fasc.* VIII. p. 16. *Fasc.* II. m. Hic & alter sunt, quorum foramina dixi p. 227.



Alia ejusdem propago, major, in partem anteriorem superiorem tympani descendit, in promontorium, sedem foraminis rotundi, sedem tympani anteriorem. Etiam hæc distincta propago fuit.

Trunculus idem meningæ datus ad quintum par ramulis, per hiatum FALLOPII (*f*) subit, inque stylomastoideam nunc perexiguam inferitur.

Tertius furculus meningæ, extra cranium natus, aliquando etiam ex trunco maxillaris internæ (*g*) ortus, in canalem muscoli mallei venit (*h*), cumque eo in tympanum abit, alio vero furculo chordam tympani, musculumque FOLII sequitur (*i*), malleumque adit, recta & majuscula anastomosi cum stylomastoideæ ramulo inosculatus

Alius a Carotide interna (*k*), dum per os petrosum transit, & anteriorem limitem tympani legit, venit in promontorium.

Sed & pharyngea arteria furculum cum tuba in tympanum mittit.

Denique præcipua arteria labyrinthi est ex aliquo ramo arteriæ basilaris in ponte nato, & adeunte etiam inferiorem sedem cerebelli (*l*). Is cum nervo molli subit sinum auditorium, & præcipuo trunco vestibulum adire dicitur (*m*), per foramina minima ejus cellulae, indeque & per singulos canales semicirculares circellos absolvere, in se ipsos redeunt (*n*), & per cochleam circumduci (*o*).

Cochlea aliam arteriam habet, ab eadem quidem auditiva natam (*p*), quæ per canalem modioli subit, & demum in scyphum penetrat, perque eum stellatis (*q*) furculis finitur, perque minima etiam foramina cochleæ (*r*) in scalas ejus ramulos dat.

Sed

(*f*) L. X. p. 116. CASSEBOHM n. 105. 248. PLATER p. 26. l. 29. Contrario ductu erepere ad duram matrem dixit DISDIER *splanchnol.* T. II.

(*g*) *Id. art. max. int.* not. 1.

(*h*) CASSEBOHM n. 105. 248. ZINN p. 38.

(*i*) *Fascic.* VIII. p. 16.

(*k*) *Fasc.* VII. p. 2. L. X. p. 119. VALSALV. t. 7. f. 1. p. 55. an COLUMBUS p. 182. 183. & HABICOT L. 10. d. 5.

(*l*) *Fasc.* VII. f. 1. a. m. p. 10. L. X. p. 133. WINSLOW n. 101. Pro morbo habuit optimus SEVERINUS *occult. abscess.* p. 272.

(*m*) CASSEBOHM t. 1. f. 3. x. & n. 241. DUVERNEY t. 10. f. 7. a.

(*n*) CASSEBOHM t. 5. f. 15. e. t. 4. f. 8. f. 11. h. f. 12. k. aut t. 4. f. 8. b. f. 12. m. & n. 245. DUVERNEY f. 8.

(*o*) DUVERNEY f. 8. B.

(*p*) CASSEBOHM n. 243. COTUGNUS p. 72.

(*q*) ZINN p. 35. COTUGNUS t. 1. f. 7. o.

(*r*) CASSEBOHM *ibid.* COTUGNUS p. 72.



Sed etiam per cochleæ utramque (s) scalam vasculum incedit, quod in similes spiras convolutum, hinc & inde ramos in periosteum (s\*) mittit. Truncus scalæ vestibuli est ab arteria (t) vestibuli; trunculus scalæ tympani ab arteria sodali venæ jugularis, sive ea ab occipitali fuerit, sive a pharyngea (u).

§. XLI. *Venæ organi auditus.*

Externæ quidem auriculæ venæ a temporali (x) utraque, simili modo veniunt, ut arteriæ solent, hinc ad anteriorem auriculæ sedem, inde ad posteriorem.

Venam tympani (y) in sinum magnum sive diverticulum venæ jugularis (z) Cl. viri deduxerunt, neque enim hic propria experimenta ulla habeo.

Aliæ per cellulas mastoideas perque foramina circa eum processum minimæ (a) Cl. viro visæ sunt.

Venam vestibuli, suspicatus erat CASSEBOHMIIUS (b).

In canalibus semicircularibus duas venas arteriarum comites IDEM vidit (c); originem a diverticulo venæ jugularis divinavit potius, quam vidit (d).

Venas arteriarum in canalibus semicircularibus sodales, & in scala vestibuli DUVERNEYUS ita dixit, ut non videatur satis certo vidisse (e).

In scala tympani foramen venosum dixit CASSEBOHMIIUS (f), quod ad arteriam ZINNIUS noster retulit (g).

Ex

(s) CASSEBOHM n. 244. t. 5. f. 8.

(s\*) RUYSCH *Thes.* II. aff. 2. n. 9.

(t) p. 246.

(u) ZINN p. 39.

(x) ARISTOTELES *Hist. anim.* L. III. n. 2. ex DIOGENE APOLLONIATA a venis colli.

(y) DUVERNEY *tab.* 9 f. 1. B. VALSALV. p. 55. non membranæ tympani, ut citat CASSEBOHMIIUS.

(z) Duæ, tres CASSEBOHMIIUS n. 106.

(a) IDEM *ibid.* t. 1. f. 1. w.

(b) n. 242.

(c) n. 245.

(d) n. 246.

(e) p. 41. 42.

(f) n. 244.

(g) p. 39.



Ex canali stylomastoideo venam ad diverticulum ire etiam CASSEBOHMI est suspicio (*b*).

Denique venam cochleæ, quæ per zonam & scalas ramos suos spargat, vere reperiri COTUGNUS iterum confirmat (*i*), cujus truncus collectus ex utraque scala in scalam tympani confluat (*k*), & per proprium foramen (*l*), proxime orificium aquæductus cochleæ, per cranium se penetret, & versus jugularem venam pergat, & videatur in sinum petrosum inferiorem aperiri (*m*). Eadem vena ramum a vestibulo adcipit (*n*).

Alia vero princeps vestibuli vena (*o*) ex omnibus canalibus semicircularibus, & vestibulo collecta, & per foramen (*p*) in rima aquæductus vestibuli in cranium venit, inque lateralem sinum aperitur (*q*).

Ego vero venam præcipuam hic desidero, comitem nervi acustici, quam cum arteria advenientem certe vidi, etsi furculos non sum persecutus. Valde probabile videtur, ab ea potissimum vena vestibuli vascula provenire. Neque enim in minoribus furculis usquam facile arterias venæ deferunt, etsi truncis suis differunt.

#### §. XLII. *Vasa lymphatica organi auditus.*

Vasa lymphatica non video, etsi novi, tamquam vere conspecta describi. Nam VIEUSSENI (*r*) vasa lymphaticonervea, sæpe meræ cellulosæ fibræ sunt, & unica de his vocula apud Clar. virum exstat. VALSALVA meram conjecturam habet (*s*). Negat se simile quid reperisse CASSEBOHMIUS (*t*).

Aliud genus vasorum lymphaticorum, non valvulosum, aptum tamen resorbendo humori cochleæ & vestibuli, laboriose descripsit Cl. COTUGNUS.

(*b*) n. 248.

(*i*) p. 70 71.

(*k*) Duo rami t. 1. f. 5. g.

(*l*) t. 1. f. 1. r.

(*m*) p. 71.

(*n*) p. 71. t. 1. f. 5. h.

(*o*) p. 72.

(*p*) t. 1. f. 4. i.

(*q*) p. 72.

(*r*) p. 27.

(*s*) p. 16. & p. 55.

(*t*) n. 107.



GENUS. Canalis nempe, quem MORGAGNUS sulco comparavit (*u*), per os petrosum continuatur (*x*), perque ejus rimam (*y*) in proprium exiguum sinum (*z*) ducit venulas lymphaticas (*a*), inque sinum notissimum transversum duræ membranæ (*b*), etiam in bestiis conspicuus (*c*).

Cochleæ vero *aquæductus* (*d*) prope fenestram rotundam, in tympani (*e*) scala incipit (*f*), & per proprium etiam semicanalem (*g*) ostio arcu munito (*h*) proxime iter nervi glossopharyngei (*i*), in caveam cranii patet.

Nova ista, neminique dicta, speramus aliorum incisorum experimentis iri confirmatum; ne quis ob vasculorum, potius insperforum sinui duræ membranæ quam inmissorum, habitum aliter de origine & fine earum venularum statuatur.

## SECTIO II.

### SONI THEORIA PHYSICA.

#### §. I.

**E**Tiam hic repeto, non semel a me iteratam confessionem. Utor divitiis collectitiis, neque in hac theoria proprium habeo inventum. Deinde neque plenum sermonem promitto, cum longi operis numerosas partes oporteat breves esse.

#### §. II.

(*u*) CORUGNUS n. 59. p. 49. add. t. 1. f. 3. l.

(*x*) t. 1. f. 2. k. f. 3. m.

(*y*) p. 50. f. 1. i. f. 4. i. t. 2. t. t.

(*z*) n. 64. p. 54. n. 65. p. 65. t. 2. s.

(*a*) t. 2. x. x. z. z.

(*b*) p. 56.

(*c*) Id p. 59. n. 69.

(*d*) p. 62. n. 73. p. 64. 65. n. 75. t. 1. f. 1. b. b.

(*e*) f. 3. p.

(*f*) Add. t. 1. f. 2. k. f. 3. q.

(*g*) f. 5. c.

(*h*) p. 66. t. 1. f. 2. k. f. 4. l. t. 2. k.

(*i*) p. 68. n. 80. t. 1. f. 1. q.



§. II. *Sonus est tremor.*

Sonum hic non dicimus mentis sensationem; id unice volumus, eam in corporibus nobis circumpositis conditionem physicam, a qua soni sensatio in mente nascitur, si organum auditus sanum liberumque habuerit.

In eo corpore, quod sonum excitat, experientia ostendit tremores alternos & vibrationes eo tempore peragi, quo excitat sonum. Earum ratio simplicissima est, ut particulæ tremantis corporis tamquam chordæ considerentur, quæ ex rectitudine alterna in curvam lineam deprimantur, cujus maxima curvitas, sive distantia a chordæ ante sonum rectæ maxima sit in ejus lineæ medio; alterne vero in eandem rectitudinem reddantur, in qua quiescunt (*k*).

Hæc dum undique in corpore sonoro fiunt, fit ut tota campana, dum sonat, alternis vicibus amplior fiat, chordis singulis in curvitatē eductis, ut in ampliorem per transversum ellipsin mutantur; & vicissim in ellipsin secundum alteram diametrum ampliorem mutatis, secundum vero priorem brevioribus, dum in rectitudinem redeunt (*l*). Hæc quidem non ex theoria, sed ex vero experimento innotuerunt. Etiam anulus percussus abit in ellipsin transversum latiore (*m*).

Inde etiam fit, ut in scypho vitreo, aqua pleno, dum digito raditur sonumque edit, aqua subsiliat, guttulasque projiciat, & pariter & aqua & hydrargyrus etiam a remotis corporibus sonoris in tremorem cieantur (*o*).

Quare cum elastici unice corporis sit, alterne oscillare, & ire atque redire, sola etiam elastica corpora (*p*) sonum edunt, eo magis quidem, quo duriora sunt, & compressionis magis impatientia, ut leviter flexa, facile

(*k*) HELSHAM *lectures* p. 258 t. 7. f. 11. NOLLET *Leç. de physiq. exper.* T. III. p. 398. t. 1. f. 3. EULER *de musica* n. 2. ROUHAULT *phys.* ex edit. CLARKII L. I. c. 26. n. 16. BIRCH T. IV. p. 46.

(*l*) NOLLET l. c. p. 399. f. 7. DESAGULIERS T. II. p. 6. 7. S'GRAVEZANDE T. II. n. 2314. BIRCH. l. c. ROUHAULT n. 19. WOLF *Versuche* T. III. p. 32. 36. Le CAT p. 262. KIRCHER *phonurg.* p. 185. de scypho vitreo. PERRAULT p. 208. 214. ed. belg du Bois *de sono & auditu* diss. I. n. 3. In scypho vitreo KIRCHER *phonurg.* p. 188. In scypho lineis spiralibus inciso lineæ insigniter longiores fiunt, & breviores, dum raditur BOYLE *of languid motion*.

(*m*) WEDEL *de contrafissur.* p. 32. In vitro BIRCH. l. c.

(*o*) BARTOLI p. 137. 173.

(*p*) MUSSCHENBROECK n. 1417. NOLLET l. c. p. 398.



facile rumpantur, qualia sunt fragilia metalla ( $q$ ) ex cupro & cadmia, cupro & stanno ( $r$ ), cupro stanno & bismutho ( $s$ ) composita. A magno frigore clavicymbali chorda tono integro altius sonavit ( $s^*$ ). Huc, ob tensionem suam, quam patiuntur, adhibentur intestina animalium; vel demum inter ligna ea, quæ sunt quam maxime elastica.

Quare & mollia metalla vix resonant, ut aurum & plumbum ( $t$ ).

Ex eadem ratione etiam chorda tensa resonat, non tensa nihil quidquam.

§. III. Sed tremor particularum minimarum corporis sonori.

Dudum demonstraverunt recentiores philosophi, ut sonus nascatur, non sufficere corporis sonori in aere oscillationem; & requiri omnino elementorum solidorum ( $u$ ) ejus corporis tremores, itusque & reditus. Ita forceps ferrea, cujus crura ad contactum adducta fuerunt, dimissa, tremit tota & vibrat, verum sonum non edit, dum oscillat, & etiam quando percussa fuit, levem debilemque dat sonum. Eadem vero forceps, si extremis finibus in durum corpus incurrerit, tremit ( $x$ ), ut digito oscillationem sentias, sonatque; idemque fit, si coercitis finibus, per latus duro corpore plectatur ( $y$ ). Ita chorda clavicymbali percussa a duro corpore tremit, & sonat: eadem, si clavis obducta panno deciderit ( $z$ ), vibrabit quidem, sed non sonabit; iterumque sonum reddet, si in corpus durum incurrerit.

Campana nive tecta ( $a$ ) oscillat, sed non sonat, & plectrum oleo obductum ( $b$ ) si fidem percusserit, faciet, ut oscillet, ut sonet non faciet, quia molliter percussa in elementis non tremit.

I i 2

Porro

( $q$ ) NOLLET p. 403.

( $r$ ) Partes cupri tres, stanni quinque KIRCHER *Musurg.* p. 520.

( $s$ ) MERSENN. *harmonia instrument.* p. 155.

( $s^*$ ) K. *Svensk. Acad. handl.* 1760. trim 4.

( $t$ ) ROUHAULT n. 24. Aurum siamense mollius est, hinc sonus in chordis gravior *Mém. avant.* 1699. T. II. p. 21.

( $u$ ) F. Tertius de LANIS L. IX. c. 3. GRIMALDI *physico mathes. de lumine, colore & Irade* Bonon. 1666. *Mém. de l'Acad.* 1716. p. 340. La Hire de la trompette marine p. 522. CARRE *Mém.* 1709. p. 58. 59. MUSSCHENBROECK n. 1407. S'GRAVEZANDE n. 2315. 2316. DESAGULIERS T. II. p. 7. Du Bois n. 4. s. 22.

( $x$ ) MUSSCHENBROECK n. 1414. Add. la Hire de la tromp. mar.

( $y$ ) S'GRAVEZANDE l. c.

( $z$ ) MUSSCHENBROECK n. 1408.

( $a$ ) ROUHAULT n. 17. MUSSCHENBROECK n. 1413.

( $b$ ) MUSSCHENBROECK n. 1409.



Porro, etsi hic aliqua postea demum demonstranda nobis sumimus, tamen aliud experimentum huc pertinet, & ostendit, omnia elementa corporis sonori ad sonum conferre, non superficiem solam. Ut cylindrus octavam edat soni alterius cylindri, necesse est, non duplam esse, sed octuplam, idque in campanis & cylindris pariter obtinet (*c*). Octies nempe plura elementa tremere oportet, ut dupla prioris octava nascatur (*d*).

Is in particulis minimis tremor facile digitis, & in vitro spiralibus ligneis inciso (*e*) percipitur, idemque in vasis aqua plenis, has, quas diximus (*f*) undas excitat, quas adnotatum est, non ab ambitu ad centrum tendere, ut fieret a simplici dilatatione vitri, sed totam aquam incrispari (*g*).

Hinc cum corporum valde sonorum particulæ facile divellantur, facile etiam eadem a sonis ipsis franguntur. Celebris fuit olim caupo Londinensis (*b*), P E T T E R, aliosque *Conradus MEYER* (*i*) in belgio, & alii iterum (*k*) nuperiores lucrosi experimenti artifices, etsi non omnes norunt id artificium imitari. Ejus cauponis artificium erat, certo tono, quem alias definiemus, in vitrum *inclamato*, vitra frangere, ut etiam 25. scyphos ex ordine ruperit (*l*), intra unicam semihoram. Rumpuntur autem voce ex gravi in acutam mutata (*m*), celeritate nempe vibrationum aucta. Rumpuntur etiam absque voce hominis, sola strictione fidium (*n*), cum scypho unisonarum subito in acutiem mutato, aut vitri rapidiori rasione (*o*).

## §. IV.

(*c*) MERSENN. *Harmon.* L. I. artic. II. p. 267. Cylindris ligneis ad musicam utuntur Nigritæ, iisque notas musicas reddunt LIGON *barbad.* p. 49.

(*d*) CARRE *Mém. de l'Acad.* 1709. p. 58. 59.

(*e*) BOYLE *languid and. unheeded motion.*

(*f*) p. 250.

(*g*) BARTOLI p. 140. 141.

(*b*) MORHOF *ὑαλονκλασις* Kicl. 1682. 4. du HAMEL *de corpor. affect* p. 173.

(*i*) BARTOLI p. 194.

(*k*) MORHOF p. 243. de LANIS II. p. 395. Nuperiores P. V. UFFENBACH *Reisen* T. III. p. 240. HEISTER *vit.* p. 26. WOLF *Versuche* T. III. n. 23. PILKINGTON *Mémoires.*

(*l*) MORHOF p. 18.

(*m*) IDEM p. 133.

(*n*) BARTOLI p. 189.

(*o*) MORHOF.



§. IV. Transmissio soni.

Per pleraque omnino corpora sonus transfertur, & in diffita loca tremor iste propagatur. Ostendendum est primo per dura corpora ( $p$ ) propagari, cum exciderit Cl. viris, solum per aerem sonum transmitti.

Primum id ostendit evidentissime modus ille audiendi, quo etiam surdi audiunt. Quibus nempe per aures sonus non exauditur, ii tamen audiunt, si ferreum ( $p^*$ ) bacillum, in exemplo, dentibus prehenderint, isque bacillus percussus fuerit a colloquente: ita percipiet æger sonum stridentis ferri; idemque fiet, si instrumentum musicum quodcunque mordicus dentibus tenuerit. Verba loquentis per baculum, & loquentis & audientis dentibus correptum, bene audiunt etiam surdastri ( $q$ ), & ex hoc experimento nata est methodus, qua surdi audire discunt: oportet autem auditurum dentes superiores adhibere, loquentem ore instrumentum continere sufficit ( $r$ ). Qui obturatis auribus baculo instrumentum tangit ( $r^*$ ), dum id sonat, musicos tonos per dentes audiet. Horologium in extremo baculi positum egregie sonare audies, si baculum dentibus prehenderis, non vero sine dentibus ( $s$ ). Per cornu audiunt surdi, quod ore receperint ( $s^*$ ), & horologii ori inferti ( $s^{**}$ ) vibrationes. Bacillo firmiter contra suggestum appresso, de quo minister verba faciebat, & eo bacillo dentibus conpresso, audiebat surdus ( $s^\dagger$ ). Qui musicus surdus erat, prehendebat vertibulum mordicus, & tunc, cum nunc sonos audiret, chelyn ex arte pullabat ( $t$ ), aut digito admoto citharæ tonos distinguebat ( $u$ ). Quæ

I i 3

scribe-

( $p$ ) Consentit Cl. NOLLET *leg. de phys.* T. III. p. 415. seqq. BARTOLI p. 173. ESTEVE *de l'ouïe* p. 29. &c

( $p^*$ ) PORTA *magn. natur.* L. XX. c. 1. de rastro locutus. INGRASSIAS *de offib.* p. 97. DUVERNEY p. 88. SCHELHAMMER p. 258. KIRCHER *Musurg.* II. p. 559. BOERHAAVE *Prælect.* T. IV. p. 415.

( $q$ ) *Act. Erud.* ann. 1760. p. 38. *Comm. Nor.* 1743. hebdom. 12.

( $r$ ) JORISSEN *Diss. sistens. nov. meth. surdos reddendi audientes physic. & medic. rat.* Hall. & BAUMER in *diss. de methodo surd. a nativitate faciendi audientes & loquentes* Erfurt 1749. facto in surdo nato experimento.

( $r^*$ ) F. M. HELMONT *paradox. discurs.* II. p. 73.

( $s$ ) *Act. Erud.* l. c. p. 37.

( $s^*$ ) WELSCH *epifagn. obs.* 24.

( $s^{**}$ ) BUFFON *Histoir. natur.* T. II. p. 345.

( $s^\dagger$ ) *Bresl. Versuche* n. 21. & eodem modo soni noctu terræ impressi percipiuntur FABRIC. *ib.* p. 38.

( $t$ ) BOERHAAVE *ib.* INGRASSIAS *de offib.* p. 7. 9. DUVERNEY p. 90. SCHELHAMMER. KIRCHER *phonurg.* FABRIC. p. 78. *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 1. obs. 35. qui eo modo surdos docebat audire.

( $u$ ) KAAUW *perspir.* n. 1150.



scribebantur super brachium dorsumve surdæ virginis, ea recte audiebat ( $x$ ). Qui surdus manu tenet colloquentem, vocum quasi syllabas ex tremore distinguit ( $y$ ). Familiare est surdis audire, quæ super eorum caput pronuntiantur, ut ex proximo tremor ossibus capitis inpressus in organi auditus intima veniat ( $y^*$ ). Strepitus etiam minimus, vasi inpressus, in quo pisces natant, ab iis animalibus percipitur ( $z$ ).

Adparet in his experimentis, tremorem corporis sonori per solidum corpus ad hominem illibata vi perferri, & exaudiri, dum ejus ossa cranii in similes tremores fuerint incitata.

Ita in celebri illo experimento, quo doceri suscipitur, aerem solum sonorum esse vehiculum, horologii in spatio inani positi campanula a malleo percussa omnino sonum edit, nisi gossypio ( $a$ ), mollive, & suffocante tremores pulvino imponatur. Nunc hinc omnis aer abest, superest, ut tremor sonorus ( $b$ ) per mensulam & campanam ad aerem exteriorem & ad aures adstantium venerit.

Sed etiam in longiorem distantiam soni per continua solida corpora perferuntur, ut per trabem ( $c$ ), cujus alteri fini corpus sonorum ad-movetur, alteri auris, tremit enim ea, si sicca fuerit ( $d$ ). Et terræ ab equis percussæ strepitus aure ad terræ foveam admota ad duo milliaria exauditur ( $e$ ).

Nam ipsa terra ad loca maxime distantia sonos perfert, ut non alia ratione hostium adventus eminus possit innotescere. Hallæ aure terræ adplicatæ tormenta in pugna Rosbachiana explosa ad aliquot milliaria audiverunt ( $f$ ), & bacillo in terram fixo, dentibusque comprehenso remotorum tormentorum ictus ( $f^*$ ) alii. Ipse hydrargyrus a sonis per terram delatis in undas agitur ( $g$ ).

Denique,

- ( $x$ ) *Journ. de Médec.* 1757. Jun.
- ( $y$ ) *Idem* *ibid.*
- ( $y^*$ ) F. de LANIS p. 928. *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. I. obs. 25. MORHOF *paradox. sens.* p. 3. HOFMANN *disquisit.* p. 313.
- ( $z$ ) ARDERN *Phil. Transf.* n. 486.
- ( $a$ ) DESAGULIERS II. p. 387.
- ( $b$ ) NOLLET l. c. T. III. p. 411. S'GRAVEZANDE n. 2339.
- ( $c$ ) F. Tertius de LANIS L. X. p. 424. BARTOLI p. 174. Etiam strepitus radentis digiti KIRCHER *phonurg.* p. 47. cum trabs 200. pedes longa esset.
- ( $d$ ) Etiam solo digito percussa BARTOLI p. 131.
- ( $e$ ) CASATI *della tromba parlante.*
- ( $f$ ) BUCHNER I. *Abhandlung* in collectione Cl. viri.
- ( $f^*$ ) SCHNEIDER *de off. temp.* FABRIC *de aure* L. III. c. 11. p. 38.
- ( $g$ ) F. T. de LANIS p. 482. add. BARTOLI p. 173.



Denique, omnibus comparatis in *cameris* illis *resonantibus* (*b*), in quibus sonus hominis ad parietem leniter loquentis, in opposito pariete facile exauditur, non vero in locis intermediis, videtur omnino tremor non aeri incuti, sed parieti muri, indeque per fornicem ad sedem oppositam redire. Nihil enim habent *æ* quadratæ cameræ cum duobus focus ellipseos (*i*) commune, ex quibus vulgo hoc phænomenon sunt interpretati. Quadratæ enim sunt, aut sphericæ, aut alterius non ellipticæ figuræ, dum fornicatæ sint, neque per apertum ostium aeri sonoque (*k*) patens interrumpatur, manifesto argumento, per solidos muros sonum reperire. Melius auditur in summo fornice (*l*), & in universum soni robur augetur eundo (*m*). Fatetur, alio in casu, per muros propagari ipse Cl. BARTOLI (*m*<sup>\*</sup>).

§. V. *Per aquam transmittuntur.*

Non mirum est Cl. viros noluisse per aquam sonos propagari, cum ea elatere destituatur, elater vero ad tremores videatur jure requiri, qui sonum faciunt. Animadverterunt adeo Cl. viri, piscatores in navicula urinatorum sub aqua stupentium sonos non audire (*n*), & ipsos urinatores ad sex sub aqua orgyas negant vel tormentorum explosionem sensisse (*o*).

Hæc ut sint, certum est tamen, sonos per aquam deferri (*p*). Ostenditur suo loco pisces non videri auditus expertes esse.

Addit

(*b*) Glocestriæ DERHAM. Vinariæ BRUKMANN. Suzæ BASSOMPIERRE *Mem.* T. II. p. 545. Romæ in æde D. Petri KIRCHER *phon.* p. 61. de LANIS p. 425. Caprarolæ MONCONIS *Voyag.* T. IV. p. 480. BARTOLI p. 96. 97. 98. & p. 104. 105. 106. qui tamen per aerem mavult sonum serpere. Londini, in cupula D. Pauli inque whispering gallery ALBERTI *Reise* T. I. p. 64. DERHAM *physic. theol.* p. 120. KALM *Reise* T. I. p. 378. & in universum in cupulis KIRCHER *phonurg.* p. 66.

(*i*) Conf. BARTOLUM.

(*k*) DERHAM p. 121.

(*l*) TAGLINI *de aere* p. 244.

(*m*) ALBERTI. DERHAM.

(*m*<sup>\*</sup>) p. 112.

(*n*) PANTHOT. apud SALZMANN *de urinat.* p. 12. STURM *colleg. exper.* T. II. p. 35. DERHAM *physic. theol.* p. 133.

(*o*) Apud GASSENDUM in LUCRETIIUM, qui locus nunc non est ad manus.

(*p*) NOLLET l. c. *Mem. de l'Acad.* 1743. p. 204. ESTEVE.



Addit vir Cl. fonos per aquam transmissos potius fortiores reddi (q), quam qui per aerem migrant; debilitari vero, quando ex aqua in aerem exierunt (r). Hinc audiunt urinatores (s), sed a nautis in nave manentibus non audiuntur (t). Ipse demum sub aquis audivit NOLLETUS (u), etiam ad 18. pedes, vocemque humanam distinxit. Suntque alia similia exempla (u\*). Debilitatur tamen sonus (x), & aliquot notis fit utique gravior (y), & una suavis. Sic etiam tonus a raso vitro natus gravior fit, quando aqua repletur (z). Qui nummos fabricabat adulterinos, in cellam cautus se abdiderat, foveamque circumdederat vasis aqua plenis (a). Tintinnabulum, quod in aere quidem sonat, ita tamen ut is aer alio quasi, aquæ aut hydrargyro pleno, spatio ambiatur, tunc quidem pulsatum debilissime resonat (b).

Neque tamen is per aquam trajectus sonus ad aerem pertinet (c), qui fit in aqua, nam superesse etiam visum est, quando aqua aere repurgata fuerat (d), & mavult Cl. vir aquæ elaterem reddere, quo pressioni cedat, & se restituat (e). Parum omnino si tremit, & lente, id ob summam duritatem elementorum fit. Demum etiam & debilem sonum reddit & gravem.

Possis addere, aquam a fonis in manifestas undas & tripudia excitari (f), & oleum omnino non crispari (g), quo experimento confirmari

(q) *Mém. de l'Acad.* ibid. p. 223.

(r) *Conf. etiam Phil. Transf.* n. 486.

(s) STURM l. c.

(t) IDEM l. c. PANTHOT. l. c. DERHAM.

(u) *Leçons de phys.* T. III. p. 417. *Mém. de l'Acad.* 1743. p. 205. apud KLEIN de auditu pisc. p. 25.

(u\*) Miles suecus apud TISEL *esterligare försök* p. 41. ad decem ulnas. Audiri, sed minus clare *Phil. transf.* n. 486.

(x) *Phil. transf.* n. 486. S'GRAVEZANDE n. 2332. WOLF *Versuche* T. III. n. 8. de LANIS L. X. p. 424. NOLLET *leçons* p. 418.

(y) HAWKSBEЕ *Phil. transf.* n. 321. KIRCHER *Musurg.* L. IX. p. 241. *Phænurg.* p. 9.

(z) *London Chronicle* 1760. p. 37 MORHOF *ὄαλ.* p. 103. 105.

(a) *Malab. Miss. Gesch. cont.* 28. p. 165.

(b) S'GRAVEZANDE n. 2332 de LANIS L. X. p. 424.

(c) NOLLET *Mem. de l'Acad.* 1743. p. 219.

(d) p. 218.

(e) *Leçons* T. III. l. c.

(f) p. 250.

(g) MORHOF *stent.* p. 104.



mari videtur, non communem fluidorum, sed aquæ, & aquosorum liquidorum (*b*) esse proprietatem.

§. VI. *Per aerem.*

Utique tamen per aerem, ut tenuem una, & summe elasticum, opportunissime soni in distantem aurem propagantur, ut omnino, si aeris elementum in spatio sonum perferente augeas, quod fit plus una atmosphæra in id spatium stipata, augeas una soni vim (*i*), quæ increseat, ut densitatum quadrata (*k*), & ad maiorem simul distantiam percipiatur (*l*). Si paulo alio modo demum aeris auxeris elaterem, pariter soni momentum crescit. Huc refertur, quod æstate (*m*), quam hieme, soni robustiores sint, & in calefacto aere producti longius exaudiantur (*n*). Pariter augentur iidem, quando aer muris coercetur, ut cedere nequeat (*o*).

Adparet adeo, posse soni intensitatem modo a sola densitate augeri, ut in campana, in quam duas atmosphæras stipaveris (*p*); modo a solo elatere, ut in aere calefacto una & clauso; modo in utraque ratione, quando & densitas aucta est & elater, ut in aere subterraneo, & una calefacto, & clauso.

Contra in aere vel leviori, vel minus elastico, vel una & leviori, & minus elastico, sonus minuitur. Aere pluvio & nebuloso [multis admixtis particulis non elasticis feto] soni vix exaudiuntur (*q*). Ob raritatem ajunt in summis montibus (*r*) sonos stloporum reddi minus audibiles, quod tamen experimentum factum in monte Carpathico, nos in alpibus, multo altioribus nunquam potuimus eo cum successu repetere. Possent

(*b*) Spiritus vini, cerevisiæ, hydrargyri.

(*i*) WOLF *Versuche* T. III. n. 7. COTES p. 298. 299. DERRHAM p. 132. HELSHAM *Lect.* 17. p. 257. HAWKSBEЕ *Phil. trans.* n. 297. S'GRAVEZANDE p. 645. n. 2350. NOLLET p. 426.

(*k*) NOLLET *leçons de phys.* T. III. p. 428. 429. ZANOTTI *Comm. Bonon.* T. I. p. 176.

(*l*) HAWKSBEЕ l. c. MUSSCHENBROECK *ibid.* n. 1442. NOLLET p. 426.

(*m*) S'GRAVEZANDE n. 2353.

(*n*) IDEM n. 2354. ZANOTTI *Comm. Bonon.* Vol. I. p. 173.

(*o*) NOLLET *Leçons de phys.* p. 432. seqq.

(*p*) L. VIII. p. 204.

(*q*) TAGLINI *de aere* p. 234. BARTOLI p. 75.

(*r*) FROELICH apud VARENIUM in *Geograph.*



Poffet forte, fi liceret in fummos scopulos emergere, qui undique liberi in coelum eminent. Nunc eo vix usquam pervenitur, & femper est aliquid circumstantium rupium, quod sonum potius augeat. Ego vero, qui aeris in fummis montibus plenum ad respirationem elaterem fim expertus, vix fidem FROELICHIANÆ narrationi adhibeo.

Verum quidem & certum est, aerem per antliam pneumaticam rarefactum, ad sonum reddendum ignaviorem reddi, ut est rarior (*s*), demumque, quando exquisite de campana pene omnis est eductus, penitus evanescere. Oportet ad hoc experimentum ministrum aerem exhausturum aliquanto diutius laborem urgere, quam ad plenum hydrargyri in barometro lapsum (*t*) necesse foret, cum elater in aere superfit etiam densitate valde diminuta, uti modo de aere montano monui.

Denique tamen omnibus rite præparatis, campanula in vacuo spatio frustra percussa, nihil nobis sonat, neque exauditur quidquam (*u*), si & omnis aer sollicitè fuerit eductus, & cautum præterea, ne horologium tinnitum suum solidis machinæ partibus imprimat. Poffet enim eo modo fallere experimentum, & sonus in vacuo loco natus exaudiri (*x*), quale etiam ex minus accurate exhausto aere vitium nascitur; unde factum est, ut Cl. viri in vacuo spatio sonum interire negaverint (*y*).

Restituto aere sub campanam sonus redditur audibilis (*z*), & una cum aeris copia pariter augetur (*a*). Si etiam in spatio aere pleno campanula sonaverit, sed id spatium alio inani spatio ambieris, perinde sonus in isto inani spatio suffocabitur, neque ad aures pervenire poterit (*b*).

Manife-

(*s*) HELSHAM l. c. s'GRAVEZANDE T. II. p. 640. *Phil. transf.* n. 297. COTES p. 299.

(*t*) s'GRAVEZANDE T. II. p. 640.

(*u*) DU HAMEL *de corp. adfect.* p. 220. 221. BIRCH T. II. p. 500. T. IV. p. 379. ex PAPINI *exp. CAMERAR. tentam.* p. 311. s'GRAVEZANDE n. 1323. WOLF *Versuche* T. III. p. 16. MARIOTTE *Mém. de l'Acad.* 1699 p. 25. DESAGUELIERS T. II. p. 387. NOLLET *Leg.* III. p. 41. HAWKSBEЕ *Phys. Mechan. exp. & Phil. transf.* n. 297. POLINIÈRE *Cours de physiq.* p. 245. 246. MUSSCHENBROECK *ad Cimentin.* p. 88. *phys.* n. 1467. Vix ullus VATER *Physiolog.* p. 246. Fere nullus DERHAM *phys. theol.* p. 131. Strepitum dat unice campanula GERIKE L. III. c. 15. Non auditur tibia, & campanula difficillime PAPIN. *Cont. du digest.* p. 11. *Exp.* 10. Vel nullus sonus, vel ægerrime audibilis BOYLE l. c. Neque enim semper exstinguitur. s'GRAVEZANDE.

(*x*) DESAGUELIERS l. c. NOLLET l. c. MUSSCHENBROECK *ibid.* s'GRAVEZANDE.

(*y*) DU HAMEL *de corp. adfect.* p. 220. 221. rationes profert negantium. Negant FLORENTINI, & MERSENNUS *Harmon.* fol. l. n. 1.

(*z*) BOYLE *nov. phys. mechan. exper.* n. 41. s'GRAVEZANDE.

(*a*) HELSHAM l. c.

(*b*) HAWKSBEЕ *Phil. transf.* n. 321.



Manifestum est adeo, ætherem ad sonum propagandum ineptum esse, neque videas, qualem aerem, a communi diversum, velit Cl. le CAT, qui sit soni vehiculum (c).

Absque corpore solido poterit in aere sonus oriri, si fluidum ab igne intus concepto in aere explosum fuerit, ut in tonitru, globis igneis in aere crepantibus. Et fiet denique sonus aliquis, ab aere moto in aerem quiescentem illapso (s\*).

§. VII. *Ut aer sonum concipiat, & propaget.*

Sit nunc corpus solidum, quod primum tremat, ut in singulis minutissimis particulis suis oscillet, sit ejus, quem diximus, exitus ex chorda in arcum, cui chorda subtenditur. Impellit adeo aerem (d), qui spatium inter chordam, & eum arcum replebat, eumque in proximam aeris regionem urget; velocissime quidem partem undæ aeræ corpori sonoro proximam, semper lentius eam, quæ a fonte motus remotior est. Sed is aer, quo est a corpore tremente remotior, eo cedit lentius, resistentia ergo erit aeris aut quiescentis, aut lente moti, contra aerem, quem corpus sonorum tremendo submittit. In eo limite, in quo aer tremulus a resistente reliqua atmosphæra reprimatur, erit densissimus aer; & vicissim rarior ad superficiem corporis, quod contremiscit, cum is idem tremor magnam aeris partem fugaverit.

Quare, ex legibus corporum elasticorum, pars aeris densissima retroaget aerem rariorem contra corpus sonorum, a quo advenit, quem porro alius tremor ejusdem corporis secundo versus atmosphæram repellit.

Sed præterea, cum pars aeris eo modo condensata, etiam atmosphære proxima sede densior sit, non solum versus tinnulum corpus, sed etiam ad liberam pariter atmosphæram densior iste aer se expandet, impelletque aerem sibi proximum: unde per easdem leges secunda (e) sedes densioris aeris nascetur, quæ & ipsa partim retroaget aerem contra primam densita-

K k 2

(c) p. 261. Rationem addit, quod campanæ sonus ignem non exstinguat, sed flatus pilei. Sed neque sonus ventum excitat. Alius omnino est motus tremulus particularum aeris, per minima oscillantium, a torrente integrarum massarum aeris, qui est ventus COTES p. 309.

(c\*) DODART *Mém de l'Acad.* 1707 p. 92. 93.

(d) MUSSCHENBROECK n. 1438. NEWTON *Princ. Phil. Natur.* L. II. prop. 43. &c. HELSHAM p. 259. seqq. COTES p. 306.

(e) MUSSCHENBROECK n. 1438 COTES p. 310.



densitatis sedem corpusque sonorum, partim se expandet versus atmosphæram, & pariter comprimendo tertiam regionem densiorem formabit. Quiesceret autem aer, qui ad corpus sonorum rediit, nisi novus impulsus a corpore tremulo natus novam in aere undam cieret (*f*).

### S. VIII. *Propagatio soni.*

Propagabitur autem sonus, per eas undas undique & æqualiter per sphæræ cavæ speciem, cujus radius est ultimæ undæ a corpore sonoro distantia, centrum ipsum corpus sonorum, cum æque faveat aeris motui quique ductus, aerem enim ponimus uniformem. In ejusmodi cava sphæra, si omnia auribus humanis plena forent, pariter audient omnes, Sed debilitabitur sonus in ratione quadrata distantiarum, quod continuo crescant cavi imaginabiles sphærici cortices, inque majus spatium se vis tremula sonori corporis diffundat, atque adeo, ut plus impellit aeris, ita debilitetur, donec resistentia major fiat pressione, atque sonus porro suffocetur. Eritque id decrementum in ratione duplicata distantiarum (*g*), quæ eadem corticum sphæricorum perpetuo crescentium, & æque crassorum est ratio.

Propagatur autem utique, & in satis distantes locos, & cum robore insigni. Scyphus aqua plenus rarus alios scyphos in motum agit (*h*), inque argento vivo a sono campanæ vortex oritur (*i*), & a tubæ (*k*) sono, & a chely (*l*), in aqua similes circuli, quales in aere diximus nasci, alterne crescentes versus centrum, & alterne ad ambitum vitri redeuntés oriuntur, & aquam incrispant, ut demum subsiliat (*m*).

Sed a sonis gravibus columnæ (*n*) etiam fortissimæ, & longe distantes contremiscunt, sæpeque baculum, dum organum (*o*) in templo sonabat, defixum vidi alterne adscendere, & descendere, ut manifestum esset, totum templi ædificium in tremorem agi & subsilire.

Ex

(*f*) NEWTON *Coroll.* ad Prop. 47. L. II.

(*g*) MUSSCHENBROECK, n. 1440. ESTEVE, p. 32. EULER *musie.* p. 9.

(*h*) KIRCHER *phonurg.*

(*i*) WOLFF *Versuche* T. III. n. 10.

(*k*) MORHOF.

(*l*) BARTOLI p. 137.

(*m*) IDEM p. 135. 136.

(*n*) IDEM p. 162. BOYLE *of languid mot.* de LANIS p. 431.

(*o*) BARTOLI p. 113.



Ex acclamatione græcorum, cum Romanus imperator Græciam liberam in ludis renuntiaret, aque exercitus Ptolemaidem obsidentis classico perculsas aves, de cælo mortuas decidisse legimus. Tonitru pullos canarinos incubationis die 7. 8. in ipsis ovis necat (*p*), & pisces obtundit, etiam occidit (*p*<sup>\*</sup>). Demum tormenta ad 7. milliaria, & ad decem (*p*†), & ad 40. demum (*q*) ædes succusserunt, & fenestras: Æthna vero omnino ad 30. milliaria in ædibus solis, quæ voragini ardentis verticis opponerentur (*r*).

In densato aere, per ea, quæ diximus, fortior sonorum est effectus. Sub campana urinatoria sonus buccinæ (*s*) hominem stupefecit; & pisces sub glacie conturbantur ab ictu glaciei inflicto, ut manubus se capi patiantur (*t*).

Ultima distantia, quæ a sono percurritur, nondum nota est. Nonaginta milliaria Italica superasse lego (*u*), & accessisse ad 180. & 200. anglica (*u*<sup>\*</sup>); & memini a viris fide dignis mihi narratum fuisse, cum Landavia obsideretur, leucis distans fere 48. tormentorum fragorem Basilæ esse exauditum.

Quæ interim ita velim sumi, ut minime doceam primigenium sonum tantum habuisse roboris. Is enim, ut continuo dicetur, a sonis accessoriis corporum firmerum mire augetur.

§. IX. *Ut soni robore crescant.*

Eædem tremoris sonori, quæ alterius fluidi elementi sunt adfectiones, & pariter lineam rectam itinere suo describunt, & corpora dura percutiunt, in quæ incidunt, atque ab iis corporibus ad angulum ei æqualem  

K k 3
redeunt,

(*p*) HERVIEUX *des serins de Canarie* p. 181.

(*p*<sup>\*</sup>) RICHTER *Ichthyoth.* p. 312. 313.

(*p*†) BARTOLI p. 111.

(*q*) *Journ. des savans* 1694. n. 30.

(*r*) MORHOF *l. c.* p. 191.

(*s*) STURM *colleg. Exp.* T. II.

(*t*) *Oeconom. Nachricht.* T. V. p. 659.

(*u*) MUSSCHENBROECK n. 1441. Stremboli accensi mugitus a 60. milliaribus exauditus, tormentum a 30. & 40. BARTOLI p. 86.

(*u*<sup>\*</sup>) DERHAM *phys. theol.* p. 134.



redeunt, sub quo inciderunt ( $x$ ). Neque enim huic evidenti legi derogare crediderim, quod homo trans murum loquens audiatur, neque inde persuadeor, undas sonoras circa obstacula se conſectere ( $y$ ). Interjecta enim obstacula majora, ut colles, valde sonos minuunt, & quoties valde crassa sunt, penitus suffocant; si vero eadem obstacula a sono in motum cieri possunt tremulum, uti murus potest, tunc quidem is ipse murus concussus sonum regenerabit. Nam etiam quando murus undique clausus est, neque superne undæ sonoræ, neque per latera se conſectendo pone murum viam inveniunt, tamen soni trans murum exaudiuntur, ut in cameris vicinis, muro integerino distinctis experiaris. In curvam lineam adeo sonos flecti non bene creditur, eoque modo a luce distingui ( $z$ ), quod quidem mihi nunquam probabile visum est.

Ab hac rectæ lineæ adfectione intelligitur, qui fieri possit, ut in elliptici fornicis camera ( $a$ ) duo homines, in foco utroque ellipseos positi secum submissa voce colloqui possint, neque quidquam ejus sermonis alii etiam propiores exaudiant. Notissimum est enim, eam esse ellipseos proprietatem, ut linea recta, quæ a foco in circumferentiam ducta cum alia linea, ex axi ellipseos educta, angulos cum tangente æquales fecerit, ea quidem cadat in alterum ejus ellipseos focum ( $a^*$ ). In cameris, quarum fornices sunt sphærici, idem fere phænomenon observatur, ellipsis enim a circulo parum differt, & fere duarum axium inæqualitate.

Ab eadem angulorum reflexorum cum angulo incidentiæ æqualitate fit, ut in foco speculi parabolici ( $b$ ) sonus fortius exaudiatur, ligneisque speculis parabolicis deauratis, sibi que oppositis ( $c$ ), sonus in altero foco pronunciatus, ad alterum integerrimus transferatur, & facile percipiatur ad 60. pedes.

Ad

( $x$ ) KIRCHER *phonurg.* p. 12. NOLLET l. c. p. 436.

( $y$ ) COTES p. 311.

( $z$ ) PORTERFIELD *on the Eyes* T. I. p. 252.

( $a$ ) POLINIÈRE p. 149. t. 10. f. 14. KIRCHER *phonurg.* p. 98. seqq. *Musurg.* p. 300. BARTOLI D. 101. MONTANARI *galer. di minerv.* T. I. p. 252. WOLF *Versuche* T. III. n. 20.

( $a^*$ ) Negat se experiendo comperisse de LANIS, sed respondet Cl. HASE *de tubis flentor* p. 31. seqq. & experimentum profert SENAC *Ess. de phys.* p. 62.

( $b$ ) Ex observatione MORLANDI, & GÆRTNERI apud HASE p. 33. ut horologii portabilis sonus ad 60. passus exaudiretur. Conf. TAGLINI p. 242.

( $c$ ) *Journ. de Trév.* 1714. p. 556. HASE p. 32. de LANIS &c.



Ad conservationem etiam sonorum parabola spectat, a s'GRAVEZANDIO ad tubam stentoream adhibita ( $c^*$ ). Parabolica campana utebatur Cl. CONYERS PURSCHALL, in quam cylindricus tubus inferebatur, per quem ipsum vox impellebatur ( $c^{**}$ ).

Ejus curvæ lineæ vires vir Cl. cum ellipseos prærogativa conjunxit. Foco nempe elliptici tubi os admovit: sic fit, ut lineæ sonoræ in alterum ellipseos focum conveniant. Sed idem ex constructione focus est tubi parabolici cum elliptico conjuncti. Ex proprietate adeo parabolæ ( $d$ ) omnes radii ex foco in ambitum dispersi, & ad parietem adlapsi, ad axin parabolæ paralleli exeunt, neque disperguntur.

Non augetur quidem ( $e$ ) ex collectione aliqua, sed conservatur tamen soni robur, quando impeditur, ne undæ sonoræ ex sua natura in sphaeram amplissimam se diffundant. Is scopus obtinetur in cylindris, qui vocem coercent, ut in aquæductu vis vocis audibilis ad 500. & 600. pedes producat ( $f$ ), & ad alteram finem percipi possit. Etiam in plumbeum cylindrum ( $g$ ) si inclamaveris, magnus fiet resonitus.

In cono truncato, sonus augetur, quod per quascunque lineas impulsus, post multas alternas parietum percussiones, & a parietibus factas reflexiones, ultimo lineæ sonoræ omnes in unam coincidunt ( $i$ ). Eo tubæ stentoreæ vulgares pertinent, valde bonæ, si ad os valde angustæ fuerint ( $i^*$ ). Vicissim iidem coni auribus admoti felicissime sonos auri repræsentant ( $i^{**}$ ). Ex ampla circumferentia in angustum exitum ( $k$ ) stipatos sonos spirales tubæ ex ampla origine in angustum finem contractæ valde augent ( $l$ ). Augentur autem, neque conservantur unice soni, quando radii sonori non unice dissipantur, sed colliguntur in angustiorum focum.

Tubam

( $c^*$ ) n. 2380. 2381.

( $c^{**}$ ) *Phil. transf.* n. 141.

( $d$ ) MERSENNUS *Harmon* (fol.) p. 4. in *Genesim*. p. 512. 513. HAASE.

( $e$ ) Augetur utique, sed ex tremoribus conjunctis canalibus WOLF *Versuche* T. III. n. 19.

( $f$ ) I. B. PORTA, idem primus tubæ stentoreæ inventor *Mag. Nat.* L. 16. c. 12. KIRCHER *phonurg.* p. 45. 62.

( $g$ ) BARTOLI p. 292. 293.

( $i$ ) KIRCHER *phonurg.* p. 48.

( $i^*$ ) MARIOTTE apud du HAMEL *de corp.* L. II. c. 4. Ejusmodi sunt tubæ chinenfes RENAUDOT p. 25.

( $i^{**}$ ) MONTANARI *Gal. min.* I. p. 248.

( $k$ ) KIRCHER *ibid*

( $l$ ) IDEM *Musurg.* p. 277. OTT *de sono voc. hum.* p. 407. SCHELHAMMER p. 157.



Tubam stentoream spiralem efficaciam summam habere Clar. olim avunculus noster WEDLIUS (n) ostendit, quales, puto, ex theoria KIRCHERUS pinxerat.

Cochleæ cavæ ope sonum ad maximam distantiam cum summa celeritate, & in temporis puncto propagari Robertus Hooke (o) adnotavit. Omnibus præfert Cl. HELSHAM tubas factas ex logarithmica spirali circa axin suam revoluta (p). Cochleata quidem, quæ dicebatur a KIRCHERO (q), auris DIONYSII, non vera est cochlea, aliter enim eam vidit optimus testis (r), ut tamen possit, etiam qualis est, ad colligendos sonos valere. Alterne cuniculus inflectitur, & sursum angustior est, & in fine extremo arctior ei canalis inseritur, qui in cubiculum DIONYSII creditur terminatus fuisse, in quo utique minimos sonos exaudiri potuisse est probabile. Certe etiam nunc valde resonat (s).

#### §. X. *Augmentum soni a resonitu natum.*

Magna pars efficacæ, quæ in tubis stentoreis, in canalibus subterraneis, in antris, in spiralibus cœmis observatur, omnino huc pertinet. Nempe qui in dura & elastica corpora incidit aeris tremor, is cogit ea corpora contremiscere, nempe vibrare, ut corpus primigenium, utve aeris inde concitata unda oscillavit. Eam vim exercet in omnibus muris, rupibus, metallis, lignis, aliisque corporibus duris, & resistantibus, in ipsa demum aquæ levi nitidaque superficiem. Inde fit, ut in inmensum vis soni crescat, tot concitatis *elastis* (t), quæ similem sonum reddunt. Quando enim distantia non magna est, soni a corporibus ambeuntibus nati cum primigenio sono confluent (u), inque unam majorem vocem abeunt voces innumeræ, quas præter primam tot ambeuntes parietes reddiderunt. Hinc sonus minus, quam visus, distinctus est: multi enim soni in unum consentiunt (x).

Resonant

(n) Auris *Geodidaxros*.

(o) In præfatione ad *Posthuma*.

(p) p. 76.

(q) *Phonurg.* p. 71. 82.

(r) BARTOLI p. 282.

(s) IDEM ibid. *Della VALLE Itin.* T. VIII. p. 192.

(t) HELSHAM p. 74. 75. TAGLINI p. 242.

(u) STURM *phys. general.* p. 676. 677. du Bois n. 49. 54. S'GRAVEZANDE n. 2378. MONTANARI *Galer. di miner* T. I. p. 255.

(x) BERKELEY *theor. of vision.* p. 339.



Resonant vero corpora dura omnia. Inde vehemens resonitus ( $\gamma$ ) templorum nudorum, camerarum nondum ulla supellectile obstructarum, rupium, antrorum ( $z$ ). Resonant ipsa in arboribus folia ( $a$ ), ut æstate echo in sylvis multo fortior sit ( $b$ ), quam hieme, cum nudis arboribus. Resonat ipsa aqua, quando in planitiem quieta subsedit, & longe exaudiuntur & elegantissime ( $c$ ) musica instrumenta, quæ per tacitam noctem in tranquillo lacu sonant: ut etiam nautarum sermones a quatuor ( $d$ ) miliaribus distinguantur. Cum amicorum alter in Seraglio, alter Scutari staret, & cum sodali colloqueretur, potuerunt sermones suos, per tranquillum mare, ad duarum leucarum distantiam exaudire ( $e$ ).

Contra mollia corpora videntur sonos suffocare, quia non augent. Terra nive ( $f$ ) tecta, mollis arena ( $f^*$ ), nebulosa aqua per aerem sparsa, vasta prata, templa tapetibus ornata, aut plena auditoribus ( $g$ ), sonos non sinunt invalescere ( $h$ ). Qui in scapha colloquuntur, vix mutuos audiunt sermones, nisi ædes ad ripam objectæ sint, quæ sonum reflectant, ut vocem suam tamquam in iis ædibus natam audiant ( $i$ ).

### §. XI. Echo.

Quando corpora sonum reflectantia auri nostræ vicina sunt, tunc quidem novi illi soni, ab adstantibus corporibus suppeditati, cum primigenio sono confluant ( $k$ ). Verum certa mensura est, per experimenta nondum

( $\gamma$ ) Veteres, ut immensa hominum multitudo in amphitheatris comicos audiret, dispositis ex arte inanibus doliis, (aeneisve vasis) vocem confirmabant PLINIUS L. XI. c. 51.

( $z$ ) De lapideis in VESUVII voraginem coniectis BARTOLUS p. 292. 293.

( $a$ ) KIRCHER *phonurg* p. 10.

( $b$ ) PERRAULT p. 220 ed. belg.

( $c$ ) BARTOLUS p. 86. *Fr. Tr. de LANIS* p. 435. STURM T. I. p. 658. MARTENS *Spitzb* p. 115. MONTANARI *Gal. di min.* T. I. p. 247.

( $d$ ) BARTOLUS *ibid.*

( $e$ ) GREAVES *travels*. Putei aqua pleni melius resonant KIRCHER *phonurg* p. 8. Etiam echo a nive debilitatur KIRCHER *phonurg* p. 11.

( $f$ ) p.

( $f^*$ ) PLINIUS *Histor. natur.* L. XI. c. 51.

( $g$ ) STURM T. I. p. 654. NOLLET p. 433.

( $h$ ) *F. Tert. de LANIS* p. 429.

( $i$ ) Du Bois n. 49.

( $k$ ) MONTANARI l. c. p. 253



nondum satis definita, & secundum accuratiorem, aut minus tenerum sensum ( $k^*$ ) audientis hominis varia; ultra quam soni secundi seorsim a sono primo exaudiuntur, & anima nostra, & primigeniæ vocis syllabam distinguit, & similem syllabam vocis renatæ. Eam distantiam KIRCHERUS pedum cum reditu 110. fecit ( $k^*$ ), MUSSCHENBROECKIUS 53. pedum, atque adeo cum reditu 106. ( $l$ ) æstimavit. MORTONUS pedum 90. ( $m$ ), STURMIUS centum ( $n$ ) pedum, Robertus PLOT 120. pedum ( $p$ ), MERSENNUS pedum 200. ( $q$ ), ita enim 40. passus interpretor. Ad longiores vero sonos repetendos longior distantia requiritur. Ad duas syllabas alii 400. ( $r$ ), alii tantum 105. ( $s$ ), alii 240 pedes ( $t$ ) poscunt. Ad tres alii 600. pedes ( $u$ ), alii 150. alii 180. ( $x$ ) requirunt; ad quatuor syllabas 182. pedes ( $y$ ), ad quatuor & quinque pedes 210. ( $z$ ); ad 11. syllabas pedes 1320. ( $a$ ) MERSENNUS, ad 12. syllabas passus 480. ( $b$ ); & sic de numerosioribus; etsi etiam hic aliqua varietas superest. A trecentis certe passibus syllabas sex & septem STURMIUS, a 430. novem, a 480. undecim repeti testis est ( $c$ ), ubi mirum videtur a 7. ad 9. syllabam multo majus, quam in aliis distantia augmentum posci. Alias omnino distantias habet KIRCHERUS ( $d$ ).

Echo ab iisdem corporibus resilit, quæ modo enumeravimus ( $e$ ). Si de muro in murum vox editur, cui alter parallelus exstat, potest fieri, ut non semel, sed omnino pluries, eadem syllaba exaudiatur, suntque aliqua non satis nota ædificia, ubi vox primigenia octies ( $f$ ), duodecies, &

( $k^*$ ) *Phonurg.* p. 46. 110. *Musurg.* L. IX. p. 245.

( $l$ ) n. 1458.

( $m$ ) *Natur. histor. of Northamptonshire* p. 358.

( $n$ ) *Phys. gener.* T. I. p. 66.

( $p$ ) *Natural histor. Staffordsb.* p. 29. *Oxfordshire* p. 10.

( $q$ ) Præf. ad *harmon.* fol. MUSSCHENBROECKIUS 69. requisivisse ait.

( $r$ ) MERSENNUS.

( $s$ ) MORTON.

( $t$ ) PLOT.

( $u$ ) MERSENNUS.

( $x$ ) MORTON.

( $y$ ) IDEM.

( $z$ ) PLOT. *Staffordshire* p. 28.

( $a$ ) ad 1320. PLOT *Staffordshire* p. 29.

( $b$ ) MERSENNUS.

( $c$ ) Ibid.

( $d$ ) *Phonurg.* p. 34.

( $e$ ) Etiam ab aqua KIRCHER l. c. p. 8. a fulcato agro BARTOLI p. 291. a foliis in sylvis. &c.

( $f$ ) KIRCHER *phonurg.* p. 7.



& terdecies (g), 14.<sup>s</sup> (b), 17.<sup>s</sup> 19.<sup>s</sup> (i), 24.<sup>s</sup> & 29.<sup>s</sup> & 32.<sup>s</sup> (k), & 56.<sup>s</sup> (l) exauditur. Huc celebris echo simonettæ villæ, cujus tamen nimis propinqui muri polysyllabas voces confundunt (m).

Similis multiplicitas repetiti resonitus fiet, si subinde alia & alia obstacula vocem reflexerint, ita altiora alia aliis, uti remotiora sunt (n), audietur enim a primo, deinde a secundo, a tertio obstaculo, reflexa vox.

Semper autem debilius resonabit echo, quia ultimi soni a majori distantia redeunt.

Reddit echo non humanam vocem solam & literas, sed tonos musicos, accuratissime (o) summa. Lego s. ab echo non pronuntiari (p).

### §. XII. Celeritas soni.

Diximus non separari a sono primigenio sonum reparatum, si nimis vicinum fuerit obstaculum. Nempe mens humana duos sonos celerrime sibi succedentes non distinguit, neque duas corporum lucentium imagines, estque menti aliqua temporis mensura, quam alias requiremus, & qua eget, ut duo proxime sibi subsequentiâ distinguat. Nunc sonus celeritate fertur summa, quam tamen Cl. viri partim calculis positis, partim experimentis factis, satis accurate definiverunt. Nempe lucis adeo rapidum est iter, ut tempus, ab ea de sole progrediente, impensum possit haberi pro nullo, quando de rebus in tellure gestis sermo est.

Quare tormentum majus eminus & conspicuam flammam editurum, & audibilem bombum, certi homines exonerant; aliosque habent ad notum pedum numerum distitos amicos, qui accurato horologio (p\*) aut pendulo instructi, ad primum fulminis conspectum, incipiunt (p\*\*) oscillationes numerare,

L 1 2

(g) *Hist. de l'Acad.* 1710. p. 19. NOLLET T. III. CARDAN *subtil.* p. 528.

(b) MONTANARI l. c. p. 247.

(i) PLOT *Oxfordshire* p. 8.

(k) Villa simonetta BARTOLI p. 73. KIRCHER *phonurg.* p. 56.

(l) Puto etiam eadem SIMONETTA villa. Nempe de istopo sermo est *Phil. transf.* n. 480.

(m) WRIGHT *travels* p. 473 474.

(n) MOSSCHENBROECK n. 1459. Exemplum multorum obstaculorum habet PLOT *Oxfordshire* p. 15.

(o) *Act. Moguntina* l. p. 138.

(p) ROGER *effectus musices* p. 41.

(p\*) Præfert pendulis horologia DERHAM *Phil. transf.* n. 313.

(p\*\*) Methodum describit BARTOLUS p. 54.



merare, meuntque numerum earum oscillationum, qui inter fulminis conspectum, & exauditum tormenti tonitru elapsus est. Ita olim GASSENDUS (g) celeritatem soni definire adgressus est, pedesque reperit in minuto secundo 1473. MERSENNUS intra minutum horæ secundum percurrere scripsit pedes 1380. (r). Cimentini Academici intra quinque horæ minuta secunda (s) italicum milliare, atque adeo pedes  $1147\frac{4}{5}$  in minuto secundo relegi invenerunt. Gallici academici CASSINUS senior, PICARDUS, & celebris *Danius* ROEMERUS, pedes gallicos 1097. (t) percurfos numeraverunt. Cl. WALKER non constanter eandem summam reperit, sed inter 1150. pedes & 1526. (u). *Isaacus* NEWTON ex subtilissimis calculis (x) pedes confecit 969. iisque ob crassitiem aeris additis pedibus 119. ad 1086. atque ob vapores, qui aerem condensant, reperit pedes 1142. (y), qui efficiunt pedes parisienses 1020. quam summam experimentis FLAMSTEDIUS & HALLEIUS confirmaverunt, & G. DERHAM (z). EULERUS, etiam calculis usus, pedes fecit 1100. (a), cum alias inter 1222. & 1069. pedes eam celeritatem inclusisset (b). Academici Galli, maximis distantis, & tormentis usi, pedes gallicos fecerunt 1038. (c), & 1041. (d). Prope Quito repererunt pedes 1044. (e), & 1050. Cayennæ vero omnino pedes 1198. (f).

Hæc experimenta, si accurate capta sunt, demonstrant, aliis & aliis a causis velocitatem soni aliam esse, aliamque.

Et primo videri potest, celeritatem æstate (g) & in regionibus calidioribus aliquanto (g\*) maiorem esse, ut sit ratio utriusque velocitatis ut 76. ad

(g) Apud MUSSCHENBROECKIUM.

(r) *Harmon. Prop. V. art. 4. Balistic. p. 138.*

(s) p. CCXXXV. MUSSCHENBROECK numerat pedes 1185.

(t) Du HAMEL *Hist. de l'Acad. p. 168.* MUSSCHENBROECK numerat 1172. sed erant hexapedæ 1280. pro 7. secundis.

(u) *Phil. transf. n. 256.*

(x) *Princ. mathem. II. propos. 50.*

(y) HELSHAM p. 284.

(z) *Phil. transf. n. 313.* & in eo numero requiescit Cl. HELSHAM p. 264.

(a) *Musices p. 4.*

(b) *De sono. Conf. Miscell. Taurin. I. p. 92.*

(c) *Mém. de l'Acad. 1738. p. 192. 193.*

(d) *Ibid. 1739. p. 193.*

(e) La CONDAMINE *introduc. p. 98.*

(f) *Voyage de la riv. des Amazones p. 206.*

(g) HELSHAM p. 264. s'GRAVEZANDE n. 2302.

(g\*) ut Cayennæ.



76. ad 78 (*b*). Ex calculis solis diversitatem proposuerat Clar. Cotes (*b*\*). Sed etiam favens ventus aliquantum iter soni accelerat (*i*).

Negaverunt aliquam venti in morando sono potentiam esse Clar. viri (*k*). Cum tamen ventus mediocris 15. fere pedes, ventus nondum maximus aut 66. pedes, aut demum 119. (*l*) in minuto primo percurrat, poterit adeo ventus suo renixu ad 10. fere partem de velocitate aeris sonori demere, & consentiunt experimenta, utique ventum de celeritate soni in ratione demisse, quæ sit 111. (*m*) ad 122. (*n*), & demum vehemens turbo subito sonum suppressit (*o*). Sic contra ventus favens sonum ad remotiorem distantiam perfert (*o*\*).

Nebula una  $\frac{1}{77}$  parte celeritatem soni minuit (*p*).

Qui ergo distantias locorum ex itinere (*q*) sonorum volunt metiri, eos ad hæc omnia animum advertere necesse est.

De eo utique discrimine constitit, nihil habere firmi, quod a robore sonorum repetitur. Qui enim fortes sonos celerius progredi putarunt (*r*), ii neque experimenta habent consentientia, neque ipsam naturam rerum (*s*). Vere hæc olim GASSENDUS, ex comparato sclopi minoris, & tormenti fragore (*t*), quem FLORENTINI diverso genere tormentorum usi confirmarunt (*u*), tum nuperi (*x*) Cl. viri. Sed neque acutior sonus celerius, quam gravis progreditur (*y*).

Neque fatigatur sonus, ultimasve partes sui itineris lentius, quam primas percurrit, & constanter duplo tempore duplum iter relegit (*z*).

L 1 3

Ipsa

(*b*) BIANCONI *epistola* p. 86. 89.

(*b*\*) p. 324.

(*i*) ESTEVE p. 31.

(*k*) BOERHAAVE p. 308. 309. & GASSENDUS, & PERRAULT c 4. & FLORENTINI p. CCXXXIII.

(*l*) Conf. L. VIII. p. 202.

(*m*) *Mém. de l'Acad.* 1738. p. 197.

(*n*) DERHAM l. c. & *phys. theol.* p. 134. add. s'GRAVEZANDE n. 2343.

(*o*) BARTOLUS p. 73.

(*o*\*) MUSSCHENBROECK n. 1451.

(*p*) BIANCONI.

(*q*) *K. svenska vetensk acad. handl.* 1741. tum FLORENTINI p. CCXXXV.

(*r*) KIRCHER *phonurg.* p. 14.

(*s*) HELSHAM p. 264. s'GRAVEZANDE n. 2294.

(*t*) Apud BARTOLUM p. 62. 63.

(*u*) p. CCXXXII.

(*x*) PARISINI p. 202. DERHAM *phil. transf.* l. c. *phys. theol.* p. 135.

(*y*) KIRCHER apud BARTOLUM p. 63.

(*z*) GASSENDUS. SCHELHAMMER p. 127. FLORENTINI p. CCXXXIV. DERHAM *Phil. transf.* l. c. PARISINI *Mém. de l'Acad.* 1738. p. 203.



Ipsa etiam Echo eodem in tempore ab obstaculo ad aurem sonum refert, quo ab aure ad obstaculum detulit (*a*), etiam in trigesimo reditu. Hinc ab echo etiam distantiam metimur, ut serius rediret (*a*<sup>\*</sup>).

### §. XIII. *Oscillationes corporis sonori.*

Quando corpus sonorum ab aere, aliove duro corpore percussum tremat, non unius & indivisi quasi tempusculi is tremor est, sed omnino diu repetitur, ut alterne corpus increseat, & decreseat (*b*). Eos tremores, diu durabiles, in campana sonante facile oculo percipi diximus; sonumque pariter a campana editum lente per alternos pulsus in silentium degenerare adtenta auris percipit. Eadem chordarum musicarum, & omnium in universum corporum sonantium in tremendo est constantia. Facile intelligitur, etiam hos ejusdem corporis sonos ex multis se consequentibus sonis coalescere: ut tenerior auris in uno sono plures, etiam quinque, distinguat (*c*).

Sed dudum subtiliter est inventum, hos tremores alternos in aliis exemplis celerrime sibi succedere, in aliis lente se insequi, ut intra datum tempus, sonantis instrumenti alias numerosi pulsus sint, alias pauciores.

Deinde aurem nostram aliter adfici, quando celeriter corpus sollicitatum tremat, aliter, quando lente. Ut *gravem* sonum vocent, qui a paucis tremoribus lente se consequentibus nascitur, *acutum*, qui a tremoribus numerosis intra datum tempus ocyssime se excipientibus. Et omnino acumen *soni* (*d*) sit in ratione directa numeri vibrationum; & *toni* sint discrimina numeri undarum (*e*).

Iterum limites certos natura his vibrationibus circumscripsit. Si valde pauci tremores fuerint, ne quidem exauditur sonus, quem ex oscillationes generant. Non exaudiri sonum (*f*) natum a decem vibrationibus observatum est, neque in universum percipi, cujus oscillationum numerum oculus posset inire.

M E R S E N;

(*a*) DERHAM *Phil. transf.* l. c. BARTOLI p. 59.

(*a*<sup>\*</sup>) ESTEVE p. 51.

(*b*) p. 250.

(*c*) BUFFON *Histoir. natur.* T. III. p. 336.

(*d*) S'GRAVEZANDE n. 2358 MUSSCHENBROECK n. 1418. &c.

(*e*) BUFFON l. c. p. 337. SAUVEUR p. 138. &c.

(*f*) KIRCHER *musurg.* p. 429.



MERSENNUS inde omnino (*g*) 6. vibrationes intra minutum secundum poscit, ut sonus possit auditu percipi, additque raros esse musicos homines, qui infra sonum 25. vibrationum norint descendere (*b*). In acutissima chorda recursus habuit 832. (*i*).

Cl. inde SAUVEUR (*k*), accurate in ea re versatus, invenit organi ecclesiastici tubum, quadraginta pedes longum, generare sonum gravissimum, quando duodecies, cum dimidia insuper vibratione, intra minutum secundum oscillat.

Pro fixo quasi termino eum sonum sibi sumsit, qui nascitur a centum intra secundum minutum vibrationibus; & omnium acutissimum sonum esse, cujus vibrationes intra idem tempusculum sint 6400. Quare tota scala sonorum audibilium continebitur intra  $12\frac{1}{2}$ . & 6400. vibrationes, qui numeri se habent uti 1. ad 512. Cum eo viro vulgo sentitur (*l*).

Paulo aliter quidem summus analyseos auctor Leonhardus EULERUS has vibrationes numeravit, ut limites sint oscillationum 30. quimus omnium audibilium tonus esset, & 7520. vibrationum, qui summus, aut acutissimus; quæ ratio est 1. ad  $250\frac{2}{5}$  (*l*\*).

Omnino vero acumen differt a robore, & penitus distincta res est intensitas toni, & acumen. Illa est, si materies eadem fuerit, in ratione momenti percussionis, & numeri particularum in corpore sonoro percussarum; hæc in ratione celeritatis recursuum. Soni gravissimi, ægre ab aure perceptibiles, fortissime columnas concutiunt (*m*). Et in eodem tono potest soni intensitas esse 72es major, minorve (*n*).

#### §. XIV. Causæ discriminis tonorum.

Cur aliæ chordæ aliis frequentiores edant in dato tempore oscillationes, oportet inquirere. Causæ sunt omnino variæ, & earum prima diversa tensio chordarum. Omnes adeo tonos in eadem chorda diversa pondera tenden-

(*g*) *Harmonia* in 4. L. I. art. 4. prop. 4. SAUVAGES *physiol.* p. 166.

(*b*) *Harmonia* L. I. l. c.

(*i*) *Ibid.* p. 274.

(*k*) *Mémoire. de l'Acad.* 1700. p. 139. 140. &c.

(*l*) MUSSCHENBROECK n. 1434. numerat 12800.

(*l*\*) *De music.* p. 8.

(*m*) Apud MERSENNUM BARTOLI p. 162. & p. 254 261. A gravi sono testudinis (liuto) fere in aqua scyphi circuli nati sunt, a sono acuto vix quatuor BARTOLI.

(*n*) SAUVEUR l. c. p. 141.



tendentia producant; facile vero prævidetur, tensam magis chordam recessus habere celeriores, minus tensam difficilius emoveri, & vibrare lentius.

Experiendo constat, vibrationum numerum sive toni acumen, esse in ratione subduplicata ponderum tendentium ( *o* ). Ita si chorda alia libra una appensa tensa fuerit, altera libris quatuor, vibrationes earum erunt uti 1. & 2. & toni octava, dist bunt, quas edunt. Si chorda A. tensa fuerit libra una, altera B. libris novem, etiam tunc numerus vibrationum B. erit ut 3. ad vibrationem 1. corporis A.

Ex eadem ratione, absque tendentibus ponderibus, corpora magis dura, magis elastica, sonabunt acutius, ut æ, quæ ex fragilibus metalli componuntur campanæ, & chalybeæ atque cupreæ chordæ; ea vero corpora gravius sonabunt, quæ molliori ex metallo fiunt. Gravissime sonant inter metallicas chordæ aureæ ( *p* ), & gravius, quæ ex auro siamensi, & molliori parantur ( *q* ). Diximus tono integro altius tensas a summo frigore chordas clavicymbali sonuisse ( *q*\* ). Aqua, qua scyphus repletur, videtur tremores vitri elasticos morari, cum per diapason inde tonus ingravescat ( *r* ).

Si æque tensæ fuerint chordæ, aut ejusdem metalli, vel materie, tunc iterum erunt numeri vibrationum inversi, ut longitudines chordarum ( *s* ); ita ut duplo longior chorda duplo pauciores vibrationes edat, & octavam humiliorem; & inter tubos ( *t* ) organi ecclesiastici, qui alterius est octuplus, octuplo etiam parcius oscillet ( *u* ). Etiam hæc per similia experimenta ( *x* ), & per ipsum monochordum ostenduntur. Ipsæ undæ in scypho aqua pleno natæ per medium dividuntur, quando sonus per octavam

( *o* ) MERSENNUS *harmonia* p. 266. NOLLET p. 460. 464. HELSHAM p. 275. MUSSCHENBROECK n. 1430.

( *p* ) BARTOLI p. 276.

( *q* ) *Mém avant.* 1699. T. 2. p. 21.

( *q*\* ) HELLANDT *K. Svensk. Acad. handling.* 1760. Trim. 4.

( *r* ) MORHOF p. 105.

( *s* ) MERSENN. p. 268. KIRCHER *Musurg.* p. 424. NOLLET p. 461. EULER p. 7. 12. BARTOLI *tract* 4. n. 3. 4. MUSSCHENBROECK n. 1423. 1427 SAUVEUR p. 138.

( *t* ) In tibiis EULER p. 20. In tibiis sola longitudo sonos variat non latitudo IDEM p. 16. 17.

( *u* ) SAUVEUR p. 140.

( *x* ) NOLLET l. c. p. 462. BIRCH T. I. p. 447. HELSHAM p. 273. MUSSCHENBROECK n. 1423.



octavam adscendit ( $\gamma$ ). Est ergo A. ad B. uti l. L. fumendo literas capitales pro adfectionibus A. & minusculas pro adfectionibus chordæ B.

Denique chordæ æque tensæ, & æque longæ, habent vibrationum numeros in ratione inversa ( $z$ ) diametrorum, aut crassitie: ut duplo crassior chorda duplo pauciores edat oscillationes. Est ergo A. ad B. :: c. C.

Quare in universum numeri vibrationum sunt in ratione inversa longitudinum & crassitierum, & subduplicata tensionum, eritque in chorda A. is numerus  $= lc \sqrt{T}$ . in chorda B.  $LC \sqrt{t}$ . Eruntque æquales utrinque vibrationes, quando  $lc \sqrt{T} = LC \sqrt{t}$ . ( $z^*$ ).

Campanariorum sonorum acumina sunt in ratione ponderum sive triplicata diametrorum ( $z_{**}$ ).

Oportet autem hic memorem esse, non ita chordæ cuique, aut tibie, suum sonum proprium esse, quin ob diversam partium ejus, non eodem modo tensarum, naturam, plures uno tonos ( $a$ ) edat, quos docta auris distinguit, & acutos, & graves. Cum sono principe dedisse ejus octavam, & quintam, & tertiam, quæ una exaudirentur, testes sunt ( $b$ ); & demum, omnem sonum componi ex primario, & ex duobus acutissimis, nempe duodecima & decima septima ( $c$ ), artifex peritissimus docet. In eadem campana diversos sonos in unum conjungi veteres scripserunt ( $d$ ).

§. XV. *Proportiones numeri vibrationum.*

Primus, qua erat admirabili certe perspicacia, PYTHAGORAS ( $e$ ) a malleis harmonice sonantibus fabrorum excitatus, factis numerosis experimentis

( $\gamma$ ) *Mém. avant.* 1699. p. 322. BARTOLI p. 140. & olim GALILEI *Mecan. dialog.* I. p. 90.

( $z$ ) NOLLET p. 461. HELSHAM p. 274. Duplicatam rationem facit MERSENNUS p. 268. Sed non video quemquam nuperiorum ita sumere.

( $z^*$ ) Add. EULER p. 7.

( $z^{**}$ ) MERSENN.

( $a$ ) KIRCHER *Musurg.* L. IX. p. 203. F. *Tert. de LANIS* T. II. L. X. p. 444. ad 450. PERRAULT. ESTEVE p. 44. MAIRAN. *Mém. de l'Acad.* 1737. p. 15.

( $b$ ) Le CAT p. 167. PARDIES *Mém. de Trév.* 1722. p. 1733. Duas octavas ab una chorda edi, quæ exaudiri possint.

( $c$ ) RAMEAU *de l'harmonie* p. 13. 15.

( $d$ ) MERSENN. *harm. instrum.* p. 159. F. T. de LANIS L. X. p. 430. du Bois n. 182 & de fistulis n. 38.

( $e$ ) Apud CRNSORINUM.



rimentis, comperit tandem, rationes diversarum harmoniarum, & septem discrimina vocum.

Nempe ab eo antiquo certe tempore *consonantia* (f) dicitur, quando numeri vibrationum in duabus chordis æquales sunt, atque adeo earum vibrationes eodem tempore recurrentes in unum sonum conjunguntur.

*Octava* vero, quando chordæ, cæterum æqualis, longitudo (g) duplex, & in universum, vibrationum numerus, in chorda A. est duplus vibrationum chordæ B.

*Quintam* dixerunt, quando chordæ A. æque tensæ, & æque crassæ ac chorda B. longitudo est; uti 3, & in chorda B. uti 2.

*Quartam* vocarunt, quando eadem ratio, cumque ea conjuncti vibrationum numeri, sunt, uti 4. & 3.

*Tertiam majorem*, in qua ratio eadem est, uti 5. ad 4.

*Tertiam minorem*, in qua ratio est, uti 6. ad 5.

Reliqua nomina hoc in opere, tot aliis destinato objectis, interim omittimus (h).

*Octava superior* dicitur, quæ fit a numero vibrationum duplo, *inferior*, quæ a subduplo.

Omnes toni audibiles aut in octo (i) octavis continentur, aut in decem (k), ut longitudinum in chordis sonoris summæ rationes sint 1024. & 1. Neque supra eam rationem soni exaudiuntur, neque infra (l).

Inter duas octavas subtilis & docta auris 43. tonos, sive heptameres distinguit (m). Immensa adeo vis tonorum distingui potest, nempe ad 387.

## §. XVI.

(f) BARTOLI p. 125. s'GRAVEZANDE p. 647.

(g) Ea ut simplicissima vulgo utuntur HELSHAM p. 273. BARTOLI p. 122. KIRCHER *phonurg.* p. 181. &c.

(h) MERSENNUS *harmonicor.* L. IV. KIRCHER *phonurg.* L. VI. c. 2. CARTESIUS *de homine* p. 72. BARTOLI p. 122. a sola longitudine: s'GRAVEZANDE l. c. HELSHAM p. 273. MUSSCHENBROECK n. 1426.

(i) SAUVEUR p. 140. cum 6400. sit potentia decima numeri  $12\frac{1}{2}$ .

(k) EULER p. 8. nempe inter 30. & 7520.

(l) SAUVEUR. EULER.

(m) SAUVEUR p. 136. 140.



## §. XVI. Tremores sympathici.

Quando chorda stricta sonum edit, aut quodcunque demum instrumentum musicum, tunc similes, & eadem numero vibrationes, nascuntur in omnibus instrumentis ejusdem toni ( $n$ ), nempe intra idem tempus toties oscillare apti, quoties corpus primo tremens solet vibrare. Non est necesse ejusdem generis instrumentum esse, nam & chorda cum voce unisona, & fistula organi ( $o$ ) cum tibia ( $p$ ), aut cum chorda harmonice contremiscit, & cum chorda propria, sibi que unisona, scyphus ( $q$ ) aqua plenus; tum cum eo tibia ( $r$ ), & tuba ( $s$ ), & cum eodem alius scyphus ( $t$ ), & tympanum cum vitro ( $t^*$ ). In scyphis vitreis consonantibus tremor, & aquæ incrispatio, & subsultus sunt quam manifestissimi ( $t^{**}$ ). Denique tympana consonant, ut altero ictu in altero globuli conpositi subsilient ( $t^+$ ).

Præter chordas, æquo tempore numeros vibrationum habentes æquales, etiam harmonice contremiscunt chordæ, quarum oscillationes sunt ad sonantis corporis vibrationes in ratione aliqua simplici ( $u$ ), quæ nempe sunt in ratione dupla, sive octava distant ( $x$ ); deinde quæ sunt in ratione sesqui altera, & quinta distant ( $y$ ); debilius inde in sympathicos tremores cidentur chordæ, quæ distant tertia ( $z$ ), & reliquis tonis, quarum rationes

M m 2

nume-

( $n$ ) KIRCHER *phonurg.* p. 187. *Musurg.* L. IX. p. 210. CAMER *Cent.* I. n. 77. BARTOLI p. 107. 126. 163. BIRCH T. III. p. 337. MONTAGNAT *thes.* MAIRAN *Mém.* 1737. p. 10. 11. du Bois n. 46. De lyra CARDAN *subtil.* p. 514. Clavicymbalum tactum in tribus aliis clavicymbalis melodias produxit KIRCHER *phonurg.* Musicus, instrumentorum [liuto] parandorum peritus vidit, crepante chorda aliqua in omnibus suspensis ejusdem generis instrumentis, chordas unisonas una sonare BARTOLI p. 163. Etiam remotæ chordæ unisonæ earum aliqua percussa sonant WELSCH *de sono* n. 12.

( $o$ ) BARTOLI p. 112. WALLER *Phil. transf.* n. 134.

( $p$ ) BARTOLI p. 135. du Bois n. 46. LAN. p. 392.

( $q$ ) BOYLE *of languid motion.* BARTOLI p. 135. 136. 138.

( $r$ ) Imperfectius MORHOF p. 22.

( $s$ ) Aqua certe exsilit & effluit MORHOF.

( $t$ ) IDEM p. 75. KIRCHER *phonurg.* FABRIC. *de larynge* L. 3. c. XI.

( $t^*$ ) ROUHAULT p. 173. ut vitreæ fenestræ a certo tympano solo contremiscerent.

( $t^{**}$ ) BARTOLI p. 135. 136. MORHOF p. 75.

[ $t^+$ ] MORHOF p. 78.

( $u$ ) Fortius chartulæ chordis impositæ tremunt ad simplices proportionēs CARRE'.

( $x$ ) BARTOLI p. 127. MAIRAN. CARRE' *Mém. de Trévoux* 1708. S'GRAVEZANDE n. 2374.

( $y$ ) CARRE', BARTOLI, le CAT, MAIRAN, S'GRAVEZANDE n. 2376.

( $z$ ) MAIRAN, &c. In quarta definire BARTOLI p. 127.



numeris exponuntur magis conpositis; & denique obscuros, & vix percipiendos sonos edunt. Et in eadem chorda contremiscunt diversæ chordæ partes, ut cum præcipuo sono acuti alii duo producantur, duodecima & decima septima (a).

Eum tremorem inprimis per ipsa corpora dura a chorda principe ad sympathicas chordas propagari credibile est, cum & suffocetur ea sympathia, si corpus primo loco sonans lanæ (b), aut alteri molli pulvinari incubuerit; & nimis magnæ duræque moles contremiscant, quam ab aere solo emoveri sit credibile (c). Hinc etiam suspensæ chordæ, cæterum harmonicæ, non contremiscunt, si suspenderis instrumenta (d); nisi proxima fuerint (e).

Tamen etiam per aerem (f) ejusmodi tremores sympathicos a chorda sonante ad chordam isochronam propagari cum Cl. viris credas. Manifestum enim est, aerem ipsum, solumque ventum ex instrumento musico suos sonos obtinuisse (g). Nunc si aer etiam solo torrente suo tremores musicos ex chordis obtinet, cur non obtineat idem, quando ipse tremoribus musicis gravis oscillat (h).

An ideo, ut septem primigenii lucis radii diversa sua ad refractiones patientia differunt, ita & in aere dantur particulæ diversi elateris, quarum aliæ ad hos, aliæ ad alios sonos unisonæ sint, atque suum quæque vibrationum in dato tempore præscriptum numerum habet, ut adeo quæque species eos sonos ad aurem deferat, qui sibi sint harmonici (i)? Num etiam in aliis, duris corporibus diverso gradu elasticæ sunt particulæ, quarum quæque cum analogo sibi sono contremiscat, eumque harmonice reddat (k).

Ad

(a) RAMBAU *prin. de l'harmonie* p. 15.

(b) BARTOLI p. 165.

(c) De columnis BARTOLI p. 162. De muris IDEM p. 112 Sed vide T. III. c. 5. tot. p. 165. &c.

(d) DUVERNEY p. 82. F. T. de LANIS T. II. p. 390. BARTOLI p. 164.

(e) De LANIS p. 425.

(f) S'GRAVEZANDE n. 2372. *Miscell. taurin.* I. p. 109.

(g) BARTOLI p. 108. KIRCHER *phonurg.* p. 106. &c.

(h) p. 257. seqq.

(i) F. MAIRAN *Mem. de l'Acad.* 1737. NOLLET l. c. p. 477. 479. 481. HARTLEY p. 41. *Machinas in aere esse, quæ sonos suscitant* MOSCA T. II. p. 107.

(k) F. Tertius de LANIS L. II. p. 444 445. BOERHAAVE *prælect.* T. IV. p. 321. *Sonum gravem crassæ partiæ, tenues acutum faciunt* ESTEVE p. 52.



Ad eam sententiam adlatum est, a tympani certo sono fenestras evidentius subsiliisse ( *l* ), & Echo certos tonos magis quam alios fide & plene repetere ( *m* ), quando forte obstacula, ex quibus echo redditur, certis particulis magis abundant. Columnarum cum organis consonantium tremores ejusmodi determinatæ analogiæ tribuunt ( *n* ). Et phænomenon chordarum, harmonice non consonantium, quando tonorum sunt valde inæqualium ( *o* ), effatum Cl. virorum certum reddere videtur. Nam certè idem murus omnis generis voces reddit, sonosque & melodias ( *p* ), & perinde fragorem tormenti, aut tibiæ suaves modulos, gravissimos nempe sonos & acutissimos pari fide repetit.

De aereis quidem particulis objicit vir ILL. *Leonhardus* EULER ( *q* ), non posse in particulis atmosphæræ diversum elaterem aliquo longiori tempore superesse: nam si ponas corpuscula in aere nunc esse iniqui elateris, continuo dilatata ea, quæ superat, & compressa, quæ est inferior, communis mensura elateris omnibus debet restitui.

In corporibus duris magis probabile videtur, alio & alio modo elasticas durasque particulas esse. Mirum tamen potest videri, & mollissima folia, & durissimas cautes, interque eas variæ duritatis lapides, perinde omnis generis sonos in echo reddere.

Cæterum ab his tremoribus internis ( *r* ) sympathicis, in corporibus unisonis ( *r*<sup>\*</sup> ) a corpore sonoro excitatis, pendet illa MORHOFIO celebrata scyphorum disruptio. Rumpebantur enim voce humana ( *r*<sup>\*\*</sup> ) ab unisono ( *s* ), & efficacius ab octava subito nata ( *t* ) superiori, cujus tremores celeriores in separandis elementis vitri plus haberent roboris ( *u* ). Nam etiam graviores chordæ percussis acutis sonant ( *x* ). A voce acuta in gravem mutata non rumpuntur scyphi ( *y* ). A tuba, mire-

M m 3 ris

( *l* ) ROUHAULT.

( *m* ) PLOT *oxfordshire* p. 12.

( *n* ) BOYLE *of languid and unbee ded. motion.*

( *o* ) p. 275.

( *p* ) *Aët. Moguntiaca* I. p. 138. seqq.

( *q* ) EULER *opusc.* n. 59. 60.

( *r* ) Ad torrentem aeris a voce incitati refert BARTOLUS p. 187. Sed nimis apparet a tremoribus esse internis, cum etiam a raso alio scypho scyphi rumpantur.

( *r*<sup>\*</sup> ) BARTOLI p. 194. 195.

( *r*<sup>\*\*</sup> ) Etiam suspensi aliquando rumpuntur BARTOLI p. 196.

( *s* ) UFFENBACH *Reisen* T. III. p. 240. MORHOF p. 133. BARTOLI p. 198. 199.

( *t* ) MORHOF c. 9. BARTOLI p. 189. du HAMEL *de corp.* L. 2. c. 4.

( *u* ) Tuba diapason sonante magis exsilit aqua, & tremores sunt fortiores MORHOF.

( *x* ) BARTOLI p. 129.

( *y* ) IDEM p. 190. 191.



ris non fractum fuisse, etsi aqua exsiliabat, & effluebat ( $z$ ). A voce vero, sed etiam a razione scyphi alterius rumpebantur ( $z^*$ ), aut a chely cum scypho unifona ( $z^{**}$ ), quem oportebat rumpi.

## S E C T I O III.

## A U D I T U S.

§. I. *Radii sonori conveniunt in meatum auditorium.*

**H**ominis auricula lata est superficie, & ex naturæ instituto de capite exstat, atque sonos fere ab omni parte capitis advenientes occupat ( $a$ ), facilius tamen a parte anteriori, ut in animalibus venantibus. Vittarum usus multum de ea nativa auriculæ perfectione demit ( $b$ ).

*Radios sonoros* dicimus, lineas a corpore sonoro, tamquam a centro, in concentricas undas, inque sphaeræ cavæ ambitum ductas, quam sonus replet. Animalium brutorum auriculæ manifestius conicæ sunt, ut apex conici in meatum auditorium ducat. Quare cum anguli reflexionis radiorum sonorum sint æquales angulis, sub quibus illabuntur, hi radii a quaque sede auriculæ in oppositam, & demum, cum ipsa figura conica eos elabi non sinat, in meatum auditorium conveniunt, quod quidem ex diagrammate facilius intelligitur ( $c$ ).

In homine auricula minus evidenter conica est, habet autem eminentia jûga cartilaginea. Solebat tamen BOERHAAVIUS ( $d$ ) nos docere, se in cadaveris auricula patienter lineas duxisse, æquales cum illapsa quacunque in auriculam lineam facturas angulos. Ita omnes eas lineas in meatum auditorium denique convenisse.

Videntur & animalia, & homines a nemine doctos, hanc sonorum in meatum auditorium conjunctionem, tamquam adjumento sibi futuram notam

( $z$ ) MORHOF. BARTOLI p. 187.

( $z^*$ ) MORHOF p. 244.

( $z^{**}$ ) BARTOLI p. 189.

( $a$ ) Capitis orbem æquis portionibus secare, ut undiquaque audiatur TAGLIACOT *curator. chir. L. I. c. 10.*

( $b$ ) p. 188. Magnas, mobiles, versus genas productas requirit BROUZET *educat. T. II. p. 145.*

( $c$ ) SCHELHAMMER p. 171. seqq. c. c. T 4.

( $d$ ) *Prælect. T. IV. n. 549. p. 317. add. DUVERNEY p. 73.*



notam habere. Equi enim (*e*), cervique (*f*), & alia quadrupeda evidentissime auriculas erigunt, & erectas, cum mobiles habeant, versus eam sedem dirigunt (*g*), ex qua sonus advenit, ut eo plures radios sonoros occupent. In Jamaica armenta ad sonum apellantis ad pabulum conchæ auriculas erigunt, & paulo post rite percepto sono, abitum parant (*g*<sup>\*</sup>). Quare etiam erectis auriculis accurate, demissis obtuse audiunt (*h*).

Homines auriculam vix manifesto movent, per suas tamen enumeratas vires hactenus extendunt, ut aditus conchæ amplius pateat. Idem, surdastri potissimum, manum (*i*) ad angulum cum capite rectum retro aurem adponunt, multo melius adversi sibi amici voces audituri. Denique, qui obtusius omnino audiunt, amplissimum infundibulum (*k*) rectum (*l*), in spiram curvatum (*m*), in meatum auditorium inferunt, ut quam maxima a superficie advenientes sonos occupent, & occupatos colligant. Quare etiam resectis auriculis (*n*) homines plerumque malignius audiunt.

Ita obtinetur, non tantum, ut quam plurimi radii sonori in concham & meatum auditorium conveniant, sed, cum multo amplior auricula, meatus angustior sit, soni insigniter robore aucti ad tympani membranam tanquam in focum colliguntur. Idem natura fecit, quod tuba stentorea auri inserta, aut Dionysiana illa auris, cujus in centro qui sederet, sonos etiam minimos enormiter robore auctos perciperet (*o*).

Tympanum resonabile alii (*p*) auri admovent, ut tensa membrana sonos recipiat, quos resonitus in cava capsula augeat, & fortiores in membranam tympani pulsus excitet.

Ipse

(*e*) GIBSON *diseas of hors.* p. 44. 45.

(*f*) ARISTOTELES *Histor. anim.* L. IX. c. 5. PLINIUS L. VIII. c. 32.

(*g*) Equus GIBSON l. c. putorius apud GREW *Cosmol. sacr.* p. 24.

(*g*<sup>\*</sup>) SLOANE *Jamaica.*

(*h*) ARISTOTELES. PLIN. l. c.

(*i*) HADRIANUS apud GALENUM *de usu partium* L. XI. c. 12. DUVERNEY p. 69. C. HOFMANN *Instit.* p. 171. BOERHAAVE *pralect.* T. IV. p. 411. *Journ. econ.* 1753. fevrier.

(*k*) J. Nicus ERYTHRAEUS F. B. LALLIO tribuit: sed GALENUS jam habet.

(*l*) Tubam acusticam p. 262. POLINIERE *exper. de phys.* p. 320. CLAYTON *Miscell. Cur.* T. III. p. 283. Viam illapsæ aquæ eo artificio detexit ARANT. *obs. anat.* c. 10.

(*m*) KIRCHER *Musurg.* L. IX. p. 305. le CAT p. 293.

(*n*) Inde quasi strepitus perpetuus, & cicadarum cantus *Art de faire les rapports* p. 102.

(*o*) Cum humana aure comparat P. della VALLE *voyag.* T. VIII. p. 192.

(*p*) Seb. TRUCHET *Breslauer Saml.* 1718. p. 1000.



Ipse demum meatus auditorius, ut alii tubi, per reflexiones sonorum, & respondentes ad singulas adlisiones tremores elasticos ossæ & cartilagineæ naturæ, sonos auget omnino & roborat (*q*).

## §. II. *Membrana tympani.*

In fundo meatus auditorii tympani membrana est; inque ea depressio in scuti speciem, versus tympanum, conica eminet, ut in umbonem, introrsum (*r*) convexum terminetur. In eum umbonem undæ sonoræ per naturam conii convergentis ultimo impingunt (*s*): sed ea membrana sponte tensa est, in adulto homine etiam magis (*s*\*). Non ergo dubitari potest, quin ea membrana a sonoris chordis in tremores cieatur (*t*).

Ea via tremores sonoros ad auditus organum venire debere suadet analogia tot simili meatu præditorum animalium (*u*), tum morbi, qui auditum tollunt, quoties aut iter sonori aeris per meatum auditorium impeditur, aut membrana nequit tremere.

Cum caro meatum auditorium replet, auditus (*x*) abolitus est, & restitutus, ea carne extracta (*y*), & a corpore in aures illapso, aque velamento (*z*) vitioso tympani membranam obducente (*a*), & a veribus in auditorio meatu (*b*) nidulantibus audiendi facultas perit.

Sed frequentissimum est, ceruminis nimiam copiam (*c*), & spissitudinem, surdastros facere, surdosque. Ejusmodi sunt homines, quos circumforanei medici injecto aliquo sapone sanant (*d*), quales & ipse vidi. Adgnoscat ab obstructo meatu auditorio natam surditatem ILLUSTR. de BUFFON (*e*).

Si

(*q*) p. 262. seq.

(*r*) p. 200. 201.

(*s*) p. 279.

(*s*\*) 200.

(*t*) p. 259. &c.

(*u*) p. 197.

(*x*) MARCHETT. *obs.* 28.

(*y*) Ibid.

(*z*) ZOD. MED. GALL. T. III. p. 183.

(*a*) p. 197. 198.

(*b*) ACRELL *chirurg. händels.* p. 99. 100.

(*c*) VALSALVA p. 12. MORGAGN. *Epist.* p. 173. DUVERNEY p. 72. 157. KENNEDY *Ophthalmogr.* p. 108.

(*d*) Oleo tartari in aqua fœniculi soluto HOFMANN *de errorib. in praxi vulgar.*

(*e*) T. II. p. 345.



Si quando obstructa aure aliquis auditus (*f*) superfuit, ut in puero absque auribus nato, cum meatu clauso (*f*<sup>\*</sup>), poterit vel per tubam aliquid sonorum ad organum ejus sensus venisse, aut per ipsos concussorum ossium tremores (*f*<sup>\*\*</sup>).

De ipsa membrana, num vitiata auditum tollat, dubitari potest. Sunt qui negant, etiam exemplis (*g*) citatis, & experimentis (*h*).

Alii tamen ajunt obfuduisse, quibus ea membrana perforata fuerit, pariter exemplis adductis (*i*), & experimento in cane facto (*k*). In Italia frequens esse malum, & a nimia repurgatione, gravem auditum (*l*) supervenire, qui ei membranæ ruptæ imputatur. Nulla membrana tympani in furdo (*l*<sup>\*</sup>). Cui gladio membrana tympani læsa fuerat, auditus destructus (*m*), sensim tamen, cum sanaretur, restitutus est. Per purulentiam auditus aboliuitur (*m*<sup>\*</sup>). Quare, cum etiam VALSALVA testetur, facile ejusdem semper membranæ vulnera consolidari (*n*), possunt aliqua exempla innocuæ in ea violationis ad hujusmodi curationes referri; vel ad tubæ EUSTACHII superstes officium.

Inutilem enim esse, aut quod proximum fuerit inutilitati, unice tympanum claudere (*o*), neque singulare artificium hujus non alteri similis membranæ, neque ejus, quam laudavimus, in tot animalibus constantia

(*f*) De aure altera clausa BARTHOLINUS *Hist.* 36. *Cent.* VI.

(*f*<sup>\*</sup>) UYLHOORN ad HEISTERI *Chirurg.* p. 733.

(*f*<sup>\*\*</sup>) p. 253.

(*g*) SCHNEIDER *de catarrh.* L. III. p. 405. *Phil. transf.* n. 461. LIEUTAUD *précis de médec. prat.* p. 532. de BUFFON T. III. p. 343. VIEUSSENS p. 54. (tamen ut non omnino surdus esset homo).

(*h*) Nempe WILLISIUS, cum in cane membranam tympani perterebrasset, tertio demum me se elapso, surditatem vidit supervenisse *de anim. brut.* p. 133. tum CHIRAC apud KOENIG. *anim. regn.* p. 163. pari eventu, similique fere SCHELHAMMER p. 207. & CHESELDENIUS p. 305. 306.

(*i*) STENZEL *physiolog.* c. 29. D. de MARCHETTIS. Sensim demum obsurdescere DUVERNEY p. 75.

(*k*) J. G. PAULI ad J. V. HORNE p. 130. (*destructis* equidem ossiculis), et in morbo a VALSALVA narrato p. 101.

(*l*) BARTHOLINUS *Hist.* 29. *Cent.* IV. & in exemplis DUVERNEY p. 75. NABOTH p. 130.

(*l*<sup>\*</sup>) RIOLAN. p. 229.

(*m*) KALTSCHMIDT *de otalgia* p. 15.

(*m*<sup>\*</sup>) HOFMANN *disquis.* p. 313.

(*n*) *De aure hum.* p. 101. nova membrana renata p. 102. clausove vulnere p. 103. conf. apud MORGAGNUM p. 75.

(*o*) Ne aliquid subeat *Ess. de phys.* nov. ed. p. 750.



tia ( $o^*$ ), neque ossiculorum cum ea nexus, propriique, qui ea ossicula regunt, muscoli credere nos sinunt.

Laxior infanti ( $p$ ), & tecta præterea mucoso velamine, minus acriter contremiscit, ut credas inde fortiores sonos, nuper nato homini periculosos, aliquantum frangi. Adulto homini & ipsa indurescit, & suo in anulo fortius tenditur, uti diximus.

### §. III. *An tendatur harmonice.*

Chorda tensa melius resonat ( $q$ ). Ex hoc experimento, & ex considerata membranæ tympani fabrica, exque muscoli EUSTACHIANI officio nata est minime improbabilis conjectura. Nempe quando accuratius nobis expedit audire, ut debiles, & peregre advenientes sonos subtiliter distinguere velimus, creditur, hinc quidem auriculæ aditum per suas vires aperiri; deinde per musculum mallei aut principem, aut unicum, tendi membranam, ut introrsum ducta angulum cum circulo, super quem eminet, faciat minorem. Ita omnes radii ex umbonis centro ducti in ambitum longiores fient, ut qui superficiem longioris coni tangant, eritque tota membrana undique tensa. Volebat autem magnus PRÆCEPTOR noster animalia, & certe hominem, tunc eo ejus membranæ officio uti, quando mens primum a confuso aliquo strepitu excitata ( $r$ ), curiositate mota se recolligit, eumque strepitum vult quam distinctissime percipere ( $r^*$ ). Qui musculos laxatores tympani admittunt, vires habent, qui ad sonos nimis fortes vicissim membranam tympani relaxent, aut alternis cum musculo EUSTACHII vicibus eandem membranam restituant ( $s$ ).

Cæterum addunt singulare exemplum nimis laxæ membranæ tympani ( $t$ ), quæ ad auditum inutilis esset, nisi quando maximi tympanorum tremores accede-

( $o^*$ ) p. 201. 202.

( $p$ ) p. 200.

( $q$ ) p. 272.

( $r$ ) *Prælect.* T. IV. p. 402. ad n. 562.

( $r^*$ ) Aliquod ejusmodi vel equorum phænomenum videtur confirmare dictum p. 279.

( $s$ ) Similia jam docuerunt WILLIS *de anim. brut.* c. 14. PERRAULT *du bruit.* p. 235. ROUHAULT, *Holder of speech.* p. 164. DUVERNEY p. 78. seqq. DERHAM *theol. physiq.* L. IV. c. 3. p. 127. BAYLE *probl.* CHESLDEN *anat.* p. 308. MAIRAN *Mem. de l'Acad.* 1737. p. 72. le CAR. p. 277. Neque repugnat, ut scepticus sit, JOHANNES BOHN *progymnasim.* 26.

( $t$ ) HOLDER *clem. of speech.* p. 160. WILLIS *anim. brut.* l. c. *Philos. trans.* n. 35. BOERHAAVE p. 415.



accedebant. Ab iis tensa, etiam vocem humanam nunc distinguebant. Ab aqua in tympano nimis abundante surditas ( $t^*$ ).

Subtiliorem aliam in eadem membrana tensionem, alii scriptores admiserunt. Etsi enim cum omnibus tonis aliquæ in duris corporibus particulæ consonant ( $u$ ), accuratior tamen est harmonia ( $x$ ) durorum corporum, quæ pariter tensa eundem numerum oscillationum in iisdem tempusculis edunt. Quare cum credatur, oscillationes membranæ tympani ad audiendum requiri, creditum est pariter, ut varii soni, quos audire nostra interest, purissimi menti repræsententur, varias etiam ejus membranæ tensiones requiri. Eas ergo vires, quas diximus eam membranam tendere, & laxare, adhiberi putant Cl. viri, ut ad graves sonos exaudiendos eadem laxetur, ad acutos contra tendatur, eademque cum omnibus, ut varii sint, unisona sit, eundemque numerum oscillationem in eodem tempore repræsentet, atque adeo in intimo organo auditus eosdem tonos repetat, quos aer ad membranam tympani attulit ( $y$ ).

Si omnino muscoli per ossicula membranam tympani regunt, quæsitum est, num a voluntate regantur, exemplo futuros, etiam non visa membra arbitrio regi; num potius motus iste sit ex ea classe, quæ absque voluntate ex machinæ corporeæ fabrica sequitur. Experimento in se ipso facto putabat *Hieronymus FABRICIUS*, utique eos musculos voluntatis imperio parere, cum strepitum intus in aure voluntatis potestate excitare posset ( $z$ ). Loco tranquillo strepitus subito confuse percipitur, ante clamorem ( $a$ ).

Pro altera opinione analogia oculorum militare videtur, in quibus arcanæ quædam ad majorem minoremve lucis vim, & ad propiora aut remotiora objecta mutatio, certo locum habet, & tamen voluntas sola, absque ea in luce, aut vicinia objectorum diversitate, nullum omnino arbitrarium imperium in eandem iridem habet, neque eam, ut sphincterem quidem aliquem, jubendo tendere, & arctare valet.

Cl. COTUNNUS a tympani membrana tum per cellulosos suos nexus, tum per

N n 2

manu-

( $t^*$ ) VALSALVA apud MORGAGN. *Epist.* VI. p. 141.

( $u$ ) p. 277

( $x$ ) p. 275.

( $y$ ) BOERHAAVE *prælect.* T. IV. p. 405. HARTLEY p. 238. ROGER *de effect. music.* p. 49.

( $z$ ) De aure c. 6. p. 31.

( $a$ ) ESTEVE p. 7.



manubrium mallei, chordam tympani (*a*<sup>\*</sup>) in tremorem cieri, sic ab ea irritatione musculus EUSTACHIANUM, & stapedium, quia duro nervo suos ramulos habeant, in contractionem agi, perspicaciter, & pro summo suo ingenio suspicatus est. Videtur autem in ea hypothese a fortioribus sonis membranam etiam magis tendi, cum contra laxari expediat.

De tota hac quaestione ægre aliquid definitur, cum experimenta capere non detur. Si quidem tamen musculus est, qui tympani membranam tendere possit, omnino animum eo inclinarem, ut ea revera tendatur, & laxetur vicissim, neque frustra malleus aut membranæ innascatur, aut a musculo gubernetur. Neque experimentum repugnat; credas enim, etsi certus non sis, credas tamen, accuratius te audire, quando accuratius audire vis. Ita certe mihi experienti videtur. Ad tonos ergo valde debiles probabile fuerit, tendi membranam, laxari posse vix probabile fit. Etsi enim quam maxime velis, non poteris acutiorem stridoris vim aliter, quam obturatis auribus frangere.

Sed eandem membranam harmonice tendi posse, ægrius adfirmaverim, cum certum sit, sonos quoscunque, absque ejus membranæ ope, animæ perinde repræsentari, quando vibrationes sonoræ (*b*) continuo ad ossa capitis ipsa admoventur; neque aliquam in itinere soni majorem aut minorem tensionem necessario posci, cum ossa cranii nullo modo acrius tendi possint.

#### §. IV. *Officulorum motus.*

Si membrana tympani percutitur & introrsum premitur (*c*), non potest non malleus etiam mechanica necessitate (*d*), introrsum premi, & unacum malleo connexa incus, ejusque inprimis crus longius; quod ipsum stapedem impellere, inque fenestram ovalem altius potest adigere (*e*). Is idem motus est, quem FABRICIUS (*f*) audivit, quem in talpa vidit *Guilielmus DERHAM* (*g*).

Quare

(*a*<sup>\*</sup>) p. 76.

(*b*) HOFMANN *disquis. anat. patbol.* p. 313. KAAUW *impet. fac.* n. 372. BAUMER *surdi a natur. faciend. audient.* cum sonus per baculum ferretur.

(*c*) p. 280.

(*d*) VIRUSSENS p. 50. seqq. WALTHER *de membran. tymp.* n. IX. ALBERTI p. 130.

(*e*) RAU *amphitheatr. zootom.* p. 98. COTUNNUS &c.

(*f*) p. 283.

(*g*) *Physic. theol.* p. 118.



Quare ut membranæ tympani destructio, ita ossiculorum caries (*b*), & elapsio (*i*), & cruris longi incudis erosio (*k*), & demum si certa fides est historiæ, incudis defectus (*l*) auditum destruit. Ea enim maxime naturalis via nunc interrumpitur, qua aeris tremores ad vestibulum penetrare oporteret.

Hinc animalia, quæ auditu pollent, ossicula habent, quæ tremores sonoros a meatu auditorio ad vestibulum transmittunt, calidi sanguinis quadrupeda & aves. Hinc inter animalia frigidi sanguinis optime audit lacerta (*m*), deinde rana (*n*), quæ duo ossicula habet; vipera minus, cui unicum ossiculum, [ & nulli canales semicirculares ] (*o*); salamandra aquatilis (*p*) vix quidquam, cui ossicula nulla. Recte ergo, ossicula ad perficiendum auditum facta (*q*) esse doceas.

Stapedius musculus potest altius defigere in vestibulum partem stapedis exteriorem (*r*), eo ipso ergo, dum accuratius audire expedit, pressionem in vestibulum augere.

#### §. V. *Tubæ officium.*

Auricula non unica via est, per quam soni ad tympanum veniunt; est & altera, per nares, & os & EUSTACHII tubam, semper patula. Certum est hominem, qui naturali instinctu regitur, quoties accuratius vult sonos percipere, os late (*s*) aperire, indecoro gestu, & rustico, sed ad finem suum non inutili, potissimum in iis, qui gravius audiunt (*t*). Eum sonum videtur in tympano, per reflexiones & repetitiones confirmari (*t\**).

N n 3

Videntur

(*b*) DUVERNEY p. 184. VALSALVA.

(*i*) HEISTER not 60. ad compend. anat. BLAIR miscellan. p. 142. seqq. Delic. Med. Chir. p. 169. VALSALVA p. 101. Journ. de Medec 1761. m. Oct GENGAR anat. Chir. p. 202. Solo quidem malleo elapso non penitus sublatus dicitur auditus MANGET. biblioth. p. 264. 265.

(*k*) VALSALVA p. 101. 102.

(*l*) MAR. MERSENNUS apud BEVERWYCK de calculo. p. 86.

(*m*) GEOFROI in Mem. des Savan. etrang. p. 191.

(*n*) IDEM p. p. 169. 172.

(*o*) ID. p. 181.

(*p*) p. 185.

(*q*) ESTEVE p. 16. &c.

(*r*) p. 210.

(*s*) BARTOLI p. 301.

(*t*) ESTEVE p. 11.

(*t\**) De sonis in universum BUFFON T. III. p. 343.



Videntur etiam animalia esse, in quibus hæc præcipua via sit sonorum, ut in testudine (*u*), rana.

Sed in homine adeo necessario videtur aeris per tubam liber ad aurem internam commeatus, ut ea obstructa non minus auditus pereat, quam perit, ex vitiis auditum per meatum auditorium impredientibus. Exempla sunt in erosione (*x*) musculorum tubæ: in polypo obstructante iter tubæ (*y*); in turunda tubæ EUSTACHIANÆ (*z*) inserta; in tonsillarum repetita inflammatione (*z*<sup>\*</sup>), in aphthis (*z*<sup>\*\*</sup>); in tumore palati (*a*) meatum EUSTACHII spectante; in mucro congelato tubam replente (*b*). Vulgo quidem in catarrhis auditus obscurior est, qui per diarrhœam (*c*), aut alvi purgationem (*d*) restituitur, sublata causa, quæ tubam obstruebat. Et coram habeo nobilem puellam, cujus altera auris a maligno faucium illo morbo obsurdit, qui sub anni 1762. initia Bernæ gravis & funestus incubuit. Ulcus una adest.

Fuse Cl. WATHEN (*e*) surditatem ab obstructa tuba EUSTACHIANA curare docet specillo inserto, & injecta aqua cum melle rosarum mista. Inde enim ægri continuo levantur. Sponte, cum a catarrho homo surdaster esset, edito ad deglutiendum nixu, & exaudito quasi crepitu, malum cessisse scriptum est (*f*). Gargarisini similiter salubris effectus est, a magno præceptore adhibiti (*g*).

Oportet autem, ut eo beneficio gaudeamus, ab inspirando tantillum temperare. Inter ducendum enim spiritum, non tremor aliquis, sed integer torrens aeris per tubam subit, & tympani membranam fortius extrorsum reprimit, quam a tremoribus aeris introrsum premitur. Hinc aerem reten-

(*u*) CALDESI p. 12. Negat meatum auditorium in eo animale esse, quod ita accipio, ut sit perangustus. Etiam in rana tuba per ampla est GZOFROI p. 174.

(*x*) VALSALVA p. 122. Gravis inde auditus.

(*y*) IDEM p. 116. BECKET obs. 18. ubi surditas cum polypo sublata est.

(*z*) VALSALVA ib. Adeo certo, ut turunda remota auditus rediret.

(*z*<sup>\*</sup>) HESTER apud WIEDEMANN de tonsill.

(*z*<sup>\*\*</sup>) BOERHAAVE p. 415.

(*a*) Cum tinnitu aurium TULP l. n. 35.

(*b*) WATHEN Phil. transf. 1755. n. 35. GUYOT Hist. de l'Acad. 1724. p. 53. & Phil. transf. n. 461.

(*c*) MICHEL obs. sur le pou's obs. 12.

(*d*) RIVIN. de audit. vitiis p. 22. SCHROETER de auditu p. 23. 24. HOFMANN apolog. GALENI L. II. c. 240. de auditu gravi.

(*e*) L. c.

(*f*) DERRHAM p. 123.

(*g*) KENNEDY p. 107.



retentum, cum strepitu tubam subire (*b*), & etiam frigore suo incommodum fuisse, & denique membranam tympani dirupisse legimus, cum os & nares cohiberentur. Inter oscitandum perfecta surditas nascitur (*b*\*), ut sæpe accurate animum advertens expertus sim, me subito amici sermonem amisisse, quando oscitabam; est enim ea lenta & maxima inspiratio.

Non ideo nego, alia tubæ EUSTACHIANÆ commoda esse. Per eam cedere potest aer in gravissimis sonis, tonitru, magnorumque tormentorum explosione (*i*). Tanta enim tunc ejusmodi fragoris est efficacia, ut sæpe subito (*i*\*) inde homines obsurdescant. Gravius longe malum foret, si aer in cæco tympano inclusus, vi sua tota undis per meatum auditorium subeuntibus resisteret, a quibus comprimitur. Nunc per tubam cedere potest.

Creditum est etiam aerem externum ea via ad tympanum venire, tum ut ejus cavi aerem recente elemento renovet, ne elatere amisso reddatur inutilis; tum, ut idem sit ejus aeris cum externo elater (*k*). Nimis enim acute audiremus, si atmosphærae aer ponderosus, & aer interim tympani levis foret; & contra obtusus fieret sensus, si atmosphæra in levitatem mutata, ut in montium adscensu, internus aer densitatem maritimam retineret. Nunc per inspirationem aer tympani cum externo aere idem redditur.

Dictum est etiam calidum aerem in tympano rarefieri, ut resistat aeri per meatum auditorium tremores adlaturus. Eum calorem temperare aerem noviter per nares tubamque receptum (*l*).

Per foramen tympani ejusmodi aerem (*m*) ad tympanum posse venire nunc quidem, cum ejusmodi foramen nullum sit, non refutamus.

Hactenus

(*b*) DERHAM in *Phil. transf.* l. c.

(*b*\*) Habet ARISTOTELES de gener. L. V. c. 2. *Isagog.* c. 54. Minus audire CASSIUS *probl.* n. 20.

(*b*\*\*) SCHELHAMMER p. 213.

(*b*†) DUVERNEY p. 177.

(*i*) FABRIC. P. 3. c. XI. LAURENT. L. XI. *quest.* XI.

(*i*\*) BOERHAAVE p. 417. REUSNER *obs.* 45. HEDANUS *obs.* 5. 6. 7. L. III. inter quas etiam est observatio surditatis a maximæ campanæ sonis. Campanarii & tormentorum magistri sonos parvos non audiunt WOLF *Wurk.* p. 700. Veteres agebant, accolæ cataractarum Nili obsurdescere A fulgure & tonitru auditus amissus *Fränk. Anmerk.* T. V. p. 176. & in altera aure surditas RIVIN. l. c. p. 16.

(*k*) Ne nimis aut rarefiat, aut densetur SENAC *Mém. de l'Acad.* 1724. p. 254.

(*l*) BOERHAAVE *prælect.* L. IV. p. 380.

(*m*) MAZINUS *Instit.* p. 121.



Hactenus vero respirationem aliquam possis per aurem admittere, ut per expirationem subtracta parte aeris fauces replentis, etiam tuba se inaniat, & adeo aer externus, per meatum auditorium subeuns, tympani membranam convexiorem reddat. Vicissim dum inter inspirandum aer in tubam venit, & tympanum replet, & aeri externo resilit, membranam credas extrorsum pelli (*n*). In rana motus membranæ tympani dicitur cum respiratione synchronus esse (*n*<sup>\*</sup>).

Denique in omni auditu credit vir ILL. VALSALVA, tubam a suo novo musculo circumflexo palati mollis aperiri & laxari, ut aeris aliquid admittat, & membrana tympani ab aeris per meatum auditorium inmissis tremoribus (*o*) melius tendatur. Ne vero inspiratio aerem in tubam reddat, qui his tremoribus resistat, comprimi tubam a salpingostaphylino musculo, & a pharyngostaphylino (*p*), qui tubæ adcumbant. Subtiliter ista, quæ neque facile sit refutare, neque demonstrare promptum. In omni tamen inspiratione musculos, quos modo nominavi, palati agere non crediderim, cum salpingostaphylinus non possit non nares obducto palato molli claudere, id autem contra inspirationis naturam sit, ut quæ per nares maxime secundum naturam unice peragatur, & adeo iter per eas ad fauces liberum requirat.

Si necesse est mucum, in tympano non fetus (*q*) solius, sed adulti hominis, abundantem expurgare (*r*), non alia, præter tubam via erit. Eo etiam pondus aliquantum ducit. Sternutationem eo pertinere Cl. viri docuerunt, ut excitato torrente aeris micum abripiat (*s*).

Hæc autem omnia, quæ de aere tympani docentur, ita possunt recipi, ut non sinus immemores, id cavum a muco plerumque repleti; neque eo loco purum & aereum inane esse.

#### §. VI. Tremores ad vestibulum continuantur.

Primum de fenestra rotunda monemus, non videri per eam viam tremores aereos ad organum auditus facile venire posse (*t*). Non respondet e directo

(*n*) LAMY in præfatione. SENAC. p. 627.

(*n*<sup>\*</sup>) LAMY ibid.

(*o*) p. 117. 118.

(*p*) p. 120.

(*q*) 207.

(*r*) FABRIC. l. c. ad fin.

(*s*) BOERHAAVE Præl. T. IV. p. 382. SCHNEIDER de offe cribrif. p. 455. adde RHAZEM L. IX. ad MANZOR. c. 36.

(*t*) Præcipuam viam esse SCHELHAMMER p. 238. seqq.



recto membranæ tympani, sed averſa omnino ab ea, & poſteriore ſe-  
dem reſpicit (*u*), & toto promontorii tubere ab ea ſeparatur. Deinde  
mucus (*x*), quem in tympano nunquam non reperi, videtur tremo-  
res valde frangere, quos poſſis in aere tympanum replente ponere.

Venient ergo in fenestram ovalem ii certe tremores, qui membra-  
nam tympani, & offacula ferierunt, & ſtapes tum ab incude in ovalem  
fenestram urgebitur; tum a ſuo musculo. Ea in vestibulum ducit, in  
quo & aquula eſt (*y*), & ſuſpenſa membrana molliſſima nervea (*z*).  
Ea pulpa ab humore vestibuli inpulſa contremiſcet (*a*), apparetque hic  
iterum aquæ ad tremores ſonoros concipiendos aptitudinem (*b*) a phyſio-  
logia ſeparari non poſſe, cum in vestibulo nullus ſit aer, neque niſi  
per eam aquam nervus auditorius mollis percelli queat. Fiet autem ea  
membrana retrorſum cava, unde aqua inſpellens advenit, antrorſum vero  
convexa (*c*). Tantillus erit motus, cum ſtapes ultra quartam partem  
lineæ ſuo in motu non deſcribat (*d*).

Nunc cum canales ſemicirculares humore ſuo repleantur (*e*), etiam iſte  
humor cedit & impelletur, & per ipſos canales, inprimis externum,  
declivem ſubibit (*f*), perque ſuperiorem, ut qui perpendicularis ſit, re-  
dibit in vestibulum, ejusque membranam pulpoſam in priorem planitiem  
reſtituet (*g*).

Et repetentur ejusmodi itus & reditus toties, quot ſunt ſtapedis in ve-  
ſtibulum progreſſiones (*h*), & quot ſunt undæ ſonoræ, quæ per mea-  
tum auditorium advenientes ſtapedem inſpellunt.

Porro cum cochlea in vestibulum altera ſua ſcala pateat (*i*), & per-  
inde aquula ſua plena ſit (*k*), etiam in cochleam ex vestibulo humor  
preme-

(*u*) p. 226. VALSALVA p. 133.

(*x*) p. 207.

(*y*) p. 229.

(*z*) p. 241.

(*a*) COTUNNUS p. 32.

(*b*) p. 255.

(*c*) COTUNNUS p. 33.

(*d*) IDEM ibid.

(*e*) p. 231.

(*f*) COTUNNUS p. 35. 42.

(*g*) IDEM p. 36. 42.

(*h*) IDEM p. 40.

(*i*) p. 237.

(*k*) p. 238.



premetur, perque scyphum (l) in scalam tympani veniet, quæ equidem clausa est. Quare ut ea aqua cedere possit, vel compressilem sumere necesse est, uti quidem de lymphaticis & gelatinosis humoribus vulgo creditur (m); sed etiam vapores sunt de natura humorum elasticorum.

Vel, ut Cl. COTUNNUS nuper nos docuit, cedit aqua cochleæ per aquæductum (o), quem ex ea in cavum cranii ducere ostendit. Ejusmodi etiam aquæductus (p) ex vestibulo exit, quem credit vir Cl. nimia potissimum in pressione, quando vehementer a magnis sonis stapes urgetur, effugium aquæ vestibuli præbere.

Cæterum id satis certum videtur, per stapedem, membranam, quæ vestibulo est pro periosteo; per eam humorem vestibuli; per eam & expansam membranam, quam Cl. vir septum dixit, & tubercula nervea mollissima vestibuli (q), & demum sensilem membranam (r) pulposamque canalium semicircularium, inque cochlea vaginam laminæ spirali membraneam (s) premi, quæ scalas dividit.

Aeri fere, qui per foramen ovale (t) subeat, & vestibulum repleat, satis similia officia (u) Cl. viri tribuerunt. Verum cum nervi ab aere tacti necessario pereant, inque pellucidam duramque chordam siccentur, merito NATURA & chordæ tympani, & vestibuli nervis, & sentienti canalium semicircularium periosteo, & demum eidem in cochlea periosteo, non aerem, sed vaporem circumfudit (x), qui in iis nervis teneritatem & mollitiem ad sensum necessariam tueretur.

## §. VII. Sedes auditus.

Intimam esse oportet, & in labyrintho poni, cum destructis ossiculis, & membrana, aliquando auditus (y) supersit, aut certe tinnitus

(l) p. 236.

(m) Argumento fibrarum & membranarum ex eo sero nascentium.

(o) p. 64.

(p) p. 60.

(q) p. 241.

(r) p. 231. 241.

(s) p. 236.

(t) MAZIN *Instit.* p. 121. MERY de l'oreille p. 429.

(u) Eum aerem per stapedem in motum cieri habet nupera *Physiolog.* p. 482. Circulum per vestibuli nervulos cochleam statuit LAMY p. 76. BARTOLI p. 319.

(x) Ex arteriis generari ESREVE p. 24. pene vere, nisi qui vapor est, eum dixisset aerem.

(y) In surdis tinnitus TULP. L. I. *obs.* 35.



nitus (z) perceptio, nempe auditus & motuum intra corpus nostrum natorum, & sonorum supra verticem nostrum editorum (a), aut per solida ossa nobiscum communicatorum (b). Surdus, qui ne bombardarum quidem explosionem audiebat, internos tamen percipiebat strepitus (b\*). Vehemens vero earum partium sensus est, & doloris (c), & strepitus. A tenero illo fluente sanguinis per arteriolas, quales possis in aure interna, exiguas certe, ostendere, enormes sonitus & flumina caput inundantia toties in morbis acutis sum passus. A musca in aurem ingressa quasi immane tonitru (d).

Neque hic quidquam subest, quod præter opinionem accidat. Nuda enim hic est pulpa nervea; quam acriter autem ea sentiat, ex minimo nervo dentis, quando perinde nudus tangitur, facile quidem æstimatur.

Nunc a nervi auditorii mollis nata ex tremoribus sonoris adfectione, auditum nasci nemo dubitat; is enim nervus fere solus in omnibus animalibus, quæ audiunt, reperitur (e). Qua vero in sede anima sonos percipiat, & quomodo unica mollissima pulpa tot sonis distinguendis sufficiat, omnino quæritur.

In vestibulo quidem auditus sedem esse posset probabile videri (e\*), cum in eo princeps sit pulpa nervi, & in omnibus notis animalibus, etiam pene surdis, aliquid vestibuli simile reperiatur (f). Elegantissima tamen fabrica cochleæ, canalesque semicirculares non potuerunt frustra facti esse, & omnino obscure audiunt ea animalia, quibus solum est vestibulum (g).

Quare siquidem in vestibulo solo obtusius auditur, erit aliqua pars auditus in cochlea, inve canalibus semicircularibus, ut videatur subtilio-

O o 2

rem

(z) Elapso malleo tinnitus MANGET *bibl.* p. 264. 265.

(a) p. 253.

(b) I D.

(b\*) SMETIUS *Miscell.* L. X. p. 548.

(c) Cephalea atrox ab abscessu in auditus cavernulis SCHRAEDER *Dec.* III. *obs.* 10. & a verme, sanata eo excusso ZACUT *Prax. med. mirab.* L. I. *obs.* 7. A tonitru tinnitus intolerabilis & diuturnus RIVIN. l. c. p. 16. A tormentorum explosione, in vulneribus capitis gravissima symptomata PARE' L. IX. c. 14. Inde mors in infante HILDAN. *Cent.* I. *obs.* 19. & apoplexia funesta AMAT. *Cent.* III. *Cur.* 22.

(d) BINNINGER *Cent.* IV. *obs.* 81.

(e) GROFROI l. c. p. 191. etiam in salamandra aquatica p. 186. raja p. 185. testudine CALDESI p. 13.

(e\*) Ita DRIDIER *Anat.* p. 312. DUVERNEY *posth.* II. p. 542.

(f) In vipera, cui nulli canales semicirculares sunt GROFROI p. 181. in colubre p. 185. cæcilia p. 179.

(g) Vipera minus quam rana, hæc minus quam lacerta audit IDEM p. 191.



rem sonorum distinctionem aut ab altera harum partium pendere, aut ab utraque.

Utrum vero similis sit, vel ex fabrica poterit definiri, vel ex anatomico comparata. Multum juvaremur, si de piscium auditu constaret. Nunc etsi plurimi Cl. viri adfirmant, & etiam insectis (*b*) auditum tribuunt, sunt tamen, qui dubitant (*i*), aut denique negant (*k*); iidemque & in lacertis (*l*), & in insectis (*m*) auditum nolunt admittere. Olim pisces audire scripserat ARISTOTELES (*n*), etiam absque conspicuis organis. Paguros musica ex latibulis excitari (*o*), & pastinacas sonis musicis delectari (*o*\*) legimus; nam de Delphinorum deliciis non adinet dicere, qui sint de quadrupedum calidorum classe (*p*). Plausu pisces congregari, & in suis vivariis ad propria nomina adflescere (*q*) passim legimus; Troctas, glanos, cyprinos ad vocem magistri accurrisse etiam ex propria observatione RONDELETIUS auctor est (*r*), & ad fidium sonos aliosam accurrere (*s*). Fusc pro suis piscibus nuper Jacobus Theodorus KLEIN (*t*) pugnavit, & advocatos adproperare plurimi sunt testes (*u*).

Cyprinum certo audire (*x*), & salmone, atque strepitu abigi (*y*) alii confirmant. De adfines etiam lacerto idoneus auctor est, speciem ejus generis *Warral* musicam amare, & cum monachis Dervis circumagi (*z*).

Si liceret recipere, piscium aliquem verum auditum esse, multum pro canalibus semicircularibus, & pro ea sententia profectum foret, quæ in

- (*b*) LYONNET *insect. theol.* II. 5. cum inter ea dentur, quæ canora sint.  
 (*i*) NOLLET *Mem. de l'Acad.* 1743. p. 201.  
 (*k*) ARDERN *Phil. trans.* n. 486 ut strepitum per solos tremores sentiant.  
 (*l*) PARISINI Chamæleontem surdum faciunt.  
 (*m*) Bombyces non audire, neque a tonitu terreri JUSTI *Neue Wabr.* n. 2.  
 (*n*) *Hist. anim.* L. IV. c. 8. *part. anim.* L. II. c. 10.  
 (*o*) ÆLIANUS *anim.* VI. c. 30.  
 (*o*\*) L. 17. c. 16.  
 (*p*) Accurate balænæ audiunt ANDERSON p. 192. & delphini PLINIUS L. XI. p. 39.  
 (*q*) PLINIUS L. X. c. 70.  
 (*r*) p. 107.  
 (*s*) RONDELET p. 221. *Hist. natur. des anim.* T. II. P. I. p. 172. 173.  
 (*t*) *Mantiss. de auditu pisc.* p. 27. 28. *Miss.* I. n. 9. 10.  
 (*u*) BOYLE *exper. & observ. phys.* BRADLEY *philosoph. account of the works of nature* p. 63. *general account* p. 97. *Farmers direct.* p. 21. PEYER *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 4. 5. obs. 145. UFFENBACH *Reisen* T. III. p. 147. HOFMANN *Instit.* p. 194. KLEIN *mantiss.* p. 27. 28.  
 (*x*) RICHTER *Ichthyotholog.* p. 798.  
 (*y*) ROBERG *de salm.* p. 14.  
 (*z*) SHAW *travels* p. 429.



in iis canalibus, inque media eorum longitudine, sedem sensus auditus ponebat. Tunc enim ejusmodi ratiocinium proponeretur; absque offi-  
culis, tympano & cochlea (a) pisces frigidos audire; cum offi-  
culis, sed abs-  
que cochlea, aves (b); utrumque genus habere suos canales semicircu-  
lares; absque canalibus semicircularibus nullum esse (c), nisi illum ob-  
scuro serpentum (d) auditum, & salamandræ (e); rectius vero &  
ranas (f) audire, & lacertas (g) etiam melius, quibus sint ejusmodi  
canales. Addiderunt Cl. viri, esse etiam in canalibus semicircularibus co-  
nicam fabricam, & decrescentes ex ordine latitudines, quæ cum multis  
chordis possint consonare (g\*).

Rari tamen fuerunt, qui hanc tenerent sententiam, multa contra eam  
COTUNNUS (h) protulit, non certo in iis canalibus ostensos nervos,  
ductum quidem hætenus conicum, tamen etiam æquabile lumen (i).

Artificiosissima tamen cochleæ machina dudum physiologorum oculos  
in se convertit, ut non alibi accuratum auditum, & subtilem sonorum  
distinctionem, crederent perfici. Potissimum vero placuit Cl. viris lamina  
illa spiralis membranacea, cum nervis (k) inter utrumque folium decurrenti-  
bus, quos sibi sumunt. Cum enim ea lamina verum sit triangulum, tantum con-  
volutum, rectangulum, cujus angulus ad verticem cochleæ peracutus sit,  
continuo viderunt viri ingeniosi, habere se machinulam, in qua chordæ  
innumerabiles contineantur. Origo latissima in basi cochleæ est, brevissi-  
mi fines proxime apicem, [ut quidem Cl. viri eam fabricam sibi re-  
præsentabant]. Nempe chordas longissimas, ad basin positas, cum so-  
nis (m) gravissimis, brevissimas, quæ sunt ad verticem, cum acutissimis

O o 3

sonis

(a) M R A D *de venenis* p. 43. D U V E R N E Y p. 99.

(b) D U V E R N E Y *ibid.*

(c) De piscibus D U V E R N E Y *Mém. avant.* 1699. T. I. p. 280. R I C H T E R *ichthyo-  
theol* p. 61. De raja G R O F R O I p. 188. De avibus P E R R A U L T p. 211. S E N A C  
*Essays* p. 619 610.

(d) G R O F R O I p. 179. 182. 183.

(e) p. 185. 191.

(f) p. 191. add. 173. 176. 177.

(g) p. 191. add. p. 170. & *posth.* l. c.

(g\*) D U V E R N E Y p. 102. 103.

(h) p. 43.

(i) *Ibid.* & p. 230.

(k) p. 243.

(m) D U V E R N E Y p. 98. B O E R H A A V E n. 563. D. de M A I R A N *Mém. de l'A-  
cad.* 1737. N O L L E T p. 480. C O T U N N U S p. 79. M U S S C H E N B R O E C K n. 1479.



sonis harmonice contremiscere, & per eos tremores animæ eos sonos distincte repræsentare. Nerveas vero eas chordas & sensiles posuerunt, quod credantur ex modiollo (*n*) inter duo folia laminæ membranaceæ nervuli excurrere, & ex eadem ratione alii aliis longiores esse. Esse adeo laminam spiralem primum auditus organum (*o*).

Excusari etiam posse, quod in avibus cochlea nulla sit, cochleatum enim cavum habere circumductum capiti, in avibus canoris amplius (*p*).

Nuperi aliqui Cl. viri, de scypho edocti, qui sit in vertice cochleæ, & nervum auditorium eo venire persuasi, in eo potissimum vertice sedem auditus posuerunt (*q*).

Objectum est equidem, nervos laminæ spiralis breves esse (*r*), neque cum iis chordis consonare posse, tanto longioribus, quæ extra aurem contremiscunt. Objectum etiam, nervulos longitudinem (*s*) laminæ spiralis metientes, contra fidem anatomes sumi, & naturam nervorum pulposam ad celerrimos tremores non sufficere, & eos nervos, basi solidæ inpositos, ad vibrandum parum aptos videri.

Ad illam quidem objectionem responsum (*t*) est, non esse necesse, ut chordæ cochleæ unisonæ, & æque longæ sint cum chordis externis: & sufficere ad consonandum, si in facili aliqua proportionem cum corpore sonoro sint, ut in octava, aut octava octavæ, aut certe in aliqua quacunque simplici ratione (*u*).

Tamen tantum valuit hinc quidem cochleæ artificium, inde comparata anatome, ut, qui canalibus semicircularibus faverent, cochleam non excluderent. Ita VALSALVA (*x*) omnes suas Zonas conjunxit, tum quæ in canalibus sunt semicircularibus, tum quæ in cochlea. Et ILLUST. SENAC (*y*), cum in medio canalium semicircularium auditum peragi statueret, apicem tamen cochleæ addidit. Et dudum partitas vices utriusque organi alii fecerunt (*z*), ut accurati quidem

(*n*) PERRAULT *du bruit* p. 246. seqq. DUVERNEY p. 96. COTUNNUS l. c.

(*o*) PERRAULT p. 212. 247. BOERHAAVE l. c. VIRUSSENS p. 87. 88. le CAT p. 282. BUFFON T. III. p. 343. MAIRAN l. c. p. 76. NOLLET l. c.

(*p*) *Phil. transf.* n. 206. Esse pro cochlea CLAYTON *musc. cur.* T. III. p. 333. Habet etiam MOULIN *Phil. transf.* n. 199. A labyrintho ad labyrinthum communicant.

(*q*) BRENDÉL l. c. n. 5. & tamen cum canalibus semicircularibus SENAC p. 754.

(*r*) CRAMÉR *Journ. des sçavans* 1741. Jun.

(*s*) ESTEVE p. 22. 43. 44.

(*t*) MAIRAN *Journ. des sçavans* l. c.

(*u*) NOLLET p. 482.

(*x*) p. 128.

(*y*) *Essays de physique* p. 754.

(*z*) DUVERNEY p. 104. *soib.* l. c. MUSSCHENBROECK *Inst.* n. 1479.



dem auditus organum in cochlea, minus vero distincti in canalibus sit, quos diximus (a).

§. VIII. *Quid in re obscura firmum videatur.*

Ego quidem omnium primo removeo ab auditus organo nervorum tremores elasticos, qui cum tremoribus corporum mundanorum harmonice oscillant (b). Nervus enim, ut mollissimus, ita ad elaterem & tensionem, videtur unus omnium ineptissimus esse.

Deinde separo tremores aereos ab iis, qui continuo, & nullo intervallo separati, partes capitis solidas percutiunt. Illos potissimum per ossicula adferri, perque stapedem, ad organum intimum auditus credo propagari (c); tamen etiam aliquando per tubam (d); stapedem vero per aquulam & vestibuli intimum organum auditus in tremores conjicere, & membranaceam pulpam vestibuli (e), ex superioribus probari posse video.

Iterum, per experimenta certum est, nullo auditum exteriori aurium apparatu egere, & sonos suos animæ repræsentare (f), absque meatus, tympani, & ossiculorum auxilio. Adeo hæc vera sunt, ut perfecte surdi non solum per baculum sonos acutos & graves distinguant (g), sed omnino per totam superficiem corporis sonos percipiant, tremoresque sentiant (h), eumque tremorem ad pedes usque & in epigastrium excurrere (i), ita certo norint, ut tympanum pulsari ex sensu circa ventriculum discant (k). KAAUWIUS, perfecte surdus, egregius erat orator. Quare auris externa cum tympano remotis potissimum sonis recipiendis, & robore augendis inservit.

Tremores porro harmonicos ab ipsis duris ossibus repeto, quæ a sonis externis, aque aeris undis aut eminus advenientibus, aut cominus, in oscillationes cientur unisonas. Sunt autem ea ossa ad id ipsum facta, prædura,

(a) VERDUC *usag. des part.* II. p. 214.

(b) L. X. p. 359.

(c) p. 284.

(d) p. 285.

(e) p. 241.

(f) p. 253.

(g) BAUMER l. c.

(h) KAAUW *impet. fac.* n. 372.

(i) MONTANARI *Gal. di Minerv.* T. I. p. 249. CAZZI *Idée de l'homme phys.* p. 133. KAAUW n. 281.

(k) MONTANARI *ibid.*



prædura, & adeo fragilia (*l*), ut nullum metallum sonorum fragilius sit, de cochlea loquor & de canalibus semicircularibus. Eos osseos ergo canales contremiscere, & nervos suos per suos tremores percutere video, ut sentiant, non quod nervi oscillent, sed quod mollis eorum pulpa a tremoribus elasticis ossium ictibus celerrime sibi succedentibus percutiatur.

Eritque sedes auditus tam late patens, quam nervi in labyrintho; in membranacea adeo expansione vestibuli (*m*), & aliis pulposis colliculis (*n*) ejus camerae: in cochleæ nerveis ramulis (*o*), quos credas inter duas paginas laminæ spiralis incedere; in nervis pulposi periostei (*p*) canalium semicircularium, quos merito suspiceris ab eo periosteo non abesse, etiam si ostendere difficile fuerit.

Neque repugno, quin cum sonis externis gravioribus melius longiores chordæ laminæ spiralis osseæ, & canalium sectiones latiores (*q*): cum acutis melius breviores (*r*) chordæ osseæ (*s*) laminæ ejusdem, & angustiora lumina eorundem canalium contremiscant. In cochlea quidem eas fibras osseas transversas oculus ipse distinguit (*t*).

Quare auditus poterit locum habere, dum sit nervus in auditus organo, qui a contremiscente osse percutiatur (*u*). Melius tamen peragetur idem, si ossa auditus laminas, tubulosve habuerint conicos (*x*), aut triangulari (*y*) modo decrecentes, ut longo ordine aliæ sectiones aliis longiores sint.

Reliqua pars auditus nihil ab aliis sensibus habebat distinctum. Nam rami acustici per truncum nervi mollis ad cerebrum impressionem sonorum remittunt. Ostensum enim est, compresso auditorio nervo (*z*), etiam in cerebro parte aliqua vitiata, cum integerrima aure, auditum supprimi.

## §. IX.

(*l*) p. 230. 231.

(*m*) p. 241.

(*n*) Ibid.

(*o*) p. 243.

(*p*) p. 242.

(*q*) p. 295.

(*r*) Ibid.

(*s*) Recte ZINNIVS noster, nervos & membranas non tremere, sed osseas fibras *Epist. cit.* p. 35. 36.

(*t*) p. 235.

(*u*) p. 291.

(*x*) Canales semicirculares in avibus, piscibus, serpentibus.

(*y*) Cochlea in quadrupedibus.

(*z*) In surdo nervi auditorii arefacti ARENDS de cephalalgia.



§. IX. *An nervus durus ad auditum faciat.*

Aliquid ad tensionem tympani facere, ut Cl. virorum fuit hypothesi (a), id quidem recipi nequit, cum hæc humana chorda toto mallei manubrio a tympano removeatur, & si quidem aliquando cellulosis ad eam revincitur nexibus, tamen cum ipsa sit nervus, tensionis incapax (b), neque alia corpora tendere possit.

Sed neque causam facilis auditus, quando instrumentum sonans dentibus corripitur (c) ad eam chordam retulerim. Perinde enim exaudiuntur tremores, quos alio loco cominus ad cranii ossa effundimus, in quo de chorda tympani nulla est suspicio (d).

An tamen per eam chordam tremores ad nervum durum propagentur (e)? An ab ea chorda fiat, ut a quibusdam nimis acutis sonis dentes strepant (f)? An non aliquid ad auditum durum nervum facere ostendatur, quod eo compresso, surditas sit secuta, cum nullo modo nervus mollis violaretur, ut ex vulnere ad initium (g) masseteris illato, & a compressione forti gutturis (h)? Hæc omnino quæras.

Vix possis his testimoniis negare, integritatem nervi duri ad auditum requiri; sed neque unice huic sensui sumes inservire, dum auriculam externam, musculum internum & stapedium suis ramulis regit. Absque enim iis aut musculis, aut ossibus, auditus nonnunquam superest (i). Quo tamen modo nervus durus ad integritatem conferat sensus, possis requirere, cum nusquam cum molli trunco misceatur. A tremoribus sonoris chordam, dum per tympanum transit, nervumque dum per aquæductum migrat, hætenus adfici, ut in illis notissimis dentium stuporibus, nihil quidem repugnat.

## §. X.

(a) INGRASSIAS p. 9. J. M. HOFMANN. BOERHAAVE T. IV. p. 375. Ex voluntate tendi GAUTIER obs. IV. p. 57. Incudem a chorda suspendi RONDELET p. 49.

(b) L. X. p. 359.

(c) CHESELDEN anat. of hum. body p. 234.

(d) Super verticem capitis p. 253. 284. 295.

(e) GÜNZ de humor. p. 224.

(f) LA CHARRIÈRE p. 105.

(g) SMETIUS miscell. L. X.

(h) Hist. de l'Académie 1705. p. 53.

(i) p. 281.



§. X. *An ad cerebrum nervus redeat.*

Singularem in aure intima fabricam *Bartolomæus SIMONCELLIUS* (*k*) in libro inedito descriptam reliquit. Nervum nempe mollem per fulcum cochleæ subire, & modioli permigrare canalem, deinde ex apice exire, in cochleæ scalam mergi, abire pariter cum cochlea in gyram ductum, exire in vestibulum, in pulpam expandi, iterum in filamentum gracilefcere, circumire per tres canales semicirculares, deinde in ostio proprio canalis maximi, sive inferioris, per proprium foramen in cranii cavum redire, inque ramos divisum in duram matrem, & superficiem superiorem cerebri, & circa glandulam pinealem distribui, ita impressionem sonorum non per communem trunci mollis viam, sed per istum venosum quasi nervum in cerebrum redire (*k*\*).

Multa hic omnino ad anatonem addita sunt. Nondum quisquam certo vidit, aut per cochleam (*l*), aut per canales semicirculares (*m*) nervum aliquem vere circumire. Et id filamentum nerveum, quod *SIMONCELLIO* visum est in cranium redire, adque duram matrem, est omnino propago nervi quinti paris (*n*) secundi, quæ dura membrana tecta in aquæductum venit, seque nervo duro admiscit. Ita se habere, possis ex *Antonio PACCHIONO* (*o*) discere, & ex posthumis *VALSALVÆ* (*p*) operibus. Alia, quæ olim *Eliæ CAMERARIUS* (*q*) objecit, non necesse est repetere.

§. XI. *Cur unicus sonus audiatur.*

Duplex hæc est quæstio: Prima cum sonus omnis ex multis sonis in unum confluentibus coalescat (*r*), & cum in omni sono sit & primordia-

(*k*) Apud *MISTICHELLIUM* in epistola ad *Guilielmum DESNOUES* data, inter *lettres de DESNOUES a Guilielmini* p. 206. 207. 208. tum apud *El. CAMERARIUM* *epist. Taurin.* X. p. 151., in *append.* ad *Danielis HOFMANN*, generi *CAMERARIANI*, *hypothef. Gouey. confutat* p. 16. tum apud *HEISTERUM* not. 62\*. ad *Comp anat.* qui iconem italicam recusam dedit.

(*k*\*) *MISTICHELLI* *ibid.* p. 211.

(*l*) p. 243.

(*m*) p. 241.

(*n*) *L. X.* p. 214.

(*o*) *Epistol.* ad *PACCHIONUM* p. 164.

(*p*) p. 132. *diff. l. n. 3.*

(*q*) *l. c.*

(*r*) p. 264.



mordialis sonus a fonte soni editus, & soni innumerabiles a corporibus duris nati, quæ is sonus percutit, & qui in meatu auditorio, tympano & labyrintho demum se addiderunt (*s*), cur inquam simplex sit adeo compositi soni sensatio?

Videtur in universum anima impressiones non distinguere, quæ sint valde similes; ut enim distinguat, discriminis notas satis evidentes inesse oportet, quas ipsa æque dilucide sentiat, ac quidem objecta sentit, quæ oportet distingui: eæ nisi satis evidentes fuerint, neque objecta distinguet. Ita in pariete albo anima uniformem alborem videt, quando eminus inspicit; neque nascitur, nisi simplex albi coloris sensatio. Propius si accesserit oculus, jam tubercula & vallecule in eo pariete distinguet, & anima partes a partibus dissidere persuadebitur. Nunc soni isti primigenii, & ex reflexione nati, hætenus sunt simillimi, quod a fonte soni in corporibus duris tremores excitentur harmonici (*t*), nempe æque celeres excitentur, etsi primigenii quidem soni debiliores, posterius additi soni fortiores sunt. Hinc docta auris in illis compositis sonis partes dissimiles (*u*) distinguit, qui vulgarem aurem prætereunt non percepti. Plane, uti in exemplo a PRÆCEPTORE (*x*) proposito, numerosissimi auditores una canunt, & homini, eminus audienti, videntur unum sonum edere, si quidem perfecta omnium canentium fuerit harmonia, ut eosdem omnes tonos edant; facile tamen discrimen percepturo, si aliquis indoctior alium tonum admiscuerit.

Ejusmodi vero dissonantiam in coalescentibus tremoribus nullam permittit lex, quæ fortius (*y*) resonat cum chorda sonante, ea quæ unisona est, debilius semper ut est ab unisona remotior (*z*). Quæ unisono vicinæ sint, difficile habent discrimen, & ab anima non facile percipiendum; quæ ab unisono remotæ sunt, eas ob debilitatem anima non sentit.

Est autem etiam alia quæstio, quare nempe in duabus auribus non duas voces, sed unicam audiamus, cum præterea situs auris alterius obversus sonoro corpori, aversus alter, possint in robore soni discrimen facere. Est enim soni intensitas in ratione numeri particularum in aures

P p 2

incur-

(*s*) p. 295. 296.

(*t*) p. 294. 275.

(*u*) p. 273.

(*x*) p. 419.

(*y*) NOËLLET *leçons de phys.* p. 482. & p. 275. nostr.

(*z*) LIDEM *ibid.* & p. 276. nostr.



incurrentium, per velocitatem, aut [in systemate LEIBNIZIANO (a)], per quadratum velocitatis multiplicati; æquum autem est, plures particulas in aurem adversam ( $a^*$ ) nudamque incurrere, pauciores in adversam, tectam molli vitta.

Iterum eo est reditum, ut similes nimis impressiones anima non distinguat. Nunc duas aures ita similes esse & æquales, ut etiam mensuræ canalium semicircularium (b) utrinque eadem sint.

Sunt etiam, qui, subtili certe anatomica adnotatione usi, nervorum auditoriorum in scriptorio (c) calamo unionem huc adhibuerint, non prætervisam anatomicis antiquioribus (d).

Nunc aures quidem frequenter inæqualium sunt virium ( $d^*$ ), ut etiam ex ea inæqualitate Cl. viri (e) aurem non musicam, falsamque vel fuscam vocem deduxerint. Et certum est, plurimos homines altera aure recte audire; altera pene surdos esse. Et tamen hi homines suis inæqualibus auribus unicum sonum percipiunt.

Videtur autem sufficere, ut corpus sonorum per utramque aurem tremores in solidis auris utriusque partibus æque numerosos excitet: ita soni fient similes, & anima fortiori sono magis perculsa, debiliorem non distinguet. Quo ipso iterum argumento confirmor, non nervos nostros, utique in altera aure sæpe teneriores, in altera callosos, sed solidas partes auris intimæ a sonis in tremores agi.

## §. XII. *Diversitas in diversorum hominum auditu.*

Si in eodem homine dextrum organum auditus sinistro simillimum esse solet, non ideo eadem in diversis hominibus constantia dominatur. Dum VALSALVA (f) adnotavit, canalium semicircularium mensuras in aliis & aliis hominibus tamen differre, quam adnotationem ita auxit CASSEBOHMIUS (g), ut etiam nomina a longitudine canalium sumpta noluerit admittere, quam inconstantem reperiret. Officula  
etiam

(a) S'GRAVEZANDE n. 2388.

( $a^*$ ) VALSALVA p. 126.

(b) IDEM p. 140. 141.

(c) Fascic. VII. tab. 3.

(d) G. a ZERBIS anat. p. 135.

( $d^*$ ) VANDERMONDE art de perfectionner l'espèce humaine II. p. 383.

(e) BUFFON Hist natur. T. III. p. 345.

(f) Conf. loc. cit. p. 231.

(g) p. 141. 142.



etiam alia aliis vel duplo majora vidit accuratissimus CORUNNUS (*b*), & ego satis memini, in stapede potissimum, cum plurimos eorum coram haberem, ne duos quidem sibi satis similes me reperisse.

Nobis quidem suffecerit & nimiam audiendi vim, & nimis obtusam proposuisse. Nimis acute audiunt aliquando in acutis morbis (*i*), phrenitide (*k*), hydrophobia (*l*), tetano (*m*). Junioris ALBINI morbum alias tetigimus (*n*). Hystericæ etiam feminae minimis nonnunquam a sonis mirifice turbantur. Nervorum videtur esse adfectio, quorum vis sentiens aucta est, quo vero modo augeatur, non est dicere. Conjecturas adferre possumus, turgiditatem, quæ se tremoribus offerat, tenuitatem involucrorum, quæ nudiores medullas ictibus magis reddat obnoxiam, tensionem per siccitatem, aliasque morbosas causas subnatam. Omnes enim partes corporis humani simplicissime extensæ mirifice sensu augentur, ut in tortura est notissimum.

Contra gravis auditus sæpe quidem in ipso fetu jam adest, cum plurimi infantes absque auditu nascantur, & ideo muti sint, quod nunquam sermones aliorum hominum exaudire potuerint (*n*\*). Est præterea gravitas auditus, quæ omnibus hominibus per senium serius aut ocysus supervenit, qui unicus FONTENELLII pene seculum superantis, qui idem musæ olim gallicæ SCUDERIE (*o*) morbus fuit. Videor mihi reperire, etsi senes etiam oculorum usum denique amittunt, frequentius tamen & cum paucioribus annis aures obsurdescere. Multa hic medicinæ pars incognita est, cum hujus omnium morborum senilium vulgatissimi sedes & natura ignoretur. Subtilem nempe anatomen hæc inquisitio requirit, ad quam pauci medici apti sint. Indurari (*p*) laminam spiralem conjectura est. Videntur autem nervi omnes occalescere, ut neque intestina, neque vesica urinaria stimulum sæcum perinde sentiat, neque a luce oculi æque vivide adficiantur, neque a saporibus linguæ papillæ, neque a venereis sollicitationibus genitales muscoli.

P p 3

Citius

(*b*) p. 61. cum fenestra rotunda osse clausa foret.

(*i*) BOYLE *determinat. effluv* p. 131. GORTER *Chirurg. repurg.* n. 997.

(*k*) ARETÆUS *acut. curat.* l. I. c. I. In mania FISCHER *de miro sens.* augment.

(*l*) L. X. p. 294.

(*m*) HILLARY *Natural hist. of Barbadoes* p. 241.

(*n*) L. X. l. c.

(*n*\*) PLIN. L. X. c. 49.

(*o*) VERDUC *usq. des part.* L. II. p. 195.

(*p*) BUFFON l. c. T. III. p. 344.



Citius tamen obsurdescunt, qui magnis sonis vivunt obnoxii. Tormentis bellicis præfecti, & campanis vibrandis, exiguos sonos non audiunt (*q*), uti diximus.

§. XIII. *Gratia sonorum & odium.*

Odiosissimi (*q*<sup>\*</sup>) in universum toni valde acuti sunt, ut stridor ferreæ laminæ perbrevis, quæ a lima raditur: etiam sibilus acutior (*q*<sup>\*</sup>), & nonnullorum hominum singularis aeris ad dentes adhæsiō, quando literam S. pronuntiant. Mechanica certa causa ejus odii est, nam & dentes inde stupent (*r*), & sensus incommodus a canariensium indigenarum acutissimo sibilo per 15. dies in aure superest (*s*). Creditur cum his acutissimis sonis brevissimas chordas zonæ cochleæ adeo vehementer contremiscere, ut pene dissolvantur (*s*<sup>\*</sup>): omnino uti similes acuti soni ipsa vitra frangunt (*t*).

Gravissimorum sonorum magnum robur est, & exigua gratia. Tormentorū majorum vicinorum fragor ita aures afficit, ut sæpe inde, qui adstant, obsurdescant, idque vitium per totam (*u*) vitam supersit. Causa mechanica ignoratur; certum tamen est, nervos nostros adfectiones nimis vehementes non ferre, aque iis destrui, ut a solis fulgore retina solet, ab acidissimis liquoribus lingua.

Hæc hætenus facilia sunt, difficilior vero quæstio, unde musica tonorum successio aut placeat, aut ingrato modo aures, potissimum doctas, adficiat. Observatum est, placere fere frequentiam *consonantium*, in quibus tremores sunt æquales, aut certe proportionum in tonis, quorum vibrationes simplices rationes habent, quas exiguis numeris exprimendis (*x*), ut sub dupla & dupla, vel uti 2. ad 3. uti 3. ad 4. (*y*); ut demum voluptas minuatur, quando ratio nimis est in magnis numeris, ut 6. ad 7.

Animad-

(*q*) WOLF *Wirkung*. p. 700.

(*q*<sup>\*</sup>) Non ex idiosyncrasia sola, ad BARTHOL. *hist.* 28. Cent. III.

(*q*<sup>\*</sup>) Marmotæ irritatæ BUFFON l. c. T. II X. p. 221.

(*r*) La CHARRIÈRE l. c. p. 05.

(*s*) SPRAT *histor. of the Roy Socitey*. p. 217.

(*s*<sup>\*</sup>) ROGER p. 101. CHEYNE *sanit. infirm.* p. 177.

(*t*) p. 277.

(*u*) p. 287.

(*x*) BARTOLI *tratt.* IV. c. 2. &c. EULER p. 37. ROGER *de effectū music.* p. 61.

(*y*) Quartam non esse dissonantiam BARTOLUS p. 229.



Animadversum est porro, vibrationes in rationibus simplicibus sæpius coincidere, ut in unisona semper, in octava 50<sup>s</sup>. in 100 vibrationibus, in quinta supra 33<sup>es</sup>, parcius vero, quo remotiores sunt ab æqualitate vibrationum numeri.

Hi frequentes consensus vibrationum voluptatem faciunt (z).

Neque longe abfuit, quin adderetur, ideo placere consonantias & proportionales faciles, quod anima, sui equidem laboris ignara, vibrationes vere numeret, & facilitate rationum simplicium delectetur (a); quo ipso argumento aliqui ex STAHLII schola utuntur, ut sensationes obscuras nobis demonstrent (b).

Nunc quidem numerare animam, & numerare 7000. (c), in minuto secundo vibrationes, & esse sui laboris ignaram, videtur omnino conscientiae nostrae & simplicissimo experimento repugnare. Ægerrime medicus 140. pulsus numerat adtentissimus, & numerabit 50<sup>es</sup> plures vibrationes, neque sentiet se numerare.

Porro res ipsa falsa est. A peritis musices hominibus quæsi (c\*) num omnino hæ faciles consonantiae placitum melos dent: negarunt, & responderunt, puerile fore, & flaccidum, chordam pererrare eandem. Sed etiam BARTOLUS, gnarus harum rerum homo, non tertiam solum utramque, sed sextas omnino, quarum rationes sunt 5. ad 3. & 8. 5. (d) in melodiis gratissimas esse testatur.

Paulo aliter ILL. nuper EULERUS, voluptatem (e) posuit in cognito ordine, quo soni acuti & graves sibi succedunt (f), adeoque, quando ordine aliquo celeres vibrationes & graves se subsequuntur, in anima gratum sensum nasci. Verum etiam & ordinem ipsum, & ordinis causam, nemo nisi musicae artis peritus percipit, & tamen voluptatem omnes sentiunt, etiam animalia (f\*).

Quare hanc quidem gratiae in successione tonorum causam ad ea refero, de quibus per experimentum constat; physica vero ratio ignoratur. Neque magis hoc in exemplo credo a nobis requiri, ut causam mechanicam

(z) MERSENNUS L. I. prop. 5. ESTREVE p. 47.

(a) Conjectura fuit MERSENNI Harmon. p. 265. HARTSORKER *physique* p. 119. TAGLINI *de aere* p. 227. KRUGER *Grundriss* p. 39. *physiolog.* n. 334. KRAZENSTEIN *Beweis* p. 55. NICOLAI *von der Schönheit* p. 40. *von der Music* p. 17. BUFFON T. III. p. 340. seqq.

(b) KRUGER. KRAZENSTEIN. NICOLAI.

(c) p. 271.

(c\*) Add. HALLE *von Thieren.* p. 111.

(d) p. 231.

(e) p. 11. 33.

(f) p. 34.

(f\*) LALLEMANT *mecan. des passions* p. 128.



nicam exponamus, quam quidem tenemur rationem reddere, cur certi colores placeant, cur certus acrimoniæ gradus sapida corpora faciat, cur papillarum cutanearum in definita proportionem frictuum fremitus voluptatem efficiat.

§. XIV. *Causæ effectus musices.*

Certum est in omni homine, etiam quam maxime musices ignaro, alios sonos & sonorum successiones alios in anima adfectus generare; neque dubium est, celeritatem (*g*), sonosque acutiores lætitiā, sonos vero graves & lentum melos tristitiā efficere, ut in his exemplis maneamus; alios fortes & una veloces sonos animum, etiam animalibus, addere. Ipsi barbari fluvii *Orenoko* accolæ gravissimis sonis, quos ventribus repetitis ad eandem tubam adaptatis producant, adeo triste faciunt melos, ut nemo moestitiæ possit resistere, quæ ex eo instrumento nascitur (*h*). Ipsi musici docent lætos, teneros, plenos majestatem, aliosque modos (*i*) certa vocis temperatione producere, methodumque ergo docent, qua desideratus animi adfectus obtinetur. Neque adeo aut veteribus historicis, græcorum & scandinavorum, fidem negavero, qui a peritis musicis quoscunque imperatos animi adfectus in illustribus auditoribus excitatos narrant (*l*). AMURATES IV. sævus fratrum exterminator, a perito Psalterii magistro eo est redactus, ut & ei, & amicis vitam condonaret, & ipse demum (*m*) lacrimas non contineret.

Mihi quidem res non adeo difficilis videtur. Lætitiā nempe homines excitatis & celeribus sonis, tristitiā lentis & gravibus ab ipsa natura docti exprimunt: omnino uti frontem in lætitiā explicant, caperant iidem in ira. Quare ex lege adfociationis (*n*) idearum, celeres soni eam in cerebro & in mente statum revocant, cujus signa sunt ii celeres soni, & graves pariter eum animi adfectum restituant, cujus dialectus in gravibus tonis est. Omnino uti etiam gestus pantomimorum, per solam idearum adfociationem, lætos, venereos & tristes adfectus apud Veteres excitabant.

Denique

(*g*) CHEYNE *sanit. infirm.* p. 177.

(*h*) GUMILLA *Hist. natur. de l'Orenoq.* T. I. p. 320.

(*i*) BERRARD *art. de Chant.* p. 28. seqq.

(*k*) Non facilem se præbet *Johannes. WALVIS Phil. transf.* n. 247.

(*l*) Le CAT p. 286. ROGER p. 101. 103. 104. 105. Auctor. *l. l'Amateur.*

(*m*) D. CANTÉMIR in *historia Turcica.*

(*n*) Vide hæc L. XVII.



Denique morbos varios arte musica sanari ( o ) passim legas, etiam apud illustres auctores: delirium ( p ), rabiem ( q ); solentque huc demorforum a Tarantula ( r ) exemplum referre, qui solo certo sono ad saltandum incitato convalescant. Sed tarantulæ quidem morsus nullas habet ejusmodi vires, & Cl. KÆHLERUS ( s ) dudum ostendit, innocentem ab eo vitio esse bestiolam, atque melancholiæ genus esse, quo Hydruntini adficiuntur. Nunc quidem melancholicos lætis sonis hætenus adjuvari dedero, quod flexum ad moestitiam animum ab ea obscura voluptate revocent, quam homines ejus temperamenti in tristibus ideis quærent.

Est etiam mechanicum quid in sonis fortibus, ut cerebrum conturbent, sanguinem exagitent, & denique speciem faciant febris. A tympani pulsatione sanguinis velocitatem augeri, cum qua de vena incisa fluit, utique legimus ( t ).

Subtiliter olim brevis vitæ juvenis Cl. ROGER ( u ) hæc explicare tentavit, per particulas heterogeneas, nostris admistas spiritibus: eos putabat densari, sic fieri unisonos cum sonis, cum quibus alioquin nihil haberent harmoniæ: excitatis ergo iis sonis oriri in spiritibus motum, quo adtenuentur. Sed oportebat de phænomeno prius constituisse, cujus resolutionem quærit.

Paulo aliter Georgius CHEYNE a musica docuit in fibris nerveis homotonas oriri vibrationes, uti tremores sympathici chordarum se mutuo excitant ( x ). Per eas vero oscillationes possis credere, aliter & aliter systema nerveum adfici.

Addam unicam voculam. Hominem aure excellere crederes ( y ), nisi musica auris avicularum canorarum, adeo apta ediscendis & imitandis cantilenis hominum, hic nos moraretur, nec nostro generi eam laudem finiret tribuere.

LIB.

( o ) Collegit varia NICOLAI von der Music n. 25. add. GUNZ l. c. ROGER p. 93. MALOUIN Ergo ad sanit. music.

( p ) Hist. de l'Acad. 1707. p. 7. 1708. p. 23.

( q ) Ex cane rabido natam HUNAUDE de la rage p. 306.

( r ) Hist. de l'Acad. 1702. p. 16.

( s ) In Svenska Acad. handling 1758. Trim. I. p. 34. &c.

( t ) ZODIAC. MED. GALL. T. II. p. 149.

( u ) p. 95. seqq.

( x ) CHEYNE l. c. p. 168. 169.

( y ) BUFFON T. IV. p. 31.



## L I B E R X V I.

## V I S U S.

## S E C T I O I.

## O C U L I T U T A M I N A.

## §. I.



Ures ad tremores aereos percipiendos factæ sunt, ad æthereos tremores oculi: hinc illæ quidem partim elasticæ, partim duræ fabricatæ, cum aer mollia corpora in tremores sonoros ciere nequeat, neque ejusmodi corpora resonent: oculi ex humoribus, quia humores lucis iter hætenus permittunt, ut tamen id potenter immutent. Longa erit descriptio, & partes oculi tutelæ propositas primas, deinde oculum ipsum proponemus, in eo læti, quod non alia pars corporis humani ita penitus innotuerit, ut quidem oculi anatome hoc potissimum seculo tradita est.

§. II. *De oculo in genere.*

Latius patet visus provincia, quam auditus. Nam & pisces oculos habent manifestos, de quorum auditu dubitatur, & insecta pleraque, & animalia testacea bene multa. Conchyliæ pleraque habent duos oculos (*a*) in propriis cornubus. Cancræ & veros oculos habent, & iis resectis excæcantur (*b*). Ipsi demum pulices (*c*), & alia (*d*) animalcula hexapoda ex pediculorum genere (*e*), & acari, & animalcula microscopio

(*a*) De cochleis LISTER *Exerc. anat.* II. p. 19. cui sunt in apice: de cochlea aquatica IDEM p. 3. cui sunt in medio: de murice COLUMNA *purp.* c. I. Aliæ cochleæ quatuor habent oculos Oecon *Abbandl.* VIII. p. 796.

(*b*) HOOKE *micrograph.* p. 178.

(*c*) CATALAN *Journ. des Sav.* 1680. 1681.

(*d*) BAKER *employin for the microsc.* c. XXIII. HOOKE *microgr.* p. 206. cum icon. Monachus anonymus in *Journ. des Sav.* 1689. n. 38. SWAMMERDAMIUS nullos invenerat p. 701.

(*e*) CATALAN.



pio solo conspicua (f) oculos naſta ſunt, & in argi zoophyti tentaculis ſingulis corpuscula ſunt oculorum ſimilia (g).

Vermes tamen dantur, oculis deſtituti, ut fasciola (h), infeſta hepati ruminantium animalium, ut prima claffis limacum (i). Conchas etiam lucem fugere dicitur (k).

De talpa male negatum eſt (l), cujus oculi antiquiſſimis jam temporibus innotuerint (m).

Demum, quæ animalia nullos videntur oculos habere, ea tamen viſu aliquo non deſtitui probabile fit. Nam & polypi lucem amant (n), & ſequuntur, & ubi proxima ſunt microſcopica animalia, tamen ſe evitare norunt (o).

Per paria plerisque animalibus oculi dati ſunt. Unicum par eſt in animalibus perfectioribus quadrupedibus, avibus, piſcibus. Unum etiam in non paucis infectis (p); aliis, ſed ſolis tamen infectis, & teſtaceis duo (q), tria (r), quatuor (s), quinque (s\*), ſex (t),

Q q 2

ſeptem

(f) HILL. *effays* p. 232.

(g) BOHADSCH *anim. marin.* p. 68.

(h) PALLAS *de infeſtis vivent.*

(i) ADANSON *coquillag.* p. 3.

(k) *Conchyliolog.* T. II. p. 20. Oculos limacibus in univerſum negabat POUPART *Journ. des ſav.* 1693. n. 39.

(l) SCHELHAMMER *Eph. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. obſ.* 130.

(m) Nigrum ubi oculus eſt ARISTOT. *Hiſt.* L. I. c. 9. Cum lente cryſtallina & vitreo corpore deſcribit GALENUS *de util.* L. XIV. c. 6. Habet SEVERINUS *Zoot.* p. 317. J. B. CARPENSIS p. CCLIX. b. hic cum vitreo etiam corpore & lente. HARTMANN *perit. anat. vet.* p. 59. Iac THOMASIIUS in *lib. de viſu ta'p.* a. 1659. edito. RAI *wisdom of God* p. 141. ZINN *Comm. Soc. Gott.* T. IV. BROWNE *epid. err.* L. III. p. 344. DERHAM *phyiſic., theol.* p. 94. bene.

(n) TREMBLEY *des polyp.* p. 66. BAKER p. 137. ſeqq. ROESEL *Inſect. Beluſt.* T. III. p. 549. SCHÆFFER *Armpolyp.* p. 30. 55.

(o) JOBLOT I. p. 33.

(p) In quibusdam araneis ALBINUS. POWER *obſ.* X. In pediculo POWER *obſ.* VI. VII. HOCCKE *obſ.* 47. In pulice CATALAN. *Journ. des ſavans* 1681. n. 12. POWER *obſ.* I. In acaro caſei POWER *obſ.* XII. HILL. *anim.* p. 26. in aliis infectis CATALAN *Journ. des ſav.* 1681. n. 12. In lampyride POWER *obſ.* XX. In muſca aranea REAUMUR T. VI. p. 574.

(q) In aliis araneis SEVERIN. p. 346. ALBIN. HOCCKE *obſ.* 48. POWER *obſ.* VIII.

(r) Etiam in araneis ALBIN. POWER *obſ.* VIII. IX. LEHMANN *chronic.* p. 631. LYONNET I c. In aliquibus ſcorpis SWAMMERDAM *blædel. diertjens* p. 167.

(s) In araneis HILL. l. c. POWER *obſ.* VIII. IX. LYONNET II. p. 28. 29. LEHMANN p. 631. BRADLEY *philoſ. acc.* p. 131. de plerisque: in tarantula BAGLIV. p. 609. c. 1. in ſcorpis aliis SWAMMERDAM *blædel* I c.

(s\*) Decem oculi in vermibus lapides vorantibus JOURN. DES SAVANS. n. 32.

(t) In formicaleone REAUMUR l. c. p. 355. in eruca ſalicis LYONNET p. 40.



septem ( $\pi$ ), octo ( $\chi$ ). Pro unico vero pare etiam compositos illos muscarum oculos numeramus.

De monoculis dubitatur, num omnino unicum habeant oculum ( $\gamma$ ); num duos vicinissimos ( $\pi$ ). Si unicus est, id unum animal cyclops haecenus innotuit ( $\alpha$ ).

Muscarum genus duos fere grandes ( $b$ ), reticulatos oculos habet, cum tribus minoribus ( $c$ ): per certa enim experimenta constat, minores eos globulos ( $d$ ) veros esse, & ad videndum aptos ( $e$ ) oculos. Habent adeo quinos oculos Locustæ ( $f$ ), Ephemera ( $g$ ), muscæ ( $b$ ), crabrones ( $i$ ), tipulæ ( $k$ ), formicæ alatae, mares & feminæ ( $l$ ), & alia numerosa insecta ( $m$ ). Duos minores oculos jam viderat GOTTFRIEDUS in campestri cimice ( $n$ ). Sed auctor est SWAMMERDAMIUS. Magnos oculos veros esse dubitanti VALISNERIO ( $o$ ). contraria experimenta alii opposuerunt ( $p$ ).

## §. III.

( $\pi$ ) SWAMMERDAM p. 95.

( $\chi$ ) In podura K. *Swenska wetensk handling* 1743. trim. 4. Præter tres minores oculos muscarum se 10. 12. alios minores invenire PUGET *lettre* p. 52.

( $\gamma$ ) Unicum numerat BRADLEY *philos. Account.* p. 148. SCHÆFFER *grüne Armpolypen.* p. 29. sed compositum.

( $\pi$ ) SWAMMERDAM *bloedelooze diertjens* p. 74. 75. BAKER *employment* p. 303. BERTRANDI p. 56. Quatuor IDEM, credo aliquo ex mendo.

( $\alpha$ ) Nullum dari animal cyclops POWER p. 81.

( $b$ ) Tum formicæ POWER *obs.* XXII. locustæ *obs.* XXI. XXIII. XXIV. vespæ *obs.* XXVII. Lampyrides *obs.* XX.

( $c$ ) RE'AUMUR T. IV. p. 289.

( $d$ ) Habent corneam membranam pellucidam, & uveæ imitamentum SWAMMERDAM *bibl.* p. 496. 497.

( $e$ ) Effossis muscæ non vident CATALAN. & la HIRE in *Journ. des sav.* 1678. n. 29. & 1680. Non bene negat anonymus *Jour. des sav.* 1689. n. 38.

( $f$ ) RAHTLEF. *Heuschrecken* T. II. n. 106. 115.

( $g$ ) RE'AUMUR T. VI. p. 493. CATALAN.

( $h$ ) RE'AUMUR *ibid.* *Phil. transf.* n. 284.

( $i$ ) VALISNER. *gal di min.* T. VII. p. 9. RE'AUMUR T. V. p. 147. T. I. f. 1. T. f. 15. 16.

( $k$ ) RE'AUMUR.

( $l$ ) GOULD *of ants* p. 56. non reliquæ.

( $m$ ) Omnia *Mém. avant.* 1699. T. X. p. 610.

( $n$ ) *Giorn.* apud TINASSI edit. 1669. p. 139. 140.

( $o$ ) Dubitabat VALISNERIUS *Oper.* T. I. p. 221.

( $p$ ) ROESEL *von Fliegen und Schnaken* p. 49. Iis enim abscissis libellæ quasi ebriæ & vertiginosæ per aerem oberrant.



§. III. *Partes tutelæ oculi præpositæ. Supercilia.*

*Supercilia* (*q*) sunt colliculi tumidi, plurimis extrorsum ad tempora inclinatis pilis densis, imbricatis hirti, sub ima fonte ita utrinque positi, ut intima parte altiores, naso supremo distincti, super oculos, in eadem cum orbitæ arcu lineâ, sensim ad marginem orbitæ externum evanescant exæquati. Eminentiam tenent, quæ fit a superiori arcu orbitæ aliquantum antrorsum magis producto; quam reliqua frons est. Ex cute fiunt, & multo celluloso laxoque textu, ut sint mobilissimi, & ex musculo-losa carne.

Gratiam insignem faciei supercilia addunt, ingrato spectaculo in nonnullis calva. Non reperiuntur in animalibus, quibus aut plumis tecta cutis est, aut alioquin capillata (*r*), homini adeo propria. Accurate sentiunt ob nervos, quos dicemus, numerosos, neque absque periculo læduntur (*s*). Mobilitas in ipsis summa est, ut facillime & sursum ducantur cum elevata fronte, & vicissim ad oculum deorsum trahantur. Ii motus proprios habent musculos, sibi præpositos. Eos ut intelligamus, aliqua oportet præmittere.

§. IV. *Membrana Epicrania.*

Omnia quidem cranii ossa suum habent periosteum, tenue plerisque locis, uti ossa ipsa tenuia sunt; crassius in paucis, ubi crassa, ejusdem naturæ cellulosæ, ut alia periostea, tantum ex paucioribus cellulis stipatum & glabrius: Arteriis (*t*), ut ubique, pingitur innumerabilibus. Num sentiat quæsitum est (*u*): ego quidem non sentire ex analogia crediderim, sed numerus insignis nervorum, qui super periosteum cranii adeunt, experimentum difficile reddit. Hoc *Pericranium* est, non bene a periosteo (*x*) distinctum, simplex (*y*) utique, & absque certis laminis (*z*).

Q q 3

Huic

(*q*) WINSLOW *Expos.* T. IV. *tr. de la tête* n. 255.

(*r*) PORTERFIELD T. I. p. 4.

(*s*) Inde cæcitas PLATNER *progr. de vulner. supercil.* Mors ipsa GENEA *anat. Chirurg.* p. 239.

(*t*) In icone convexi cranii RUYSCHIANA.

(*u*) *Oper. anat. minor.* T. I. p. 345.

(*x*) Distinxerunt VESALIUS L. VII. p. 777. *exam. obss.* Fallop. p. 164. C. BARTHO- LIN *inst. anat.* p. 247. GLASER *de cerebr.* p. 4. LINDEN *physiolog.* p. 353.

(*y*) MARCHETT. p. 103.

(*z*) Etiam huic membranæ duas laminas tribuit WINSLOW n. 199.



Huic per cellulosa fila laxa, cum mobilitate adligatur membrana *Epicrania* (a), aliis fere membranis laxior, cum aliquo splendore, quasi tendineo (b), tamen etiam cellulosa, quam inter & cutem denuo textus cellulofus minime strictus cum aliquo sicco & duriusculo adipe est.

Ad occipitis eminentem cristam incipit adparere, cum musculorum capitis eo loco insertorum tendineis fibris confusa (c). Fertur antrorsum trans temporalem muscolum, minus valens ad auriculam (d), & ad jugum (e) fortiter adnexa; ut musculus temporalis inter pericranium, & istam membranam sit. Qui vero sub temporali musculo negarunt pericranium esse (f), ii, perinde ut alibi in corpore humano, musculofas fibras ossi se inmittere crediderunt. In fetu vero facile adparet, ubique musculos in periosteum proprie finiri.

A veteribus passim pro pericranio habita est, ejusque lamina exteriori, ut inter utramque & adeps & temporalis interciperetur (g). Inde etiam credas ortam esse pericranii in laminas tres (h), & quatuor (i) distinctionem. Ad aponeurosin tamen occipiti = frontalem pertinere dudum inventum est (k).

Porro inter utrumque jugum trans frontem descendit tenuis, tecta (l) frontali musculo, & circa palpebras nasumque evanescit (m), in cellulofam telam mutata. Sed ejus fines omnes minus accurate definiuntur, cum amisso splendore, & certo fibrarum ductu, in omni sua circumscriptione obscura, quasi dissipata dispareat. Quem addit Cl. WEITBRECHT paniri-

(a) LUDWIG de membrana *Epicrania* p. IV. V. *Coiffe aponeurotique* WINSLOW n. 196. seqq. VERDIER p. 196. *Galea aponeurotica* WEITBRECHT *Comm. Acad. Petrop.* T. VII. p. 332. *Tenuis involucrium* ALBIN de *musc.* L. II. c. 1. p. 138.

(b) Decussatas fibras LUDWIG. WINSLOW n. 197.

(c) WINSLOW n. 197. VERDIER p. 196. LUDWIG p. V. LIEUTAUD p. 119. addit processibus transversis vertebrarum cervicis necti.

(d) ALBIN. p. 141.

(e) LUDWIG p. VI. LAURENT. p. 520. FALLOP. p. 216. ALBIN. *ibid.* WINSLOW n. 200.

(f) LIEUTAUD p. 119. VERHEYEN p. 211. ANDR. LAURENT. p. 188. 520.

(g) C. STEPHANUS L. II. c. 46. FALLOP. p. 216. DIEMERBROECK p. 337. RÖDERER *thes.* n. 10. COWPER ad *Tab.* 5. BIDLOI. WINSLOW n. 200. BARBAUT *splanchnolog.* p. 289.

(h) MARCHETT. p. 103.

(i) T. ANDRÆ p. 147.

(k) La CHARRIÈRE *operat. chir.* p. 268.

(l) WEITBRECHT p. 332.

(m) Per palpebram superiorem productionem emittere WEITBRECHT l. c.



panniculum (n) carnosum verum, ab adipe fibris cellulosis distinctum, non adgnosco.

§. V. *Musculi occipitales (o), Frontales.*

Lati (p), utcunque parallelogrammi (q), breves, carnei, cum finibus utrinque tendineis, oriuntur a radice processus mamillaris ossis temporum, inde per os occipitis a linea transversa superiori, proximi, distincti tamen, super musculos cervicis & capitis.

Inferiores fibræ rectiores sunt, exteriores magis inclinatae, oblique pergunt antrorsum divergendo (r), & in membranam aponeuroticam definunt (s).

Eam membranam tendunt, & firmant (t), ut frontales musculi ad eam, tanquam ad fixam partem, supercilia & conjunctas palpebras possint levare.

Lego in CASSEBOHMIANIS *posthumis*, Cl. virum aliquando nullos occipitales se reperisse: & minimos fuisse consentit WINSLOWUS (u).

Cum retractoribus auris nonnunquam (x) cohærent.

Sive eundem cum Frontali feceris (y) musculum, five diversum (z) non valde erraveris; potius tamen conjunxerim. Qui unum faciunt musculum, habent fere membranam Epicraniam pro ejus aponeurosi (a).

FRONTALES (b) musculi fibras suas ex anteriori sede membranæ epicraniæ (c) colligunt, qua sede quasi ex mucrone aliquo nascuntur

(n) p. 311. 312.

(o) FALLOP. p. 62. b. COLUMBO etiam dicti *de re anatom.* & CASSERIO *de auditu* T. hom. 3. f. 1. ad C. obscure.

(p) ALBIN. p. 139. t. XI. f. 6. LUDWIG. p. VII. COURCELLES *tab.* 5.

(q) Irregulares SANTORIN. p. 5. COURCELLES *ic.*

(r) EUSTACH. t. 29. 31.

(s) LUDWIG WINSLOW n. 260. ALBIN. t. 5. 9. II. p. 6. WEITBRECHT p. 332. COURCELLES. SANTORINUS p. 5.

(t) WINSLOW n. 263. 264.

(u) n. 261.

(x) LIEUTAUD p. 121.

(y) SCHRADER *Dec. I obs.* 6. DOUGLAS *myogr. compar.* c. 4. CHESELDEN p. 173. ALBINUS, COWPER *myot.* c. 6. p. 16. WINSLOW n. 262. PARSONS *physiognom.* p. 61. LIEUTAUD p. 121.

(z) LUDWIG p. XII. SANTORINUS p. 7. WEITBRECHT.

(a) CHESELDEN, VERDIER p. 96. WINSLOW, LIEUTAUD.

(b) Verum esse musculum MASSA *apost.* p. 5.

(c) ALBIN. p. 139. & t. I. t. XI. f. 7. LUDWIG p. IX. Negat solus WEITBRECHT p. 333.



tur (*d*), indeque per frontem convergunt (*e*), ut superne distincti, inde, ex media fronte, totam (*f*) frontis latitudinem occupent (*g*). Magis convergunt fibræ intimæ, interiores minus (*h*). Fibras ab anthe-lice & a levatore auris accedentes accipiunt (*i*).

Fibræ intimæ in nasum producuntur, & triangulari quadam appendice (*k*), quam nuperi scriptores peculiari nomine musculum *Procerum* dixerunt (*l*), descendunt, confusæ in aponeurosin compressorum narium (*m*): Mihi etiam in cartilagine & proximum ossis finem (*n*) terminari videntur. Aliæ fibræ in levatorem communem alarum nasi & labii superioris (*o*); tum in ipsum, ut certe ALBINUS auctor est, os (*p*) frontis in angulo oculi majori se inmittunt. In fibras denique orbicularis palpebrarum musculi pleræque fibræ se disjiciunt (*q*), aliæ in corrugatorem supercilii (*r*), mihi certo visæ.

Credas diversa & pene opposita hujus musculi officia esse. Quando membrana epicrania tensa est, & una musculus occipitalis contrahitur, tunc videtur sursum ducere palpebras, supercilia, frontemque, quam simul, dum modice agit, extendit, ut fit in lætitia (*s*); majori vero vi contractus in transversas rugas colligit.

Contra

- (*d*) ALBINUS ubique.  
 (*e*) EUSTACHIUS t. 41. f. 1. t. 28. 30. 35.  
 (*f*) ALBIN. p. 139. tab. I. XI. f. 7. superius quam alii.  
 (*g*) WINSLOW n. 257. EUSTACHIUS t. 41. f. 1. Obliquas esse fibras frontalis musculi monebat C. HOFMANN *instit.* p. 160.  
 (*h*) ALBIN. p. 139. WINSLOW n. 258.  
 (*i*) Cum anteriori & posteriori auris conjungi LIEUTAUD p. 143.  
 (*k*) EUSTACHIUS t. 41. f. 1. t. 28. 35. CASSER. *org. audit.* t. 2. f. 1. D. E. BARTHOLIN. p. 38. COWPER *myot.* t. 25. f. 5. t. 21. COURCELLES t. 1.  
 (*l*) SANTORINUS, qui tamen peculiare a glabella natos fasciculos addit t. I. b. b. Pyramidalem dixerat CASSERIUS l. c.  
 (*m*) ALBIN. p. 140. & tab. I. XI. f. 7. d. COURCELLES. LUDWIG p. X. SANTORIN. ad a.  
 (*n*) Ita fere CASSERIUS.  
 (*o*) ALBIN. p. 140. t. I. XI. f. 7. 9. WEITBRECHT tab. 15. f. 1. e. e. LUDWIG p. X.  
 (*p*) ALBIN. *ibid.* t. I. t. XI. f. 7. h. COURCELLES t. I. b. Negat Cl. WEITBRECHT p. 333. 334. Videri WINSLOW n. 259.  
 (*q*) ALBIN p. 140 tab. I. t. XI f. 7. k. LUDWIG p. X. COWPER t. 21. SANTORIN. C. & p. 7. WINSLOW n. 259. EUSTACHIUS t. 28. 31. 35.  
 (*r*) ALBIN, WINSLOW n. 259. SANTORIN. p. 8. Inde corrugatorem oriri CANT p. 2.  
 (*s*) Ut ejus musculi opera celeberrimus pictor VAN DYCK serenitatem fronti impertierit CANT p. 2.



Contra, quando laxus est musculus occipitalis, orbicularis vero palpebrarum vehementer contrahitur, tunc possit idem (*t*) frontalis contra nasum frontem deorsum ducere, & supercilia super oculum detrahare, uti fit in iracundia, & quando nimiam lucem volumus avertere.

Cl. WEITBRECHT composita ratione mavult (*u*) frontem quidem descendere; ascendere vero supercilia, finibus musculi mobilibus ad se invicem accedentibus. Negat Cl. PARSONS, cum in unum musculus frontales confluant, qui una omnes suos fines (*x*) elevet.

Inæquales in eodem homine, & alterum altero altiore reperit Cl. ESCHENBACH (*y*).

### §. VI. *Corrugatores* (*z*) *supercilii* (*a*).

Unus utrinque numerari solet. Origo est, tum a margine orbitæ (*b*), exterius, quam angulus internus, ad interiora paulum foraminis supra orbitalis; alio fasciculo supra id foramen; tum a glabella (*c*), five a parte ossis frontis (*d*) supra nasum explanata; denique etiam exterius, pluribus plerumque fasciculis, tribus, quatuorve.

Ita seorsum extrorsum recedunt (*e*), sulcis quibusdam distincti fasciculi (*f*), tecti orbiculari musculo & finem faciunt sui in frontalem (*g*), quo antè teguntur, & in orbicularem orbitæ, subiectum frontali (*h*), demum

(*t*) Ita etiam LUDWIG p. X. & SANTORINUS p. 13.

(*u*) p. 334.

(*x*) *Of physiognomy* p. 61.

(*y*) *Anat.* 590.

(*z*) COITER *obs. anat.* p. 109. DOUGLAS.

(*a*) ALBIN. p. 148. Frontalem vocat PARSONS l.c. p. 5. 6. 7. 8. Pro orbicularis parte habet RIOLANUS p. 301. *Sourciliers* WINSLOW n. 265. & *petits sourciliers* LIEUTAUD p. 121.

(*b*) Etiam WINSLOW n. 165. SANTORIN. p. 8.

(*c*) ALBIN. p. 148. t. XI. f. 1.

(*d*) Ex conjunctione ossium nasi cum osse frontis WINSLOW n. 262. aliquanto superius ALBINUS p. 148.

(*e*) ALBINUS *tab.* 2.

(*f*) WINSLOW n. 265. SANTORIN. *tab.* 1. Unicum & nimis parvum fasciculum COWPER t. 25. f. 5. Conf. ALBINUS *tab.* XI. f. 1.

(*g*) ALBINUS p. 149.

(*h*) IDEM *ibid.* DOUGLAS p. 10.



demum in cutem (*i*) pulposam supercilii, a media parte orbitæ extrorsum.

Hic musculus leni actione frontem & supercilia restituit, quando musculi frontales eas partes sursum duxerunt. Vehementiori contractione & supercilium, & partem cutis, quæ oculis est proxima, deducit ad interiora, & oculo præponit; & frontis cutem cogit sequi, ut super nasum plicis longitudinem sequentibus corrugetur (*k*), & pilos superciliorum erigit (*l*), atque membranam epicraniam hætenus tendit (*m*).

Ita utique oculos obumbrat, nimiumque fulgorem abarcat. Etsi enim id negatum fuit (*n*), nemo tamen soli horizonti nunc vicino oculos obvertit, quin hoc musculo supercilia deducat. Adnotat Cl. PORTERFIELD, non malam esse orientalium consuetudinem, in tanto solis perferenissimum aerem splendore, quando supercilia sua antiquissimo more nigro colore tingant (*o*).

Idem musculus in ira & indignatione agit, & facit, ut torvum inspiciamus, quod Britanni propria voce *frown* exprimunt. Characterem ejus odii forte ideo exprimit, quod ab exoso objecto oculum defendat, ut ne adspectu quidem digno.

## §. VII. Palpebræ.

Extrema munimenta oculi diximus, quæ sequuntur, sunt propiora. Ea reperiuntur in quadrupedibus (*p*) omnibus, etiam frigidis (*q*), in piscibus calidis (*r*), in avibus (*s*). Piscibus frigidis nullæ sunt (*t*) palpebræ, quibus

(*i*) DOUGLAS p. 10. PARSONS p. 7. WINSLOW n. 265. ALBIN. p. 149. LIEUTAUD.

(*k*) WINSLOW n. 266.

(*l*) ALBIN. p. 149.

(*m*) LUDWIG l. c. p. XI.

(*n*) HAMBERGER *physiolog.* p. 531.

(*o*) T. I. p. 12.

(*p*) Equum negant habere palpebram inferiorem JELIAN L. IV. c. 49. Tantum nullos pilos inesse POLLUX L. II. c. 4.

(*q*) Testudini CALDESI p. 14. viperæ SEVERIN. p. 238. Ranæ PETIT *Mém. de l'Acad.* 1735.

(*r*) Turfioni TYSON p. 28.

(*s*) ARISTOTELES *part. anim.* L. IV. c. II. COITER. p. 130. In struthincamelo PARSINI, VALISNER. T. I. p. 249.

(*t*) ARISTOTELES *part. anim.* II. c. 13. *hist.* L. II. c. 13. POLLUX L. II. c. 4.



quibus duri sint oculi (*u*), uti neque infectis (*x*), & cancris (*y*) ob eandem puto causam.

Adeo necessaria hæc tutela est, ut ea destituti oculi & a quacunque injuria pereant, et dulcissimus somnus obrepere nequeat. Certe REGULUM, quem per omne tormentorum genus Carthaginenses necasse dicuntur, legimus vigiliis perpetuis (*z*) resectis denique palpebris (*a*) interiisse: nisi ea Romanorum est calumnia; nam aliter etiam, & lento veneno dicitur periisse, & tota historia parum habet speciei. Chineses, aut Japonenses sanctum virum, nomine *Darma*, cum omnia frustra tentasset, resectis demum palpebris effecisse legimus, ne somnus obrepens sublimes meditationes turbaret (*a*<sup>\*</sup>).

Hinc palpebras per somnum non committi funestum (*b*) signum est, negligentis se animæ, neque incommoda sui corporis sentientis.

Hinc ubicunque perpetuæ fere nives, & solis circa horizontem circumeuntis radii, oculorum periculum augent, secundas palpebras arte sibi parare necessitas barbaras gentes docuit, fere in eo uno ingeniosas. Sunt lignea, vel eburnea (*c*) tutamina, gracili rima ad lucem aperta. De Renone cervo (*d*) improbabilis est historia; eum dicunt perexiguum foramen superciliorum tantum videre, quantum est necesse, dum per nives ambulans oculos claudit.

### §. VIII. *Palpebræ majores.*

Cutis a superciliis descendens, pilis nunc vacua, sensimque tenuior, descendit continua ante oculum, libera, & paulo infra æquatorem oculi producta, ibi quasi resecta videtur desinere.

R r 2

Vere

(*u*) ARISTOTELES *ibid.* POLLUX *ibid.* LINN *synt. natur.* p. 239. PERRAULT *Eff.* T. III. p. 64.

(*x*) Vide CATALAN *Journ. des sçavans* ann. 1681. & in universum de iis, quibus duri sunt oculi PORTERFIELD I. p. 23.

(*y*) PERRAULT l. c.

(*z*) CICERO *de offic.* L. III.

(*a*) A. GELLIUS L. IV. c. 4.

(*a*<sup>\*</sup>) KÆMPFER *Amoen. Exot.* p. 609. 610.

(*b*) HIPPOCR. *aphor.* S. VI. n. 52. *prognost.* Sect. II. p. 4. CELSUS L. II. c. 6. p. m. 54.

(*c*) ELLIS *voyag. to hudsonsbay &c.* p. 137. 143.

(*d*) PONTOPPID. *Hist. natur norveg.* T. II. p. 22.



Vere tamen non definit (*e*), & contra se ipsam reflexa, tenerior nunc, & plurimis vasculis rubris pellucetibus ornata (*f*), ad marginem pene orbitæ adscendit. In ea papillas nerveas RUYSCHIUS vidit (*g*).

Inde demum inflexa, veli modo ante scleroticam descendit, & ante corneam, novo nomine *adnatæ* vel *conjunctivæ* (*b*) membranæ donata, cumque sclerotica, & cornea (*i*), laxiori cum illa, cum ista breviori (*k*) cellulosa tela arctius connata, ad marginem orbitæ inferiorem pervenit. Alba est eadem, & mediocriter vasculis picta. In intervallo ejus & scleroticæ aliquis est adipis, tum vascula plura, & in eam ipsam cellulofam telam humores morbosus effunduntur, dum cornea nihil mutatur (*m*). Hactenus palpebram diximus superiorem, majorem (*n*).

Ab orbitæ inferioris margine, iterum eadem reflexa sursum, a se ipsa, quæ conjunctiva fuit, solo interposito vapore defensa, adsurgit paulo minus quam ad medium pupulæ æquatorem, ibique in aciem pariter abit, quæ ab acie superiori rima transversa ita diffidet, ut adductæ tamen palpebræ sibi congruant, nisi quod, ob tumidum palpebrarum marginem, inter eas & oculum, quasi triangularis curvilineus canalis superest (*o*). Ea parte, ut in superiori palpebra, rubra est, & vasculosa.

Ab ea acie denuo in cutis communem naturam restituta, contra se ipsam descendit, & in faciei porro cutem continuatur. Hæc est *palpebra inferior*, minorque.

Ubique ergo palpebra oculum operit, ibi tres sunt laminæ cutis, anterior, vera cutis sed tenuior: media, sive palpebræ rubrum velamentum

(*e*) Conf. hæc cum *Comm.* BOERHAAVE. T. IV. p. 92. *Prim. lin.* n. 496. ZINN p. 244.

(*f*) WINSLOW n. 273.

(*g*) *Thef.* X. n. 123. 124. t. 3. f. 6. *Thef.* IV. n. 36. KAAUW n. 108. & PORTERFIELD l. p. 15.

(*b*) WINSLOW p. 272.

(*i*) IDEM n. 274. MAUCHART *de ungue corneæ* p. 12. PETIT *Mémoire de l'Acad.* 1726. p. 99. MAITREJEAN p. 14. ZINN p. 24. 25. LIEUTAUD p. 127. Paulum ultra corneam protendi Cl. BERTRANDI p. 52. forte quod cultello non ultra sic persecutus. Confirmavit Cl. RAMSPEK *in specim. anat. botan.* p. 14.

(*k*) BOERHAAVE *morb. ocul.* p. 24. FLEMING *physiolog.* p. 516.

(*l*) KATHLAUW *de cataract.* p. 26.

(*m*) BOERHAAVE *morb. nerv.* p. 81. *morb. ocul.* l. c. IDEMA *van den oogen* p. 17. RAMSPEK *specim. inaug.* p. 14.

(*n*) Inter aves noctuæ soli major est, reliquis speciebus amplior inferior COITER p. 130.

(*o*) DUVERNEY *posth.* p. 134. *Comm.* BOERH. T. IV. n. 513. PETIT *Mém. de l'Acad.* 1734. p. 136. ZINN p. 249. WINSLOW n. 277. FERREIN *non ergo fistul. lacrim. cauter. actuale* ann. 1738. TAYLOR *anat. du globe de l'oeil* p. 5. SENAC *Essays de physique* edit. cum *anat. Heister.* ann. 1735. p. 689.



tum ( $o^*$ ), quod oculum mobile contingit; & conjunctiva denique, nunc a cute magis degener, & supertenta oculo. Vapore deleto, qui intercedit, per quietem palpebra facile ad oculum adnascitur ( $p$ ).

Omnes ex tres cutis laminæ habent suam epidermidem ( $p^*$ ), quæ & ante conjunctivam producit, & ante corneam ( $q$ ), post macerationem non ægre separabilis, quæ eadem a morte mucosæ & sebo adglutinato obducta, opaca nunc & crassior, membranæ novæ nomine inponit ( $r$ ). Hinc in senectâ anguium etiam oculorum tutamina reperiuntur ( $s$ ), & nova subinde renascuntur ( $t$ ). Hæc causa nonnunquam est cæcitatæ ( $u$ ). Ab ejusmodi sebacea materie, quæ oculum obduxerat, remota, miraculum superstitionis explicat R. A. BEHRENS ( $x$ ).

Palpebra superior cum inferiori in utroque oculi angulo conjungitur. Angulus major ( $y$ ) dicitur, qui naso propior, minor, qui temporibus.

Sensus in palpebrarum cute est acerrimus, mirumque phænomenon hic adnotatum est, a sola luce, per integram epidermidem, tamen sternutationem supervenisse ( $z$ ), & lacrumationem ( $a$ ). Sed etiam in conjunctiva & oculi & palpebræ sensus est validus ( $a^*$ ), ut minima arenula inter oculos & palpebras interlapsa intolerabilem molestiam faciat, quam expertum me fuisse memini, non remissuram, usque dum siphone, aquam tepidam impulsi. Pruritus ab animalculis natus animadversum lego ( $b$ ).

R r 3

§. IX.

( $o^*$ ) Recte GATAKER unicam esse conjunctivam, tunicam non duas *of the eye*. p. 30.

( $p$ ) BARTISCH *augendienst* p. 18. b. S. YVES *des malad. de l'oeil* c. 15.

( $p^*$ ) Non tamen sola epidermis conjunctivam efficit, ut legi.

( $q$ ) MAITREJEAN p. 4. DUDDALL *de cornea* p. 4. S. YVES p. 5. *Comm. ad BOERHAAV. T. IV. p. 92.* PORTERFIELD I. p. 63. *Prim. lin.* n. 496. ZINN p. 25. & dudum EUFUS Hinc vesticulæ in conjunctione corneæ pellucidæ & conjunctivæ BONHOMME *cephalot* p. 121.

( $r$ ) ZINN p. 26. Conf. cum conjunctiva MAUCHART *de corn* p. 32. DUDDALL. *append.* Corrugationem corneæ jam vocat SAL. ALBERTI *de lacrum* n. 90.

( $s$ ) ARISTOTEL. *hist. anim.* L. VIII. c. 17. BIRCH T. II. p. 56. GREW *rarit.* p. 49. VESLING *epist. postb.* p. 72.

( $t$ ) VESLING *ibid.* ARISTOT. *hist. anim.* L. II. c. 17.

( $u$ ) In gallinis, ut videtur Bresl. *Samlung.* ann. 1721. m. Dec. Capitoni pisci hieme oculi albescunt ARISTOT. *hist. anim.* L. VIII. c. 9.

( $x$ ) Brunsvic 1734.

( $y$ ) Angulos duos jam habet ARISTOTELES *Histor. anim.* L. I. c. 9.

( $z$ ) CASSIUS *problem.* n. 36. 17. BOYLE *languid and onbeed. mot.* p. 264.

( $a$ ) HAYMANN *in Comm.* p. 113.

( $a^*$ ) Sentire JAUSSEMAND *in thes.*

( $b$ ) VERBRUGGE ad finem versionis opusculi GUILLEMEANI *de ocul. morb.*



§. I X. *Tarsus uterque. Cilia.*

Ut palpebra ora libera totam suam latitudinem teneat, in omni motu, neque utcunque contracta fiat secundum transversam diametrum angustior, natura simili fere artificio usa est, quo grandes tabulas pictas solemus distendere. Ut enim ad baculum eum extendimus, ita ad cartilaginem palpebra utraque firmatur, quam *tarsum* dicimus. Lamina est uterque, superior tamen major, magis lunatus, sursum convexus; inferior rectior & inter exteriorem paginam palpebræ, & interiorem, margini proximus interponitur (c). Uterque tarsus ad exteriora maxime gracilescit, ad nasum crassior est (d). Aliquanto, quam palpebra, breviores uterque.

Idem margo, ex cute tumida factus, multiplicem (e) ordinem *ciliorum* (f) producit, pilorum nempe durorum, elasticorum, qui in superiori palpebra (g) uberiores, longe descendunt, deinde arcu facto sursum reflectantur (h): in palpebra inferiori primo adscendunt, deinde reflexi deorsum redeunt; utrinque eo longiores, quo mediæ palpebræ viciniore. Hæc cilia rimam utrique palpebræ interpositam obumbrant, lucisque accessum arcent. Eadem & colores (i) splendidos, a radiis fortioribus lucidi corporis prætergredientibus, & inflexis, natos induunt, & iridem faciunt circularem, quæ summo mane, circa humecta cilia ad candelam CARTESIO olim, & mihi sæpissime adparuit.

§. X. *Glandulæ sebaceæ.*

In utraque palpebra, ne tarsi sibi illisi cutem convulnerent (k), cautum est smegmate, quod nuper excretum limpidius (l) est, per siccitatem vero & aeris vim abit in sebum molle (m), in vermiculos, nam vidi, figurabile, inque lemas. Id unguen antiquis, anatomicis minime

(c) Conf. ZINN *descr. ocul.* p. 246. WINSLOW n. 269. 270.

(d) WINSLOW. SCHOBINGER *de fist. lacrum.*

(e) Trium WINSLOW n. 278. quatuor ALBIN. *Adnot. L. VIII.* p. 32. & in *icone pluri-* tium t. 3. f. 4.

(f) Βλεφαρίδες POEFLUX L. II. c. 4.

(g) ALBIN. *ic. cit.*

(h) ZINN p. 248. 249.

(i) BAYLE *oper.* p. 484. 485.

(k) Deleto adipe in tarsorum motu sonus fit Cl. BARTHOLIN. *Instit. anat.* p. 494.

(l) MEIBOM *Epist.* ad LANGELOTT p. B. 3. b.

(m) WINSLOW n. 279. Subviscidum MAITREIAN p. 7. Fila trahere MORGAGNUS.



me ( *n* ) ignotum, paratur in singulari omnino organo. Pori quidem in utriusque palpebræ limbo triginta ( *o* ), & quadraginta ( *p* ) adparent in una, etiam in duabus lineis ( *q* ), pone cilia. Ii pori ducunt in minimum, cavum ( *r* ), plerumque frequenter flexum ( *s* ), intestinulum, quod in palpebra utraque, secundum lineam in universum rectam, a tarso recedit. Superiora longiora sunt ( *t* ), tum media in utraque palpebra ( *u* ). Dantur etiam bifida ( *x* ) intestinula, aut e duobus & tribus unita ( *x*\* ). Non tenent totam palpebræ longitudinem, & ad aliquod utrinque interval- lum ab angulis oculi nulla sunt ( *y* ). Inter utramque laminam ponun- tur palpebræ, posteriori propiora, & incilia habent sibi in tarso re- spondentia ( *z* ). Inferiori in palpebra latiora sunt ( *a* ).

Sed neque hæc fabrica simplex est. In ea enim intestinula alii mino- res utrinque sacculi densa serie aperiuntur, breves ii, subrotundi ( *b* ), similes cryptarum ( *c* ), & simili pleni sinegmate. Num in has minores cry- ptas aliæ elementales glandulæ succum suum inspirent, ego quidem ignoro. Cera arteriosa in ea impulsæ, alba rediit ( *d* ).

Glandulosa corpora in utroque oculorum angulo, plurima, permi- nuta, dixit C. STEPHANUS ( *e* ), quæ non alio facile referas. Inde in icone ipsos ductus, striasque parallelas, expressit *Julius* CASSERIUS ( *f* ). Neque alio spectaverint puncta lacrumalia anguli externi H. FABRICIO ( *g* ) dicta.

( *n* ) BERENGARIUS, qui adipem dixit *Isag. anat.* p. 58. b.

( *o* ) Ultra triginta MEIBOM B. 3. Triginta quatuor ZINNIUS in superiori palpebra. Ultra triginta in superiori palpebra VATER p. 331. Triginta duo in superiori MORGAGN. *Adv.* l. t. 4. f. 1. Inferiori in palpebra pauciora quam triginta ZINN.

( *p* ) Raro numerosiora MORGAGNUS p. 10.

( *q* ) ZINN p. 251.

( *r* ) GUNZ l. c.

( *s* ) MEIBOM *ic.* MORGAGN. p. 10.

( *t* ) MEIBOM B. 3. b.

( *u* ) MORGAGN. p. 10. ZINN l. c.

( *x* ) ZINN p. 251. & in *lc. tab.* 7. f. 8.

( *x*\* ) GUNZ *de humor.* p. 388.

( *y* ) MEIBOM *ic.* ZINN p. 251.

( *z* ) WINSLOW n. 279.

( *a* ) ZINN p. 251. GUNZ l. c.

( *b* ) VATER *miscell. Berol.* T. IV. p. 330. ROBERT *de nov. invent. anat.* p. 21. MOR- GAGN. p. 10. ZINN p. 251. WINSLOW n. 279. Lacunas vocat GUNZ.

( *c* ) Glandulas vocat MEIBOM B. 3. b. Negat glandulas esse, exosus id nomen RUYSCHIIUS *ibid.* 10. n. 124.

( *d* ) RUYSCH l. c. BOERHAAVE *Prælect.* T. IV. p. 105.

( *e* ) L. I. p. 128. Lacrimas addidit emulgere.

( *f* ) *De organ. vis.* T. I. f. 3. 4. absque explicatione.

( *g* ) *De ocul. fabr.* p. 25. Ex eo C. BAUHINUS & D. de MARCHETTIS p. 129.



dicta. Demum *Henricus MEIBOMIUS*, vir eruditissimus, tota constituit ann. 1666. (*b*), triennio (*i*) prius detecta. Non valde nota tamen *Jobannes MERY* (*k*) in Gallia restituit, sed uberius *ILLUST. MORGAGNUS*.

In multis quadrupedibus reperire *MEIBOMIUS* auctor est, tam ex rapacibus (*l*), quam ex ruminantibus (*m*).

Ex earum glandularum sebo, & admixtis lacrumis fit ea colla, quæ multorum quadrupedum (*n*), continuo postquam nata sunt, palpebras conglutinat, ut cæca nascantur: neque certe in cane, & fele vera membrana (*o*) est, quæ discedentibus palpebris rumpatur. Tartaros aliquot a partu diebus clauso esse oculo, puto ex præjudicata opinione aliqui scripserunt (*p*).

#### §. XI: Intervallum paginarum palpebraliū.

Inter anteriorem palpebræ paginam & posteriorem cellulosa tela est, in quam facile humor se diffundit (*p*\*), sive anatomici artificium aquam impulerit, sive a morbosa causa eo congeratur. In variolis is tumor vulgatissimus est, & oculos, cum exsudante viscido glutine, sæpe aliquot diebus clausos tenet.

Multa etiam in eo intervallo superius pinguedo est.

Est etiam eo loco musculus, & ductuum lacrumalium series, & *ligamentum*, quod vocatur *Tarsi*. Nanquam mihi aliud obvenit, quam cellulosa, lata, lamina, quam possis artificio adjuvare, & quæ ab ora orbitæ utraque versus tarsum sub orbiculari musculo protensa, prius tamen in veram cellulosam telam resolvatur (*q*), quam tarsum attingit.

A pe-

(*b*) *Epist.* ad J. *LANGLOT* Helmst. 1666. & in disp. de fluxu humor. ad ocul. ann. 1687. n. 16.

(*i*) Fol. not. B.

(*k*) Granula in rosarii speciem disposita ap. *MAITREIEAN* p. 7. 8. Exiguæ glandulæ *TASSIN* p. 111.

(*l*) Cane.

(*m*) Ove, bove, cervo.

(*n*) *Felium* *NORWYCK* de uter. grav. p. 16.

(*o*) *BUFFON* *Histoir. naturel.* T. V. p. 220.

(*p*) De *LUCA* relat.

(*p*\*) Ex humore per æstum dilatato palpebræ sensim in mirabilem, acutam, caudam extrusæ fuerunt in cadavere *BURGMANN* in *epist. propr.*

(*q*) Fatetur Cl. *ZINNIUS* p. 248.



A periosteo alii (*r*), aut a dura membrana orbitam (*s*) vestiente, ejusque lamina exteriori deducunt, & ad tarsum usque continuant (*t*). Nunquam mihi certum & a natura definitum ligamentum visum est. CASSEBOHMUS in vitulis manifestius esse scripsit. *Josias WEITBRECHT* omisit.

Nihil etiam conjunctivæ commune est cum orbitæ periosteo, etsi ita sensit vetustas (*u*), & nuperiorum aliqui. Veriorem sententiam *Nicolaus MASSA* (*x*) aperuit, tum *J. FANTONUS* (*y*).

§. XII. *Glandula lacrumalis.*

Veri nominis glandula, quam veteres *innominatam* (*z*) dixerunt, & *superiorem*, cum vel alteram in angulo interno residentem *corunculam* (*a*) pro glandula lacrumali haberent, vel glandulam bestiis propriam (*b*). Dura est, magis quam pleræque glandulæ, & in lobulos plusculos (*c*) distincta, per quorum intervalla nervi transeunt; & vasa, lobulis in rotundos minores, acinos diffilientibus (*d*), quos filamentosa & duriuscula membrana cellulosi generis conjungit. Crassior lobus anteriorem sedem tenet, versus tempora, inque osseum lacunar orbitæ impositum, sui vestigium non obscurum inprimit, quod vocant glandulam in recessu (*e*) lacunaris orbitæ poni. Ad lacrimas pertinere, neque veteribus ignotum fuit (*f*).

In

(*r*) WINSLOW n. 271. qui sibi tribuit inventa. LUDWIG p. VI. TAYLOR. *Anat. du globe de l'oeil.* p. 6. An fuerint membranæ sub cute palpebrarum ORIBASII p. 178.

(*s*) ZINN p. 247.

(*t*) WINSLOW.

(*u*) GALEN. *util. part.* L. X. c. 2.

(*x*) p. 92.

(*y*) *Anat* p. 224.

(*z*) Adhuc WHARTONUS p. 182.

(*a*) Ab ea separat CARCANUS L. 2.

(*b*) Ab ea DUVERNEYUS *Nouv de la Rep. des lettr.* ann. 1686. & in *posth* I. p. 585.

(*c*) Duos WINSLOW n. 275. Plures rectius ZINN p. 253. sex, septem CASSEBOHM.

(*d*) Glandulas vocat congregatas MONRO *obs. anat. and. physiol.* p. 77. &c.

(*e*) WINSLOW T. I. n. 199. T. IV. n. 275.

(*f*) GALEN. *de util. part.* L. X. c. 11. BERENGAR. *Isagog.* p. 59. CARCANUS l. c.



In quadrupedibus (*g*) & avibus reperitur, quibus præterea alia secunda glandula lacrumalis est, in avibus dudum (*h*) dicta; in quadrupedibus pro nova a HARDERO descripta in lepore (*i*), cuniculo (*k*), sciuro (*l*), cervo (*m*), taxo (*n*), elephanto (*o*); pro novo invento restituta a DUVERNEYO, & ad ea animalia restricta, quibus esset tertia palpebra. Neque bene HARDERIANAM glandulam etiam in homine reperiri adfirmant (*q*), aut ab HORSTIO tertiam lacrumalem glandulam esse inventam (*r*).

### §. XIII. *Ejus ductus excretorii.*

Analogia aliarum glandularum conglomeratarum similium, quibus sui etiam ductus excretorii sunt; necessitas inveniendi fontes lacrumarum; similitudo lacrumæ cum saliva, probabilem reddunt suspicionem, utique ex glandula, quam descripsimus, per aliquos ductus excretorios parari lacrumam, & super oculum effundi.

Deinde *Nicolaus STENONIS* (*s*) F, die 11. novembr. anni 1661, præsentem BORRICHIO (*t*), ductus detexit, in bubulo oculo, ortos a lobulorum intervallis (*u*), sex (*x*), ad duodecim, setæ capaces (*y*), qui porro per interiora palpebræ superioris descenderent, & in ejus membrana conjunctiva osculis distinctis aperirentur, multo posterius

(*g*) Etiam in cetis, ut in tursione TYSON.

(*h*) In ulula PETIT *Mém. de 1736* in gallopavone IDEM *Mém. de 1735*. p. 135. In ave demoiselle PARIS. Ad angulum externum pertinet, & superior est, sive propior cuti, & capitis superficie.

(*i*) J. M. HOFMANN *idea patb.* p. 268.

(*k*) IDEM *ibid.*

(*l*) IDEM *ibid.*

(*m*) IDEM. & *Act. erudit.* 1694. n. 2. p. 49.

(*n*) *Eph. Nat. Cur.* Dec III. ann 3.

(*o*) PARISINI. In testudine duæ lacrumales glandulæ CALDESI p. 15.

(*q*) HEUCHER *Oper. omn.* p. 526.

(*r*) p. 525.

(*s*) *Epistol.* BARTHOL. 85. *Cent. III.* p. 363. *Conf. de musc. & gland.* p. 35. n. 10. *de gland. ocul.* p. 88.

(*t*) *Epist.* BARTHOL. l. c.

(*u*) *De gland. ocul.* f. 1.

(*x*) STENON. p. 88. Sed undecim pingit in *icone* f. 1. ad octo & novem PORTERFIELD p. 40. Septem & octo DUVERNEY *postb.* p. 129.

(*y*) STENON. p. 88. *Coll. priv. amstel. obs.* p. 6.



rius (z), vel superius, quam cilia. Eos ductus in bubulo etiam & ovillo oculo facile, & sæpe reperi (a).

Sed etiam a glandula lacrumali majori, avium (b), ductum Cl. vir repererunt, apertum circa initia membranæ nictitantis (c), & demum in testudine, ejusque utraque glandula, quarum quæ interior ductus suos in unum grandem canalem colligat, quem facile omnino persequaris (d). Etiam glandula lacrumalis quadrupedibus propria suum ductum habet (e).

In homine nuper nondum perinde omnia liquebat. Etsi enim STENO-  
NIUS (f) ductus excretorios etiam in homine sibi visos esse dudum scripsit, multique scriptores ita de iis agunt (g), tamquam absque controversia perinde in genere humano, ut in brutis animalibus, reperirentur, non tamen facile est, etiam omni cura adhibita, eos ductus invenire, neque potuit aut MORGAGNUS (h) eos detegere, aut ZINNIUS (i), aut ego demum: & nobiscum, ut videtur Cl. PORTERFIELD (k), & amicus olim noster SCHOBINGERUS (l).

Paulatim tamen experimenta aliqua proposita sunt, quæ in homine essent facta. Semel & oscula & ductus sibi visos SANTORINUS memorat (m). Jacobus Benignus WINSLOW (n), & J. LIEUTAUD administrationem describunt, qua eos canales in oculo sub aqua pura merso insufflare possis, & alio demum modo J. Fridericus CASSEBOHMIUS tensa palpebra, & pressa glandula innominata, humorem ex osculis exire coegit.

Deinde, nuper illustris parentis solertissimus filius fusius suum inventum proposuit.

S s 2

(z) STEN. f. 2. d. d.

(a) Conf. SCHOBINGER *de fistul. lacrum.* p. 5. AMSTELOD. in suo collegio privato &c. In tursione TYSON.

(b) PARIS. MONRO *obss. anatom. and physiol.* f. 4. e. PARISINI in casuario, PETIT *Mem. de 1735.* in gallopavone.

(c) HOFMANN *ibid.*

(d) CALDESI *tab. 8. f. 7.*

(e) HOFMANN *ibid.* p. 288. In elephanto PARISINI. In palpebra tertia duo ejus ductus DUVERNEY *posth. I* p. 585.

(f) *Epist. BARTHOL.* 55. Cent. IV p. 357.

(g) MURALT *vadem* p. 48. GLASER *de cerebro* p. 82. BRIGGS *ophthalmogr.* c. 6 f. 8. la CHARRIERE p. 269. HEUCHER *ars magn. anat.* n. 7. BRISSEAU *de la catar.* p. 4. *tab. 2. f. 1.* BONHOMME *Cephalotom.* RIBE K. *svenssk. Acad. handl.* 1745. Trim. I.

(h) *Adv. anat.* I p. 26. *Advers.* VI. p. 41.

(i) p. 254. Difficiles visu DUVERNEY p. 129.

(k) T. I. p. 40.

(l) p. 5.

(m) p. 79. 80.

(n) n. 276.



posuit. Post aliqua ergo tentamina, ab anno retro 1753. (o) facta, vir Clar. in oculo, quem in cruenta aqua maceraverat: vidit an. 1758. (p) ostia & ductus coloratos (q) versus glandulam tendentes, & eos deum vivo argento replevit: ut sint sex, septemve ductus (r), prodeuntes ex glandula (s) innominata, inter se nusquam connexi (t), descendentes per faciem internam membranae conjunctivae palpebralis (u), & aliquot lineis supra tarsum in conjunctiva scleroticæ aperti.

Sed eos ductus Cl. HUNTER ab an. 1747. monstrabat, ut nunc video (u\*).

#### §. XIV. *Alii Fontes lacrumæ.*

Certum est tamen, non omnem humorem, qui oculos extus oblini, ab hac glandula, hisve ductibus oriri, ut vel ex inferiori palpebra cognoscas, quæ pariter ad oculum adhæsura, nullos ductus habet, a quibus interius irroretur. Ab omni ergo interna superficie conjunctivae palpebralis, & pariter procul dubio a conjunctiva oculari, ros arteriosus (x) undique exhalat, qui utramque conjunctivam, ut ubique in corpore humano inter vicinas membranas fit, oburat, & separet. Eam exhalationem non difficillime aqua in carotidem effusa imitatur.

Nescio an improbabilis fuerit conjectura, vaporem ab arteriis potissimum parari; lacrumam, quæ in fletu copiosior effluit, a glandula.

Veteres ex cerebro lacrimas derivabant (y), & ex anteriori ventriculo.

#### §. XV. *Lacrumæ natura & utilitas.*

Exiguum est, quod de hujus humoris natura tenemus, limpidam esse, sed salinam aquulam, inque igne totam exhalare. Analysin chemicam nullam novi, cum vix ea copia possit colligi, quæ ad experimenta sufficiat.

(o) L. c. p. 76.

(p) Ibid.

(q) p. 77.

(r) p. 78. Ita etiam CASSEBOHM. LIEUTAUD. RIBE. Fasciculatim LIEUTAUD p. 135.

(s) Tab. 2. f. 1. f. 2.

(t) MONRO p. 8.

(u) RIBE l. c.

(u\*) Medic. Comm. p. 54. In ope viva lacrumam vidit de ductibus effluere.

(x) RUYSCH Epist. III. p. 28. BOERHAAVE prælect. T. IV. p. 96. SIGNOROTTI apud MELEI de fistula lacrum. p. 89 90

(y) Etiam S. ALBERTI de lacrumis.



ficiat. In crystallos coivisse lego (z), & non infrequens est, ut in aliis aqueis humoribus humani corporis, ita in lacruma pariter calculos con-  
crescere (a). Mira est historia crystallo-  
rum, quas ex acidis austeras in  
ophthalmia palpebris adhærentes, Cl. SCHAPERUS vidit (b).

Sanguinem se admisuisse, tanta copia, ut homo sanguinem dicatur  
lacrumasse (c), passim exempla sunt, aliqua equidem suspecta (d).

In ophthalmia nonnunquam subdulces (e) fuisse lacrumas auctor ex-  
stat. In cervo fætent, similes ceruminis (f), a copia, puto, admisti  
sebi, quod ea animalia de oculo non norint abstergere.

Utilitas primaria videtur, humectare exteriorem oculi superficiem, ne  
ab aere, ut omnes aliæ membranæ, siccet; utque adeo flexilis mobilitas  
& in oculo conservetur, & in palpebris.

Acre quodcumque a lacrumis adfluentibus abstergitur, five mechani-  
cum fuerit, ut illapsa animalcula, arenæve (g) granula: five chemica  
irritatio, ut a fumo, cepis, ab ipsa luce vividiori (h), a frigore.  
Eam omnem molestiam mechanice confluens lacruma solatur.

§. XVI. *Causa cur ex tristitia lacrumæ uberius generentur.*

De acri quocumque diximus. Etiam a titillatione narium, fluunt (h†). Ma-  
nifestum est, non alia machina (h\*) naturam egere, ut ad acris & lædentis cor-  
poris contactum largiter adfluat, atque posse absque muscoli orbicularis actione,  
secretionem lacrumarum augeri. Adsperso nempe in membranam villosam inte-  
stini coli falso pulvere, vidi totum sub oculis meis velamentum minimis gut-  
tulis madescere. Idem in oculis expertus est Cl. olim MEIBOMIUS (i); in  
saliva, ad acris cevadillæ contactum, non sine molestia ipse repetii. Cau-

S s 3

fa,

(z) BRUKMANN Cent. I. Epist. 58.

(a) PLOT natur. hist. of oxfordshire p. 200. In caruncula lacrumali calculus BLASIUS  
L. VI. obs. 16. In sacco lacrumali le DRAN operat. p. 166. FRANCUS Journ. des savans  
1679. p. 138.

(b) De lippitudine Crystallifera

(c) BORELL. Cent. II. obs. 56. STALPART Cent. I. obs. 19. BARTHOLIN. hist. 52.  
Cent I. Lacrumæ tubellæ PALLIN obs.

(d) BARTHOLIN.

(e) SEARAGLI vigil. ment. & oculi p. 391.

(f) GREW rarit. p. 21. C. BAUHINUS de bezoar. p. 50.

(g) In brutis animalibus pulvere insperso adfluunt MEIBOM epist.

(h) HAYMANN Comm. BOERHAAV. T. I. p. 113.

(h†) DUVERNEY p. 137.

(h\*) Succuti tamen ductus lacrumales, etsi non exprimuntur BORDEU sur les  
gland. p. 287.

(i) Vaf. nov. palpebr.



sa, ut ea secretio augeatur, nondum nota est, videtur autem in nervis esse (*i*<sup>\*</sup>).

Alia causa est in congestione sanguinis, quæ fit ad caput, dum subita sit. In risu diffusiori, in sternutatione, in tussi, ut nimis frequenter experior, lacrumæ abundius generantur, & per genas defluunt.

Alia iterum causa est in adfectu *tenero*, sive cum gaudio conjunctus fuerit, sive cum moerore. Cum gaudio enim, vel ex magna fortuna amici, vel ex virtutis admirabili exemplo vivide depicto, lacrumæ in hominibus tenerioris sensus abunde fluunt. Cum tristitia vulgo notum est.

In eo adfectu conjungitur equidem proprium respirationis genus, in quo sanguis per pulmonem difficiliter fluit (*k*), non tamen necessario: nam etiam absque illo clamoso fletu silentes lacrumæ per decoras feminarum genas furtim delabuntur: & in sanguinis per pulmonem fluxuri impedimentis multo majoribus (*l*), inque ipsa pleuritide, lacrumæ nullæ adparent. Neque crediderim, humorum ad caput congestorum volumen per lacrimas ulla alicujus momenti portione posse minui (*m*). Neque in ea lacrumarum concitatione magnæ videntur musculorum partes esse (*n*): præter modicam enim oculorum clausionem, quæ fit palpebra superiori sibi permessa, vix quidquam observes (*o*). Elevatio vero medii labii inferioris, & depressio laterum, partiumque oculo subjectarum, nullam habet in vias lacrumales potestatem.

Etiam animalia cum tristi adfectu dicuntur flere; certe equi (*p*), cervi, tarda avis (*q*), testudo (*r*); ex variis adeo classibus capta mortique vicina animalia dicuntur & gemere, & lacrumari. Pygmaeus flet, & faciem manu tegit (*r*<sup>\*</sup>).

#### §. XVII. Quo lacrumæ ferantur.

Pars utique magna procul dubio in sano homine resorbetur: nam & ubique in corpore humano venæ bibulæ exhalantibus arteriis respondent, &

(*i*<sup>\*</sup>) Manifesto irritatis nervis dentium superiorum lacruma fluit CHESLDEN *anat.* ed. VI. p. 234.

(*k*) Longa inspiratio, cum expiratione imperfecta L. VIII. p. 308.

(*l*) L. VIII. p. 309.

(*m*) PARSONS p. 81.

(*n*) R. WHYTT *essays* p. 52.

(*o*) SCHREIBER *de lacrum & Aetu* p. 8. PARSONS l. c. p. 78.

(*p*) SCHNEIDER *de catarrh.* L. III. p. 371.

(*q*) QUIQUERAN *laud. provinc.* p. 36. 37.

(*r*) LIGON *Barbad.* p. 36.

(*r*<sup>\*</sup>) BONT. L. V. c. 32.



& indicia sunt, esse etiam in oculo. Vapore relaxantis aquulæ sæpissime hordeola, inflammationes, sanguinis suffusiones dissipavi, nihil de morbo demturus, nisi ea aqua poros suos resorbentes offendisset. Ad suffusum-cruorem sanguinem columbarum instillare, vetustum est præsidium (s), tum in dolore & inflammatione a deposita cataracta superveniente (t).

Sed & alia via est, qua superflua lacrumarum copia ad nares ducitur: quam nunc oportet describere.

§. XVIII. *Caruncula lacrumalis.*

Liceat, ob situs viciniam, has duas particulas breviter exposuisse.

Caruncula quidem, multis, seculo XVI. & XVII., erroribus ansam præbuit, cum physiologi duas in oculo lacrumales glandulas requirerent, neque anatomici præter istam carunculam aliam haberent, quæ glandulæ inferioris veterum nomen gerere posset. Distinxerat tamen RIOLANUS (u).

Oblonga est, & extrorsum conica, quasi in caudam exeuns particula, rubella, facta membrana partis intimæ palpebræ tertiæ, cum duabus majoribus palpebris conjuncta, cumque multa cellulosa tela molli abeunte in oblongum corpusculum, transversim positum, in quadam fissuræ palpebrarum appendice, quæ in angulo interno est, seque interponit ei parti palpebræ, quæ est interior puncto lacrumali (x), & quæ in hominibus (y) fit ex palpebris ad angulum acutum convenientibus.

In eo corpusculo plusculæ sedent glandulæ (z) sebaceæ, subrotundæ, majusculæ, foraminibus (a) pertusæ, quæ suos pilos (b) perexiguos, & ægre conspicuos, producant, nonnunquam morbose longos (c).

Circumstare similis acinos DUVERNEY (c\*).

Nihil

(s) MARCELL. p. 67. DEMETRIUS de accipitr. p. 560. RHazes ad Mansor. L. IX. c. 22.

(t) MAITREIRAN p. 202.

(u) In C. BAUHIN. p. 719. tum VERDUC. osteolog. p. 105. Recte etiam habet GUILLEMRAU de oculis Sect. VII. c. 4. MASSA p. 91. aliique.

(x) MORGAGN. Adv. VI. t. 2 f. 2 ZINN t. 7. f. 10. retracta, nam accurate ad puncta pertingit.

(y) Indos arcum habere, non anulum GUMILLA Orinoko T. I. p. 105.

(z) Eas glandulas habet J. MERY cum suis excretoriis ductibus Journ. de Médec. 1697. p. 28. & DUVERNEY posth. p. 31. Fuse de iis MORGAGNUS advers. l. t. 4. f. 1. Vesiculas vocant, oleosum humorem separantes auctores physiologiæ batavæ p. 524.

(a) RUYSCH Test. II. t. 1. f. 3. DUVERNEY.

(b) MORGAGN. Adv. I. p. 28 & in ic adv. VI. p. 59. WINSLOW n. 283. SCHOMBINGER p. DUVERNEY.

(c) ALBIN. anat. L. II. c. 8. p. 32. 33.

(c\*) Ibid.



Nihil habet cum punctis lacrumalibus, cumque via lacrumarum (*d*) commune, neque per eam lacrumarum iter ullum patet: sed utique palpebrarum partem internam distinet utrinque, ut lacrumæ sistantur, & ad finem internum palpebrarum colligantur, quo accurate loco puncta, quæ dicuntur lacrumalia, se liberior efferunt, & quasi eminent in ultimum finem declivem fissuræ palpebrarum, quæ est versus nares. Sebum etiam secernit (*e*), quod ea sede collectum *lemarum* nomine innotuit. Et in avibus (*f*) reperitur, & in quadrupedibus.

### §. XIX. *Palpebra tertia.*

Ea in homine est leve quoddam fabricæ animalium imitamentum. Homini duplicis cutis pallida lunata (*g*) plica est, quæ ante carunculam lacrumalem, vel pone eam, nam situs non semper idem est, de angulo interno oculi extrorsum emergit, valde omnino exigua, lunata, cornubus superius & inferius positis, cava parte media, extrorsum respiciente. Utilitas obscura est. Mobilis est, & sæpe se aut effert aut occultat (*g\**).

In animalibus (*b*) quadrupedibus major, dura, cartilaginea (*b\**) reperitur, ut in bove (*i*), castore (*i\**), fele (*k*), apro tayacu (*l*), *philandro* opossum (*m*), urso (*n*), elephanto (*o*); iterumque major in avibus (*p*); in iis enim eam habet longitudinem, ut a proprio musculo super oculum ducta, eum totum possit operire. Quare a plurimis scriptoribus dicta est, in aquila,

(*d*) Sebum in nares demittere ROLFINK. KRUGER *physiol.* p. 42. Receptaculum esse lacrumarum SIGN. l. c. p. 91.

(*e*) Limpidum, dum recens, oleosum.

(*f*) In anseri SCHNEIDER *de catarrh.* T. III. p. 349.

(*g*) MORGAGN. *Adv. Anat.* I. t. 4. f. 1. *Advers.* VI. t. 2. f. 3. ZINN t. 7. f. 10. WINSLOW n. 283. PLATNER *fistul. lacrum.* p. 13.

(*g\**) Solo elatere ab oculo resilit PORTERFIELD T. I. p. 33.

(*b*) PETIT *Mém. de l'Acad.* 1727.

(*b\**) DUVEANFY I. p. 585.

(*i*) MORGAGNUS *Advers.* VI. t. 2. f. 1.

(*i\**) *Histoir. de l'Acad.* 1704. p. 60.

(*k*) PORTERFIELD T. I. p. 38.

(*l*) COWPER *Phil. transf.* n. 153.

(*m*) *Phil. transf.* n. 290.

(*n*) *Comm. lit. Nor.* 1734. hebdomada 38.

(*o*) BORRICH *herm. aegypt. sapient.* p. 238. PARISINI.

(*p*) De avibus fuscæ *Mém. avant.* 1699. T. II. p. 119. PERRAULT *Ess. de physiq.* T. III. & olim ARISTOT. *part. anim.* L. II. c. 13. COITER p. 130. CHARLETON *manif.* p. 83.



aquila (*q*), ossifraga (*r*), gallopavone (*s*), noctua (*t*), struthione (*u*), casuario (*x*), anser (*y*). Ita fit, in animalia, quibus nocturna præda, & perampla pupilla est (*z*), ut plurima lux in oculi intima penetret, & quæ in plena luce atmosphæræ vivere oportet, ipsumque solem inspicere (*a*), ea habeant oculum una & luci patentem minimæ, & tamen ad maximam lucem tutum. Corneam etiam membranam ab illapsis corpusculis mundare, & avertere corpora oculo nocitura (*b*) potest.

In piscibus pariter adest, & suum musculum habet, ut in galeo (*c*), scombroid (*d*), asello (*e*), & planis piscibus universis (*g*). Habet & testudo (*h*), suis cum musculis, & crocodilus (*i*), & chamæleon (*k*), & rana, sed pellucidam (*l*). Præterea pisces sæpe ipsa cute communi teguntur (*l*\*). Habent & calidi pisces, ut phoca (*m*), manati (*n*), cui cartilaginea est. Sepiæ peculiare est tutamen oculi (*o*). Obduci oculis visa est in fele (*p*), rana (*q*) &c.

Videtur

(*q*) ALDROV *ornithol.* L. I. p. 115. seqq. *Hist. de l'Acad.* 1704. p. 60. BORRICH *barn. sap.* p. 238.

(*r*) ALDROV. *ornithol.* T. I. p. 226.

(*s*) PETIT *Mém. de* 1735. f. 6.

(*t*) COITER p. 130. ALDROV. T. I. p. 527.

(*u*) PARISINI.

(*x*) IDEM.

(*y*) PEYER *obs.* 44.

(*z*) Ut feli, oto.

(*a*) Aquilæ BORRICH l. c.

(*b*) PORTERFIELD L. I. p. 38.

(*c*) PERRAULT *eff. de phys.* T. III. p. 40. CHARLETON *mantiss.* p. 83. *Mercure de France* 1752. m. Decemb. Ubi describitur circularis cornea, prædura, introrsum gracilescens.

(*d*) SCHONEVELD p. 66. BIRCH T. IV. p. 534.

(*e*) BIRCH T. I. p. 116.

(*g*) Quia se in arenas abdunt LEEUWENHOECK *Phil. transf.* n. 293. ANDERSON p. 94. PORTERFIELD T. I. p. 21.

(*h*) CALDESI p. 14. 15. PARIS. PETIT *Mém. de l'Acad.* 1736.

(*i*) PARISINI.

(*k*) IDEM.

(*l*) ROESEL p. 19. Add. PETIT *Mém. de* 1736. JACOBÆUM.

(*l*\*) SCHÆFFEE *pisc. tararat.* p. 80.

(*m*) PARIS.

(*n*) *Comm. nov. Acad. Petr.* T. I. p. 303.

(*o*) SWAMMERDAM *bibl.* p. 893.

(*p*) SCHUBER *num suffus.* p. 9. ad fumum sulfuris. BOYLE *final. caus.* p. 524.

(*q*) PORTERFIELD L. I. p. 38.



Videtur cartilaginis nomine a V I D O indicari ( *r* ). Homini exigua est, qui manu oculum repurgare, multisque modis & nimiae luci perspicere possit, & nimis parcae.

§. XX. *Puncta lacrumalia.*

Finis palpebrae verior, & lineae, quae tarso intus recepto confirmatur, ad principium appendicis palpebrarum, quam diximus ( *s* ), finemque carunculæ lacrumalis interiorem ( *t* ), aliquantum eminet, albo, papillari ( *u* ), colliculo, a qua sede palpebrae id quod superest, alio ductu ad suum finem pergit ( *x* ). In eo colliculo paulo interius, quam est linea tarsi, utrinque simile & æquale foramen est, non ita parvum, quin feta facile subeat, eo facilius, quod circa quodque foramen non eundem cartilago ( *y* ), sed duriuscula & callosa cellulositas sit, quæ nunquam finit ea puncta connivere ( *z* ), aut in rimæ speciem collabi, ut alia, non aliquo simili artificio confirmata, foramina solent. Aperto oculo distant, clauso se contingunt.

Antiqua res est, ipsi GALENO nota ( *a* ), & VEGETIO ( *b* ), qui veterinariam scripsit, & plusculis vetustiorum instauratorum ( *c* ) anatomes; a FALLOPIO ( *d* ) tamen rectius constituta, in recentioribus subtiliter repetita.

Habent

( *r* ) p. 76.

( *s* ) p. 327.

( *t* ) RUYSCH *Thes.* II. l. c.

( *u* ) WINSLOW n. 281. Eminentiam habet ANEL *Nouv. descript. du conduit lacrimal.* p. 28. Separatam a reliqua palpebra ZINN. t. 7. f. 10.

( *x* ) PERIT *Mém. de l'Acad.* 1734. tab. 21. f. 1. 2. HEISTER *Chirurg.* tab. 16. f. 6. 9.

( *y* ) ANEL *Nouvel. descript.* p. 28. BIANCHI *ducl. lacrum* p. 6. HEISTER *fistul. lacrum.* p. 13. Neque offeus est anulus MELLI p. 30.

( *z* ) WINSLOW. ZINN p. 254.

( *a* ) *Util. part.* L. X. c. XI. AVICENNA L. III. *Pen.* 5. *tract.* 1. c. 2.

( *b* ) Foramina subtilissima, per quæ tamen Chirurghi pertenuem fistulam inflabant L. II. c. 21.

( *c* ) Gabriel a ZERBIS p. 121. b. J. BERENGARIUS in MUNDINUM p. CCCCLVIII. MASSA *in rod.* p. 91. C. STEPHANUS, de palpebra inferiori L. I. p. 128.

( *d* ) *Obs. anat.* p. 212. de *ulcer.* p. 181. VIDUS p. 321. CARCANUS L. II. *Spiramina* dixit SAL. ALBERTUS p. 30.



Habent & quadrupeda (*e*), & aves. In aquila descripsit BORRICHIUS (*f*), in ulula PETITUS (*f*<sup>\*</sup>), in scope numidica PARI-SINI (*g*).

Singulare fuit vitium, si MELLIVS puncta lacrumalia aut minima reperit, aut nulla (*h*). Male quatuor, in utroque oculi angulo duo, fecit FABRICIVS (*i*).

Angustia sua & externa corpuscula illapsura arcent, & refluxui ex sacco lacrumali resistunt.

§. XXI. *Ductus lacrumales.*

Punctum lacrumale quodque ducit ad ductum inter laminas (*k*) appendicis palpebræ, pone orbicularis musculi fibras (*l*) subcutaneas abscondum, tenerum, per experimenta irritabilem (*m*), in quem epidermis & cutis adtenuata in ipsas nares continuatur, cumque membrana pituitaria coit.

Hi ductus multo, quam puncta (*n*) promittunt, latiores (*o*) sunt, ut sæpe vidi, quando conpresso altero alterum glutine piscium cæruleo replebam. Tenerrima autem, albaque eorum natura est (*p*). A punctis lacrumalibus aliquo brevi spatiolo recti exeunt, inferior sursum, superior deorsum (*q*), deinde ductum mutant. Quando oculus clausus est, tunc uterque transversus incedit; quando apertus, tunc superior descendit (*r*),

T t 2

inferior

(*e*) In bove certe, & ove persecutus sum.

(*f*) *Hermet. sapient. ægypt.* p. 277.

(*f*<sup>\*</sup>) *Mém. de l'Acad.* 1736. p. 132.

(*g*) *Mém. pour servir à l'histoire des animaux.*

(*h*) p. 110.

(*i*) *De oculo* p. 25. Duplicia etiam puncta habet C. BARTHOLIN. *Spec. hist. anim.* p. 109. 110

(*k*) ANEL l. c. Sal. ALBERTI n. 27.

(*l*) ZINN p. 256.

(*m*) WINSLOW n. 282. nisi forte una musculosæ fibræ irritatæ fuerunt.

(*n*) Non bene æquales BIANCHUS f. 1. 2.

(*o*) MORGAGN. *Adv.* VI. p. 47. LIBOTAUD p. 123. Nimis angustos facit HER-SPER de fist. lacrum. & fere BERTRANDI p. 87.

(*p*) ZINN p. 256. MORGAGN. VI. p. 61.

(*q*) ZINN p. 255. t. 7. f. 10.

(*r*) Pythagoricam literam cum sacco suo referre Sal. ALBERTI n. 30. Sed vide ZINN p. 255. *Id. cit.* MELLI f. 2. le CAT p. 500.



inferior fere semper transversus (*s*) est, ut in vivis hominibus vidi. Superior potius aliquanto longior (*t*), & minor est. Non sunt penitus recti (*t*\*), & aliquanto cute longiores, qua continentur:

Incedunt autem super carunculam lacrumalem alter, alter infra eam, ut eam mediam amplectantur. Videntur modo duobus locis distinctis in anteriorem partem (*u*) sacci lacrumalis aperiri, ut setis inmissis vidi, & colorato liquore injecto (*x*), modo unico: cum enim superioris & inferioris ductus exiguum sit intervallum, & periculose uterque separatur, ob callosam cellulosaē telæ naturam, quæ eos separat (*y*), factum est, ut a plerisque scriptoribus ductus communis describatur, in quem lacrumalis uterque consentiat (*z*). Brevissimum tamen esse MORGAGNUS dicit (*a*), & satis adparet, similia nostrorum ZINNIIUM vidisse (*b*) Sphinctere ambiri lego (*b*\*) mihi ignoto.

Verusta & ista res est, & GALENO (*c*), & VEGETIO (*d*) nota, tamen a FALLOPIO (*e*) potissimum instaurata; & posteriori seculo a STENONIO (*f*). Deinde cum chirurgia majori studio excoleretur, *Dominicus*

(*s*) Ita etiam ZINN p. 255. MELLI in *icon.* SCHOBINGER p. 8. Paulum tamen ascendentem pingunt ZINN t. 7. f. 10. & le CAT, & MONRO, & HUISTER f. om. & magis adhuc BIANCHUS f. 2. Descendentem MORGAGNUS *Adv.* I. t. 4. f. 1. Descendere, si recte intelligo MELLI p. 30.

(*t*) Quarta parte longiorem TAYLOR p. 9. Longiorem MONRO *Eff.* III. p. 281. Varie curvos esse MELLI p. 30.

(*t*\*) Superior leviter curvus, inferior minus DUVERN. p. 130.

(*u*) ZINN p. 256. *Id.* cit.

(*x*) Et unum reperiri & duos MOLINELLI *Comm. Bonon.* T. II P. I. p. 162.

(*x*\*) Jubet inflare potius, quam setis dilatare CASSEBOHM *meth. secand. vis.* p. 52.

(*y*) In animalibus aliqua osseo septo distingui SAL. ALBERTIN. 20.

(*z*) ANEL p. 28. le CAT p. 400. PETIT f. 2. WINSLOW n. 345. TAYLOR p. 9. BERTRANDI p. 87. LIEUTAUD p. 121. SHARPE *operat. tab.* XI. la FORET *Mém. de Chirurg.* T. II p. 175. FERRIN in *diff.* *Non E. fistula lacrumali anter.* ZINN p. 255. In bove convenire RUYSCH *Mus. rar.* p. 168.

(*a*) *Avvers.* VI. p. 49. Breves etiam fecit MELLI f. 2. Lineam longam unionem la FORET. Per tertiam partem uniri BERTRANDI. Per dimidium le CAT *ibid.* Enormem ductum communem fecerat BIANCHUS l. c. & le CAT.

(*b*) p. 256.

(*b*\*) DUVERNEY p. 134.

(*c*) *De usu partium* L. X. c. XI.

(*d*) l. c.

(*e*) *Obs.* p. 122. Post eum a SAL. ALBERTI, PLATERO p. 185. CASSERIO *de ol. fact.* c. 7. CARCANO L. II.

(*f*) *De musc. & gland.* p. 35. *de vasis oculor.* p. 89. Post eum a WILLISIO *de anim. brut.* p. 145. FONTANO in *diff. anat.* le CLERC *osteol.* p. 90. la CHARRIERE p. 270. BRISSEAU p. 16. *Anon. oper. de Chirurg.* p. 133. PALFYN *anat. Chir.* p. 60.



*minicus* ANEL (*g*), aliique nuperi, studiosius in eorum canalium descriptione sunt versati, quos persæpe, & cum aliquo studio ipse sum persecutus. Ludovico BILSIO absque ulla vera causa aliqui laudem inventi tribuerunt (*h*).

In quadrupedibus, avibusque (*i*) pariter reperiuntur.

Quid sunt siphones lacrumarum involuntarii ad angulum externum oculi (*k*)? Sed neque intelligo, quare per superiorem tantum ductum lacruma lemin fistula pus prodire STAHLIUS scripserit (*l*).

## §. XXII. *Saccus lacrumalis.*

Cum ipsis ductibus innotuit, siquidem eos ad nares ducere jam GALLENUS intellexit, & AVICENNA, & VEGETIUS, & alii veterum. Accuratius descriptus est a Salomone ALBERTI (*m*). Dissenserunt Cl. viri, num ductus major simpliciori nomine diceretur (*n*): num duæ in hoc ductu partes considerarentur; subcutanea, quam *saccum* vulgo lacrumalem dicunt; & ea, quæ per ossa comprehendenda descendit, & ductus nasalis ab aliis dicta est.

*Saccus* ergo *lacrumalis*, ut descriptionem partiamur, magna ratione canalibus lacrumam adferentibus major est. Ejus tunica exterior ex membrana densa, cellulosa, quasi aponeurotica; interna ex membrana propria pituitaria, rubra, & pulposa (*o*) fit, quæ a naribus eo ascendit (*p*), & in qua perinde, ut in naribus, Clari viri glandulas (*q*) se putarunt vidisse, minimas, semel & mihi visas. Ea per cellulosum textum cum ossibus subjectis conjungitur. Illa in superficie sua fibris lon-

T t 3

giori-

(*g*) *Nouv. descript. des conduits lacrimaux.*

(*h*) BARBETIE oper. p. 64.

(*i*) PETIT *Mém. de l'Acad.* 1735. p. 132. & 1736.

(*k*) PRICHEIN II. obs 47.

(*l*) *Progr. ad disp. de ocul. adfect.*

(*m*) *Sinum* vocat n. 19. 27. &c & etiam in animalibus repetiit. Lacum GLASER de cerebr. p. 82.

(*n*) Ut ab ILL. MORGAGNO *Advers* I. &c.

(*o*) ZINN p. 257. Satis crassa non densa *Sal.* ALBERTI n. 21. Membrana alba nervea ZINN p. 257.

(*p*) M. cum in sacco lacrumali frequenter vidi

(*q*) Habet BLANCHI p. 23 Poros dixit *Sal.* ALBERTIN 21. add. MOLINELLI *Comm. Bonon* T II. P. I. p. 162. Pro re probabili WINSLOW n. 349. Negat BERTRANDI p. 88.



gioribus velatur, ut aliquid tendinis (*r*) simile credas te videre. Tegitur autem musculo orbiculari palpebrarum, cujus ligamentum trans ductum, ad sedem insertorum canalium lacrumalium, in transversum incedit. Figura sacci aliquid habet ovale (*t*), certe superior, cæcus (*u*), finis supra insertionem ductuum lacrumalium, in convexitatem sursum spectantem terminatur; inferius autem apertus in ductum nasalem continuatur.

Osse potissimum unguis continetur, inque processu nasali ossis maxillæ superioris (*x*), fere ad perpendiculum, ut paulum ad posteriora declinet. Finis interior est, ad eminens jugum ossis unguis, cui firmiter adhæret (*y*). Finis supremus paululum super ligamentum orbicularis musculi se effert. Finis imus ad musculum obliquum inferiorem oculi pertingit, cujus aliquas fibras vidi sacco manifesto inferi. Proprium musculum alii habent. (*z*). Partem superiorem valvula quasi in duas partes divisam fuisse, in quarum posteriorem ductus lacrumalis infereretur, rarior (*a*) est adnotatio.

Conjectura est præstantium virorum, hunc saccum etiam aliunde, præter puncta lacrumalia, aliquid accipere humoris (*b*). Vidit P. *Paulus* MOLINELLUS, cum nulla puncta lacrumalia superessent, tamen presso sacco plurimam per nares aquam fluxisse (*c*), & similem casum vidit Cl. GUNZIUS, cum ductus obstructi essent. Deinde B. ZINNIUS (*d*), cum cera replevisset, vascula replevit inde per palpebras sparsa. Exhalantes credas esse arterias (*e*).

## §. XXIII.

(*r*) Ligamentula BERTRANDI p. 88. BIANCHI f. 1. p. p. Stratum musculosum in sacco lacrumali C. V. REVERRHORST de *aglyope* Leid. 1738. p. 20

(*t*) BERTRANDI p. 88. Pene ovalem ZINN t. 7. f. 10. MELLI f. 2. Ampullarem cum constrictione media leCAT f. 3. Longiorem, sine introrsum curvo SHARPE tab. XI. Infundibuli forma ANEL p. 28. Valde brevem HEISTER. Reniformem PRATT f. 2. Informem BIANCHI f. 1. 2. Anteriorem partem compressam, mediam latiore, inde sensim angustiore facit GATAKER p. 25.

(*u*) LIRIUSAUD p. 124. WINSLOW n. 345. la CAT. HEISTER f. 7. 8. 16. 17.

(*x*) WINSLOW n. 342.

(*y*) MONRO p. 181.

(*z*) SCHOBINGER, DUVERNEY *postb.* p. 130. ex osse plano ortum tuum DUVERN Jun. *myotomol.* p. 37.

(*a*) WINSLOW n. 348. ESCHENBACH p. 406.

(*b*) De humor. p. 164.

(*c*) L. c.

(*d*) L. c.

(*e*). p. 257.



§. XXIII. *Ductus nasalis.*

Cum sacco portio ejusdem lacrumalis canalis plerumque absque ullo discrimine continuatur, quem ossa continent. In principio tamen partis ossibus comprehensæ semilunari valvula aliqua, non quidem totum canalem abscindente distingui Cl. viri dixerunt. Semel equidem a me visa est (f).

Ex eo adeo sacco ductus nasalis in osseum tubum recipitur, angustior aliquantum sacco suo (g). Eum in principio suo lamina orbitalis ossis maxillæ præcipui (h) cum osse unguis (i); inferius cum osse unguis conjuncta lamina adscendens anterior ossis spongiosi (k) inferioris efficit, cujus interventu a sinu HIGHMORI distinguitur. Modice omnino retrorsum (l), & etiam minus extrorsum tendit, & aliquando extrorsum primo, tunc introrsum modice curvatur. Diametri neque omnes æquales (m) sunt, nam compressus (n) amat esse, & præterea subinde in medio paulum arctatur (o).

Ostium denique est in meatu narium infimo, inque recessu, quem os spongiosum infimum suo arcu protegit (p), haud longe a fine osseo narium, fere super secundum & tertium dentem molarem. Inæqualis est exitus, ut inferius membrana ductum efficiens longius procurrat (q), quam pro valvula (r) sunt qui descripserint; superior brevior sit. Idem ostium aliquantum reliquo ductu angustius est (s), & introrsum respicit. Am-  
pullam

(f) Videtur & ZINNIIUS vidisse p. 258. Negat MORGAGNUS iter istud usquam impediri *Adv. I. p. 28.*

(g) MORGAGNUS *Adv. VI. p. 55.* BERTRANDI p. 88. Non semper DUVERNÉY p. 131. Nimis angustus in *ic. PETITI, HISTERI. Vocat le tuyau ANEL p. 28.*

(h) Ab eo etiam solo BERTIN T. II. p. 143. 167. cum os unguis nullum esset.

(i) BERTIN T. II. p. 140.

(k) IDEM p. 166. 190. conf. L. XIV.

(l) VERHEYEN, le CAT I. c. MORGAGN. *Adv. I. p. 28. Adv. VI. p. 52.* BERTRANDI p. 88. WINSLOW n. 343. Nimis retrorsum it in *iconibus BIANCHI & MELLI.*

(m) Irregularis amplitudinis BERTRANDI p. 88. le CAT *icon.*

(n) BERTIN. T. II. p. 166. MORGAGN. *Adv. VI. p. 53.*

(o) BERTIN I. c. Constrictus, & iterum dilatatus BIANCHI f. 1. 2.

(p) Le CAT f. 2. *Icon. anat. fasc. IV*

(q) Etiam ZINN p. 258. Elipticum osculum MORG. *Adv. VI. p. 54.*

(r) Valvulam pingit BIANCHI f. 2. h. & p. 14. tum MELLI f. 2. Negat valvulam MORGAGNUS *Adv. VI. p. 63 I. p. 28* Papillam vocat BOERHAAVE *morb. ocul. p. 19.* Habet etiam COEN. v. REVERCHORST I. c.

(s) MORGAGN. *Adv. V. p. 48. & in ic.* Aliquando perangustum DUVERNÉY *postb. p. 131.*



pullam non vidi (*t*), in quam supra finem eum ductum ajunt late-  
fcere, in modum infundibuli (*u*). Cum tamen veraces auctores (*x*) ea-  
dem habeant, oportet in fabrica hic varietatem aliquam esse.

Obliqua insertio, & procurrens membrana faciunt, ut in cadavere, &  
etiam magis in vivo homine, non facile fit, setam per nares in ductum la-  
crumalem subire (*y*).

Veteres hanc viam obiter notam habuerunt, siquidem non ignora-  
runt, ea sede iter ad nares ducere. Per idem nervum in narium mem-  
branam ducebant (*z*). A FALLOPIO breviter (*a*), a Salomone AL-  
BERTI primum rectius descriptum est (*b*).

Natura eadem est, quæ sacci, & in ea parte ductus nasalis pariter dicuntur  
glandulæ fuisse visæ (*c*). Etiam in animalibus reperitur, & perinde ad na-  
res ducit, in quadrupedibus, avibus (*d*).

Alio etiam lacrimas abire, earumque partem ex sacco lacrumali, in  
vertice nasi (*d*\*) sub osse turbinato medio [vulgo superiori] (*e*) de-  
scendere; aliam in sinum HIGHMORI (*f*) patere, etsi probabilem ha-  
bet auctorem, non tamen aliquo aut ejusdem Cl. viri, aut alterius in-  
cisoris experimento confirmatum est. Simile aliquid, sed obscurum ha-  
bet MELLIVS (*g*). Sunt etiam in osse unguis sua foramina (*h*), sed  
saccus & ductus clausi sunt, & liquorem injectum continent.

#### §. XXIV. *Musculus orbicularis palpebrarum.*

Ut iter lacrumæ in nares exponatur, hujus musculi descriptionem  
oportet

- (*t*) Negat etiam MORGAGNUS *Adv.* VI. p. 51. 52.  
(*u*) Anulum infundibulum BIANCHI f. 1. 2. MELLIVS f. 2. 3.  
(*x*) Habet ampullam le CAT in suis iconibus. *Petite ampoule* WINSLOW  
n. 346. 347.  
(*y*) POUTEAU p. 97.  
(*z*) ORIBAS. p. 268. GALEN. *Epid.* VI. S. 2.  
(*a*) p. 212. & a CARCANO  
(*b*) Pituitæ meatus n. 16. Tubulus oblongior n. 30.  
(*c*) DUVERNEY jun apud SCHÖNINGER. MAITREIRAN.  
(*d*) PETIT in ulula *Mém. de l'Académie* 1736. in gallopavone *Mém. de* 1737.  
(*d*\*) Nempe narium.  
(*e*) VATER l. c.  
(*f*) L. c.  
(*g*) p. 29 foramina exigua ex sacco lacrumali in nares patentia.  
(*h*) BERTIN T. II. p. 138.



oportet præmittere, quem variis modis pro uno (*i*), prove duobus, etiam pluribus (*k*), musculis, scriptores anatomici habuerunt.

Est nempe ligamentum (*l*) proprium, duriusculum, pene cartilagineum (*l*), ad sedem insertorum in saccum nasalem ductuum lacrumalium positum, quod a processu nasali ossis maxillæ superioris (*m*) præcipui transversim, sensim debilius, ad angulum internum, inque interiorrem finem cutis palpebram facientis se inmittit.

Nunc musculi orbicularis nomine intelligitur, latius multo quam palpebrarum ambitus (*n*) stratum fibrarum carnearum, quod undique sub cute orbitam ambit, per supercilium (*o*), adque angulum externum, versus tempora latius est (*p*), tum infra orbitam: supra eam ad angulum internum potissimum angustius. In id stratum superius frontalis musculi fibræ, & corrugatoris, se inmiscent: & proceri (*p*<sup>\*</sup>). Ad tempora totum mobile est, & absque ossea adhæsione (*p*<sup>\*\*</sup>).

Fines diversi sunt, & impediti. Pars utrimque in palpebram (*q*) utramque producit, pro diverso musculo habita (*r*), ejusque toti latitudini ad tarsum usque subcutanea insternitur. Ejus fibræ eo magis curvæ sunt, quo margini orbitæ propiores, maxime interno; eo rectiores (*s*), quo viciniore tarso: ea sede crassiores (*t*), ut *ciliarem* ex iis musculum peculiari nomine Cl. viri fecerint (*u*).

Pars

(*i*) ALBINUS. DOUGLAS, & plerique alii.

(*k*) SANTORINUS. WINSLOW n. 289. RIOLANUS *Enchir.* p. 335. qui tres facit. PARSONS.

(*l*) ALBIN p. 146. WEITBRECHT *Syndesmol.* p. 203. ZINN p. 249. WINSLOW n. 287. ALBIN. t. I. tab. XI. f. I. BIANCHI p. 8. GAUTIER *ic.* 2. BERTRANDI p. 85. WEITBRECHT *Comm. Acad. Petropol.* f. 1. e. & *Syndesmolog.* f. 77.

(*m*) BERTRANDI p. 85. ALBIN. &c.

(*n*) SANTORIN. tab. I. PARSONS &c.

(*o*) Ad angulos acutos convenire in supercilio WEITBRECHT p. 338. t. 15. f. 1. c. d.

(*p*) ZINN p. 250. ALBIN. t. XI. f. 1. PARSONS t. I. f. 1. &c.

(*p*<sup>\*</sup>) DUVERNEY *posth.* p. 127.

(*p*<sup>\*\*</sup>) CHESELDEN tab. XI. SANTORIN. PARSON.

(*q*) COWPERT t. 25. f. 1. CASSER *org. vis.* t. 1. f. 1. ALBIN. t. I. & tab. XI. f. 1.

(*r*) Duo semicirculares MOULINS p. 8. &c.

(*s*) ZINN p. 250. SANTORIN. p. 10.

(*t*) WEITBRECHT p. 338 f. 1. b. b. WINSLOW n. 291. ZINN p. 250.

(*u*) *Ciliaris* RIOLAN. *Enchir.* p. 335. 344. add. COLLINS p. 376.



Pars musculi major, orbitaria, in ligamentum ( $\alpha$ ) quod diximus, utrinque se inmittit; pars ossi frontis ( $\gamma$ ), & processui nasali ( $z$ ) maxillæ superioris, & supra ligamentum inplantatur, & infra. Pars a superiori sede in inferiorem circumducta continuatur ( $a$ ), quam interius ligamentum, tum trans idem, & trans lacrumalem faccum.

Musculi palpebralis pars ad tarsum finitur: pars ligamento transverso adhæret ( $b$ ): pars denique fibrarum superiorum ad conjunctionem utramque duarum palpebrarum, ad angulos valde inæquales, cum inferioribus ejusdem musculi fibris decussatur ( $c$ ).

Cum punctum firmitus hujus musculi sit in parte interiori, & media, mobilior autem pars in superciliis, & temporibus, hinc musculus orbicularis, dum agit, palpebram utique superiorem, & quidem manifestius deorsum ducit, & infra oculi æquatorem ( $d$ ) extendit: inferiorem debilius, sed certo tamen sursum levat, donec adductis palpebris solus canalis superfit, quem diximus. Ita lucis vim nimiam ab oculi intimis avertimus, ut suavissimo somno sit locus. Sed etiam ad visionem accuratam eo musculo utimur, quod alias fusius repetetur.

Una cum idem musculus interius firmior sit, omnia, quæ super oculum effunduntur, ab ejus quasi conveniente actione colliguntur in angulum internum ( $e$ ), sedemque eam, quæ quasi in rima palpebrarum est intima, ubi a caruncula lacrumali, & a palpebra tertia, & ab eminentiis punctorum lacrumalium, aque palpebra inferiori subjecta retinetur, & eo facilius colligitur, quod ea sede inter meræ cutis plicas locus, sed minus resistens, neque a cartilagineis tarsis compressus ( $f$ ) sit. Eo lacrumæ ergo conveniunt, eo vidi duci muscas, aliaque molesta corpuscula, quæ in conjunctivam illapsa fuerant. Quare utique contractio musculi orbicularis in angulo externo incipit, & versus majorem angulum

( $\alpha$ ) ALBIN. p. 146. tab. XI. f. 1. WEITBRECHT *Comm. Petr.* l. c. p. 339. *Syndesmol.* p. 204.

( $\gamma$ ) ALBIN. p. 146. ZINN p. 250. DOUGLAS.

( $z$ ) IDEM *ibid.*

( $a$ ) SANTORIN. &c.

( $b$ ) WEITBRECHT p. 338. g. e. f. e. SANTORINUS *cis* \* ALBIN. t. XI. f. 1.

( $c$ ) ALBIN. p. 147. SANTORIN. p. 10. & *in is.*

( $d$ ) PARSONS p. 13. 14.

( $e$ ) ALBIN. p. 147. WEITBRECHT p. 340. *Syndesmol.* p. 204. PORTERFIELD T. I. p. 45. 46.

( $f$ ) PETIT l. c. p. 136.



lum pergit (*g*). Et cum lacrumatione frequentior muscoli orbicularis contractio conjungitur (*b*).

§. XXV. *Lacrumarum iter ad nares.*

Nunc in eum locum eminent colliculi, in quibus sunt puncta lacrumalia. Si ea ponas vel ex siphonis incurvi natura, obque aeris pressionem, aquam fugere, cui crus brevius immersum est: sive potius ad modum tubulorum capillarium, eum exiguum tubulum aquam credas forbere; certe in punctum lacrumale lacruma succedet, semelque in faccum cognominem delata, porro suo pondere ad nares perget. Non (*i*) siphonis specie autem aquam adtrahi inde colligas, quod lacruma in brutis animalibus, quæ amant caput erectum tenere, inque homine jacente, per ductus certo adscendentes (*k*), pondere non adjuventur; & quod obstructo itinere lacrumæ, ex causa in naribus nata, faccus tamen lacrumalis repleatur, etsi tunc equidem receptam aquam, qua se liberare impos est, per puncta refundit (*l*).

Ab aeris pressione lacrumas in puncta urgeri alii (*m*); sed nimis angusta puncta crediderim. Neque enim aer in capillares tubulos humores urget.

Adtractione id officium perfici nuper creditum est (*o*), cum coloratæ guttulæ inter palpebras celeriter adscendant (*p*), & unguentata cylindrus, inter clausas palpebras (*q*) traducta, totam faciem earum internam nigram reddat. Sed iter secundum palpebras utique manifesto a musculis perficitur (*r*).

In puncta ipsa aquam adtractione resumí probabile fit, ex tubulorum capillarium exemplo.

In lacrumante, cum plus laborent, merito dilatantur (*r*\*).

U u 2

Utcun-

(*g*) PORTERFIELD p. 45.

(*b*) PETIT p. 139.

(*i*) Non valde credit siphoni MOLINELLI. *Comm. Bonon. T. II. P. I. l. c. p. 164.*

(*k*) HUNAUDD *Phil. transf. n. 437.*

(*l*) P. P. MOLINELLI l. c. p. 167.

(*m*) HUNAUDD l. c.

(*o*) SAUVAGES *ast. des médec. p. 12.*

(*p*) IDEM *Physiol. p. 176. de suctione vasor. capillar. p. 10*

(*q*) RUSSEL *natur. hist. of aleppo p. 104.*

(*r*) Motu peristaltico promoveri P. P. MOLINELLI l. c. p. 165.

(*r*\*) HEBENSTREIT *ocul. lacrum. p. 6.*



Utcunque fiat, certum est, lacrumæ naturalem viam per puncta in ductum utrumque, per eum in saccum, hinc in ductum nasalem, naresque ducere, eorumque infimum meatum inde humectari.

Idem iter & insertum in punctum lacrumale filum (s), aut seta, aut aqua per subtilem siphonem (t) impulsam, facile legit, olimque est adnotatum, collyriorum saporem ad os, per nares certe, pervenire (u), & aquam oculis infusam alvum movisse (x).

Quare si vetustiores (y), & nuperi aliqui (z) anatomici, iter lacrumarum inverterunt, & ex sacco per puncta eas dixerunt in oculum effundi, viderunt utique contrarium naturæ iter, quod equidem non infrequens est, ut obstructo ductu lacrumarum nasali, aut laxatis in moribundo homine sphincterulis (a), lacruma ipsa (b), aut pus, aut materies ex pure seboque mista, per ea puncta regurgitet. Ita etiam retentus (c) in naribus aer, & sanguis (d) occisæ avis, fumusve incensæ (d\*) nicotianæ, per ea puncta prodiit.

Dudum verum vidit J. FRANCO (e), tum TAGLIACOTIUS (f), monuitque de errore MEIBOMIUS (g), & GLASERUS (h), & DUVERNEY (h\*). Partem aliquam veri vidit Sal. ALBERTI (i). Nihil alieni N. MASSA docuerat (k).

In naribus irrorare sensiles membranas potest & mucum diluere.

An

(s) Chinensium exemplo NIEUHOFF iter. prim. c. 3.

(t) Ex STAHLII consilio, in progr. cit. Rem ipsam effecit Dominicus ANRE.

(u) SCHNEIDER de catarrho I. II. p. 441. GALENUS I c. MASSA p. 91. G. a ZERBIS p. 121 b. De alcohole AVICENNA L. III. fen. 5. tr. I. c. 2.

(x) RULANDUS apud ROLFINK p. 330. PLEMP ophthalmogr. p. 116.

(y) CARPUS. FALLOPIUS p. 212. S. ALBERTUS n. 3. 27. orat. p. 118. C. STEPHANUS FABRICIUS p. 28. C. BAUHINUS theatr. p. 373. C. BARTHOLINUS p. 144. LINDEN physiol. p. 117.

(z) SIGNOROTTI apud MELLI p. 89. 90.

(a) HEBENSTREIT I c p 6.

(b) P. P. MOLINELLI Comm. Bonon. T. II. P. I. p. 167.

(c) Sal. ALBERTI n. 22.

(d) PETIT Mém. de l'Acad. 1735. p. 173. in gallopavone.

(d\*) DUVERNEY postb. p. 135.

(e) Chirurg p. 217.

(f) Chirurg curt. L. I. c. 7.

(g) In lib. cit.

(h) De cerebr. p. 82.

(h\*) Nempe apud le CLERC osteol. p. 90.

(i) n. 39.

(k) L. c.



An ad os ipsum per ductum incisorium lacruma descendat, ut ejus canales inter salivales recte recenseantur (*l*), ut nuper repetiit M. B O R D E U (*m*), alias (*n*) disquiretur; & vide interim, quæ de collyriis & alcohole diximus (*n*<sup>\*</sup>). Canalis autem iste, ut pauca moneam, cæcus est. Ductus ex lacrumalibus ad gingivas descendere conjectura videtur (*o*).

§. XXVI. *Musculi diductores palpebrarum.*

CLAUDIT oculum musculus orbicularis; eum aperire jubet visus, princeps oculi officium.

Palpebram superiorem elevat tum ipse frontalis, qui supercilium & orbicularem musculus sursum revellit (*p*); tum proprius musculus *levator palpebræ superioris*.

Is cum oculi musculis oritur, tendineus, ab involucro nervi optici (*q*), ut sæpe vidi, juxta patheticum. Rectus antrorsum tendit, conscendit oculi globum (*r*) partim interior recto musculo superiori, & partim superior, eumque decussat. Reflectitur circa convexi bulbi circulum maximum, tectus orbiculari palpebræ; fit tendineus (*s*), dilatatur (*t*) triangulari specie, & aut tarso (*u*) superiori se inmittit aut proximæ cuti (*x*). Totam adeo palpebram elevat, & oculum luci aperit. In amore & admiratione agit (*y*). Veteribus notus fuit, ipsi forte GALENO, cum arabes (*z*) habeant, qui solebant GALENUM exscribere. In libris tamen GALE-

U u 3

NICIS,

(*l*) C. DREZINCOURT *præhud.* p. 187.

(*m*) *Recherches sur les gland.* p. 299.

(*n*) L. XVIII.

(*n*<sup>\*</sup>) p. 304.

(*o*) SIGNOROTTI l.c.

(*p*) p. 312. 313.

(*q*) EUSTACH. t. 39. f. 2. CASSER t. I. f. 7. ALBIN. in *icon.* t. XI. f. 21. ZINN t. V. f. 1. 3. p. 248. A foramine ALBINUS p. 174. In origine cum recto superiori coherere BERTRANDI p. 82.

(*r*) ZINN *tab.* 5. f. 1. &c.

(*s*) ZINN p. 249. ALBIN. p. 174. *tab* XI. f. 17. 21.

(*t*) CASSER. t. 3. 4. f. 7. GAUTIER f. 2. BURBETTIN t. 22. f. 1.

(*u*) ALBIN. p. 174. t. XI. f. 21. CASSER t. I. f. 3. EUSTACHIUS.

(*x*) ZINN p. 249.

(*y*) PARSON p. 53.

(*z*) AVICENNA p. 12. L. I. *doctr.* I. *fen.* I. ubi dicit cartilaginem firmamentum esse musculi palpebræ. Unus est musculus palpebrarum reclusor, inquit THEOPHILUS c. 18. L. IV. Habet CARPUS p. CCCCXLVII.





NICIS, qui supersunt (a), legitur, obliquos musculos tarsis inferi. Restituti musculi gloriam sibi vindicat ARANTIUS (b), & FALLOPIUS (c). EUSTACHIO tamen VESALIUS (d) ipse tribuit.

Palpebra inferior minime immobilis est, ut scribi video (e). In vivo homine, & potissimum in sexu mobiliori, & descendere vidi, & duci ad angulum internum, & externum denique (f).

Nempe ab orbiculari palpebrarum, semper quidem duos, frequenter tres fasciculos aberrantes de inferiori ejus parte emitti reperi.

Eorum extimus ex vicinia ossis malæ descendit ad minorem zygomaticum (g), cumque eo ad labiorum angulum venit. Is palpebras una extrorsum ducit.

Alter fasciculus, pene æque perpetuus, etiam duplex, triplex, ab eodem, orbiculari interior priori, ad labium superius introrsum descendit (h).

Uterque potest orbicularem inferiorem deprimere.

Tertius intimus ad levatorem proprium labii superioris sæpe accedit (i). Hi duo palpebram deorsum ducunt, & introrsum.

Idem est depressor palpebrarum, qui a radice ciliorum ortus, inferitur angulo interno orbitæ, & circumdat palpebram inferiorem, dictus Bernandino GENGA (k). An est fasciculus accessorius orbicularis musculi Josiæ WEITBRECHT (l).

In

(a) De usu part. L. X. c. 9. ORIBAS. p. 178. 179. qui negat p. 181. se vidisse musculum anguli interni. Duos habebant sub initia restitutæ anatomes musculos superioris palpebræ, ut C. STEPHANUS p. 298. tum LOBSEEL de venibus p. 58.

(b) An. 1548. obs. c. 18. p. 67.

(c) p. 65. ad annum 1553. & ipsi tribuit CARCANUS.

(d) Romana diligentia excitatum se reperisse Exam. obs. FALLOP. p. 48.

(e) GALEN. loc. affect. L. IV. c. 2. ORIBAS. p. 180.

(f) Recte mobilem esse RIOLANUS p. 271. ANDRY orthoped. II. p. 105.

(g) LIEUTAUD p. 125. DOUGLAS append. p. 4. EUSTACH. t. 41. f. 1. ALBIN. p. 147. Est musculus exiguus cuti, genæ, & ossi nonnunquam malæ, adnatus, cuns ad orbicularem palpebræ GARENGEOT myotom. T. II. p. 158. & HEISTERI p. 174. & VERHEYEN t. 27. f. 1. & Adami KULMUS t. 28. Sed ii a nostra observatione differunt: & WEITBRECHTUS merum vult esse inferioris orbicularis fasciculum. Ad os jugale ducit BERTRANDI p. 83. DUVERNEY postb. p. 127.

(h) SANTORIN tab. I. o. p. 9. BERTRANDI p. 81. ad cutem genarum.

(i) ALBIN. p. 147. LIEUTAUD p. 125. DUVERNEY postb. p. 127.

(k) Anat. Chirurg. p. 189.

(l) Comm. Petrop. l. c. t. 15. f. 1. b.



In brutis animalibus frequenter inferior palpebra superiori mobilior est, ut in avibus (*m*), in gallopavone (*n*), aliisque; in serpentibus (*o*), etiam testudine (*p*). Noctuæ superior mobilior (*q*) est, struthioni utraque fere pari libertate (*q*\*) regitur, aliisque avibus (*r*).

Tertia palpebra suum habet motorem musculum (*s*), etiam in rana (*t*).

Voluntarium non (*u*) esse palpebrarum motum, & invito contingere passim legas, puto ex hypotheseos necessitate. Sed utique voluntati obediunt, etsi passim ex obscuro aliquo sensu molestiæ, nimixque lucis, cum exigua conscientia nostri moventur. Nolenti oculus clauditur, si metuit: nisi metuat, est sub imperio. Qui vero metuit, vult fugere malum. Inter multos gladiatores pauci absque nictando ictus intentatos excipere potuerunt, iique erant fortissimi (*x*).

§. XXVII. Orbita (*y*).

Ultimum hoc, proximum, & firmissimum oculi tutamen est, in homine, quam in ullo alio animale, quod ego noverim, tutius (*z*). Homini etiam major, quam ulli bestiarum orbitæ pars ossea est.

Orbitam dixerunt anatomici (*a*), infundibulum difforme, tamen ex angustia hætenus dilatatum, pene undique osseum, quod globum oculi, cum omni suo satellitio musculorum, nervorum, vasorum & plurimo præmolli adipe continet.

Trian-

(*m*) In universum ARISTOTELES *part. anim.* L. IV. c. 11. Plerumque COITER p. 130.

(*n*) PETIT *Mém. de l'Acad.* 1735.

(*o*) ARISTOTELES l. c.

(*p*) CALDESI p. 14.

(*q*) COITER. Utraque mobilis PETIT *Mém. de l'Acad.* 1735. p. 123. & 1736.

(*q*\*) VALISNER T. I. p. 249. PARISINI.

(*r*) PETIT l. c. 1735. p. 123.

(*s*) In casuario PARIS. Habet etiam PERRAULT in *Eff. de phys.* add. *Mém. avant.* 1699. T. II. p. 279. T. X. p. 607.

(*t*) JACOBÆUS.

(*u*) BERGER p. 314.

(*x*) PLINIUS L. XI. c. 37.

(*y*) Conf. orbitæ historiam WINSLOWI, CAMPERI a principio, & ZINNII c. 7.

(*z*) Vide in gallopavone PETIT l. c. 1735. p. 126. 127. 128. Semicartilaginea in vulture SCHEUCHZ. *Bresl. Saml.* 1726. p. 87. In cane PETIT *Mém. de* 1735. p. 126. &c.

(*a*) *Devis* RUFUS P. II. p. 67.



Triquetrum quid orbita habet (*b*), triaque plana triangularia: superius frontale, interius nasale, exterius temporale.

*Frontale* triangulum cerebro subjicitur, & ad posteriora modice cavum, qua cum temporali convenit, profundiores habet depressionem, in qua glandula lacrumalis major residet. In hac portione etiam foramen est nervi optici, in osse sphenoide insculptum.

Cum temporali triangulo futura perpetua conjungitur, & ad posteriorem sedem ab eo separatur hiato triangulari inæquali, extrorsum caudato, quæ *rima lacera* dicitur.

A nasali parte futura etiam continua separatur, & denique in glabellam desinit. In ea futura duo, triave foramina sunt, quæ introrsum arterias ducunt & nervos. Finis superior ora modice eminente, & cum fronte in aciem coeunte terminatur, in qua est incile pro vasis nervisque ad frontem exeuntibus.

Pars orbitæ *nasalis* plana est, & modice fere convexa. Eam primo os sphenoides\*, & exigua particula ossis palati (*b\**), inferius quasi adrepens, deinde os planum & commissum cum plano os maxillæ superioris, denique os unguis antèrèus profunde depressum, posterius planum efficit. A temporali parte hiato longe separatur, qui *rima spheno maxillaris* dicitur: antèrèus tamen recepta in orbitam ossis malæ parte perficitur. Ex ea rima plus quam media canalis ducit, qui infraorbitalem nervum & arteriam ad faciem transmittit.

Ora anterior etiam arcum facit, paulo magis convexum, sursum cavum.

Pars *temporalis* ab ala majore sphenoidea incipit, & ab osse malæ perficitur, modice excavata, & a frontali parte atque a nasali tum futuris, quas dixi, tum hiato separata. Et ipsa foramina habet, quæ in temporalem fossam nervos & vasa emittunt.

Orbitæ extrorsum respiciunt, ut in principio posteriori vicinæ antèrèus dissideant (*c*). Interius orbita longius procurrit, exterius brevior est, ut angulus exterior idem posterior sit (*d*).

Ajunt Eleuthis (Calmuccis) oculos magis distare (*e*).

Totam

(*b*) Vide ad hæc omnia icones ALBINI tab. off. I. f. I. SUE tab. 5. f. 2. CHESLE-  
DEN tab. 3. f. I.

(*b\**) DUVERNEY posth.

(*c*) WINSLOW L. IV. n. 206. Mém. de l'Acad. 1721.

(*d*) IDEM ibid.

(*e*) Saml. der Reisen T. VII. p. 89.



Totam orbitam propago duræ matris exterior vestit, quæ per foramen opticum & fissuram laceram advenit, porroque cum faciei periosteo continuatur. Parum firmiter adhærescit, ut solet ad ossa tenuiora (*f*).

## S E C T I O I I.

## O C U L U S.

## §. I. Globus oculi.

**O**culus in homine, & in omnibus animalibus mihi notis, pene similis est globo (*g*), tantum ut antèrius magis compressus sit, exque media ea diminuta convexitate aliquanto magis gibbum segmentum sphaeræ emineat, & præterea diameter ab anterioribus ad posteriora tendens paulo longior sit ea, quæ tendit a dextris ad sinistra (*b*). Anteriorem cæterum orbitæ sedem tenet, & interiorem, ut iris angulo interno propior sit (*i*). Magis convexus est in junioribus hominibus, & robustis, quibus humores sunt plenissimi, denique in quibusdam myopibus (*k*); minus in senibus & debilibus. Esse lego, ubi alter oculus convexior fuerit, alter planior (*l*).

Avibus (*m*), & piscibus (*n*) multo magis antèrius compressus est, piscibus etiam posterius (*o*). Animalibus nonnullis quadrupedibus magis quam

(*f*) WINSLOW L. IV. n. 295. ZINN. p. 158.

(*g*) BERTRANDI p. 52. Conf. etiam ZINN *Comm. Gott.* T. IV. p. 246. Excipe, quem dicimus, cancrum ægyptium.

(*b*) Jam ann. 1725. in *Mém. de l'Acad. des science* senior D. PETIT. Excedere semilinea. BERTRANDI p. 52. PETIT *Mem. de* 1726. p. 70. & linea ib. In ratione esse 136. ad 135. PETIT *Lettre que le crystallin est fort près de l'Uvée* p. 4. alterum enim axin facit  $11\frac{1}{3}$ . alterum  $11\frac{1}{4}$ . aut paulo minus. Ad  $\frac{2}{10}$ . pollicis oculi axin æstimat PEMBERTON *de facult. ocul.* n. 8.

(*i*) Una tertia TAYLOR p. 61.

(*k*) BERTRANDI p. 52.

(*l*) Le CLERC *Sistem. de la vision* p. 27.

(*m*) COITER p. 130. PETIT *Mém. de l'Acad.* 1726. p. 70. In ulula, milvo, & aliis avibus rapacibus, hæc convexitas adeo vehementer eminet, ut hemisphærium sphaeræ compressæ impositum referat. & pene cylindrum.

(*n*) GERING *de piscat. salm.* PETIT l. c. PORTERFIELD l. p. 65. Excipe Mustelam, cui cornea satis est globosa, neque minus quam quadrupedi.

(*o*) BERTRANDI l. c. PORTERFIELD. PETIT *ibid.*



quam homini convexus, ut talpæ (*p*), lepori, cuniculo (*q*), vesper-tilioni (*r*), & iisdem oculo posterius planiores sunt (*s*). Cuniculo & lepori præterea ad latera prominent (*t*).

Omnibus in animalibus pro sectionibus circulos habere lego (*u*). Sed invenio, apud idoneum auctorem, ægyptio cancro oculum antennæ longitudinem amplecti: & esse dimidia ejus antennæ longitudine (*x*). In ea figura num circulares sint sectiones, non certum est. Poterunt, si humores continent.

Magnitudo cæterum est fere in ratione inversa magnitudinis animalium. Balænæ (*y*), rhinoceroti, elephanto parvi sunt oculi, grandissimi infectis, etiam avibus (*z*), ut orbita in universum reliquo cranio; in nonnullis etiam ipse oculus cerebro major sit (*a*). Aquilæ prægrandes oculi (*b*), & gallo (*b*\*). Ex primis partibus corporis animalis iidem adolefcunt (*c*), & in pullo (*d*) enormi sunt magnitudine, dum in ovo est. Inter pisces etiam dantur, quibus oculi majores sunt, quam cerebrum (*e*), etiam in magna proportionem. Et in Chamæleonte orbitæ cavitas, quam cerebri, major est (*f*), & in rana (*g*). In masculis etiam animalibus lego majores esse (*h*) oculos, quam in feminis.

## §. II. *Nervus opticus, ejus conjunctio.*

Nervum opticum repetimus ab ea conjunctio, quæ est in fella equina. Ut de ea melius definiatur, oportet ostendere, opticum nervum species

- (*p*) ZINN *Comm. Gott.* l. c. p. 248.
- (*q*) DERHAM *phys. theol.* p. 91. his utrinque RAI *wisdom of god.*
- (*r*) HOOKE *Exper.* p. 82.
- (*s*) Hædis, bobus, equis BERTRANDI *ibid.*
- (*t*) PORTERFIELD p. 659.
- (*u*) IDEM l. c.
- (*x*) HASSELQUIST *resa til palestina* p. 430.
- (*y*) PEIRESC. *vit.* p. 295. Vide passim in RUYSCHIANIS *iconibus.*
- (*z*) HARVEI *gener. anim.* p. 56. &c.
- (*a*) IDEM *ibid.*
- (*b*) PEIRESC. l. c. ALDROV. l. 122.
- (*b*\*) Uncialis & ultra PLOT *natur. hist. of oxfordshire* p. 215.
- (*c*) MALPIGH. *form. pulli* f. 8. 17. 18. BUFFON T. III. p. 305. Vide de la formation du poulet T. II p. 161.
- (*d*) FABRIC. *Form. ovi* HARVEI p. 56. ARISTOTELES *gener.* L. II. c. 6. Cum faba comparat IDEM. *hist. anim.* L. VI. c. 9.
- (*e*) Ut 19. ad 2. in argentina STENONIUS *Act. hafn.* Vol. II. obs. 225.
- (*f*) PARIS.
- (*g*) CHESelden *tab. ad c. 8. osteograph.*
- (*h*) De hemerobio SWAMMERDAM *biol.* p. 244.



species visorias ad cerebrum deferre, sive, quacunque demum ratione peragatur visio, tamen eum sensum a nervo optico pendere (*i*). Id morbi ostendunt potissimum. A sanguine in nervo optico stagnante (*k*) cæcitas. Eadem a compressis nervis opticis (*l*), & induratis (*m*), & destructis (*n*), & diminutis (*n*<sup>\*</sup>). A tumoribus nervum opticum comprimentibus (*o*). A glandula pituitaria turgida (*p*). A lapide in eo nervo (*q*). Ab ulcere cerebri & nervo optico diminuto (*r*). Ab aqua nervum opticum comprimente (*s*). Ab hydrocephalo (*t*). A vulnere cranii & cerebri (*u*). A depresso cranio (*x*). A commotione, & sanguine sub cranium effuso, unde superabilis amaurosis, quam aliquoties vidi, & sanavi, post lapsus ab alto. Huc referas eas *guttas serenas*, quæ a lapsu natæ (*x*<sup>\*</sup>), aut venæ sectione & expurgata alvo sanatæ fuerunt (*x*<sup>\*\*</sup>). Vigesimo demum quinto die sublata (*y*) est ejusmodi in casu cæcitas. Adfines sunt homines, quibus ab ebrietate, distentis arteriis, nervo optico compresso, visus vitatur, aut perit (*y*<sup>\*</sup>).

Nunc in sella turcica nervus opticus dexter accedit ad sinistrum, cumque eo ita (*z*) conjungitur, ut neque solis membranis confluant, neque

X x 2

que

(*i*) Conf. L. X. p. 297.

(*k*) TRICHMEYER de polypo.

(*l*) DANKWERTS de paralyf. caus. p. 20.

(*m*) MORGAGNUS Epist. XVIII. n. 40.

(*n*) Essay on the tabes dorsalis. BOTALL de lue vener. c. 16.

(*n*<sup>\*</sup>) BONNET sepulchr. Sect. VIII. obs. 3. 5. 17. 24. KERKRING obs. 70. SCULTET obs. 36. BOTALL. lues p. 16. CHESLDEN anat. p. 225.

(*o*) HOVIUS de circulo per ocul. p. 119. Ab hydatide opticos nervos in conjunctione comprimente MEAD imper. sol. & lun. p. 103. Ab exostosi nervum opticum elidente BOERHAAVE de morb. ocul. p. 78. Ab infundibulo calcaria materia pleno, urgente eorum nervorum unionem HAEN VI. p. 271.

(*p*) VIRUSSENS nouv. system. p. 256. & HAEN in rat. med. VI.

(*q*) Zodiac. Med. Gall. I. p. 88.

(*r*) SCHARSCHMIDT Berl. Nachr. 1746. n. 26.

(*s*) KALTSCHMIDT propr. progr.

(*t*) TAYLOR p. 248. 349. KALTSCHMIDT in progr.

(*u*) AMAT. L. VII. cur. 32 in vulnere sincipitis. Ex ictu sclopetario BLANCAARD Jarrregister Cent. VII. n. 94. Ab alapa AMAT l. c. cur. 44.

(*x*) MEIBOM las. cran. la PRYRONIE Mém. de Montp. 1708. a lapsu & fisso parietali osse sinistro dexter labefactatus. Ab ictu in caput AMAT ibid.

(*x*<sup>\*</sup>) RIBE act. lit. succ. I. n. 9.

(*x*<sup>\*\*</sup>) RIBE ibid. Add. le FEVRE de vena sect. p. 73. Misc. Berol. T. VI. p. 64.

(*y*) Journ. de Médec. 1761. m. Dec.

(*y*<sup>\*</sup>) COWPER ad f. 28. append. BOERH. de morb. ocul. p. 75.

(*z*) Icon anatom. Fascic. VII. VESAL. L. VII. f. 13. EUSTACH. tab. 18. in figg. minor. le CAT p. 299.



que unice in crucem abeant, sed aliquo latiusculo spatio (a) confundantur totis medullis, quantum oculus distinguit: quod spatium etiam in homine non est brevissimum (b), fere quadratum, & in nonnullis animalibus etiam longius (c).

Ejusmodi unio in omni quadrupede reperitur, neque enim mustela debet eximi (d), neque credo serio LOESELIIUM vidisse nervos opticos non conjunctos (e). Sed etiam in frigidis quadrupedibus uniri adparet, quoties accuratior cura accessit, ut in rana (f), vipera (g), lacerto (h), chamæleonte (i), etiam in limace (k). Porro & in avibus (l) ii nervi confluent.

De piscibus frigidis dubitatur. Exstant Cl. viri, qui de plerisque (m), aut de omnibus (n) pronuntiant, non uniri (o). Idem tamen aliquos excipiunt (p), aut fatentur uniri, sed tantum in superficie (q). Ego in nulla piscium specie reperi non uniri; non quod jungantur, ubi de cranio exeunt, & sibi incumbunt. Quam primum vero radix posterior inter thalamos & tuberculum cerebri inferius proliit, maxima & luculentissima transversa trabe uniri constanter reperiō. Sed & thalamorum pars striata ab hoc nerveo funiculo unitur, tum alia superiori nervea chorda, quæ cum anteriori cerebri commissura continuatur.

In

(a) VIEUSSENS *tab.* IX. H. H. t. XV. potius nimis, tum le CAT f. c. Add. C. STEPHANUS p. 293.

(b) Add. ZINN p. 190. 191.

(c) Per 7. lineas in castore PARIS.

(d) E. N. C. Dec. II. ann. I. obs. 49. Sed emendat errorem MURALTUS *Vademec. anat.* p. 109.

(e) *De renib.* p. 59.

(f) PETIT *Mém. de l'Acad.* 1737. p. 151.

(g) CHARAS p. 20. t. 3. ad I L.

(h) In lacerto majori viridi ipse vidi.

(i) VALISNERI *Oper. omn.* T. II. p. 44. & PARISINI: Negabat PANAROLUS. BARTHOLIN. h. 62. Cent. II. & de Crocodilo *Jesuitæ Obs. de mathem.* p. 50.

(k) *Oeconom. Abbandl.* T. VIII. p. 796.

(l) In anseri COLLINS p. 1046. &c. In gallopavone PETIT *Mém. de l'Acad.* 1735. t. 6. f. 10.

(m) COLLINS p. 1046. &c. STENONIUS *myol. spec.* p. 109.

(n) WILLIS *de cerebr. & nerv.* p. 75. MONRO *Compar. anat.* p. 135. 136. BRIGGS p. 195.

(o) In raja COLLINS t. 62. f. 1. 2. 3. Asello t. 63. f. 2. Trocta f. 5. Cyprino t. 64. f. 1. aliis piscibus ibid. f. 5. t. 65. f. 1. 2. 3. 4. 5. 6. *tab.* 66. f. 1. 2. 3. 6. t. 67. f. 1. 3. 4. 6. t. 68. f. 4. t. 69. f. 1. 3. 4. 9. De hargo *Leipz. Oecon. Abbandl.* T. IX. p. 114.

(p) Lamiam STENONIUS, lucium piscem COLLINS *tab.* 70. f. 3.

(q) WILLIS l. c.



In iis animalibus, in quibus nervi optici uniuntur, quæri potest, num omnino unice se contingant, ut medulla, minime commista, dextri nervi ad dextrum oculum, sinistri medulla ad sinistram feratur.

Num contra in decussim ferantur, ut dexter oculus sinistram nervum opticum accipiat, sinister dextrum.

Num denique misceatur utraque medulla, & dexter oculus, & a sinistro nervo aliquam penum medullæ habeat, & perinde sinister a dextro.

Pro decussatione piscium exempla ( *r* ) sunt: & cancelli eremitæ ( *s* ). Nam & ipse variis in piscibus ( *s*\* ) sinistram nervum opticum dextro imponi, & absque mistura ullius fibræ ad dextrum oculum ire: sic dextrum, sed inferiori loco situm, in sinistram continuari vidi. CHESOLDENIUS etiam ex sinistri oculi vulnere, non sinistri, sed dextri lateris capitis dolorem, & paralyin supervenisse testis est ( *t* ), & per ipsam anatomen credit adparere Cl. PETITUS, vere sinistram nervum ad dextrum oculum venire ( *u* ).

Sed omnino contra eam hypothese plurima & antiqua, & nova exempla morborum militant. Ita in VESALIANA historia ( *x* ) dexter oculus & ante conjunctionem tenuior fuit justo, & post eam, cum sinister integer esset.

Deinde CÆSALPINUS ( *y* ) hominem vidit, cui dextri lateris oculus debili erat visu, & ejusdem, non sinistri, lateris nervus opticus marcidus, dexter bonus; & similis est historia Guerneri ROLFINK ( *z* ), & alia summi anatomici J. Dominici SANTORINI ( *a* ), & Cl. BERTRANDI ( *b* ). In cane cæco, nervus opticus in cæci oculi latere durior fuit, & gracilior ( *c* ), neque quidquam ultra conjunctionem morbosum.

X x 3

Hæc

( *r* ) COLLINS p. 1045. 1046. in lucio t. 69. f. 2. in pisce gurnard t. 70 f. 3. Add. in universum WILLIS p. 75 tum MONRO Compar. Anat. p. 135. 136.

( *s* ) SWAMMERDAM bibl. tab. XI. f. 9.

( *s*\* ) In iana etiam decussantur BARTHOLIN. Epist.

( *t* ) p. 294. 295.

( *u* ) Mémoir. de l'Acad. 1736. p. 70. Vide nuper. ex Cl. LAPBYRONIE repetitum experimentum.

( *x* ) p. 518. VALVERDA IV. c. 3. p. 311.

( *y* ) Quæst. méd. 10. L. II. & apud RIOLANUM p. 263.

( *z* ) De gutta serena c. 4. & LOESSEL apud BOHNIUM. Conf. MORGAGN. Epist. XVI. n. 14.

( *a* ) p. 64.

( *b* ) p. 66.

( *c* ) MORGAGN Epist. XVIII. n. 40.



Hæc cum ita se habeant, videtur sequi, recte antiquos (*d*) pronunciasse, dextrum oculum a dextro nervo optico, a sinistro finistrum facultatem sentiendi accipere, quæ etiam universæ scholæ (*e*) fuit opinio. Nam ante GALENUM fuerant, qui eos nervos decussari docuerunt, quos ipse quidem refutat (*f*).

Tamen aliquam conjunctionem multi Cl. viri adgnoverunt, ut intima natura nervorum uniretur, & aliqui etiam mistam; uti diximus, ab utroque nervo (*g*) utrumque oculum medullam habere persuasi fuerunt. Meatus certe confundi GALENUS (*h*) scripsit, ita fieri, ut uno meatu obstructo, spiritus omnes in alterum meent (*i*).

Argumenta ejus opinionis sunt, quod duobus oculis unum objectum videamus (*k*): quod uno oculo etiam alter moveatur: quod morbi ab uno oculo in alterum facillime propagentur, & inflammatio, etiam a vulnere nata, ab uno oculo ad alterum transeat: ipsaque cæcitas (*l*). Sinistro oculo vulnerato dexter paralyticus (*m*) fuit; Paralyfes chronicæ fere utrumque oculum immobilem reddunt (*n*). Addas, quod non alia causa hujus unionis faciendæ adpareat, quæ in hoc nervo unico exemplo adeo late per varia animalia dominetur. Dictum est etiam, solum animalium chamæleontem (*o*) oculos diverso modo movere, ut altero sursum, altero deorsum respiciat. Id fieri, quod ei lacertæ nervi optici non uniantur (*p*).

Horum

(*d*) GALENUS *de util. part.* L. X. c. 12. AVICENNA p. 16. b.

(*e*) GUIDO *de Cauliaco* p. 36. CAR. STEPHANUS L. II. c. 49. VESALIUS. COLUMBUS L. 8. c. 3. CASSERIUS l. c. c. 16. RIOLANUS in C. B. p. 719. [qui conjungi non confundi docet]. ROLFINK *diff. anat.* p. 713. BRIGGS in *nov. theor. vis.* HOVIUS p. 52. Le CAT p. 371. BOERHAAVIUS. PORTERFIELD, T. I. p. 192. T. II. p. 283. BERTRANDI l. c.

(*f*) IDEM *ibid.*

(*g*) NEWTON *Queries* n. 15. VATER *de visus vitiis.* TAYLOR *tab.* 5. f. 5.

(*h*) *De util. part.* L. X. c. 14. AVICENNA p. 16. b.

(*i*) ORIBAS. p. 44.

(*k*) GALENUS *ibid.*

(*l*) DEIDIER *des tumeurs* p. 222. MAGATUS *de rar. medic. vuln.* L. II. c. 21.

(*m*) MEIBOM n. 31. *de vulner.*

(*n*) HENKEL *Epist.* ad KESSELRINGIUM ex Cl. de S. YVES experientia. Add. MOR. GAGN. *Ep.* XIII. n. 19.

(*o*) PEIRESCI *vit.* p. 345. PARISINI. BARTHOLINUS *hist.* 62. Cent. II. FLACOURT *madagascar.* p. 155. SPON. *Voyage &c.* GODDARD *Phil. transf.* n. 137. VALISNERI T. II. p. 396.

(*p*) BARTHOLIN l. c.



Horum aliqua vera esse, aliqua aliam interpretationem admittere videntur. Quod uterque oculus una moveatur in homine, non adeo ab opticis nervis, quam a simili in utroque ob lucis varietatem, & objecti visibilis firum; oculi mutandi necessitate pendere videtur; nam & palpebræ una moventur, & pupillæ ( $p^*$ ), & oculus neque ab optico nervo musculi horum motuum auctores, sed a tertio, & quinto, & septimo ramos habent. Addunt, ex consuetudine ( $q$ ) utrumque oculum una moveri. Sed ii quidem debuerunt consuetudinis causam dixisse. Unicam imaginem procul dubio etiam infecta vident, quibus ostensum est, nervos opticos adeo numerosos esse, & nusquam uniri ( $r$ ), & in quibus denique, quod valde memorabile, nervi optici ex diversis truncis, etiam alias partes adeuntibus nascuntur ( $s$ ). Etiam simplex est soni perceptio, etiam si fit duabus in auribus ( $t$ ).

De Chamæleonte falsum esse ostendimus, ei nervos opticos non convenire ( $u$ ).

Aliquid tamen veri subesse ( $x$ ), morbi videntur suadere, & ipsa an-topia. Si enim natura simpliciter voluisset nervos opticos exterius & superficie tenus unire, id non confusis medullis, sed cellulosa aliqua facile fuisset obtinere, quæ in conjunctione utrumque nervum colligasset. Denique conjunctus utriusque oculi motus non a musculis, sed ab ipsa medulla opticorum nervorum conjuncta suum habet principium. Ostenditur enim a retina esse iridis constrictionem, quæ a luce fit. Sed iris oculi aperti absque luminis mutatione etiam dilatatur, quando clausi oculi iris augetur ( $x^*$ ), & in gutta serena, cum bono oculo, sæpe etiam cæci oculi pupilla contrahitur ( $y$ ). In piscibus stria transversa thalamos opticos conjungens, qua nervi optici exeunt, forte ejus unionis locum tenuerit. Varietatem in ea re esse, & nervos opticos alios sibi unice accumbere,

( $p^*$ ) PORTERF. II. p. 390. 391.

( $q$ ) PLEMP. *ophthalmogr.* l. IV. *propos.* 13. PERRAULT. PORTERFIELD I. p. 118. 119.

( $r$ ) De iis alias fusius *Sect.* IV.

( $s$ ) LYONNET *de la Chenille du saule* p. 561.

( $t$ ) PORTERFIELD I. p. 193.

( $u$ ) p. 184. Monuerunt jam PARISINI.

( $x$ ) Commistos describit PETITUS *Mém. de l'Acad.* 1726. p. 69. 70.

( $x^*$ ) PORTERFIELD II. p. 110. 113. FABRICIUS apud eund. II. p. 92.

( $y$ ) DUDDELL. *of the cornea* p. 140. WHYTT *vital. mot.* p. 114.



cumbere, alios distinctos manare suos ad oculos, nimix certe videtur inconstantix, neque naturæ moribus analogum (z).

### §. III. *Inde ad oculum.*

A conjunctione sua cum sodali nervus opticus in foramen ossi sphenoidi insculptum recipitur, indeque per orbitam magis antrorsum tendit, & extrorsum, & paulum deorsum (a).

Neque, ut fere in figuris, recta linea, sed aliquantum serpentina (b) fertur, tamen ut compensatis flexionibus rectus sit. Paulum idem comprimitur (b\*). Accedit autem ad globum oculi, eique se adaptat, in homine quidem satis memorabili portione interius (c), quam est axis longitudinis, ut pars globi oculi ad exteriora nervi multo major sit quam ea, quæ est ad interiora. Eam declinationem pleraque animalia (d) retinent, quæ redeat in vitulo, ove, fele, cane, equo (e), & plusculis in avibus (e\*) & piscibus. Lego tamen animalia dari, in quibus nervus pene (f) in centrum oculi, aut omnino in axin, & e regione lentis crystallinæ subeat (g).

### §. IV. *Fabrica.*

Eo diligentius hanc tradere oportet, quod nullus alius in corpore humano nervus similem fabricam obtineat. Et primo nervus opticus solus

(z) ESSCHENBACH *anat.* p. 969.

(a) ZINN p. 192. *Comm. Gotting.* T. III. p. 116.

(b) WINSLOW *Mém. de l'Acad.* 1721. p. 313. TAYLOR t. 5. f. 5. *Icon. anat. Fasc. I.* Ic. art. bas. cran. & Fasc. VII. t. 6. f. 2. ZINN l. c.

(b\*) An inde factum, ut scriptum sit ad unionem eundo nervos opticos diminui TAYLOR *Anat. du globe de l'œil* p. 26. & post conjunctionem majores fieri, ut in leone PARIS.

(c) EUSTACH. in *iconib.* t. 39. f. 2. 3. 4. 5. t. 40. f. 1. 2. 3. PLEMP p. 30. SCHEINER *nerv. opt.* p. 243. PEIRESC. *vit.* p. 291. SHARPE *schir. oper.* T. X. D. RAI *wisdom of god.* WINSLOW *Mém. de l'Acad.* 1721. p. 314. & *exposit. anat.* n. 227. PORTERFIELD *Ess. of a societ. at Edimb.* T. III. p. 170. BOERHAAVE *Prælect.* T. IV. p. 171. qui WINSLOWUM de eo invento monuit. S'GRAVEZANDE *tab.* 100. f. 5.

(d) Male in brutis ad latus inferi, in centrum in homine ARANTIUS c. 18.

(e) BOURGELAT T. II. P. 2. p. 149.

(e\*) Struthione PARIS.

(f) In lynce PARIS. apro Tayacu *Phil. transf.* n. 153.

(g) Phoca PARIS.



lus (b), quam longus est, ab eo foramine, quo de cranio exit, duram membranam ejusque laminam internam secum ad oculum fert, qua tamquam terete vagina undique continetur (i), molli tamen & flexili (i\*).

Sed imprimis pia membrana (k) in hoc nervo (l) manifesta est, unumque, etiam scalpello parabile, involucri efficit; quo totus iterum nervus, non ejus singuli funiculi, continetur, ut quidem in aliis fit.

Ex eo utique involucri subtilia (m) septula, cellulosa, prodeunt, & inter medullam dimissa, eam varie dividunt, neque tamen in conspicuos funiculos partiuntur, quales in aliis nervis reperiuntur. Quare expressa medulla nervus inflatus ficcusque (n) cellulofus adparet (o). Ea septa in nonnullis piscibus speciem plicati, & in se ipsum duplicati panni habere (p) dicuntur.

Denique in vagina, quam diximus, a pia membrana nata, medulla (q) continetur, in fetu medullæ cerebri similis, in adulto homine paulo durior, durissima in nonnullis animalibus, ut in aquaticis avibus. Fibrosos funiculos in homine nunquam vidi (r), qui sint aliorum nervorum similes, etsi aliquid est striarum in nervo longitudinem sequentium. In bubulo equidem oculo funiculi nervei a pia matre collecti manifesti sunt.

In

(b) FALLOP. p. 136. b. MORGAGNI *Epist.* XVI. n. 16. p. 184. 185. MERY *Mém. de l'Acad.* 1712. p. 256. &c. Duas tunicas nervi optici habet, nomina non dat RUYSCHIIUS *Thes.* I. *Aff.* II. n. 11. *Aff.* II. n. 1. *Epistol.* XIII. tab. 16. f. 4.

(i) Le CAT p. 371. ZINN *Comm. Soc. Gott.* T. III. p. 116. CASSER *tabb.* L. X. tab. 9. f. 1.

(i\*) In lamia nervos opticos, duros & cartilagineos esse scriptum fuerat RONDELETIO p. 391. Sed vere molles sunt *Mercur.* de France Decembre 1752.

(k) Conf. le CAT. p. 373. MERY *Mém. de* 1712. p. 255. 257. ZINN p. 193.

(l) Solo FALLOPIUS *obs.* p. 137. imprimis NICHOLLS p. 4.

(m) WINSLOW n. 255. MALPIGH. *Phil. trans.* n. 27. MERY l. c. p. 221. t. 13. St. YVES p. 16. ZINN l. c.

(n) MAUCHART *de cornea* p. 14. MERY p. 256.

(o) LEEUWENHOECK *Phil. trans.* n. 117. MERY p. 256. 257. *Ess. of à Societ. at Edimb.* T. II p. 388. Fibras dixit v. HORNE *de saliv.* diff. III.

(p) EUSTACH. *off. exam.* MALPIGH. *de cerebro* p. 8. *posth.* p. 25. in xiphia & thynno. Accusat plagii MALPIGHIUM SBARAGLI *vigil.* p. 5. Verum MALPIGHIUS alienis non egebat divitiis.

(q) FALLOPIUS p. 138. VID. VID. L. III. c. 2. MALPIGH. *de cerebr.* p. 9. MERY *Mém. de l'Acad.* 1712. p. 254. v. HORNE *duct. saliv.* III. Partes albæ LEEUWENHOECK l. c. Guttulæ quasi lactis, presso nervo prominentes MAJOR. *Colleg. Med. Cur. spec.* III. Nonne hæc fuit materies pultacea in equæ cæcæ nervo optico MURALT. *Vadem.* p. 223. & quasi substantia cerebri in bove *Phil. trans.* n. 108. & olim apud SPIGELIUM p. 186.

(r) Habet VESAL. *Chim. rad.* p. 187. ROSEINK. MALPIGH. Negat MERY p. 257.



In piscibus, etiam minutis, hæc sunt evidentissima, & perinde ut in illo magno pisce EUSTACHIANO, sic in minimis troctis laminae medullares complicatae in unum funiculum colliguntur; & similiter omnino in ardea ave nervus opticus parallelis plicis distinguitur. Sed etiam cellulosa tela laminae conjungens hic facillime conspicitur.

Cum plurimæ arteriolæ, alias dicendæ, per eam medullam aut ad oculum ferantur, aut ad ipsius medullæ naturam pertineant, pori (s) in nervo optico adparent, quando fissus per lineam ad axin perpendicularem secatur.

Inter eas arteriolas aliqua est major, quam & ipsam alias describemus (t), & cujus sectio majuscula olim veteribus innotuit. *Porum* (u) dixerunt, vel *meatum*, per quem species visivæ ad cerebrum veniant, in natura rei interpretanda non bene versati, etsi rem ipsam recte viderunt. Nam ejusmodi arteria, cujus lumen in dissecto nervo optico conspicuum superest, nunquam ab homine (x), neque a piscibus abest, quibus rotundus est nervi introitus, neque a quadrupedibus majoribus, etsi alii, vel GALENO infensores, quod alio loco rem quæsierint, negaverunt se vidisse (y). Meatus utique non est, neque radios potest transmittere.

Conciliat eas lites Cl. ZINNIUS (z), quod is porus utique demum ab insertione arteriæ centralis retinæ conspicuus sit, non prius, adeoque in vicinia tantum oculi adpareat.

Cate-

(s) RUYSCH l. c. *Epist.* XIII. tab. 16. f. 4. 5. *Thes.* X. n. 164. &c. WILLIS BRIGGS *ophthalmogr.* f. 6. Conf. PORTERFIELD *Ess.* T. III. p. 256. & MORGAGN. *Epist.* XVII. n. 39. ex porco.

(t) Conf. *Icon. Anat. Fascic.* VII. tab. 6. f. 2. 7. b.

(u) HEROPHILO primum *porus* dictus est, & EUDEMO GALEN. *de libr. prop. Hipp.* & *Plat. decret.* L. VII. c. 4. *de usu part.* L. X. c. 12. L. XVI. c. 3. *de caus. symptom.* L. I. c. 2. &c. ORIBAS p. 261. Vias ad oculos a sede animæ perforatas CICERO dixit *ruscul. quest.* L. I. & pridem meatus ab oculis ad membranas cerebri tendentes ARISTOT. *gener.* L. II. c. 6. Pinxit eundem *porum* in omnibus *iconibus* EUSTACHIUS. In camelo PARISINI dixerunt, & in lynce, & in catopardo Cl. DUVERNOI. Habet CORTESIUS *miscell.* I. p. 28.

(x) Habet EUSTACHIUS t. 40. f. 2. 3. 11. 12. *off. exam.* p. 227. SPIGEL. p. 187. PLEMP p. 30. SALZMANN *obs.* J. V. HORNE *duct. saliv.* III. RIOLAN p. 264. In origine cavos esse BARTHOL. *Hist.* 32. Cent. I. S. ALBERTI p. 30.

(y) BERENGARIUS p. CCCCLII. (de homine, & ad sensum) VESALIUS L. IV. p. 510. 518 *Chin. rad.* p. 181. COLUMBUS. FALLOPIUS p. 138. LAURENT. p. 579. CASSERIUS c. 16. DIEMERBROECK p. 497. J. M. HOEMANNUS in *idea phys. path.* BOHN p. 292. *Phil. transf.* n. 108. LEEUWENHOECK *Phil. transf.* n. 117. VIEUSSENS p. 159. In vacuo spatio hydrargyri non subit SCHÄCHER *admin. anat.* n. 41.

(z) p. 194. Vide *Fascic. Anat.* VII. tab. *ocul.* f. 2. 7. b.



Cæterum in omnibus animalibus, etiam minimis, pulpa nervea ad oculum venit manifesta, ut in apibus, muscis, erucis (a), cancellis (b), monoculo (c), tot filamentis distinctis, quot sunt oculi minores in majorem collecti (d). Simples fere semper sunt nervi, & absque ramis. In sepia tamen & ganglion faciunt, & ramos mittunt ad choroideam tunicam (e), & inter erucæ nervos opticos aliquis etiam aliud ramum edit (f), qui alias præter oculum partes adeat.

§. V. *Finis membranarum. Nervi optici. Sclerotica (f\*).*

Nervus opticus & in homine, & pariter in quadrupede, in globum oculi profunde se penetrat, quod alias fusius repetemus, eique per cellulosa telam accuratissime adglutinatur.

Ea vero sede, qua nervum opticum adnatum accipit, extimum ejus globi involucrum cum dura nervi membrana accurate connascitur. Id involucrum, album (g), ex cellulosa tela stipata componitur, absque conspicuis fibris, laminisve (h), densum & firmum, parvis vasculis (i), paucisque & minutissimis nervulis (k) percursum, parum adeo sensibile (l). Idem totum globi oculi complecteretur, nisi antea ei cornea membrana adaptaretur, cui recipiendæ rotunda, & paulum ovalis, adque nasi sedem latior sclerotica portio excinditur.

Pars scleroticæ posterior crassior est, in homine (m), & in quadrupedibus; antrorsum gracilescit, nisi quod ad muscutorum rectorum intersectionem paulum denuo crassior reddi videatur (n). Sed ea accessio a natura

Y y 2

tura

(a) In bombyce MALPIGH. p. 40.

(b) SWAMMERDAM t. XI. f. 9.

(c) SCHÆFFER grüne Armpolypen p. 29.

(d) STANCARI Comm. Bonon. T. I. p. 301.

(e) SWAMMERDAM p. 893.

(f) Apud LYONNET.

(f\*) Λευκος RUF. L. II. p. 54.

(g) ZINN p. 6. Columbæ tamen a succo, ut videtur, effuso tota purpurea est.

(h) IDEM p. 4. Findi macerando in fila intricata: coquendo in collam abire DUVERNEY I. p. 143.

(i) RUYSCH Epist. XIII. p. 11.

(k) n. 28.

(l) PORTERFIELD I. p. 139. Doler est a conjunctiva, vel a nervis inter eam & scleroticam migrantibus.

(m) WINSLOW n. 213. ZINN p. 7. MORGAGN. Epist. XVI. n. 32.

(n) RUYSCH thes. II. aff. I. n. 10. MORGAGNUS Epist. XVI. n. 39.



tura scleroticæ aliena est, neque vere ibi crassescit (o). In avibus antèrius crassior est, tenuis postèrius. In aquaticis lamina exterior membranacea est, interior cornea. Vim contractilem non aliam possidet, nisi quæ omnibus partibus corporis humani communis est. Ea facit, ut per vulnus oculi vitreus humor, & choroidea membrana, & retina exprimatur (p).

Nunc hanc membranam veteres (q) communi consensu habuerunt pro continuata super oculum dura cerebri membrana, neque ab ea opinione crediderunt sibi recedendum esse nuperi aliqui præcipui viri (r).

Quare priori seculo ceptum est dubitari de ea continuatione (s), cum duræ membranæ minor esset crassities (t), quam quæ scleroticam tunicam produceret; cum hujus fabrica, in avibus & piscibus, aliena a dura membrana videretur, & passim cartilaginea.

Quare scleroticam proprium (u) esse, & a dura membrana diversum involucrum plerique nuperi statuerunt, ut tamen eorum aliqui admitterent, super scleroticam a dura membrana exteriorem quasi crustam (x) conjici, aut certe cellulosam telam, quæ scleroticam ambeat (y).

Qui priorum dubia expenderat MORGAGNUS (z), tamen cum veteribus sensit, ut & in homine, & in cane, sclerotica a dura cerebri membrana continuaretur. Et est certe novum, quod hanc fabricam suadeat, experimentum. Cum enim interior, quam continuo (a) dicimus, scleroticæ lamina manifesto ex pia matre continuetur, valde fit probabile,

(o) ZINN p. 8. PETIT *Mém. de l'Acad.* 1726. p. 20.

(p) PETIT *Mém.* de 1728. p. 219. ZINN p. 5.

(q) GALEN. *de usu part.* L. X. c. 2. FABRICIUS c. 3. BARTISCH *Augendientz* p. 8. b. MOLINETTUS in *icon.*

(r) MORGAGN. le CAT *Histoir. de l'Acad.* 1739. p. 19. MERY *Mémoire. de l'Acad.* 1712. p. 255. etiam experimento producto.

(s) GUENELLON l. c. p. 323. Du HAMEL *corp. anim.* L. II. c. 5. quod ante cerebrum oculi involucria perfecta sint. VALSALVA *diff. postb.* II. n. 3. DUVERNEY *postb.* I. p. 143. WINSLOW n. 225. HEISTER *de choroid.* n. 2. ALBINUS apud LOBE' *de oculo* p. 14. KAAUW *perspir.* n. 56. HEUERMAN T. II. p. 823. ZINN p. 11. SENAC. &c.

(t) In balæna RUYSCH *Thes.* II. tab. I. f. 1. 2. 6. *Thes. max.* n. 51. RAV. *catal. rarior.* p. 37. DUVERNEY.

(u) FALLOPIUS. WINSLOW n. 235. ALBINUS apud MÖHRING *de visu* p. 33. KAAUW. *Physiolog.* Amst. edita p. 510.

(x) ALBINUS l. c. WINSLOW.

(y) ZINN p. 9. 10.

(z) L. c. n. 16. 17. Pro ea etiam opinione le CAT. p. 372. & *Hist. de l'Acad.* 1739. p. 25. GATAKER *of the eye* p. 42.

(a) n. 6.



babile, ut interius nervi optici involucrum interiorem oculi globo tunicam dat, ita exterius oculi velamentum ab exteriori optici nervi membrana esse.

Quandoquidem tamen nimis certi sunt nervi optici cum sclerotica limites (*b*); & cellulosa fila sunt, quæ nervum cum ea connectunt; & iis lente & cum patientia resectis foramen (*c*) in sclerotica membrana manet: neque cartilaginea membrana a molli involucro apte derivatur (*d*); & in plurimis animalibus nervus opticus scleroticam manifesto perforat, mutata sententia nunc video suum sibi que unice constans involucrum esse scleroticam, cui per brevissima cellulosa fila nervi optici involucrum jungatur.

Pars ejus velamenti nonnunquam etiam in homine ossea fuit (*e*).

### §. VI. *Lamina nigra sclerotica.*

Piam membranam tota antiquitas docuit in choroideam (*f*) tunicam continuari, neque præter rem. Recte omnino ostendit *Claudius Nicolaus le CAT* (*g*), involucrum nervi optici interius in laminam propriam scleroticæ abire, interiorem, tenuiorem, fuscam, ejusdem cum sclerotica longitudinis, quæ in juniore homine leviter, in adulto arte cum sclerotica conjungitur (*h*), & in aliis quadrupedibus similis reperitur. Interiorem autem aliquam piæ membranæ laminam esse, quæ choroideam producat (*i*), non invenio, & fatis adparet ne auctorem quidem

Y y 3

vidisse,

(*b*) ZINN. *Comm. Gott.* l. c. p. 119. 120. *tab. 1.* inter C. & P. *hist. ocul.* p. 10. 11. In anseri utrinque longa linea eminet in scleroticæ interiori facie, quæ finis est duri cerebri involucri.

(*c*) STENONIUS in *lamia myol. spec.* I. p. 102.

(*d*) Anseri dura, & pene cartilaginea est, & noctuæ ALDROVANDUS *paralipom.* p. 6. Noctuæ etiam SEVERIN p. 336. Cartilaginea pisces molæ I. PLANCUS *Comm. Bonon.* T. II. P. 2. p. 300. Xiphiæ SCHELHAMMER *Disp. de eo pisce.* Conf. MORGAGN. *Epist.* XVI. n. 40. in plurimis aquatilibus. In piscibus in universum STENONIUS *myol. spec.* GUENELLON *nouv. republ. des lettres* 1686. mars. Plane ossea in galeo PARISINI.

(*e*) BLAS L. VI. *obs.* 8. Emollita, cum alumine naturam duram recuperat DUVERNEY l. c.

(*f*) GALENUS *de usu part.* L. X. c. 2. Etiam nuper MERY *Mém. de l'Acad.* 1712. BERTRANDI p. 57. Negant WINSLOW, HEISTER *de Choroid. &c.* Evanescere ad initia globi oculi DUVERNEY l. p. 145.

(*g*) p. 373. add. *Hist. de l'Acad.* 1739. p. 19. 25. ZINN p. 11. *Comment.* p. 121 t. I. P. *Prim. lin. Phys.* n. 504.

(*h*) ZINN p. 6. 12. *Comm.* fig. cit.

(*i*) Le CAT p. 373.



vidisse, qui a solis vasculis & nervulis de lamina vera intus exeuntibus choroideam producat (*k*).

### §. VII. Cornea membrana.

Rectius huic soli hoc nomen reservatur, quod & veteres (*l*), & nuperi potissimum GALI, cum sclerotica communicaverunt; sola enim & pel-  
lucet, & laminis constat; in omni omnino animalium genere, cui sunt  
oculi, etiam in muscis (*m*), papilionibus (*n*), locustis (*o*), scarab-  
es (*p*), araneis (*q*) cancris (*r*), dura omnibus, & sicca (*s*), in  
crustaceis firmissima (*t*).

Figura ei circularis est, aliquanto tamen magis interior ad nares  
producta (*u*). Super scleroticam ita eminet, ut convexior sit (*x*), &  
tamquam minoris sphaerae segmentum majori oculi globo imponatur, tum  
in homine, inque fetu & juniori magis (*y*), tum in quadrupedibus (*z*),  
tum etiam magis in avibus (*a*) omnibus mihi notis, vel maxime in ra-  
pacibus (*a*\*). Definiverunt autem eam convexitatem, ut in homine  
diameter ejus sphaerae esset septem, &  $7\frac{1}{2}$ . &  $7\frac{3}{4}$ . linearum (*b*), cujus  
segmentum est cornea, octo vero lin. diameter ejus sphaerae, quam ocu-  
lus

(*k*) Ibid.

(*l*) Κεχροειδής RUFUS SUIDAS. II. p. 349. POLLUX p. 187.

(*m*) Ephemero PUGET *lett.* II. p. 82. muscae HOOKE *microgy.* obs. 77. apc SWAMMERDAM p. 490. 496. 497.

(*n*) PUGET f. 3. t. I. p. 118.

(*o*) IDEM *Journ. des sçavans* 1702. n. 5.

(*p*) SWAMMERDAM p. 336.

(*q*) HOOKE obs. 47.

(*r*) PUGET p. 109. SWAMMERDAM p. 206.

(*s*) LYONNET *insect. theol.* T. II. p. 29.

(*t*) PORTERFIELD *on the eye* T. I. p. 144. Soli tarantulæ mollis HOMBERG. *Mém.*  
*de* 1707. p. 351.

(*u*) WINSLOW n. 215. MORGAGN. *Epist.* XVII. n. 10. TAYLOR p. 20. SHARPE *tab.* X.  
D. ZINN p. 23.

(*x*) WINSLOW n. 215. FABRIC. P. III. c. 2. FALLOR p. 213. b. 214.

(*y*) PORTERFIELD I. p. 168.

(*z*) Lyncei PARISINI.

(*a*) In struthione & in universis avibus PORTERFIELD T. II. p. 160. MONRO *Com-  
parat. anat.* p. 114.

(*a*\*) Falcone, *Pæon & pyth. epist.* p. 342. aquila PARIS. ulula PETIT *Mém. de l'Ac-  
cad.* 1736. p. 117.

(*a*\*) In milvo & ulula repetii. Huic pene cylindrica est, tubique optici similis.

(*b*) MAUCHART *de cornea* p. 18.



lus ipse exprimit (c). Parum differunt mensuræ Cl. PEMBERTON, qui axin oculi  $\frac{2}{3}$ . anglic. poll. & corneæ sphæram  $\frac{5}{10}$ . facit (d), aut MARTINII, qui radium c<sup>o</sup>, 35''' æstimat (e).

Senibus (f), & presbyopibus, & nuper nato homini (g) planior est, & valde plana in piscibus (h), crassissima in fele est, in ardea tenuissima.

Cum sclerotica membrana oblique (i) conjungitur, ut subtus & interiorius cornea ponatur, sclerotica superius & exterius (k), & eadem antè super corneam producat, hæc autem postè sub cornea. Ita cornea postèrius latior est, sclerotica antèrius, & diversitas est fere decimæ partis lineæ. In ruminantibus res est manifestissima, & cornea antèrius scleroticæ quasi continuatur, postèrius oblique retrorsum adponitur. In lupo & mele cornea pariter intus longior est. In lepore sclerotica & antèrius corneam continet, & postèrius.

Post longam macerationem in aqua, & demersionem in fervidam, cornea & sclerotica secedit (l).

Ante corneam, antequam scleroticam velum a conjunctiva dimittitur, & ab epidermide. Id velum a sclerotic, a multa cellulosa tela separatur, in qua & vasa illa, vivo in homine notissima, decurrunt, quæ per inflammationem grandescunt; & perquam sensiles nervi. Cum cornea membrana idem velum pertinacius cohæret (m), ut tamen & cultro separari possit, & maceratione. Ante corneam diximus etiam epidermidem descendere (n).

## §. VIII.

(c) PETIT *Mém. de l'Acad.* 1728. p. 294. MAITREJEAN PORTERFIELD *Ess. of a Societ. at Edimb.* T. IV. p. 133.

(d) *De facult. qua ocul.* n. 8.

(e) *Optiks* p. 347.

(f) JURIN *distinct. vis* p. 147. le CAT p. 494. PORTERFIELD I. p. 168.

(g) MAUCHART *de cornea* p. 22. PETIT *Mém. de* 1727. p. 248.

(h) LEEUWENHORCK *Phil. transf.* n. 293. STENONIS *myolog spec.* p. 102. DERHAM *physico theol.* L. IV. c. 2. GERING *piscatur. salm.* SMITH *remarks* p. 11. PLANCUS I. c. p. 300. Excipio mustelam, cui satis est convexa.

(i) DIONIS p. 566. BRISSEAU p. 9.

(k) PETIT *lettre sur le cristallin* p. 5. *Mém. de l'Acad.* 1728. p. 297. pro vulgationi fabrica. MORGAGN. *Epist.* XVII. n. 19. PORTERFIELD *Ess.* n. 19. ZINN p. 23.

(l) Le MAIRE *de hypopyo.*

(m) PETIT *Mém. de l'Acad.* 1726. p. 710. conf p. 316. MORGAGNUS &c.

(n) p. 316. 317.



§. VIII. *Ejus fabrica.*

Etsi cum sclerotica tunica accurate unitur, & quasi alternis sæpe & receptis flammulis (o), non ideo tamen non diversissimam (p) a sclerotica fabricam habet. In cornea enim membrana pelluciditas perpetua omnibus in animalibus obtinet, quæ sæpe, & in avibus imprimis, & a morte superest, & in sicca (q) cornea; etsi alias, aut a fervida (r), & a ferro candente (s) pelluciditatem amittit, & ab adfufis spiritibus aut acidis (t), aut inflammabilibus: post mortem eadem opaca fit. In recens equidem nato homine minus pellucet, & aut rubro colore obscuratur (u), aut flavo, ut aliquoties vidi. Nitidissima est in pallo, qui ovo continetur. Eadem sensim per ætatem (x) obscuratur, & in senio glauca fit (y), & opaca. Hinc non perfecte pellucida claris viris visa est (z). Literas imposita manifesto majores repræsentat, minus equidem, quam lens crystallina: in cuniculo vel maximas.

Porro laminis (a) fit, quæ manifesto, quot libuerit, tres (b), quatuor (c), septem (d), quatuordecim (e), sedecim (f) scalpello ex ordine levantur, aut a morbo secedunt (g), cellulosis tenerrimis (h) filis conjunctæ. Earum laminarum pars crassior est in ambitu, pars tenuior

(o) ZINN p. 19.

(p) Recte MAUCHART *de unguis* p. 11. 12. FALLOPIUS p. 213. b. In galeo manifesto fere differt PARIS.

(q) MAUCHART *de cornea* p. 23.

(r) CUNÆUS *apol.* p. 42.

(s) IDEM *ibid.*

(t) IDEM *ibid.*

(u) PETIT *Mém. de l'Acad.* 1727. p. 247. & ZINN p. 24. Oculi toti rubri, CHROVET *Quæst. aquo.* p. 14. *de trib. tumor.* p. 22.

(x) Ab anno 16. DUDDELL *bornycoat* p. 67.

(y) CUNÆUS, DUDDELL.

(z) MAUCHART *de cornea* p. 28.

(a) RUFUS II. p. 55. VESAL. p. 803. ARANT. *obs.* p. 66. FABRIC. C. 2.

(b) In pisce GUENELLON l. c.

(c) MAUCHART *de corn.* n. 9. 10. ACHILLEINUS p. XIV.

(d) LEEUWENHOECK *arcan. nat. detect.* p. 17

(e) *Eph. Nat. Cur.* Dec. II. ann. 10.

(f) PAULI *progr.* a. 1721. ope siphonis WOLFIANI.

(g) MAUCHART *de ung.* l. c.

(h) ZINN p. 20. Fibris MAUCHART l. c.



maior in media (*i*) cornea. Crassior multo in fetu (*k*) ad lineam (*l*), & ultra (*m*), & una rugosa (*n*), in adulto homine vix superat  $\frac{1}{3}$ ''' (*o*). Septem atmosphaerarum pondus cum  $\frac{7}{10}$  tulit, priusquam rumperetur (*p*).

In avibus plerisque, qua cum sclerotica committitur, anulo continetur cartilagineo, aut osseo (*q*).

Cæterum hæ laminæ multo humore (*r*) inebriantur, five inter eas, & inter elementa solida effuso, five vasculis contento minimis, cujus guttulae post guttulas de poris (*s*) possunt exprimi (*t*), & de aciculæ vulnere sequuntur, & in moribundis exsudent (*u*), & sponte a morte exhalant (*x*), ut continuo & minus crassa fiat cornea, & una levior. Per eosdem poros ea membrana aquam sorbet, in quam dimittitur, & ea pota turgescit (*y*), & resorbta in vivo animale aqua, cum eadem nunc cum aqua habeat vim refringendi, definit esse speculum convexum (*y*\*). Eos poros ad adnatam tunicam retulit Vir ILL. (*z*), verum etiam post remotam adnatam supersunt.

Singu-

(*i*) ORIBAS. p. 38. PARIS in leone, lynce. BERTRANDI p. 55. hic  $\frac{1}{24}$ '' ibi  $\frac{1}{30}$ ''.

(*k*) ZINN p. 22.

(*l*) IDEM.

(*m*) Ad  $\frac{4}{3}$  usque, cum sit  $\frac{1}{3}$  in adulto PETIT *Mém. de l'Acad.* 1727. p. 247. 248. lettre p. 5.

(*n*) PETIT p. 255. &c.

(*o*) In adulto ad 2. & 3. duodecimas lineæ MAUCHART *de corn.* p. 15. Ad  $\frac{20}{20}$  pollicis WINTRINGHAM *inquiry* p. 256.

(*p*) In aquila HARDER *apiar* p. 63. BORRICH *hermet. ægypt. sapient.* p. 258. In vul-ture SCHUCHZER *Bresl. Samml.* 1726. p. 87. PARIS. In falcone PEYER & MUR. *epist.* p. 342. In noctua COITER p. 130. In struthione *Phil. transf.* n. 394. In gallo *coq in tien* PARIS. In columbo *Amst. colleg. priv. obs.* p. 39. In anate SEVERIN *zootom.* p. 317. & in universum in avibus MERY *Mém. avant.* 1699. T. II. p. 24. neque memini me excep-tionem vidisse.

(*q*) WINTRINGHAM *exp.* 50.

(*r*) ZINN p. 20.

(*s*) HOVIUS p. 83.

(*t*) STENONIUS *de musc. & gland.* p. 44. LEEUWENH. l. c. p. 76. WINSLOW n. 216. *Mém. de* 1721. p. 417. SCHARSCHMIDT *Berlin. Nachr.* 1740. n. 49. S. YVES p. 20. MORGAGN. *Epist.* XVI. n. 30. ZINN p. 21. BERTRANDI p. 54.

(*u*) MAUCHART *de ungue* p. 13. WINSLOW n. 214.

(*x*) PETIT *Mém. de l'Acad.* 1728.

(*y*) MAUCHART *de ungue* l. c. *de cornea* p. 23. PETIT *Mém. de l'Academie* 1728. p. 224.

(*y*\*) PORTERFIELD II. p. 127.

(*z*) SENAC *Ess. de phys.* ed. 1735. p. 691.



Singularis adeo natura corneæ est, & cum molliori ungue aut cartilagine simile quid habet. Eadem absque vasculis (a) est (b), quæ sponte sanguinem vehant, minora vero aliqua, quæ in singularibus exemplis, forte nondum satis certa (c) ex morbo inflammatorio (d) conspicua redduntur, ut etiam a contusione rubræ (e) maculæ in cornea nascantur. In ictero aliquando flavam sive bilem, sive sanguinis degeneris putrilaginem, in cornea videas. Vasculum Hovianum ramosum, ex glandula innominata ortum, nemo repetiit (f).

Nervos anatomicum artificium nullum in corneam usque membranam ducit: sed neque sensus signa aut homo edit, aut animal, quando vel DAVIELLI (g) artifex manus corneam dividit, ut opacam lentem extrahat, vel in experimentis acum in bestiarum corneam defigimus (h). Fatetur non sentire ille JAUSSE RAND (i), cui alius auctor videtur calamum rexisse, tum Cl. THURANT (k), & olim Theodorus MAYERNE (l). In cataractæ extractione non valde sentire dat WHYT-TIUS (m). Si frictionem corporum asperorum cornea percipere videtur (n), ad conjunctivam membranam, ut cutis propaginem, is sensus pertinet.

Vulne-

(a) Habere vascula rubra KENNEDY p. 21. Habet IDEMA van t'oog p. 15. PEYER parerg. p. 4.

(b) PETIT *Mém. de l'Acad.* 1727. p. 74. seqq. BOERHAAVE *morb. nerv.* p. 13.

(c) In nigrita & juvene PETIT ib. p. 73. an hæ lineæ a BERTRANDO dictæ p. 54.

(d) ALBIN. *Adnotat.* L. II. p. 8. (plurima dicit, & ramosa) BOERHAAVE l. c. v. SWIETEN T. I. p. 619. Habet *physiol. batav.* p. 296.

(e) PLATNER in *progr. ann.* 1735. GANDOLPHUS *Phil. transf.* n. 322. PETIT *Mém. de* 1727. p. 74. Ruberrimam se vidisse SKELTON de *ophthalm.* p. 10.

(f) *Fasc.* VII. tab. 7. f. 5.

(g) *Conf. oper. minor.* T. I. p. 451. 502. HOUSSET *lettre I. post obs.* 12. VERMARE *Journal de médec.* T. II. n. 6.

(h) *Exper. de part. irrit. & sensilib.* Sect. IX. exp. 204.

(i) p. 10. ex relatione tamen aliena, vult sentire.

(k) *Disp.* Ergo cataracta potius per corneam.

(l) *Prax. med.* p. 116.

(m) *Physiol. Ess.* p. 123. Testimonium pro insensibilitate corneæ inter eximendam cataractam exstat etiam in K. *svensk. vetensk. handl.* 1757. Trim. 2. & Cl. KEPHALIDIS in *der Fränk. Anmerk.* T. IV. p. 337.

(n) Sensilis est VANDELLI *Epist.* I. p. 38. seq. *Epist.* II. p. 238. WHYT *physiol. essays* p. 122. LAMBERTI p. 319. BIANCHI *Epistol.* p. 62. 173. LOTTIERI p. 295. Sensibilissima MAUCHART de *cornea* p. 20.



Vulnerata ex succo effuso pellucida renascitur (o), ut coram video, & late deleta nova redit, omnino ut epidermis.

§. IX. *Choroidea membrana. Origo.*

Cum oculus aliquot deinceps se subsequencia habeat involucra, eorum secundum *Choroideæ* nomine dudum innotuit, quod nomen *vasculosam* significat (p). Ut autem accuratius describatur, oportet dicere, quomodo nervus opticus oculum ingrediatur.

Contrahitur nempe sensim (q), inque coni mediam partem, non tamen in mucronem convergit, etiam dura nunc piaque membrana minor, quas deposuit.

Denique quando nunc angustior est, paulo antea nervi optici, ad oculum pertinentis, finis membrana orbiculari (r), cribrosa (s), obtegitur, propria, per cujus multos poros medulla (s\*) nervi conspicua ad retinam pergit. A sclerotica ea lamina non potest (t) provenire, etsi olim ita credidi, & ILL. viri. Prius enim sclerotica de nervo optico secessit, & in piscibus ad duas lineas prius, quam lamina ista oriatur (x). Deinde in porco, inque ibice, cui est evidentissima, vitri convexi ope manifesto adparet, cellulosa esse naturæ, & foramina habere vasculosa majora, minora medullosa innumerabilia. Sed etiam in aliis quadrupedibus cellulosa reperi. In mele rubra est, etiam in lupo perpulchra.

Z z 2

Ab

(o) ESSCHENBACH *var. anat. med.* n. 4. 5. *MAYERNE prax.* p. 115. *Phil. transf.* n. 453. BURRHI *de cerebr. & ocul.* p. 52.

(p) *Παροειδης* veterum eo pertinet GALEN. *de usu part.* L. X. ORIBAS. p. 40. POL-  
LUC II. c. 4. SUIDAE II. p. 349. A Choroide distinguit RUFUS, ut *παροειδης* magis sit  
iris, & *χοροειδης* magis choroidea *App.* I. p. 36. II. p. 55.

(q) MALPIGHI *de cerebro.* WINLOW n. 226. MORGAGNI *Epist.* XVII. n. 37. Le  
CAT p. 371. 372. f. 2. ZINN *Comm. Gott.* T. III. p. 127. MARTINE p. 355. qui fora-  
men scleroticæ fecit latum  $\frac{1}{17}$ ". p. 354. BERTRANDI p. 65.

(r) *Comm.* BOERH. T. IV. p. 168. & 141. ubi primum, puto, hæc lamina cribrosa  
dicta est, etsi non plene, tum melius *prim. lin.* n. 156. *Icon. Fasc.* VII. p. 42. ZINN  
p. 104. ALBINUS apud MOELLER n. 12. seq. f. 1. 2. An lamina? cujus ope choroidea in  
nervum opticum infigitur S. YVES p. 40. Habet & Cl. ZINN *de ocul.* p. 106. t. 1. f. 1.

(s) MOELLER l. c. ZINN ib. *Fasc.* VII. ibid.

(s\*) *Fasc.* VII. l. c.

(t) Ad eam referunt ALBINUS ap. MOELLERUM n. 12. MOELLER n. 14. *Physiol. ba-  
tav* p. 510. LOBE *de ocul.* p. 18. (a vasis nempe scleroticæ).

(x) ZINN *tab.* I. f. 1.



Ab ejus ambitu, piæque matris ad scleroticam reflexæ, sive membranæ fuscæ scleroticam oblinientis, choroidea celluloso, introrsum sensim arctiori, brevique textu adhæret (*y*) ad scleroticam, anuloque tumidulo de retina secedit, perfectumque circulare foramen etiam de oculo remota servat (*z*).

In avibus hæc aliter se habent. Nervus opticus nempe ad sedem anteriorem quidem semicirculo facto ad oculum accedit, & adhæret scleroticæ. Sed ad sedem internam, sive nasum, idem longe per scleroticam (*a*) & oblique se penetrat, ut in caudam abeat, quæ pene dimidium ad corneam iter absolvit, multo, quam nervus, gracilior, & continuo gracilescens. Ab ejus caudæ oris choroidea nascitur, tum a semicirculo nervi optici externo: intra choroideam a retina, ut alias dicetur.

Longe aliter in piscibus se res habet. Ea est ejusmodi & in magnis piscibus, ut in trocta lacustri, salmone, lucio, & in exiguis, ut in mustela, perca, repetita (*a\**). Nervus opticus ad ingressionem suam vix contrahitur, & potius in obliquam & dimidiam ellipsin dilatatur. Quam primum per scleroticam penetravit, adit choroideam, membranam nempe argenteam, puram, tum qua scleroticam respicit, tum interius, qua proximam membranam. Ad aliquam inde distantiam, plus linea in trocta, oritur tenera membrana, vasculosa (*a†*), rubra. Vasa sunt rubra, arteria nempe, & vena ramosa: quæ scleroticam perforarunt, & circumflexa, atque continuo divisa, & subdivisa, in carnosam pulsam circularem abeunt. Ea pulpa membrana propria tegitur, & microscopio inspecta columnis brevibus, planisque sit ruberrimis, denso ordine erectis, quæ ipsæ paulo post, membrana sua liberatæ, in RUYSCHIANAM continuantur. Recens fabrica gelatinæ rubræ similis est; siccior paulum, & spiritu vini confirmata, veram carnem refert, laminatam & fibrosam.

Inde proxime retinam, ut nervum opticum in ejus origine quasi strangulet, oritur RUYSCHIANA nigerrima, nigro unguine ita plena, ut etiam

(*y*) IDEM *Comm. Gott.* III. p. 124. 125. *de ocul.* p. 38. 39.

(*z*) IDEM *de ocul.* p. 39.

(*a*) Habet iconem & descriptionem hætenus PRTIT *Mém. de l'Acad.* 1735. p. 144.

(*a\**) Nunc etiam reperio apud GUENELLON *nouv. de la Rep. des Letr.* 1686. p. 322.

(*a†*) Habet etiam GUENELLON *ibid.* f. 5. 6.



etiam retinam circa nervi optici ingressum undique inquinet. Ea albo celluloso circulo, ad aliquam a nervo optico distantiam, circumdatur; & tum demum adnexam scyphum vasculosum accipit, & paulo post argenteam choroideam, cumque ea connascitur.

Quare Choroidea a pia matre non potest oriri (*b*), cujus alius finis sit: neque ab ejus altera lamina (*c*), sed neque a sclerotica (*c\**) a qua interposita pia separatur.

Hæc Choroidea membrana, mollis, vasculis numerosissimis picta (*d*), secundum scleroticæ tunicæ interiorem superficiem pergit circa globum oculi, parallela, vicina, & laxa, tamen manifesta cellulosa tela (*e*), & vasis nervisque cum sclerotica connexa. In ea cellulosa tela animalia aliquando adipem (*f*) habent effusum, & humana cadavera aquam (*g*). Color in fetu & homine recens nato ruber est, cum vasis sanguine plenis (*h*); in adulto homine exterius fuscus (*i*), cum colore uvæ nigræ mistus, ut tamen per ætatem sensim expallescat (*k*).

Interior facies, obversa retinæ, & ab ea tota libera (*l*), interius perinde fusca est, & pigmento nigerrimo (*m*) passim, in fetu magis, minus in fene, obducitur. Eadem in animalibus non ubique fusco mucro obducitur; sæpe dum vivunt, vivide glauco aut flavescente (*n*), unde *tapeti* (*p*) nomine olim PARISINI ACADEMICI distinxerunt. Non splendet in homi-

Z z 3

ne

(*b*) GAERN. *de us. part.* L. X. BOERHAAVE T. IV. p. 141. Monet, & recte Cl. ZINN *Comm.* cit p. 125.

(*c*) Le CAT p. 373.

(*c\**) LOBBE 18.

(*d*) Earum historia dicetur cum arteriis & venis oculi.

(*e*) Conf. & ZINN *de ocul.* p. 28. In milvo manifesta.

(*f*) STÆHELIN *Spec. anat. bot.* ann. 1721.

(*g*) ZINN p. 29.

(*h*) IDEM p. 33.

(*i*) De sede ejus fuscedinis ZINN p. 32. quam ponit in cellulosa tela.

(*k*) IDEM p. 33. PETIT *Mém. de l'Acad.* 1726. p. 78. 79. BERTRANDI p. 58. Conf. *de tapeto.* ZINN p. 44.

(*l*) Etiam ibi effusa aqua ZINN p. 30.

(*m*) IDEM p. 33. MORGAGN. *Epist.* XVII. n. 12. WINSLOW n. 219. MONRO *Comp. anat.* p. 8.

(*n*) In leæna PARIS. p. 27. isabelleo colore. Viridi in ove. Viridi aurantio & argenteo in bove, alias splendido ex nigro, cæruleo, aureo, viridi, & glauco varia. Flavio argenteo in fele cum nocturno nitore BUFFON l. c. T. VI. p. 9. In cuniculo albo ex alba rosea etiam adest teste olim IDEM p. 27. & DUDDELL *supplm.* p. 20 tum in nigrita albo *Hist. de l'Acad.* 1740. n. 5. & in puero non male vidente tamen presbyopi DUDDELL ibi p. 19. Negabat Cl. PORTERFIELD l. p. 152. bonum visum iis animalibus esse, quibus tapetum sit.

(*p*) In leæna.



ne ( *q* ), avibus ( *r* ), urso ( *s* ). Cellulosis, subtilissimis flocculis undique villosa est ( *t* ), & in ruminantibus rugis serpentinis eleganter vermiculata. In lupo rotundis particulis distinguitur, quasi cellulatum; in cane villosum nigrumque.

Alia etiam, quam olim repetimus, vasorum ( *u* ) in ea pagina fabrica est, interius recta, exterius vorticosa & arbusculata.

Cum adeo in aliquibus bestiis ( *x* ), & nonnunquam in ipso homine ( *y* ), anterior Choroideæ pagina a posteriori possit separari, & manifestior adhuc in iride sit laminarum distantia, *Henricus RUYSCHIUS* ( *z* ), in patris honorem hanc internam laminam *RUYSCHIANAM* dixit, & ita auxit inventum *Hovius* ( *a* ), ut quinque faceret choroideæ laminas, quarum secunda vortices contineret, quarta esset *RUYSCHII*.

Sed illa quidem *RUYSCHIANA* tunica nulla vera cellulosa tela a Choroide separatur ( *b* ), & vasa *RUYSCHIANÆ* sunt a vasis choroideæ.

Denique lamina quidem exterior choroideæ tunicæ cellulosa tela efflorescente magis & magis obducitur, quo fit corneæ membranæ propior, ut tandem tota albo tomento obducta, ad scleroticæ cum cornea limitem & in homine ( *c* ), & in animalibus mihi notis, in latiusculi, albi, mollisque circuli speciem cohærescat; non tenacissimo vinculo, neque intercedente, quin tamen dorso scalpelli non valde difficulter separet ( *d* ). *Orbiculum*

( *q* ) *MONRO Compar. anat. du HAMEL.*

( *r* ) Fuscam esse *du HAMEL Corp. anim. L. II.*

( *s* ) *Phil. transf. n. 377. in coati mundi, tum PARIS.*

( *t* ) *ZINN p. 43. Comm. Gotting. T. IV. p. 255. le CAR p. 374.*

( *u* ) *ZINN de ocul. p. 46. 47. tab. 1. f. 1. compar. cum t. 3. f. 2. & t. 4. f. 2. RUYSCH Epist. XIII. t. 16. f. 8. 9. 10., Thef. II. aff. I. n. 4 HEISTER. p. 15.*

( *x* ) In equo *BOURGELAT l.c. in leæna PARISINI. In ove VERHEYEN p. 248. In balæna RUYSCH apud HEISTER p. 7. In asello GUENELLON in nouv. de la republ. des lettres 1686. & prior ALLEN. MOULINS p. 59. In variis animalibus MORGAGNI Epist. XVII. n. 3. In lupo expertus sum, & in ove.*

( *y* ) Admittit *HEISTER, WINSLOW n. 218. BERTRANDI p. 62. FABRIC. Anat. pract. p. 132.*

( *z* ) *Epist. XIII. p. 13.*

( *a* ) *Hov. p. 181. &c. Conf. Judicium HEISTERI in vindic. n. 156. seqq.*

( *b* ) Unicum facit *AEBINUS apud LOBE' p. 19. n. 39. 40. HEUBERMANN n. 732. Nos in prim. lin. ZINNIIUS p. 51. 52.*

( *c* ) *Fasc. VII. t. 6. f. 5. 6. Conf. & ZINN p. 29. deinde p. 54. t. 3. f. 2. k. & de fig. ciliar. p. IV. & Comm. Gott. T. IV. p. 254.*

( *d* ) Nervulos eo loco ad scleroticam euntes, vinculum facere putat *BERTRANDI p. 64. certe in avibus.*



*biculum ciliarem* (e) dicimus: ut ligamenti nomen ad aliam partem referretur (e\*).

In omnibus animalibus sclerotica, aut cornea, ejusmodi fusca atque choroideæ simili membrana intus sublinitur, etiam insectis (g), nisi is mucus est.

Sensilem esse facile credas, cum nervis abundet (h).

### §. X. *Iris. Uvea.*

Plerique scriptores anatomici (i) anulum circularem, perforatum, qui sub cornea pellucida est, a choroidea tunica deducunt: etsi alium ductum sequitur, & angulum pene rectum cum choroidea facit. Addi potest, dari animalia aliqua (k), in quibus iris anterior de scleroticæ limite fecedit, quam est orbiculus ciliaris. Ita persuasum est Cl. nuperis incisoribus, ut iridem peculiarem membranam facerent (l). Mihi tamen evidenter in bove Choroidea & RUYSCHIANA visæ sunt paulatim in plicas abire, quæ in iride rectos in radios, in RUYSCHIANA tunica in ciliares radios lenti impositos continuantur. In *posthumis schedis* similem CASSEBOHMI adfirmationem reperio. In avibus latior orbiculus ciliaris est, & antè magis elatus, quam aut choroidea, aut iris. In eum exterius pallida nunc choroidea adhæret, & ex eo iris ita exit, ut aliqui flocculi cinerei orbiculi in iridem pergant, & in milvo continuitas iridis cum choroidea manifesta sit (l\*). Posterius RUYSCHIANA cum corpore ciliari cohæret, circulo tamen continuo quasi futura limbusque interponitur utriusque. In piscibus choroidea argentea, punctata, manifesto

(e) MAITREIBAN c. 3. p. 23. c. 13. p. 51. Ligamentum ciliare VESLING. p. 202. WINSLOW n. 218. LIBOTAUD p. 128. Coronet DUDDELL *suppl.* p. 62. Habet & PETIT apud PALFYN. Est ligamentum iridis TENON. *disp. de catar.* p. 3. f. 1. E. F.

(e\*) Prius jam adhæsit, certo in parte media & laterali, sed perfectus circulus serius superius & inferius nascitur O HALLORAN.

(f) n. XV.

(g) SWAMMERDAM. p. 492. 493. In aranea POWER *obs.* 9. siquidem pupillam habet, & iridem.

(h) JAUSSE RAND p. 10.

(i) Etiam nuperi, ut le CAT p. 174. FERREIN apud DAUBENTON T. III. p. 236.

(k) Majora ZINN *Comm. Gott.* T. IV. p. 255. Noctua.

(l) Negat ZINN *Comm. Gott.* T. IV. p. 255. & *de oculo* p. 99. 100. 101. sed dubius certe, ut paulo post adfirmet, esse a facie interna RUYSCHIANÆ p. 100. Negat OEHM *de amaurosi*, cujus *disp.* auctor, ni fallor, GUNZIUS fuit. Ad orbiculum ciliarem choroideæ finem esse MÖHRING *de visu* p. 36.

(l\*) In noctua flavis vasis a choroidea oritur.



manifesto in iridem continuatur, per circulum orbiculari ciliari similem: neque obscura est uveæ vasculosæ cum RUYSCHIANA conjunctio.

Oritur adeo Iris ex orbiculi ciliaris sede, ejusque anteriori circulo, posteriori tamen in plano, quam ciliaris orbiculi est superficies.

Inde recta introrsum procurrit, facitque circulum subtensum sphaeræ segmento, quod est cornea: tantum ut ad nasum aliquanto brevior sit, & ad tempora longius producat (m).

Num convexus (n) sit is circulus, dubitatum est (o). Mihi in fetu, etiam in infante nuper nato, & in animalibus non paucis evidentissime visus est convexus esse (p). Accedit tamen cum aliquo dubio ad PETITUM ZINNIUS (q).

Denique in homine in lucem edito iris (r) circulari foramine ex naturæ lege perforatur, iterum ad nasum aliquantum productiori (s), quod ipsum a reflexa insipientis imaginis pupilla aut pupula dicitur, diametro variabili, ad sesquilineam tamen æstimato (t). In ruminantibus rima eadem transversim oblonga est (u), in animalibus nocturno visu valentibus gracilis, tum in homine nonnunquam (x), aut alterius figuræ (y). Etiam avibus & piscibus pupilla est, non vero insectis (z), secundum optimos auctores.

Ab ea sede replicata in se ipsam membrana iridis parallela, similisque, versus orbiculum ciliarem redit, pariter eo loco & cum cornea, & cum choroidea

(m) WINSLOW *Mém. de l'Acad.* 1721. p. 317. ZINN p. 82. BERTRANDI p. 57. TAYLOR p. 23. 24.

(n) WOOLHOUSE de glaucom. p. 73. WINSLOW *Mém. de l'Acad.* 1721. p. 367.

(o) In homine negat PETIT, & planum facit *Mém. de l'Acad.* 1728 p. 217. ann. 1723. p. 44. seqq. Verum potuit Cl. viri mentem flectere causæ necessitas. Volebat posteriorem cameram oculi quam minimam.

(p) Fatetur PETIT l. c. 1728. p. 212. 213. seqq. Vidi in cuniculo, in fele Valde convexam facit Sylvester o HALLORAN of the cataract. in suis figuris. Hinc pupillam canalem conicum truncatum dixit KRUGERUS *physiol.* p. 639.

(q) p. 84.

(r) Ob membranam pupillarem.

(s) Circulare perfecte ZINN p. 83.

(t) PETIT *lettre* p. 5. & *Mém. de l'Acad.* 1725. Ad 3<sup>um</sup> dilatatur IDEM.

(u) GRISLINI in præf. de usu zootomes p. XXXIX. & in equo BOURGEOIS p. 43.

(x) MAJOR *progr.* p. 16.

(y) PLEMP *ophtalmogr.* L. III. c. 3. *Act. basn.* Vol. I. obs. 30.

(z) SWAMMERDAM *bibl.* p. 492.



choroideā membrana connexa. Ita duplex pagina nascitur, ut iris olim a *Jacobo SYLVIO* pro *duplata* choroide habita sit (*a*): in duas tamen membranas difficiliter in homine dissolvitur, in piscibus certo & evidentissime vel scalpello.

In anteriori lamina iridis eminet natura flocculenta (*b*), varie in flammulas quasdam introrsum euntes disposita, quibus aliqua est similitudo rotundorum arcuum, ad centrum pupillæ convexorum. Quivis flocculus est serpentinarum striarum introrsum convergentium, & intermistarum macularum fuscæ congeries: conjuncti vero flocculenti fasciculi arcum quasi ferratum, eminentem, ad aliquam a pupilla distantiam efficiunt, qui convexus eminet, quasi antrorsum, supra reliquum planum pupillæ elatus. Fabricæ pulchritudinem nulla (*c*) icon exprefferit. In fele & in ibice nihilo, quam in homine deterior est. In bobus hi radii rectiores sunt, & in radios similes anuli minoris continuantur. Intimus circulus (*e*), & proximus pupillæ, habet ejusmodi, sed minus evidentes flocculos radiatos (*f*), ad microscopium pariter conspicuos, eosque breviores, ex priorum arcuum convexitate natos, cæterum similes, & ejusdem coloris, cum basi membranacea coloris fusci (*g*).

Ab his flocculis ostendimus, colorem iridis pendere (*b*), ut aliqua tamen pigmenti nigri, vasculorum & nervorum, in producendo colore sit portio. Ex striæ, quando pupilla laxa est, magis serpentinæ, contra pene rectæ fiunt, quando iris arctatur. In ora pupillæ crassioribus & fuscis quasi ansis desinunt. Eadem strias serpentinas paulo aliter, quam nos, descripsit *Cl. ZINNII*, ut introrsum quidem convergerent, versus aciem iridis, ad aliquam vero ab ea acie distantiam divaricatæ & bifidæ

(*a*) *Isagog.* L. I. p. 21. Unicam facit *TENON.* p. 3.

(*b*) Flocculos habet *BUFFON* l. c. T. II. p. 521. *ZINN* p. 84. 97. *Epist.* p. 22. *sqq.*

(*c*) Pro vasculis videtur describere *BERTRANDI* p. 63. pro fibris *ZINNII* t. 4. f. 1. Hæ sunt fimbriæ laceræ, habitæ pro literis hebraicis, & miraculo aliquo *Phil. trans.* n. 67.

(*e*) *DRELINCOURT prælud.* p. 195. *ZINN* p. 84. 85. 88. *RUYSCH Thes.* II. tab. I. f. 47.

(*f*) *RUYSCH* *ibid.*

(*g*) *ZINN Comm. Gotting.* T. IV. p. 258.

(*h*) *IDEM* *ibid.* p. 257. *de oculo* p. 97. *Fascic. icon. nostr.* VII. p. 43.



fidæ (*i*) in circulum abirent ferratum, & flexuosum, ex quo aliæ minores obscurioresque striæ (*k*) ad centrum pupillæ exeant, faciantque anulum minorem iridis pupillæ circumductum, fuscum. Hactenus nempe differo, quod in circulo minori evidenter pariter lineæ sint serpentinæ, & quod musculosum (*l*) in iis nihil quidquam adgnoscam

Color (*m*) eorum flocculorum varius est, indeque iridis nomen natum est. Regionum borealium incolis solet cæruleus esse (*n*), aut pallide cinereus, Calidarum regionum cives habent saturatam spadiceum (*o*), qui idem choroideæ color est, & pene nigrum: isque color in septentrionem superiori ævo progressus, nunc per Germaniam & Angliam non rarus invenitur (*o*\*). Dantur & dicori, quibus diverso in utroque colore (*p*) est. Albis nigritis est roseus (*q*), & nonnunquam Europæis (*r*), tum albis cuniculis (*s*). In animalibus vividi sæpe iridis colores sunt: in lupo, fele, noctua flavus, qui noctu luceat, in piscibus aureus, argenteus, in rana aureus (*s*\*).

Uvæ facies posterior, quæ lenti crystallinæ respondet, pigmento (*t*) nigro plurimo obducitur, quod pellucens se ad colores iridis hactenus admiscet, ut tamen certum sit, fuscum colorem in ipsis flocculis residere. Uvea multo simplicior, & purius membranacea, neque flocculosa est, nisi in animalibus nonnullis, ut in ibice.

Eo pigmento eluto, melius post macerationem, & minus bene in recentibus corporibus, adparent in uvea membrana striæ (*u*) rectæ, elevatae, explicæ

- (*i*) p. 87.  
 (*k*) p. 88.  
 (*l*) p. 91.  
 (*m*) Iris inde RUFO. In rana aurea est.  
 (*n*) Eum colorem naturalem esse BUFFON *Hist. natur.* T. II. p. 469.  
 (*o*) Hinc Gallos esse walliæ incolas ex oculis nigris demonstratur BIRCH T. IV. p. 549.  
 Conganis tamen caecos etiam dari PIGAFETTA p. 6.  
 (*o*\*) Mississippianis nigri fere absque iride *Relat. des voy. au Nord.* T. V. p. 289.  
 (*p*) BLANCARD *Jaarreg.* T. IV. n. 75 ARISTOTELIS *gener.* L. IV. c. 1.  
 MONCONIS *voy.* II. P. 2. p. 21. BORELL. II. *obs.* 63.  
 (*q*) *Histoir. de l'Acad.* 1741. n. 5. 734. p. 15. 16.  
 (*r*) DUDDILL. *supplem.* p. 19. Radii albi & tribui.  
 (*s*) BUFFON *Hist. naturel.* T. VI. p. 316.  
 (*s*\*) Lucere RONDELLET II. p. 219.  
 (*t*) ZINN p. 85 &c. *Epist.* p. 23. PORTERFIELD II. p. 211. &c.  
 (*u*) ZINN p. 85. RUYSCH. *Thef.* II. *aff.* I. n. 7 *tab.* I. f. 4. 7. PALLUCCI *de cataracta* *tab.* 2. f. 1. 2. BERTRANDI p. 59. WINSLOW n. 220. TENON. f. 1.



ca ( $x$ ) factæ, ut videtur, adfurgentis membranæ, quæ a sede secedentium nodulorum ciliaris corporis introrsum, in ipsam aciem uveæ, & ad pupillæ foramen continuantur, tantum quod in homine, neque in omnibus animalibus ( $y$ ), ad aliquam ab acie uveæ distantiam paulo obscuriores sint, & zonam faciant interiorem, minus evidenter radiatam.

In circulo illo interiori, minus flocculento, iridis & uveæ voluerunt, certe ex hypothese, plurimi scriptores fibras esse, in circulum circumductas ( $z$ ). Verum eas sæpe & myopibus meis, cætera bonis oculis, & lentibus vitreis vehementer augmentibus adjutis cum quærerem, nunquam ( $a$ ) reperi ullas, & absque usu vitri convexi in bubulo oculo, & in humano, radios similes & concolores ( $b$ ) per zonam pupillæ proximam vidi continuari.

Sed etiam rectas fibras, quas in uvea modo diximus, secundum Cl. viros omnino carneas esse, & aperire pupulam ( $c$ ), nondum quidem ego ausim admittere: Nam per experimenta sollicitè capta ( $d$ ), iris in vivo animale irritabilitate omni destituitur, ipsisque a lucis radiis, per conum chartaceum in solam iridem determinatis, non movetur ( $e$ ); sed mu-

A a a 2

sculo

( $x$ ) Non solum in bove & balæna, in quibus ZINNIIUS, sed in avibus. In lupæ striæ valde manifestæ sunt.

( $y$ ) Non in avibus, ubi ad intima veniunt.

( $z$ ) RUYSCHIIUS alias paucas, duas, tres recepit *Thef.* II. tab. I. f. 5. alias fere ex conjectura proposuit ibid. n. 5. Alias firmiter adseruit *Aff.* III. n. II. Ex vitulo dixit *Aff.* II. n. 7. & ex balæna *Thef. max.* n. 81. Sed etiam RAVIUS habet apud VALENT. & HBISTER. de choroidea, & DUVERNEY II. p. 146. & CHESLENDEN *Anat. of hum. body* p. 292. & BRISSEAU p. 8. & BERGER *nat. hum.* p. 405. & S. YVES p. 15 & TAYLOR, & PETSCHER *diff.* n. XI. & Cl. BURTRANDI p. 59. & WINSLOW n. 210. & PORTERFIELD I. p. 151. & LOBF' de oculo p. 22. & vel potissimum MAUCHART de mydriasi p. 20. tum WHYTT *vital. mot.* p. 109. la METTRIE *Penelope* T. II. p. 37. & hætenus Cl. DERMOURS ad version. *Act. Edimb.* T. I. p. 372. & GATAKER p. 52. ex aliqua equidem necessitate plurimi, non ad experimenta. Circulares plicas in leone PARISINI dixerant.

( $a$ ) Neque vidit ZINNIIUS p. 89. Neque prior MERYUS *Mém. de l'Acad.* 1704. p. 261. Neque accuratissimus MORGAGNIUS *Adv. anat.* VI. p. 88. *Epist.* XVII. n. 9. Etiam rejicit Cl. O'HALLORAN p. 74.

( $b$ ) O'HALLORAN p. 75.

( $c$ ) S'GRAVEZANDEN n. 3064. RAU I. c. PETSCHER n. 12. Fatetur non esse manifestas DUVERNEY *posth.* T. II. p. 532.

( $d$ ) Per nostra de part. *sentient.* & *irrit.* Exp. 203. seqq. tum Cl. MULLERI de *irritab. irid.* p. 10. Fatetur etiam Cl. SAUVAGES iridem irritatam non moveri de *amblyop.* p. 16.

( $e$ ) Cl. FELICIS FONTANÆ, & Lett. II. CALDANI p. 330. in *Raccolta* Bononiæ edita.



sculo proprium est, esse irritabilem. Pridem adeo *Josias WEITBRECHT* (*f*) fibras iridis non esse musculosas monuit, deinde post nuperiora sua experimenta *Cl. DEMOURS* (*g*). In piscium vel iride, vel uvea raro fibræ quid simile vidi: Quæ striæ in uvea videntur, sunt manifesto plicæ reduplicatæ tunicæ nigræ.

Iridem sensu valde valere passim lego (*b*), nuper tamen a *Cl. DAVIEL* (*b\**), aque generoso viro, qui ejus artem expertus fuerat, percepi, diffecari iridem absque sensu, quando necesse est eam aperire, aut de cataracta solvere (*i*), quæ adhæserit, aut dilatare, ut lentem transmittat (*i\**). Quare neque eæ fibræ pro nervulis haberi debent, quæ sunt in uvea; cum alioquin nimis manifesto copia sua nervos superent (*k*).

### §. XI. Membrana pupillaris.

Et tamen cum nullus in iride sensus sit, neque irritabilitas ulla, motum velocem in eo anulo perfici mirum videri possit.

In fetu quidem hominis, & quadrupedum nulla, pupilla est, ut in ove vidi, inque fele monstrosa, & in cane *Guernerus CHROUET* (*l*). Nam ex iridis undique (*m*) acie, quæ in homine adulto pupulam finit, prodit membrana tenuissima, multo quam iris tenuior, cinerea, absque flocculis, vasis picta, quæ ab iride accipit decolora (*n*), ut tamen artificio anatomico facile repleantur, & rubescant, in rete intricata. Accedit per experimenta *Cl. HUNTERI*, quæ nunc, dum hæc paginæ de prelo prodeunt, demum lego, membranula teneerrima, suis cum vasis, a lentis crySTALLINÆ capsulâ pene ex margine adfurgens (*n\**), & ad oram pupillæ adnexa.

Ea

(*f*) *Comm. Petrop. T. XIII. p. 349.*

(*g*) *Mém. des Savans étrangers T. II. p. 387. 591.*

(*b*) *Le CAT p. 397. Journ. de Méd. II. n. 6. cum lentis pars in cameram anteriorem transeuns magnos fecerit dolores.*

(*b\**) *Journ. de Méd. 1762. m. mars. in epistola ad me data.*

(*i*) Non videbatur multum sentire *MULLER l. c. p. 10.*

(*i\**) *DAVIEL l. c.*

(*k*) *ZINNHIUS fatetur p. 97.*

(*l*) *Nullum foramen uveæ de tribus ocul. humor. p. 22.*

(*m*) *Vide opuscul. anat. p. 341. seq.*

(*n*) *V. icon. T. L. WACHENDORFFI & nostram l. c.*

(*n\**) *Med. Comm. I. p. 63.*



Ea membrana, quam describimus, ad septimum usque mensem in hominis fetu constanter reperitur: ab eodem nunc in lucem edito (o) abest: ut ne vestigia quidem supersint. In cæcis tamen hominibus nonnunquam superfuit (p). In avium pullo non reperi (q), ut eo magis mirer, in aquila & olim a CORTESIO (r), & postea a PARISINIS (s) ACADEMICIS esse repertam.

An ob eam membranam puer nuper natus non videt (s\*)? An certum est experimentum (s\*\*) ? An potest iris mobilis esse, neque oculus videre (s†)?

*Pupillarem membranam* vocamus, quam ILL. olim WACHENDORFIUS (t) primus (t\*) descriptam dedit: ego non statim, cum reperi rem, agnovi, inde excolui, & nova icone expressi (u); ILL. demum ALBINUS testatur (x), ante multos annos (y) a se inventam, & anno 1737. sculptori traditam fuisse. Nunquam tamen (z) suis discipulis (a) eam ostendit, neque id inventum ab iis tangitur in numerosis, quas de oculis ediderunt, disputationibus; quibus confirmes, nullam vel WACHENDORFII culpam fuisse, vel nostram, si priora viri ILL. jura ignoravimus. Habet etiam ILL. noster ZINNIVS (b), & CL. LAWRENCE (c).

A a a 3

§. XII

(o) *Opusc.* p. 342. Add. HEUBERMANN *physiol.* T. IV. p. 468. 469. Septima demum a partu septimana evanescere ILL. ACRELL *om föfrets sjuk domar* p. 33. 34. & post partum Cl. GATAKER p. 55. Sed nimis frequenter in nuper nato nullam reperi.

(p) LITTE *Mém. de l'Académie* 1707. p. 495. 496. KENNEDY *Ophthalmograph.*

(q) *De la form. du poulet.* p. 170.

(r) Apud ALDROVANDUM *Ornithol.* T. I. p. 226. Vocat tenuissimam & pellucidissimam membranam iridi protensam.

(s) *Mémoires pour servir à l'histoire des animaux* T. III. P. II. p. 97. 98.

(s.) RIOBAN. p. 409. MUSSCHENBROECK C. 39. fin. BUFFON T. III. p. 317.

(s\*\*) Videre SPIGELIUS C. 17.

(s†) p. 376. 377.

(t) *Comm. Lit. Noric.* 1740. hebdom. 18. t. I. f. 7. & 1744.

(t\*) Primum auctorem facit Cl. HUNTERUS D F... S. — S... S. cujus nomen non absolvit l. c.

(u) *Comm. ad BOERHAAV. Tom. IV. p. 150. Act. Upsal. ad ann. 1742. Opusc. anat.* p. 339. tab. 10. f. 34. Fascic. VII. p. 47.

(x) *Adnot. L. I. p. 33. 34. L. III. p. 92. 93.*

(y) L. c.

(z) *Conf. relat. de libr. nov. Fasc. 13. ann. 1755.*

(a) De MAFFEE. LOBE. CAMPER. MOHRING.

(b) p. 94.

(c) MEAD. *monita med.* p. 89.



§. XII. *Pupillæ constrictio & relaxatio.*

Antiquissima res est, ut neque ACHILLING (d), neque SARPPIO (e) possit gloria inventi manere. Nam & arabes habent, ut RHAZES (f), & AVICENNA (g), & nuperiores a reparatis literis scriptores (h) frequentissime observarunt. Etiam GALENUS (h\*) a valida luce pupillam mutari obscurius scripserat.

Nempe instabilis pupillæ est diameter. In homine & in animalibus quadrupedibus mihi notis (i), inque avibus (k), oviparis (l) pupilla, uti lux est debilior, ita amplior fit, ut major pars oculi nigra fiat, & iris vicissim nunc angustior fit. Pisces, quos ego incidi, iridem ad lucis mutationes habuerunt immobilem (m), etsi flammam candelæ proximam obtuli.

Contra, quando lucis fulgor augetur, iris in eadem ratione latior fit, & pupilla angustior; eademque, prima quasi & validiori impressione lucis evanescente paulo post aliquantum laxatur (n). Subita enim, & prima lucis actio fortissima est, ut etiam in cataracta pupillam claudat (o).

Is motus facillime conspicitur, quando hominis oculi luci vividæ exponuntur, & vicissim manu præposita umbra obtenditur.

Vividior

(d) Huic inventum refert R. WHYTT. *vital. mot.* p. 110.

(e) Huic tribuit H. FABRICIUS L. III. c. 6. tum GRISELINI in *vita* p. 25. 26. 27. & PORTERFIELD T. II. p. 93.

(f) In *Colliget* l. c. 17. & ad *Mansor.* L. I. c. 8. Sed etiam ARRETÆUS id phænomenon videtur observasse, cum modo dilatatam nimis, modo contractam dicat *diut.* l. c. 7. Ad solos autem morbos eas varietates retulit.

(g) *Tr.* III. *fen.* l. c. 6. 1.

(h) J. B. PORTA de *refract.* L. III. c. 6. SCHREINER *nerv. opt.* L. I. P. 2. c. 3. J. B. MONTANUS. *PLEMP.* p. 16. MOLINETTI *diff. anat. pathol.* l. p. 144. STENONIUS ad BARTHOLINUM *Epist.* l. Cent. 4. & de *musc. & gland.* p. 68. BOURDELOT apud DENYS *conferenc.* 3. BOYLE de *ipsa natur. & of posit. & privative nature of cold.* p. 14. DRELLINCOURT. POLENI *Giorn. de letterat.* tom. 27. n. 6. CRAANEN p. 591. PORTERFIELD II. p. 115.

(h\*) De *util. part.* L. X. c. 5.

(i) Hædo *exper. nostr.* 209. feli, huic accuratissime, PORTERFIELD II. p. 205. equo WOOLHOUSE p. 21. BOURGELAT T. I. p. 74. qui bonitatem oculi a sensu acuto lucis æstimavit. In corvo *Exper. nostr.* 207.

(k) Ulula PETIT *Mém. de l'Acad.* 1736.

(l) Rana PETIT *Mém. de l'Acad.* 1737. bufo ROESSEL n. 99. Non vidi. tamen in rana.

(m) In torpedine contrahi REDD *esper.* p. 28.

(n) *Mém. des savans étrang.* T. II. p. 596.

(o) PORTERFIELD T. II. p. 111.



Vividior est in juniore homine (*p*), in senibus pigrior. Jam recens nato vis mobilis est (*q*). Limites video poni inter  $\frac{3}{2}$ . lineæ (*r*), & inter 1. &  $2\frac{3}{4}$ . (*s*), inter 1. & 3. ab aliis (*t*).

Credunt Cl. viri etiam absque luminis discrimine pupillam ad objecta remotiora dilatari (*u*), ad proxima arctari (*x*). Addunt, subtiliter eam rem rimati, magis tamen ob luminis discrimina & arctari pupillam, & dilatari, quam quidem ob visum objectorum confusiolem, aut distinctiorem (*y*). Addunt iterum, angustior fieri ad objecta (*z*), quæ accurate volumus cognoscere, idque omnino verum esse reperi.

Debilitatur idem motus, & dilatata manet pupilla, & immobilis, quando vel actio luminis in organum visus intimum debilior est, aut nervosum systema oculi minus est sensibile. Illud fit vitio cataractæ (*a*), aut glaucomatis (*b*), in qua tanto gravius esse malum creditur, quanto pupilla amplior & magis immobilis (*c*). Hoc accidit retinæ, aut optici nervi culpa (*d*), & amaurosis (*e*) dicitur. Qui in amaurosi mobilitatem pupillæ superesse dixerunt (*e*\*), de imperfecto morbo scripserunt, in quo sensus aliquis lucis superfuit. Iris enim immobilis est, quoties homines adeo cæci sunt, ut vix umbram distinguant (*e*\*\*).

Dilata-

- (*p*) LA HIRE apud du HAMEL p. 317. *accid. de la vue* p. 531.  
 (*q*) BUFFON l. c. T. II. p. 450. Negat WHYTTIUS.  
 (*r*) PETIT *lettre, que l'uvée* &c. p. 5. Per tertiam partem PORTERFIELD I. p. 160 161.  
 (*s*) WEITBRECHT *Comm. Petrop.* T. 13. p. 354.  
 (*t*) TENON. p. 3.  
 (*u*) BAYLE *oper.* p. 477. DERHAM *phys. theol.* p. 101. &c. Etiam ab imaginatione remotorum corporum TAYLOR p. 205.  
 (*x*) PORTERFIELD T. II. p. 97. T. I. p. 169. *Mém. de l'Acad.* 1755. p. 601. LA HIRE *Accid. de la vue* sub fin. MAITREIRAN p. 91. O'HALLORAN p. 77.  
 (*y*) PORTERFIELD T. II. p. 102. 103. T. I. p. 163. In ulula vidit PETIT *Mém. de l'Acad.* 1736. p. 139.  
 (*z*) WHYTT *vital. motion* p. 133. ad minuta objecta MOULINS p. 54.  
 (*a*) MORGAGN. *Epist.* XVIII. n. 22. *Epist.* XX. n. 5. DUDDELL. p. 140. MAITREIRAN l. c. 8. p. 144. DAVIEL *Stockh. Handl.* 1759. Trim. I. PORTERFIELD T. II. p. 112.  
 (*b*) WOOLHOUSE p. 30.  
 (*c*) MAITREIRAN ib. GORDON *Lil. Gall. Partic.* 3. p. 274. S. YVES p. 38. JAN DAMASC. L. IV. c. 9. BRISSEAU p. 74.  
 (*d*) Eo refer. HOFMANN. *Cent.* VI. Dec. 5. c. 9.  
 (*e*) WEDEL *de gutt. seren.* WHYTT *vital. mot.* p. 113. PORTERFIELD T. I. p. 211. T. II. p. 95. MERY *Mém. de* 1707. SYLYA *de la saign.* p. 306.  
 (*e*\*) HARN VI p. 355. DUDDELL p. 139.  
 (*e*\*\*) *Journ. de méd.* 1762. Juin.



Dilatatur etiam in cataracta (*f*), deliquio animi (*g*), in ipsa morte (*h*), in apoplecticis (*i*), in comatosis, (*k*) in hydrocephalo (*l*), aut in animale, quod opio sumto sopitur (*m*), inque febribus malignis, cum mentis alienatione (*n*), aut cum amentia conjunctis (*o*).

Si aliquot a morte diebus pupilla iterum arctatur (*o\**), is effectus est exhalantis humoris aquei, atque adeo minoris spatii, cui iris præten- ditur (*o\*\**). Etiam hominibus adultis ob eam causam pupilla arctior est (*o†*), quam infantibus.

Sub aquâmerso animali pupilla amplissima est (*p*), neque ad lucem constringitur, sed quidem animale de aqua exempto, inque aerem re- stituto (*q*).

Contra augetur, aut restituitur idem motus iridis, & arctatur pupilla a scintilla electrica (*r*), ab irritatione nervorum mechanica (*s*), ab inflammatione (*t*).

Quare, cum præterea in experimentis FONTANÆ (*u*), & in homi- nibus cataracta & amaurosi adfectis, lux in iridem adfulgeat, neque ta- men constringatur eadem, causa non est in iridis irritatione; sed, ut qui- dem videtur, in quadam retinæ (*x*) adfectione nervosa.

Quare

- (*f*) HOIN ad DAVIEL p. 5.  
 (*g*) ZINN p. 102. WHYTT *vital. mot.* p. 113.  
 (*h*) GALEN. *de util. part.* L. X. c. 5. FABRIC. L. III. c. 6. MERY p. 266. POR- TERFIELD T. II. p. 95. ZINN p. 102. ANDRÆ *de irritabil.* p. 31. WHYTT l. c. p. 144. *Exper. nostr.* 203. 205. 210. 216. 218. 219.  
 (*i*) BOERHAAVE *morb. nerv.* p. 527. PORTERFIELD T. I. p. 211. T. II. p. 95.  
 (*k*) WHYTT l. c.  
 (*l*) *Journ. de Médec.* T. XII. p. 452. KALTSCHMID l. c.  
 (*m*) *Exper.* 213. 214.  
 (*n*) *Journ. de Médec.* 1757. Maj. in tetano inde orto. *Médec. experim.* p. 123. Inter mala signa est hæc immobilitas. ADD. SYLVA p. 306.  
 (*o*) KLOEKHOFF. *morb. anim.* p. 133.  
 (*o\**) ANDRÆ l. c. ZINN p. 102. WHYTT *physiol. ess.* p. 144. *Exp. nostr.* 205.  
 (*o\*\**) PORTERFIELD T. I. p. 213. MULLER p. 10.  
 (*o†*) PORTERFIELD T. I. p. 164. 165.  
 (*p*) MERY *Mém. avant.* 1699. T. X. p. 656. & *Mém. de l'Acad.* 1704. p. 262.  
 (*q*) IDEM *ibid.*  
 (*r*) *Mém. de l'Acad.* 1755. p. 86. 87. 93. & apud du HAMEL *bist.* p. 218. HILL. *fabric. of the Eye* p. 13.  
 (*s*) TAYLOR p. 186.  
 (*t*) Ex ligato nervo octavi paris *Conun. Bonon.* T. III. p. 284.  
 (*u*) p. 371.  
 (*x*) CALDAN. *Lettera* II. p. 368. MULLER p. 15. Etiam WHYTTIUS fatetur op- tical. *mot.* p. 117.



Quare iterum, in hemeralopia (*y*), quando solis radii unice ad sensum visus excitandum valent, neque aut candelæ sufficiunt, aut crepusculum, tunc pupilla perpetim dilatata (*z*) hiat; etiam epidemico malo. Adnotatum est, senioribus militibus facilius id malum accidere (*a*). Idem nempe effectus est parvæ lucis, aut exigui a luce sensus.

Cæterum pupilla ampliter patet fetui (*e*), & infantibus (*f*), minus ampliter adultis, senibus minime (*g*). Inter animalia peramplam habent, quæ noctu vident, ut ulula (*h*); & perampla est, quando dilatata, feli (*i*), cui præterea est mobilissima, ut ipsis in tenebris viso mure dilatetur (*k*). Myopibus (*l*), & noctu videntibus (*m*), ut acris sensus oculus, ita pupilla latior est, & latior in iis, qui diu in tenebris versati (*n*) tennerrimos oculos adquisiverunt, & qui iidem noctu vident (*o*). In notissimi phænomeni & causa explicanda, & organo laboratur.

Voluntarium iridis motum esse (*p*), & in avibus (*q*), & felibus (*r*) absque variata luce pupillam stringi & laxari, & etiam in homine, ex imaginatione objecti remoti, quod inspicere oporteat (*s*), pupillam patefcere; & in universum, pueros pro arbitrio eo organo uti, adultiores dedicere hanc potestatem (*t*), & tamen ad objecta accuratius perspicienda oculos

- (*y*) BLANCARD *prax.* p. 245.  
 (*z*) FOURNIER *Journ. de Médec.* 1756. Mart. Aug. - KRAMER *med. milit.* T. I. p. 92.  
 (*a*) KRAMER.  
 (*c*) PETIT *Mém. de l'Acad.* 1727. p. 247. PORTERFIELD T. II. p. 71. T. I. p. 160. 161.  
 (*f*) JURIN. *dist. vis.* p. 146. 147. Post sextum annum non mutari VANDERMONDE *art de perfect.* &c. p. 162.  
 (*g*) PORTERFIELD *ibid.* p. 165.  
 (*h*) IDEM T. II. p. 85. 271.  
 (*i*) KRUGER *physiolog. Gedank.* p. 28. PORTERFIELD II. p. 205. EVERS *submers.* p. 5. la HIRE *Accid. de la vue* p. 612.  
 (*k*) ROBINSON *of the spleen* p. 124. 125.  
 (*l*) PORTERFIELD T. II. p. 71.  
 (*m*) SCHMID *vis. vitiat.* p. 36.  
 (*n*) BOYLE *final. caus. obs.* XIV.  
 (*o*) PORTERFIELD T. II. p. 201.  
 (*p*) WHYTT p. 109.  
 (*q*) De plittaco PORTERFIELD *Ess.* T. II. p. 151.  
 (*r*) IDEM T. II. p. 147.  
 (*s*) TAYLOR p. 205.  
 (*t*) PORTERFIELD T. I. p. 118.



oculos suos accommodare ( $u$ ); demum animam, quoties oculus a nimia luce non potest lædi, pupillam dilatare, ut plus lucis adveniat ( $x$ ), argumenta sunt Cl. virorum, potissimum de STAHLII secta.

Verum hæc omnia nimia sunt, & a facillimis experimentis refutantur. Imperet sibi ipsi homo, ut vel constringat pupillam, vel relaxet; nihil efficiet, dum idem erit luminis vigor. Et ea ad remota dilatatio ad idem redit cum minori luce: debilem etiam necesse est a remotis advenientem imaginem, ob radiorum paucitatem, qui paralleli adveniunt, obque interpositum cæruleum aerem, etiam pictoribus notum.

Deinde in organo laboratur. Facillima videbatur interpretatio, si in circulo uveæ intimo sphincterem faceres: inque reliqua iride fibras radiatas. Ita videbatur ab irritata iride sphincterem ( $y$ ) se contrahere, & adtensam sibi iridem introrsum ducere. Laxatum eundem vicissim se remittere in luce debili, tumque fibras rectas suo elatere iridem angustare, pupillamque dilatare ( $z$ ).

Verum non oportet fabricas excogitare, quas sensus non confirmant. Circulus in uvea constrictor nullus est ( $a^*$ ): sed ne aperientes quidem fibræ manifestæ ( $b$ ). Neque in fele, cui accuratissime pupilla constringitur, de sphinctere cogitari potest.

Videtur potius causa esse in irritante luce, quæ excitatis viribus continuo dicendis, iridem introrsum pellat, evolutis plicis serpentinis vasorum & striarum cellulosarum, ut in rectitudinem conversæ iridem dilatent ( $c$ ). Ita communi lege etiam feles, & animalia pupilla lineari prædita, licebit comprehendere. Naturalis ergo status iridis foret angustia, & pupillæ latitudo ( $d$ ). Ex eo statu per causas irritantes depellere-  
tur, non absque aliqua violentia.

Ea

( $u$ ) IDEM.

( $x$ ) IDEM T. II. p. 96.

( $y$ ) WHYTT I. C. DREZINCOURT p. 195. &c. Sphincterem vasculosum habebat VIRUSSENS tr. des liqueurs p. 211.

( $z$ ) DEMOURS Mém. des Savans étrangers T. II. p. 596. MERY p. 263. 264.

( $a^*$ ) p. 371.

( $b$ ) Ibid.

( $c$ ) Ea fere JOHANNIS MERY sententia, nisi quod spiritus vocat I. C. p. 263. 268. Aliquid simile habet J. SHREBBARE.

( $d$ ) DEMOURS Mém. des Savans étrang. p. 588. WHYTT p. 142. PORTERFIELD T. II. p. 95. I. p. 211. Mireris ZINNIIUM angustiam pupillæ pro statu naturali habere I. C.



Ea causa videtur cum inflammatione (*d*\*) aliquid commune habere: nam inflammatio (*e*) tumefacit arterias, replet & cellulosas telas, & nascitur eadem ab irritatione, & lux adeo certo irritat, ut totum organum visus destruat, si nimia fuerit. Si lucis efficacia paulo major fuerit, actio iridis etiam cum dolore aliquo conjungetur, quem percipiet, qui in solem inspexerit.

Oportet autem irritationem, quæ in retina fit, operari posse congestionem subitam humorum in iridis vascula & flocculos. Id credas vi nervosa optime fieri, uti manifesto in pene subitus tumor nascitur a stimulo vario, etiam acri & mechanico.

Hypotheses rebus certis addere non placet. Quando a venis adstrictis, quæ in pene causa est, constrictio iridis explicatur (*e*\*), objecta est subita lucis actio (*f*). Non valde certe efficaciter, cum brevissima vascula iridis facile subito possint repleri.

Omni dilatationem pupillæ eo reduxit Cl. WEITBRECHT, ut ab iride ad crystallinam lentem adducta arctetur, & augeatur eadem ad corneam membranam reducta (*g*). Sed causas hujus alterni itineris nullas adsignavit.

Non oportet hic paradoxum, sed certo mihi visum, phænomenon dissimulare. In fele juniore iris 23. hora post submersionem erat amplissima: & lens per eam pene opaca adparebat. Volebam, ad PETITIMOREM, calore modico fornacis eam opacitatem dissipare. Ecce, post minutum fere primum oculum refero, & invenio pupillam pene clausam, ut in eo animale clauditur: iridem amplissimam, cum pulcherrimo arcu ferrato striarum flavarum. Diu ergo a morte caloris stimulus vires iridem dilatantes in motum excivit.

### §. XIII. Corpus ciliare.

Ita a FALLOPIO (*h*), & MORGAGNO (*i*) dictum, aliis *ligamentum ciliare* (*k*), aut *processus ciliaris* audit.

B b b 2

Elegans

(*d*\*) A febre strictura pupillæ BOYLE *caus. fin.* p. 524. ed. fol.

(*e*) Ita etiam MULLER p. 16.

(*e*\*) Etiam Cl. BARTHES acuti ingenii vir in 12. *quest.* & olim J. MERY.

(*f*) MAUCHART *de mydriasis* p. 26. Adde WHYTT p. 127. 128. 129.

(*g*) WEITBRECHT l. c. p. 356. 359.

(*h*) p. 214.

(*i*) Et ZINNIO p. 60. seqq.

(*k*) RUYSCH *Epist.* XIII. etiam FALLOP. *ibid.* p. 214. VID. p. 319. FABRICIUS 35. CASSER. t. V. f. 2. Tunica ciliaris VESAL. p. 804.



Elegans oculi ornamentum, utique orbiculare est, nisi quod, pariter ut iris, ad angulum (*l*) internum aliquanto arctius sit. Oriuntur nempe de superficie choroideæ membranæ paulo (*m*) prius, quam orbiculus ciliaris ei corneæ adhærescat, ad fesquilineam ab iride in homine, prius etiam in quadrupedibus, plicæ (*n*), quæ sensim de superficie choroidis elewantur (*o*), ut anterior ea, & plicæ posteriores sint; ad unam autem striam duæ, tres, quatuor lineæ elevatae concurrant (*p*). Cum ex duplici choroidea tunica fiant, ejus paginae cellulosa telam habent interpositam (*q*).

Porro eæ striæ sibi similes, sed alterne majores fere, tendunt introrsum, tectæ orbiculo (*r*) ciliari, per cujus cellulosa telam pellucet, & cui adhærent; & incumbunt mucosæ (*s*) laminæ, de qua continuo dicitur, quæ ipsa vitreæ membranæ incumbit; & eundo latefcunt, ut spatium pariter latefcens inter vitream & uveam repleant (*t*). Magna ea sede membranacea quasi vexilla sunt in lepore, lupo, & ibice.

Denique quo loco uvea (*u*) ex orbiculo ciliari prodit, ibi deferunt illi radii planum cum choroidea continuum, & albedine nunc mixtæ (*x*) transeunt trans crystallinæ lentis cum vitreo humore valleculam, & denique capsulæ ejus lentis imponuntur, antè quam est circulus maximus (*y*): adhæsiōne in cadavere humano omnino nulla (*z*). Cuique vero striæ in vitrea membrana, [vel in retina], similis linea respondet, quæ ad intervalla striarum ciliarium eminet (*a*); inque lente sibi respondens.

(*l*) ZINN p. 62. *de lig. cil.* n. 4. *De la form. du poulet* II. p. 163. CAMPER n. 12. t. 2.

(*m*) MORGAGN. *Epist.* XVII. n. 14. p. 256. ZINN p. 63. 65. 74. *tab.* 2. f. 2. *de lig. ciliar.* p. IV. *De la form. du poulet* p. 169. *Fasc.* VII. f. 7. 8. & p. 48.

(*n*) Ibidem.

(*o*) TENON. f. 1: 2.

(*p*) ZINN p. 67. 68. *De la form. du poulet* p. 163.

(*q*) ZINN p. 74.

(*r*) IDEM p. 66.

(*s*) IDEM p. 64.

(*t*) TENON. p. 3. *fig.* 3.

(*u*) ZINN *tab.* 2. f. 1.

(*x*) IDEM *lig. ciliar.* p. 3.

(*y*) IDEM p. 62. 66. 67. MORGAGN. *Epist.* XVII. n. 16. *Advers.* VI. p. 89. PETIT *Mém. de l'Acad.* 1730.

(*z*) ZINN p. 79. t. 2. f. 1. *lig. cil.* p. X. CAMPER *passim.* *Fasc.* VII. p. 48.

(*a*) ZINN p. 76. *lig. ciliar.* p. VIII. *Id. nostr.* f. 7. 8. *Add.* GATAKER p. 49.



spondentiâ nigra habet vestigia ( *a\** ). Adhærent autem ad eas lineas vitreæ, accurate quidem in homine nuper extincto ( *b* ), post aliquot autem dies ( *c* ), & in avibus leviter. Remota lente per lineam liberæ fluctuant ( *e* ). In lepore & lupo evidentissime a maxima latitudine sua contractæ in uveæ strias inferuntur, easque generant, ut finem omnino in lente crystallina non habeant. Pars ista fluitans liberas habet strias absque membrana duos radios ciliares uniente ( *f* ), sed quæque tamen suam membranam retinet. Numerum inivit ZINNIIUS, & circa septuaginta reperit ( *g* ).

Piscibus nulli sunt processus ciliares: & crystallina lens proprium habet sustentaculum. In cyprini speciebus est processus RUYSCIIANÆ & retinæ, qui in cavam quasi bursam factus, extenuatur in latam tæniam, quæ posteriori faciei lentis crystallinæ adhæret. In trocta & lucio ab ipsa arteria centrali retinæ filum circa vitreum corpus venit, & a membrana nigra accessione auctum, & ab uvea, inque campanulam abit, maculatam, intus albam, vasculosam & nerveam, quæ acuto suo mucrone lentis crystallinæ capsulæ se inmittit. Vel sola per biduum suspensam lentem sustinet. Duas in Thynno ansulas PRIRESCUS dixit ( *h* ). Præterea piscibus universis uvea ad vitream membranam vehementer adhæret.

Hæc cum vidissem, & in cadaveribus brutorum quadrupedum lentem crystallinam ita a vitrea tunica liberam reperirem, ut se pro lubitu subverteret, lentisque anteriorem faciem objiceret retinæ, unaque humorem aqueum viderem turbidum: factum est, ut nunc tamen credam, lentis crystallinæ aliquod debere vinculum esse, quo fiat, ut in sano integroque corpore securum situm & perpetuum teneat. Id vinculum tamen crediderim corpus esse ciliare: idque duobus modis lentem crystallinam sustentare. Et primo quidem, mucronibus suis, etsi liberi videntur, tamen ope muci nigri ad lentem adglutinari, quantum satis sit. Eam firmitatem in fele vidi, cujus radii ciliares lentem tractam sequuntur, neque ab ea recedunt. Multo major & inviolabilis in ardea est adhæsiō, cujus

B b b 3

totum

( *a\** ) RUYSCH *Epist.* XIII. p. 11. *Thef.* II. *aff.* I. n. 15. *Thef.* II. *aff.* II. n. 7.

( *b* ) ZINN p. 76. &c. WINSLOW n. 221.

( *c* ) FALLOP. Leviter RUYSCH *Ep.* XIII.

( *e* ) ZINN t. 2. f. 2.

( *f* ) IDEM p. 66.

( *g* ) p. 68.

( *h* ) In vita p. 394.



totum corpus ciliare capsulæ crySTALLINÆ insolubili nexu adhæret. Altera vis est in mucō nigro, qui lineas eminentes ejusdem corporis ad sulcos zonæ ciliaris hætenus adfingit, ut non absque aliquo separantis manus momento discedant. Sed ea vincula videntur a putredine deleri, quæ mucum dissolvit, & humorem aqueum reddit turbidum. Quare in cadaveribus a Cl. viris dictis tantum credam fuisse putredinis gradum, ut apices fluitantes de lente crySTALLINA discesserint, nam in quadrupedibus majoribus certo video discessisse. Ejusque mucum diluentis efficaciam major est gradus, quando tota cum vitreo corpore lens mobilis redditur, quod etiam per hiemale frigus quinto, sextove die evenisse vidi. In ipsis demum ardæ oculis, in quibus radii ciliares toti crySTALLINÆ lente accuratius adhærent, quinto, sextove die reperi fluitantes ciliaris corporis radios de ea lente discessisse.

Porro corpus hoc ciliare in majoribus animalibus manifesto membrana quadam fit, utriculosa (*i*), qualis est in avium pectine, cujus acies flocculis fuscis, villosis (*k*) ornatur, finis autem crassiori quasi ansa (*l*) terminatur; etsi inter vermiculatos margines utique membrana alba superest, qua sede absque microscopio foramen esse videretur. Denique totum corpus ciliare villis plumosis tenerrimis undique obducitur, a RUYSCHIANA tunica advenientibus. Masculosi nihil quidquam habet (*m*). Alterne longiores radii sunt & breviores (*n*), & subinde ramis inter se uniuntur (*o*) invicem.

#### §. XIV. *Anulus mucosus.*

Tota choroideæ facies interior (*p*), quam RUYSCHIANAM aliqui dixerunt, tota etiam facies posterior sive interior processus ciliarium, & denique facies uveæ iis processibus obversa, mucō fusco (*q*), & pene nigro

(*i*) TRONON. f. 2. 6. 7.

(*k*) Fascic. VII. p. 49. De la form. du poulet II. p. 163. ZINN Epist. ad WERLHOF. p. 18. lig. ciliar. p. IV. V.

(*l*) RUYSCH thes. II. tab. I. f. 7. Conf. ZINN p. 65. & t. 2. f. 2. add. ex bove HOVIUM.

(*m*) Consentit ZINN p. 70. lig. ciliar. n. 10. RUYSCH Thes. II. aff. I. n. 15. GATKER p. 49.

(*n*) ZINN p. 68. De la form. du poulet II. p. 162.

(*o*) De la format. du poulet II. p. 163.

(*p*) ZINN p. 33.

(*q*) Tabacinus MORGAGNI Epist. XVI. n. 12.



nigro obducuntur, qui speciem membranæ cujusdam mollis, neque organicæ habet, & magnis maculis elui potest. Infantibus quam adultis crassior est (*r*), dilutior etiam versus choroideæ originem posteriorem. Aquam omnino elutus turbat, maximamque ejus copiam tingit (*r*\*), redditque tabacino colore fuscam, ut saphirina (*s*) quidem raro spectaculo visa sit. A spiritu vini induratur potius, quam coagulatur (*t*), & in massulas rotundas facile cogitur, quæ suam inpressionem in retina relinquunt. Adhæret cæterum non modice, neque nisi aliqua mora & maceratione patitur se detergeri, ut magnas maculas nigras sæpe retinæ tunicæ adhærentes viderim, in homine, ave, quadrupede. Eæ maculæ in pisce in membranæ speciem confluunt, totamque retinam tegunt. In Cuniculo albo (*u*) pupillis rubris niger iste mucus desideratur, eaque ipsa est ratio, quare per corneam membranam vasa retinæ & choroideæ percipias. In animalibus quadrupedibus ab ea parte abest, in qua tapetum illud lucidum conspicitur. Cæterum latissime niger iste color in piscium oculis, etiam in insectis, dominatur (*x*). In pullo hora 94. primum nigror in oculum obrepit (*y*).

Elegans ab eo ipso muco in infantibus nascitur anulus (*z*), quando de vitreo humore corpus ciliare accurate removetur. Residet tunc in membrana vitrea, subjectus similisque ciliari corpori, etiam pariter ad tempora latior (*a*), adque nasum angustior, floris eleganter circumferrati figura, qui partem etiam aliquam lentis crystallinæ tegat, striisque alternis corporis ciliaris suis striis respondeat. In piscibus simillimus, facile paratur, accurate circularis.

Devii

(*r*) ZINN p. 33.

(*r*\*) *Un seu* ab uno oculo DUVERNEY *postb.* I. p. 145.

(*s*) D. HOFMANN ad GOUEY p. 165. *exper.*

(*t*) Sanguini ficcato comparabat CHROUET.

(*u*) Nam cuniculo cinereo choroidea & pupilla fusca est BUFFON T. VI. p. 316. *Physic. Belust.* T. III. p. 1380. & in *nostris observ.*

(*x*) SWAMMERDAM p. 491. 494. in *ape* p. 336. in nasicorni scarabæo. Etiam in minoribus apis oculis p. 496 497. Habet etiam PUGET *Lett* II. p. 78. 82. & HOOKE p. 177. ita tamen, ut mucum eum passim *uveæ* nomine vocent, sed mucus est, qui diffuat, & late squam aut digitos tingat SWAMMERDAM in *ape*.

(*y*) *Obs* 95.

(*z*) Corona nigra ciliaris *Fasc.* VII. p. 48. ZINN p. 35. 64. t. 7. f. 1. *lig. ciliar.* n. 4. RUYSCH utcumque *Epist.* XIII. tab. 16. f. 1. Couronne dentelée PALUCCI *Methode d'abatre la cataracte* p. 15.

(*a*) ZINN.



Devii hujus muci flocci frequenter per iridis oram oberrant, & membranæ ad modum aciei pupillæ in porcello adhæserunt.

Origo hujus atramenti parum nota est. Glandulas, cum mucosæ sit naturæ, pro organo secretorio habeas, quales in extrema iride *Petrus CHI-RAC* (*b*), in choroidea *COSMOPOLITA* (*c*), *VALSALVA* (*c\**), & *GUENELLON* (*d*), in uvea *J. H. SBARAGLI* (*e*), in extremis ligamentis ciliaribus *J. MERY* (*f*), & *Cl. BRISSEAU* (*g*) se vidisse tradiderunt. Nuperius qui inquisiverunt, nunquam in hoc oculi organo glandulam veram viderunt, neque *MORGAGNUS* (*h*), neque *RUYSCHIIUS*, neque *ZINNIUS*, neque ego demum. Et posterior pars oculi eum mucum nigrum etiam plurimum habet. Ex spiritu animali, qui aliquid mercurio habet simile, & sulfure sanguinis perinde componi id atramentum, ut in æthiopis mineralis exemplo, ex *C. N. le CAT* (*i*) ideo repeto, ut constet, nondum conjecturis libertatem dentam esse.

#### §. XV. *Retina tunica.*

Antiquum nomen est, etsi difficulter dicas, cur antiqui (*k*) imposuerint. Veram esse tunicam adgnoverunt (*m*). Tertium est oculi, certe posterioris, commune involucrum, idemque vulgo pro intimo traditur. Originem habet ex medulla nervi optici (*n*), diversis quidem modis in diversis animalium generibus.

In

(*b*) Apud *WOOLHOUSE* *epist.* Francf. ed. p. 46. Has & ipse vidi quasi conglomeratas, duas, in humore aqueo pendulas, puto morbosas. Papillæ in uvea *le MAIRE Journ. de Trévoux* 1727. Febr.

(*c*) p. 274. 275.

(*c\**) Apud *MORGAGNUM* *Epist.* XVII. n. 4. in fele.

(*d*) L. c. in asello pisce.

(*e*) *Ocul. & ment. Vigil.* p. XXXVII.

(*f*) *Mém. de l'Acad.* 1707. p. 499. 500. Rejicit *BERTRANDI* p. 64.

(*g*) p. 12.

(*h*) *Epist.* XVII. l. c.

(*i*) p. 379.

(*k*) *Ἀρχνοειδης* *CELSE* L. VII. c. 7. *POLLUC.* L. II. c. 4. p. 187. 188. & *VET.* post *HEROPHILUM* dicta, *ἀμφιβληστροειδης* *RUFO* app. I. p. 37. II. p. 55. *GALENO.* Rete fibratum & vasorum esse *BRIGGS.* *MAITREIEAN* c. XI.

(*m*) *ORIBAS.* p. 32.

(*n*) Recte jam veteres *ORIBAS.* p. 31. 281. nervum opticum expandi, ut vitreum humorem contineat, & p. 32. non esse tunicam, sed cerebri portionem exentam. Non bene aliqui nuperi negarunt, ut *SIMSON* *essays* p. 254. & dubitarunt alii.



In homine, & in quadrupedibus similibus, diximus nervum opticum in conum contrahi ( $n^*$ ), dum per scleroticam se penetrat: deinde in loco angustissimo membrana tegi tenera, perforata ( $o$ ), per cujus foramina medullam possis exprimere. Ea nunc medulla, uti per hæc foramina transiit ( $p$ ), ita confluit, abitque in membranam, crassam ( $r$ ) quidem, sed mollissimam, pellucidam utique ( $s$ ), quando recens oculus inspicitur, ut per eam sub aquis choroideam videas, tamen ex flavo subcinereum. Ejus origo paulum depressa, calycis ( $t$ ) quandam, in homine obscuriorem, manifestiorem fere in bestiis ( $u$ ) speciem habet; in plerisque enim animalibus lamina cribrosa infra RUYSCHIANÆ horizontem depressa est. Ab alcohole vini, & ab aceto, & sponte etiam a morte retina opaca fit, & in omnibus animalibus albida ( $x$ ) reperiatur, nullo colore varia.

Ex ea origine retina undique expanditur circa choroideæ ( $y$ ) faciem internam, & circa vitreum humorem; & ab eo tamen libera ( $z$ ), & a choroidea ( $a$ ); partemque globi majorem amplexa, firmiter ad principium processus ciliarium ( $b$ ) adhæret, circulo evidente & puro, pauloque crassiori ( $c$ ).

In

( $n^*$ ) *Étroit.* *É. froncè* DUVERNEY I. p. 146.

( $o$ ) p. 363.

( $p$ ) ZINN p. 109. Consentiant MOELLER. SENAC *Ess. de phys.* 1735. p. 693. RAHTLAUW *cataract.* p. 32. le CAT p. 376. &c.

( $r$ ) Quam choroidea crassior est WINSLOW n. 223. Tenuissimam vocat PECQUET ap. MARIOTTE p. 502. Nimis etiam tenuem facit Cl. Clifton WINTRINGHAM, ut *TTT* pollice non sit crassior, *Enquiry* p. 257.

( $s$ ) MARIOTTE. du HAMEL *corp. anim.* l. 2. c. 5. MORGAGN. *Epist.* XVII. n. 35. Semipellucida HAMBERGER *elem.* p. 523. In bove semipellucida du HAMEL. In leone opaca IDEM l. c. albo opaca DUVERNEY p. 146. Olim F. SARPIUS, non imperite, membranas oculorum opacas esse; pellucere tamen, quod sint humore ebriæ, *in vita* p. 27. Subrubra in recens nato videtur.

( $t$ ) FABRIC. P. III. c. 10. p. 110. BRIGGS f. 2. utcunque. BERTRANDI p. 65. WINSLOW n. 223. MORGAGN. *Epist.* XVII. n. 36. le CAT p. 371. f. 2. S. YVES p. 161.

( $u$ ) ZINN p. 107. 108. In lupo ingressus nervi optici est manifestissima cupula depressa, anulo cincta tumente albo. In ibice similis fere natura est, inque mele; huic circulus, albo cinctus anulo.

( $x$ ) PECQUET p. 499. 500.

( $y$ ) *Icon. anat. Fasc. VII. tab. 7. f. 7. 8.*

( $z$ ) ZINN p. 113. *Physiol. Amstelod.* p. 502.

( $a$ ) Ligamentulis necti WINSLOW, & vasis BERTRANDI p. 68. MAITREIEAN c. 9. Utique in ove vascula dat ad vitreum corpus.

( $b$ ) SCHEINER p. 27.

( $c$ ) *De la form. du poulet* p. 166. ZINN p. 113. t. 2. f. 1. f. MORGAGN. *Epistol.* XVII. n. 47. Nonne albus circulus PALLUCCI p. 17. 18.



In avibus alio modo de nervo optico oritur. Is enim, uti diximus, oblique introrsum in caudam productus, de suo involucro choroideam tunicam producit. Medulla vero transit per rimam longam, ut in ardea facile eam de tota longitudine albæ laminæ premendo exsudare coegerim. Ea ipsa nunc medulla, quando per longam fissuram involucri (*d*) transit, fit in membranam retinam pelluentem, quæ continuo etiam ea sede prodit, ex qua pecten, inter eum pectinem media nervumque. Inde similiter circumvoluta, pari circulo, ad originem ciliaris corporis terminari videtur.

In piscibus pulchra fabrica est & facilis. In iis [cyprino, mustela, aliis] nervus opticus, dilatatus sub sclerotica, postquam eam perforavit, & choroideam edidit, constringitur & aliquo adhuc spatio nudus incedit, deinde edit & scyphum vasculosum & proximam tunicam RUYSCHIANAM, iterumque ea perforata, longius adhuc producitur, & demum retinam generat. Intus per integros humores circulus albus opacus, paulum depressus, foramine perforatus vasculoso adparet, & in variis piscium speciebus circulum multa series fuscorum pilorum circumdat.

In trocta, & salmone & lucio eadem fabrica, quæ in avibus est, & nervus opticus de prælonga rima retinam emittit, ipse in arcum utrinque productus.

Hæc de origine retinæ, nunc de fine anteriori. In avibus quidem, quas incidi, gallinis numerosissimis, columbis, anseribus, anatibus, etiam rapacibus, ut in milvo, manifestum est, retinæ quidem crassiorē partem ultra non procedere; & ex eo circulo (*e*), quo retina ad corpus ciliare adhærescit, tenuiorem laminam, eo corpore interiorē subcineream, a vitrea diversam, quam est reliqua retina antrorsum pergere, substratam corpori ciliari, & una ad lentem crystallinam venire: Ea lamina in pullo, dum ovo continetur, a corpore ciliari separari potest, ut in vitrea membrana integra supersit (*g*). Etiam a vitrea tunica eadem in juniore animale potest removeri, ut ipsa cum corpore ciliari maneat, pellucidissimum vero vestigium, perfecto circulo circumscriptum, in vitrea membrana supersit, demersum, minusque  
exteriorius,

(*d*) Conf. PERIT *Mém. de l'Acad.* 1735. f. 10. D. L. E. Habent etiam in struthio camelo PARISINI.

(*e*) p. 165. 166.

(*g*) p. 165. 169.



exterius, quam fuit, cum lamina retinae suo loco remaneret. Postquam autem fetus de ovo exclusus est, adhærescit porro ea membranula & ad corpus ciliare, & ad vitream membranam (*b*). Possis negare a retina esse, ut nova sit membrana; sed a retina tamen continuatur, ex exteriori ejus facie (*i*), etsi tenuior est, & a spiritibus acidis, & vinosis opaca fit.

Similis autem in homine mihi (*k*) membranula, & aliis Cl. mecum viris WINSLOWO (*l*), PALLUCCIO (*m*), J. LIEUTAUD (*n*), FERREINIO (*o*), TENONIO (*p*) adparuit; ut etiam in adulti corporis oculo, retina quidem ad vitream membranam, & ad corporis ciliaris ambitum maximum adhærescat, cæterum laminam tenuiorem emittat (*q*), quæ corpus ciliare intus convestiat, subjectum mucoso anulo, cumque eo corpore ad lentem adveniat, cujus anteriori planitie adhærescit. Eam laminam credebam me in fetu anno 1744. 9. april. primum reperisse, deinde in aliquot humanis corporibus.

Negabat autem eandem laminam ZINNIUS (*r*) olim optimus, negant alii Cl. viri, & cum eam ipsi quidem ZINNIO in oculo humano ostenderem, ad spiritum vini se recepit, qui partes tenerrimas mutet (*s*); ea vero, quæ alii Cl. viri viderunt (*t*), ad vitream membranam, zonamque,

C c c. 2

quam

(*b*) p. 166.

(*i*) p. 167.

(*k*) *Fascic. VII. tab. art. ocul. f. 7. 8.*

(*l*) n. 237. FABRICIUS L. I. c. 5. L. III. n. 8. LINDEN *physiolog.* p. 484. DEIDER *obs.* p. 326. Olim fuit recepta sententia. Vide ORIBASIUM p. 31.

(*m*) Eo libello nunc destituor, sed ex adversariis repeto, laminam istam a PALLUCCIO membranæ communis nomine describi p. 18. seqq. Nempe retinam in circulum album membranæ communis inferi; a linea alba ad usque oram dentatam corneæ crassitie minui, & ab ora sua ad distantiam quartæ partis lineæ a circumferentia lentis crystallinæ RUYCHIANÆ adhærere, per vasa, ut videtur, lymphatica. Plicas porro efficere, quæ se in lentem conjiciant; eamque continere lentem, ne de nido exeat. Habet etiam fabricam nostræ similem CASSEBOHMIUS in schedis *posthumis*.

(*n*) p. 141.

(*o*) RAMSPEK *specim.* p. 24. RAHTLAUW l. c. p. 19. qui addit totam lentem includere, ut olim FABRICIUS.

(*p*) De *cataracla* p. 5.

(*q*) PALUCCI p. 19. &c. LIEUTAUD. WINSLOW apud HENKEL II. p. 79.

(*r*) p. 113. tum MORGAGN. l. c. n. 47. & ALBINI discipuli MOHRING p. 59 LOBE' n. 49. HEUERMANN n. 741. MOELLER n. 17. *Holl. physiol.* p. 501. olimque BARBATUS p. 194.

(*s*) p. 114.

(*t*) LIEUTAUD. PALLUCCI. FERREIN p. 115.



quam vocat, ciliarem revocavit. De situ etiam dubium movet (u). Sed is non dubius est inter anulum mucosum, & vitream membranam: & ego in avibus vitream zonulam & retinam nimis certo distinxi; inque homine circulus PETITII, in omni non violato corpore, ostendi potest, argumento, vitream zonulam anteriorem integram superesse, dum ad mucum nigrum laminæ albæ retinæ, fere in omnibus subjectis, adhærentes adparent. Denique, cum res in quadrupedibus difficillima sit, membranam tamen a retina ad lentem sub anulo mucoso in taxo nuper continuavi. In avibus verior retina eodem loco definit, lamina vero tenerior ulterius producitur, in piscibus nulla est zona ciliaris ZINNIANA. Omnibus perpenſis amplio, ei ſententiæ propior, quæ membranulam a retina diverſam inter uveam, & vitream, ad lentem producit.

Sensu retina eminet, quæ sit pulpa continua nervi optici. A sole enim nimio percussa (x) maximos dolores excitat, & animi deliquium. Qua parte insensilis sit, alias ostendetur (y).

Vasa rubra habet, manifesta in omnium quadrupedum genere (z), breviter tamen rubra, ut rami minores perspicui sint (a); & tamen non difficillime injectum tenuem sed coloratum humorem admittant, inque conspicuum rete abeant (b). Eorum originem truncosque alias dicam, qui per laminam cribrosam transeunt. Horum vasorum in retina conspicuorum alia manifestissime arteriæ sunt, alia venæ, ut olim ORIBASIUS (c). Id piscibus non vidi, & in avibus multo obscuriora sunt. In vasculosum rete ita positum est, ut teneat sedem intimam, sive vitreo corpori contiguam; exteriorem vero, quæ ad RUYSCHIANAM respicit, multa congesta medulla obtegit. Membranas duas vocari lego (d), mihi quidem non ita successit (e), ut medullari parte integram vasculosam integram separarem. Id utique macerando obtinetur, ut destructa medulla (f) cellulosa

(u) p. 114.

(x) In cæco KLOEKHOR *morb. anim.* p. 53.

(y) PORTERFIELD *Ess. of a Societ. at Edimb.* T. II. p. 221.

(z) Habet ORIBASIUS p. 34. Dudum viderunt in leone PARISINI, & in Gazella.

(a) Dimidia parte anteriori o HALLORAN p. 53. In ove flavorubra.

(b) Discipuli ALBINI MOEHRING p. 59. MOELLER n. 19. f. 3. HEUERMANN T. II. n. 739. 740. RAHTEAUW p. 20. *Physiol. Amstel.* p. 502.

(c) p. 34.

(d) *Adnot.* L. III. c. 14. p. 60. & discipuli, etiam RUYSCH. *Epist.* XIII. p. 15.

(e) Neque ZINN p. 112. credit posse succedere.

(f) RUYSCH *Thes.* II. *Aff.* II. n. 8. ZINN p. 110. ALBIN. p. 61. seqq.



lulosa tela tectum (g) solum vasculosum rete superfit. Experimentum inchoavit RUYSCHIUS (b), ALBINUS perfecit.

In piscibus (b\*) omnia absque artificio manifestiora sunt. In cyprino enim pisce, quæ nervus opticus lineis duabus nigris quasi pingitur, in retina paulo post separatio quædam, dum in vini spiritu maceratur, se præbet conspicuam, ut pedunculus fibrosus, medullosus, nervi quasi in hemisphærium distinctum inferatur. Si tunc scalpello secundum ductum fibrarum retinam fideris, manifesto ea abibit in membranam exteriorem, albam, nisi ubi adhærentem habet mucum nigrum, inorganicum: & interiorem, veram medullam, quæ pulcherrimo spectaculo, similis purissimæ nivis, in strias fibrasque rectas expanditur: qua autem medulla incipit diffundi, ibi quasi foramen est, sive depressio infundibulo similis. Lamina ergo hic in retina interior fibrosa est, & alia exterior (b\*\*) pulpofa. Evidentissimæ, maximæ, & liberrimæ fibræ in tinca sunt, tamen etiam in grandiori cyprino. Eandem porro fabricam fibrillosam nuper in omnibus piscibus reperi, lucio, salmone (b†), & pariter in omnibus laminas duas separavi. Idem in avibus, non tamen pari facilitate succedit, ut gallopavone, ardea. Deinde, etsi quadrupedibus retina pro portione mollior est, & tenerior, tamen etiam in fele, in mele, porco, ibice, repetito, derafa molli et pulpofa tunica alba, extima, glebosa, laminam internam vasculosam, & tenerrimam separavi. Ut omnino absque erroris metu laminas in retina duas recipias, pulpofam, & veri nominis arachnoideam. Neque fibras credo a reliquis animalibus abesse, quas in lepore (b††), & porco de quadrupedum classe, & in ardea inter volucres manifestas viderim, manifestiores etiam in noctua.

Plicas (i) aliquas radiatas casus & mollities fecit, striæ veræ (k),

C c c 3

aut

(g) ZINN p. 111.

(b) Membranofum & medullosum distinguit *Tbes.* II. *Aff.* I. n. 12. Medullosum deletum esse *Aff.* II. n. 8. Membranas duas inesse medullarem, & vasculosam *Epist.* XIII. p. 15.

(b\*) In asello cabeljaauw GUENELLON *Nouv. de la rep des letr.* 1685. mars p. 320.

(b\*\*) In asello GUENELLON l. c. f. 3. 4. 5.

(b†) GUENELLON f. 1. 2.

(b††) VALSALVA *diff.* II. n. 6. MORGAGN. *Epist.* XVII. n. 40. ZINN p. 109. *Comm. Gott.* T. IV. t. 5. f. 3.

(i) RUYSCHE *Epist.* XIII. tab. 16. f. 19.

(k) Fibras habet PECQUET p. 500. 504. BRIGGS f. 2. p. 206. BOHN p. 371. BEERTRANDI p. 65. Etiam crassitiem ad  $\frac{1}{32400}$  pili æstimat PORTERFIELD *eff.* T. IV. p. 252. 253. in ave ad  $\frac{1}{17280}$  400. pili ejusdem.



aut fibræ radiatæ in pellucida hominis retina nullæ (*l*) sunt, et si eas, subtiliores puto, & inconspicuas, anatome comparata probabiles reddit.

In omnibus animalibus oculatis retina exstat, nempe pulpa cerebri medullofa ad intima oculi subjicitur (*n*).

In apibus majoribus oculis pulcherrima omnino est fabrica. Quamvis nempe hexagoniam, cavam, corneam replet pyramidalis fibra, in superficie atrata, versus fundum oculi convergens (*o*), ubi suum habet verticem in semilunari membrana (*p*), alba; cui alia tenuior & pellucidior subest (*q*), hæc puto retinæ similis. Sub ea retinæ simili membrana est alia mollior fibrarum series, mistarum bronchis, quæ eidem membranæ interius adplicantur, transversæ, & pyramides sustinent (*r*), quæ cum cerebro cohærent, suntque ejusdem cum cerebro coloris. Sic in scarabeo nasicorni crassus opticus nervus (*s*) venit ad membranam (*t*) retinæ similem, cui gelatinosæ pyramides insistent, quæ corneas tunicas basi sua replent (*u*). In hemerobio (*x*) & retiformis tunica adest, & fibrillæ ab ea ortæ, ad singulam corneam tendentes (*y*). Eadem in universum est cancelli natura, in quo nervus opticus evidenter filamenta ad gelatinam corneæ subjectam dat (*z*). Sic in raja nervus in fila distributus ad corneæ particulas dividitur (*a*).

#### §. XVI. *Avium pecten.*

Liceat paucis hanc pulcherrimam particulam dixisse, quam in omnibus avibus

- (*l*) Non reperit in homine ZINN p. 110.  
 (*n*) In hemerobio SWAMMERDAM p. 261. 262. Cancelli p. 206. Scarabæo p. 332. apes p. 4. In ephemero PUGET *lettre* II. p. 82. HOOKE p. 178.  
 (*o*) SWAMMERDAM p. 493. t. 20. f. 1. h. h.  
 (*p*) p. 495. f. cit. i. i.  
 (*q*) Ibid.  
 (*r*) p. 495. t. 20. f. 5. q.  
 (*r*\*) p. 496. f. 5. s.  
 (*s*) t. 29. f. 7.  
 (*t*) p. 337.  
 (*u*) p. 336. t. 29. f. 7. a.  
 (*x*) HOOKE p. 178. in libella.  
 (*y*) SWAMMERDAM p. 261. 262.  
 (*z*) p. 206. t. XI. f. 3.  
 (*a*) p. 496.



avibus vidi, & post priorum scriptorum minus felices labores PETITUS (b) accuratius descripsit; aliqua vero nobis liceat addidisse (c).

Intra retinae de nervo optico originem pecten prodit, ita ut integram retinam possis de eo nervo depellere, quæ hunc pectinem, tanquam vagina, cæco etiam fine terminata continet. A retina nascitur, ex fissura nervi optici (d) planis alterne quasi in acumen ferræ exeuntibus. Paralelogramma (e) fere membrana est (f), utriculosa, vasculosa, fusca, & pene nigra, tenera, ad morem flabelli super se ipsam plicata, non similis bursæ (g), neque cavum aliquod continens, & quam maceratam imperfectam planitiem explices. Fertur antrorsum (h) versus partem posteriorem capsulæ lentis, eique late aptatur, ut tamen alias unum longius filum (i) solum firmiter adhærescat, alias omnino ne filum quidem videas, sed unice adtrahi a pectine lentem.

Ex nervo optico in pectinem tot ex ordine sibi parallelæ exeunt arteriæ (k), totque venæ, quot sunt plicæ, eæque secundum longitudinem pectinis ad ejus finem anteriorem veniunt, & in capsulam forte lentis (l).

Neque fibras habet (m), neque musculosi quid (n), ut lentem movere possit (o); sed omnino corporis ciliaris simillima membrana fit. Absorbere laterales radios Cl. PETIT (p). Mihi videtur, similis arteriæ ALBINIANÆ & bursulæ piscium, advehere sanguinem lenti crystallinæ.

Piscibus nempe etiam pecten est, sed dissimilis. In trocta & lucio ex ingressu nervi optici prodit arteria nigro pigmento obducta, cujus alter ramus vitreum corpus adit; alter circumductus circa vitreum humorem  
cellulosa

(b) *Mém. de l'Acad.* 1735. p. 144 seqq.

(c) *De la form. du poulet* II p. 140.

(d) Habent fissuram PARISINI in struthiocamelo.

(e) *Trapeze* PETIT p. 145. f. 10. 11.

(f) *De la form. du poulet* p. 140. *Journ. des Savans* l. c.

(g) PARIS. *Mém. pour servir à l'histoire des animaux* T. III. P. 2. p. 154. in struthione: & p. 98. in aquila.

(h) *De la form. du poulet* l. c.

(i) Id filum ex angulo derivat, & multo longius pingit PETIT p. 145. f. 11.

(k) Habent PARISINI p. 84. & evidentius BORRICHIIUS in aquila *Add. Journ. des Sav.* 3699. n. 5. In milvo evidenter vidi.

(l) *De la form. du poulet* p. 141.

(m) Vocant fila PARISINI in gallo coq indien, & in aquila, & PETIT p. 145.

(n) Ut PHILIPPUS de la HIRE apud du HAMEL *Histoir.* p. 509.

(o) IDEM, & PORTERFIELD II. p. 276. DERHAM *phys. theol.* p. 105.

(p) p. 147.



cellulosa tela sensim altiori augetur, & denique de interiori quasi iridis facie in plumulam abit, quæ mucrone suo capsulæ lentis crystallinæ adhæret (*p*<sup>\*</sup>). Sed in cyprino, & in altero viliori cyprino capitone, etiam pulchriora vasa vitrei corporis ostenduntur. Huic nempe arteria de RUY-SCHIANA tunica cum sustentaculo lentis crystallinæ prodit, eademque in duos ramos fissa totum humorem vitreum in speciem circuli ambit, qua retina antèrius finitur. Ex eo circulo innumera vasa ad vitream membranam veniunt, undique sparsa, quæ circa convexitatem ejus humoris circumflexa, ramis palmatis cum vasis posterioribus inosculantur. Ea posteriora vasa a centrali arteria retinæ in centrum vitrei humoris subeunt, & ex uno principio in speciem radiorum sparsa, recta alias, & alias serpentina, ad ambitum exeunt, pulchris inter se & cum vasis anterioribus anastomosis conjuncta. In principio sanguis est, finis vasorum est decolor.

#### §. XVII. Vitrea membrana.

Et si veteribus *υαλοειδης* membrana nominatur (*q*), FALLOPII tamen est inventum (*r*), & pellucidissima & tenuissima, & a nullo aliohole mutabilis, simplex membrana (*s*), quæ & in avibus, & in quadrupedibus, & in piscibus, intra retinam ex se ipsa oritur, nusquam observabili aliquo vinculo connexa, nisi ALBINIANAM arteriolam velis (*t*), aut vasa vitreæ membranæ pellucida, quæ in ove & bove (*u*) ad eam, dum retinam parallela sublinat, non obscura veniunt. Facillime ostenditur, flatu per vulnusculum adactò, ut mireris fuisse, qui negarent (*x*); eaque læsa humor effluit (*y*). Antèrius sunt, qui crassiorem esse scribant (*y*<sup>\*</sup>). Poros (*z*) minimos habere videtur, sibi enim permissus humor vitreus

(*p*<sup>\*</sup>) p. 381.

(*q*) RUFUS appell. L. II. p. 55. I. p. 37. Nam ex eo ipso loco adparet, eandem membranam modo vitream dictam esse, modo retinam.

(*r*) p. 214. b.

(*s*) Duas laminas nominat WINSLOWUS n. 218. BERTRANDI p. 68. TAYLOR p. 33. GUNZ de suff. BARBAULT p. 315. Negat ZINN p. 121. PALUCCI metode p. 30. FLU-RANT T. II. p. 476.

(*t*) Vide interim ZINN p. 126.

(*u*) Habet & MORGAGNUS *Epist.* XVII. n. 28. & EUSTACHIUS t. 41. f. 5.

(*x*) BRIGGS c. 3.

(*y*) BERTRANDI p. 73.

(*y*<sup>\*</sup>) O. HALLOLAN p. 44.

(*z*) PORTERFIELD *Ess.* T. I. p. 244.



treus pene totus exhalat (a), & vicissim ex aqua imbibita pondere augetur (b).

Replet retinæ cavem totam, & ab ejus circulo albo, sub anulo mucoso, porro antrorsum pergit. Verum eo loco in homine, & in grandioribus animalibus quadrupedibus, manifesto in duas laminas abit.

Earum anterior (c), nonnullis fulcis corporis ciliaris plerumque fuscata, & striata, propriis etiam brevioribus (d) fibris, quæ ad eos sulcos respondent, subinde percurfa, venit ad anteriorem planitiem crystallinæ lentis (e), ante circulum maximum, ejusque ibi capsulæ adhærescit. Hanc coronam ciliarem novo nomine dixit Cl. CAMPER (f), zonam ciliarem ZINNIUS (g), res enim ipsa a PETITO detecta (h) dudum innotuerat, nisi etiam is anulus ante PETITUM a J. Jacobo RAVIO ostensus est (i). Circularis esset, nisi ad tempora foret latior (k). A retina fieri excidit FERRENIUS, nisi discipuli est error (l).

Lamina posterior vitreæ membranæ discedit ad originem processuum ciliarium, & ad lentem introrsum etiam, sed paulo posterius advenit, recta profensa, & eam porro postquam adtigit, tenaciter satis conjuncta, posterius includit. Eum anulum, quo lentem continet, in senioribus firmiorem esse lego (m).

Inter has duas teneras membranas flatus (n) potest inmitti, qui circumferentia

(a) PORTERFIELD I. p. 243. ZINN p. 120. MAUCHART de cornea p. 14.

(b) PETIT Mém. de l'Acad. 1728.

(c) IDEM ibid. 1726. p. 80. Adde ZINN p. 124. BERTRANDI p. 72. CAMPER l. c. n. 7.

(d) ZINN p. 123. Vascula vocat lymphatica BERTRANDI. Tendineas fibras CAMPER.

(e) Comm. ad BOERHAAVE. T. IV. p. 163. ZINN p. 123.

(f) c. 2. n. 6. p. 12.

(g) p. 121. & in progr. de ligam. ciliar. n. 4.

(h) L. c.

(i) In balana p. 38. Leg. Raviani Conjecturam nunc confirmat CAMPERUS, qui in eo legato cera plenum anulum vidit p. 13. n. 8.

(k) ZINN. p. 124. CAMPER.

(l) Apud HENKEL II. Saml. p. 79.

(m) PALLUCCI l. c. p. 33.

(n) ZINN p. 123. tab. 7. f. 1. CAMPER n. 7.



phera lentis ambitur. A PETITO dictus ( $n^*$ ) est: nullo ( $o$ ), quem conspicuum reddas, humore fluido repletus ( $p$ ). Nam electrico elemento turgere conjectura est ( $q$ ).

In quadrupedibus, puto, omnibus reperitur ( $q^*$ ), in avibus desideratur, & unica vitreæ membranæ lamina ad lentem crystallinam venit.

### §. XVIII. Humor vitreus.

Pisces, aves, & quadrupeda & testacea ( $r$ ) humores in oculis nata sunt, insecta nullos ( $s$ ), & quas nonnulli scriptores lentes ( $t$ ) dixerunt crystallinas, eæ sunt verissimæ corneæ.

Eorum humorum maxime abundat ( $u$ ) in oculo vitreus, a pelluciditate dictus. Ruber est ( $x$ ) in tenero fetu hominis & quadrupedis ( $y$ ); nam in avibus purissime pellucet ( $y^*$ ), & magnitudinem oculi pene solus efficit ( $z$ ), minima enim in pullo lens est. In homine pondus est ad grana 104. ( $a$ ), cum oculus totus penderet 142.

Homini a fervida non cogitur ( $b$ ), & ab admoto igne, vel sponte etiam sua, exhalat ( $c$ ), perinde ut aqua incompressibilis ( $d$ ), cum tamen  
falem

( $n^*$ ) L. c.

( $o$ ) ZINN p. 124.

( $p$ ) Aquam tamen ex vitreo eo perspirasse testis est BERTRANDI p. 73.

( $q$ ) BOISSIER de suffus p. 16

( $q^*$ ) Vidi in cane, bove, lupo, ove, ibice &c. In lupo pulcherrimus, lineam latus est.

( $r$ ) Cochlea habet aqueum, vitreum & crystallinum SWAMMERDAM Biblia p. 105.

( $s$ ) DERHAM physicotheol. L. VIII. c. 3. p. 363. SWAMMERDAM de hemerobio p. 261. 262. &c. de respir. coroll. 22. 23.

( $t$ ) PUGET Journal des Savans 1702. n. 5. & in Epist. sur les yeux des insectes. JOBLOT I. p. 13. in culice.

( $u$ ) VESAL. exam. p. 162.

( $x$ ) ZINN p. 118 FABRIC. II. Saml. p. 58. Flavum etiam vidi in puero 14. dierum, vidi & in puerpera.

( $y$ ) De catulis CHROUET & O HALLORAN. In phoca rubrum esse CHROUET de trib. humor. p. 22. SCHELHAMMER de eo animale. In porcello vidi.

( $y^*$ ) In milvo tamen sanguine suffusum vidi. In lucio pisce flaventem.

( $z$ ) De la-form du poulet II. p. 161. Non invenio pauciorum in avibus esse, ut C. BARTHOLINUS exerc. anat. I. etsi portio ad lentem in adultis minuitur. Sed etiam in quadrupedum embryone oculi ob vitream corpus grandes sunt. Vidi in embryone capellæ paucarum septimanarum corpus totum 17. cent oculum 11 paulo pulmone minorem.

( $a$ ) PETIT Mem. de l'Acad. 1728 p. 221. & 95. ibid.

( $b$ ) CHROUET l. c. p. 16.

( $c$ ) MAUCHART de cornea p. 14. MALPIGH. posth. p. 26 WOOLHOUSE in diff. editis a D. le CERE p. 36. PETIT Mem. de l'Acad. 1728. p. 221.

( $d$ ) WINTRINGHAM p. 289. 290.



falem & terram aliquam, & aerem (*e*) contineat (*f*). Plures quam in aqueo globulos (*g*) in vitreo humore LEEUWENHOECKII industria reperit.

Aqua communi ponderosior est, & in ea fundum petit, estque densior, in ratione quidem exigua (*h*). Literas impositus auget (*i*), etsi modice, & minus quam lens (*k*) crystallina. Pariter a gelu durescit (*l*), atque dilatatur (*m*).

Porro non mirum est viscosum (*n*) esse, multoque magis quam aquam (*p*) in ranis (*q*), & in testudine (*r*), avibusque (*s*), in piscibus (*t*) nonnullis totum glutinosum. Neque enim mera aqua est. Gelu (*u*), quo cogitur, aer in emphysemata expansus (*x*), venenum acidum, quo cellularum membranæ obscurantur (*y*), exitus aquulæ per vulnus non subitus, sed successivus (*z*), ut alia post aliam guttula per nova vulnera sequatur, & in spatio, de quo aer subtractus est, subinde novæ bullæ rumpantur, aeremque edant (*a*); ea omnia ostendunt, membranam vitream (*b*) in ejus corporis caveam descendere, idque in-

D d d 2

nume-

(*e*) CHROUET p. 15.

(*f*) Oculus in spatio inani turgit HOFMANN *hypoth. gouey.* p. 250.

(*g*) LEEUWENHOECK *Phil. trans.* n. 108.

(*h*) 10024. ad 10000. WINTRINGHAM p. 296. Invenerat jam SCHREINER p. 65. densiorem esse.

(*i*) Pene æque refringere ac lens RAHTLAUW p. 31. minus bene.

(*k*) SENAC p. 582. est CARTESIUS *dioptric.* c. 3. & la HIRRE *Mém. de l'Acad.* 1707. & PEMBERTON c. 8. & HAWKSBEЕ *Phil. trans.* n. 328. & ROBINSON post HELSHAM *lect.* p. 401. Plerique aquæ comparant.

(*l*) ZINN p. 118.

(*m*) IDEM *ibid.* BERTRANDI p. 76.

(*n*) Humor tenuis, qualis in ovo ORIBAS. p. 42.

(*p*) Noncuplo WINTRINGHAM p. 278.

(*q*) C. BARTHOLINUS.

(*r*) FEUILLEE *Journal.* t. 2.

(*s*) Aquila BORRICH *Hermet. ægypt. sap.* p. 258.

(*t*) In phoca HARTMANN *de phoca.* p. 16.

(*u*) ZINN p. 120. MORGAGN. *Epist.* XVII. n. 28. PETIT *Mém. de l'Acad.* 1723.

Cogi jam MERRET post BOYLE *de frigore* p. 5. BIRCH T. I. p. 354.

(*x*) LITTRE *Mém. de l'Acad.* 1713. p. 13.

(*y*) MORGAGNI *Epist.* XVII. n. 27. PALLUCCI p. 34. SEARAGLI *supl.* I. p. 212.

(*z*) BOERHAAVE T. IV. p. 160. MAITREIRAN c. 10. p. 35. ZINN p. 120.

(*a*) MUSSCHENBROECK *de aere* p. 18.

(*b*) RIOLAN p. 416. BERTRANDI p. 68. BRISSEAU p. 10. WINSLOW IV. n. 270.



numerabilibus septulis dividere, ut totum cellulis (c) communicantibus fiat, extus latioribus (d), intus angustioribus; tum recepta in cellulas aqua, vasisque per membranas distributis. Parallelepipeda esse, nimis ornate olim WALDSCHMID (d\*). Inflatum corpus vitreum vulgo in racemos lobulorum abit (e). Quare in igne, postquam exhalavit aquula, in glomerem membranarum contrahitur (f), & postquam aqua inde falsa, ex ignis vi propulsa, adscendit, manet tela folliculosa & cellulosa (g). Ob eas causas passim malunt corpus vitreum dicere. (h).

A veneno chemico (h\*), & in morbis (h\*\*) aliquando turbatur (i), quod glaucoma nuperi (k) vocant, insanabile malum, & demum in cartilagineam (l) osseamve naturam abiisse visus est (m). Cæterum ne in senio quidem facile opacum fit.

Ab usu rubiæ semel aliquis in membrana vitrea rubor fuit (n).

Destructum renasci, neque levis auctor exstat (o), & ajunt ocularii aliqui, jacturam in administratione DAVIELII factam facile reparari (o\*).

## §. XIX.

(c) DUVERNEY *posib.* I. p. 149. CHROUET *ed.* I. p. 16. *ed.* II. DESMOURS *Mém. de* 174. p. 60. GUENELLON. MORGAGNI n. 27. 28. WINSLOW n. 230. BERGER p. 406. MAITREIEAN p. 36. 37. PETIT *Mém. de* 1723. & 1728. S. YVES p. 16. LIEUTAUD p. 129. ZINN p. 19. BRISSEAU. PORTERFIELD I. p. 244.

(d) In parte anteriori nonnunquam extra cellulas aquam esse BERTRANDI p. 74.

(d\*) Apud PASCHIIUM *invent.* p. 492.

(e) Etiam HOVIUS p. 18.

(f) DBIDIER *consult.* T. III. p. 107.

(g) BOURGELAT p. 46.

(h) Antoine MAITREIEAN c. 10. p. 34. LIEUTAUD p. 129. Laudat id nomen HEISTERUS *apolog.* p. 225.

(h\*) Cum oleo tartari, spiritu salis, nitri, & vitrioli, non autem cum aceto turbatur PETIT *Epist.* II. p. 31. In fervida paulum opacari, sed celeriter iterum limpidum fieri MOEHRING *de visu* p. 55. Spiritum nitri cum humore vitreo effervescente BORRICH *Hermet. med.* p. 408.

(h\*\*) Membranas inflammatas opacari DAVIEL *Epist.* ad Cl. HOIN p. 12. Cum vitio vitrei cataractas vidit LANCISI apud PALFYN *Anat. Chir. Ital.* T. III. p. 170. & in cane opacum vitreum MERY *Mém. de l'Acad.* 1713. p. 122.

(i) MORGAGNUS *Epist.* XVIII. n. 37. Paulum opacum in fele STÆHELIN *Spec.* ann. 1724. c. 7.

(k) HEISTER *catar.* p. 260. BRISSEAU. Recusat id nomen MORGAGNI *Epist.* XVIII. n. 42.

(l) Sic fere MORGAGN. *Epist.* XVIII. n. 40.

(m) HENKEL *de cataract.* p. 11. qui apud MORANDUM id malum vidit, & LANCISIUS apud HEISTERUM in *vindic.* p. 203. *Chirurg.* p. 602.

(n) Du HAMEL *Mémoire de l'Acad.* 1739. p. 9.

(o) POZZI *Comm. Epist.* p. 84.

(o\*) Fränk. *Anmerk.* T. VI. p. 252. seqq.



§. XIX. *Lens crystallina.*

Non ignota HIPPOCRATI, qui certe (*p*) glutinosum quid in oculo notum habuit, quod elapsum thuris simile fieret, deinde toti antiquitati (*q*); reperitur in piscibus, avibus, & quadrupedibus (*r*), semper multo, quam vitreus humor, minor, inque avium potissimum pullo. Major est in animalibus noctu videntibus; ut in ulula (*s*); tum in cuniculo, lepore. Multo major pro portione piscibus, si cum vitreo humore comparaveris.

Limpida huic corpori natura est, in avium etiam fetu, nam in quadrupedum (*t*) catulis, homineque nondum nato, uti sæpe vidi, utique rubet. Deinde infantili ætate plerumque nitidius (*t*<sup>\*</sup>) pellucet, & in quadrupedibus excolor est (*u*), avibusque: his pernitidum (*x*), neque in his, ut in homine, flavescit.

Mature tamen, aliquando jam in puero modo in lucem edito, ut bis omnino vidi, secundum alios a vigesimo quinto ætatis anno (*y*) incipit flavescere, porroque magis & magis ad topazii naturam accedit. Vidi autem centrum magis flavum fuisse, ambitum pallidius luteum. Non reperi, cum siccarem, lentes eas flavescere (*z*), & siccissimas, gumineas, albissimas coram habeo (*a*). In ultimo senio crystallinum corpus opacum fit, id enim senium fere cum oculorum caligine conjungitur (*b*). Frequenter demum etiam in minori ætate album & opacum redditur, & in homine, & in animalibus quadrupedibus (*b*<sup>\*</sup>): estque ea vulgatio

D d d 3

tior

(*p*) Περὶ ὁφθαλμοῦ(*q*) CELSUS VII. c. 7. n. 13. &c.(*r*) Etiam talpæ CARPUS p. CCIX. b. GALEN. de util. part. L. XIV. c. 6. DEERHAM phys. theol. p. 94.(*s*) COITER p. 130. PETIT Mém. de l'Acad. 1730. p. 11.(*t*) CHROUET. Vidit etiam ZINNIIUS p. 129.(*t*<sup>\*</sup>) Videri opacani, sed continuo clarescere a calore, in brutis nuper natis. PETIT Mém. de l'Acad. 1727. p. 213. Id mihi non perinde successit.(*u*) Etiam PETITO observante Mém. de 1730. p. 18.(*x*) In aquila ALDROVAND. ornith. I. p. 116.(*y*) PETIT Mém. de l'Acad. 1730. p. 18. WINSLOW n. 234. ZINN p. 129. PALUCCI p. 39. 40. PORTERFIELD T. I. p. 230. C. Lit. Nov. 1745. p. 287. &c. Etiam in cataractis fere flava est. In mele flavescentem vidi.(*z*) MORGAGN. l. c. n. 32.(*a*) Sicca & pellucens EL. CAMER. Coll. exper. p. 164.(*b*) Conf. St. YVES p. 267. Siccari CUNEUS.(*b*<sup>\*</sup>) PARISINI in leone: in coatimondi, Cl. BUFFON l. c. T. VIII. p. 349. ego in fele vidi.



tior cataracta, uti recte sub hujus seculi (c) principium ostensum est, & numerosissimis (d), etiam nostris exemplis confirmatum, post aliquas prioris ævi (e) quasi partim divinationes, partim singulas observationes: & veterum cum vero mistos errores (e\*). Ab acidis etiam liquoribus, & a vini stillatitio liquore, lens crystallina opaca fit (f), tum ab igne (g), & a congelatione (h) densatur (i).

Figura in aliis aliisque animalibus alia est, tum in homine. Primumque piscibus non quidem sphærica (l). Semper enim antèrius planior est, ut nunc coram in multis speciebus video, sed minori discrimine (m). Sphæricæ propior etiam est in serpentum genere (n), in testudine (o), in rana (p).

Etiam

(c) Anno 1682. & 1685. in id inventum incidit MAITREJEAN c. 3. publicavit an. 1707. inde Petrus BRISSEAU, qui anno 1705. edidit. L. L. GOUEY p. 312. VIEUSSENS *trait. des liqueurs* c. 15. Anno 1707. Vir ILL. Herm. BOERHAAVE in *med. instit.* HEISTERUS circa annum 1709.

(d) MERY *Mém. de l'Acad.* 1708. 1709. 1713. p. 122. PETIT apud BRISSEAU p. 164. MARECHAL apud eund. p. 153. & BOURDELOT p. 164. & ipse BRISSEAU p. 38. LANCISI ap. PALFYN. III. p. 170. 173. C. Lit. Nor. 1745. p. 287. *Act. Edimb.* V. n. 54. VALISNER. T. III. p. 40. I. ADAM KULMUS p. 58. BENEVOLI apud COCCHIUM. HEISTER *vindic.* p. 204 seqq. *Satyr. files* II. n. 4. STÆHELIN in *thes. var.* anno 1724. c. 7. SANTORIN p. 83. MORGAGN. *Epist.* XVIII. n. 15. 22. 40. VALSALV. ib. n. 22. 26. 29. apud PALFYN *Anat. Chir.* III. ad annum 1718. *Bresl. Saml.* 1724. p. 220. FIZES *de catar.* p. 70. FABRIC. *progr.* anno 1759 ed.

(e) In cataractis crystallinam lentem adfici olim docuit CARRE' apud ROLFINK *diff.* I. c. 17. p. 179. & iterum 1262. Sed habuit pro incurabili, tum LASNIER in *histoir. de la Chirurg.* p. 204. qui utique a chirurgis acu lentem transfigi docuit PALFYN. *Anat. Chir.* p. 386. porro GASSENDUS. ROUHAULT *Phys.* L. I. c. 35. MARIOTTE *nouv. découvr.* Vidit etiam lentes in cæcis induratas STENONIUS p. 82. add. *Act. Hafn.* V. obs. 6. & DRELINC. *præl.* p. 193. & PECHLIN. L. II. obs. 33. & hic gypsea materie obductas angulosas, tuberosas. Olim in senio exsiccatos CUNEUS *apolog.* p. 42.

(e\*) ORIBASIIUS, & veteres omnes, morbum crystallinæ lentis non ignorarunt, & dixerunt glaucoma. Eum vero morbum, qui manu sanatur, cataractam dixerunt, & a membranaula derivarunt *Synops.* L. VII. c. 47. & *anat.* p. 42.

(f) PETIT *Mém. de* 1710. p. 21. 22. 23. 34.

(g) Cocta SPARAGLI *vigil. ment.* 3 ocul. p. XXXVI. PETIT *Mém. de* 1730. p. 20.

(h) ZINN p. 131. MERRET ap. BOYLE *de frig.* p. 5. BOYLE *of cold.* p. 81.

(i) SEVERIN. *Zoot.* p. 338. SCHURER *num. in curat suffus.* p. 7.

(l) Sphæricam faciunt jam PEIRESCUS *vit.* p. 294. tum du HAMEL *corp. anim.* L. II. c. 5. PERRAULT *Essays* GREW *Cosmolog.* p. 24. DERHAM p. 403. LREUWENHORCK *Phil. transf.* n. 293. SMITH *remarks* p. 11. PORTERFIELD I. p. 90. 230. II. p. 261. 263. In galeo PARISINI; in Xiphia SCHELHAMMER: in Salmone GERING *disp.* in Spirincho IDEM ib. in Lucio SEVERIN *Zoot.* p. 372. in torpedine REDI p. 28. in Vipera IDEM l. c.

(m) PETIT *Mémoire. de l'Academie* 1730. p. 12. seqq.

(n) IDEM. p. 11. BERTRANDI p. 69.

(o) PETIT p. 16. CALDESI p. 17. *Hist. de l'Acad.* 1706. p. 8.

(p) PETIT *ibid.*



Etiam calidis animalibus, sed in aqua multum circumspicientibus, valde convexa est & pene sphaerica, ut tursioni (*q*), phocæ (*r*), corvo marino (*s*). Nam piscibus radii luminis per aquam adveniunt, & cornea tunica plana est.

Inde avibus in universum, quas ego viderim, lens quidem plerisque antèrius planior (*t*), planissima picæ, postèrius valde convexa est, majori, quam in quadrupedibus, discrimine, ut mihi videtur. Dantur tamen, quibus antèrius etiam convexior est, ut (*u*) ulula aliisque (*x*); in ave regia neutra (*y*).

Quadrupedibus omnibus etiam pene commune est, exterius planiorem, postèrius convexiorem (*z*) lentis figuram esse. Magis tamen convexa est antèrius, & fere sphaerica in lepore (*a*), cuniculo (*b*), hystrice (*c*), coatimondi (*d*), leone (*d*\*). Planissima in priori hemisphaerio mihi in fele visa est, in mele valde convexa, nucleo sphaerico.

Homini non quidem constans (*e*) est penitus figura, tamen ut pariter,  
ut

(*q*) PETIT l.c. p. 11. Thyngo antèrius lens plana PEIRESCUS l.c.

(*r*) PARISINI.

(*s*) IDEM. DERHAM l.c. p. 106. PERRAULT *Eff.* III. p. 66. Media figura inter lentem & globum PORTERFIELD T. I. p. 230.

(*t*) In anseie PETIT p. 10. Gallopavone IDEM ibid. Struthione PARIS. Aquila IDEM. BORR. *Sapient. hermet.* p. 258. PEIRESCUS p. 294. Meleagride PARIS. ALLEN. MOULINS p. 54.

(*u*) PETIT l.c. p. 11. & coram video.

(*x*) IDEM *Mémoires de l'Acad.* 1736. p. 140. In avibus aquaticis & piscibus planis mediam inter lentem & globum figuram esse PORTERFIELD l.c. I. p. 230.

(*y*) PARISINI.

(*z*) Elephantè PARIS. Equo PETIT p. 8. Bove ibid. Vacca barbarica PARIS. Cane PETIT ibid. Lepore ibid. Fele ibid. Vulpe ibid. coatimondi ibid. opossum *Phil. transf.* n. 290.

(*a*) PETIT p. 10.

(*b*) Ut ipse vidi.

(*c*) PARISINI.

(*d*) K *Swenska wetensk. Handl.* 1747. p. 286.

(*d*\*) In leone, leæna, lynce, & hystrice & rupicapra antèrius convexiorem dicunt PARISINI, quod mireris *Mém. pour servir à l'histoire des animaux* T. III. P. I. p. 12. &c. & vix credas ex felis exemplo, quæ de leonis classe est.

(*e*) Habet jam THEOPHILUS *fabr. corp. hum.* L. IV c. 19. & AVICENNA L. III. *Fen.* 3. c. 1. C. STEPHANUS *ic.* p. 303. deinde FALLOPIUS p. 215. Lenticularem figuram RUFUS dixit.



ut in quadrupedibus, antèrius planior sit, pone convexior (*f*): minus tamen quam fere in ullo animale (*g*) convexa sit, & rarum fuerit, si aliquando aut æqualis fuit convexitas (*h*), aut posterior minor (*i*), aut eadem parabolica (*k*). Neque ejusmodi lentem aut ZINNIIUS vidit (*l*), aut ego.

Maxime utrinque convexa, et pene globosa est homini, nondum nato, tum nascenti (*m*): & myopi (*n*). Inde sponte explanatur (*o*); ut credatur (*p*) circa annum trigesimum perfectam mensuram suæ planitiæ esse adeptæ. Passim tamen legas, senibus planiorem esse (*q*).

Mensuras sumere difficile (*r*) quidem fuerit, si accurate volueris in opere versari. PETITUS tamen, qui plurimum in dimetienda lente crystallina laborem posuit, reperit anteriorem convexitatem esse partem sphæræ majoris, cujus diameter sit inter 6. & 9. lineas, raro ultra (*s*), frequentius tamen circa  $5\frac{1}{2}$ . & 8. lineas (*t*). Posteriolem convexitatem dimensus, invenit segmentum esse sphæræ, cujus diameter sit inter  $4\frac{3}{4}$ . &  $5\frac{1}{2}$ . lineas, frequentius tamen 5. (*u*). Convexitatem anteriorem ad sphæroides, posteriorem ad conum hyperbolicum KEPLERUS olim retulit (*x*).

Primus

(*f*) FABRICIUS *de ocul.* in *ic.* L. III. c. 8. VIDUS p. 318. COITER *tab. anat.* PICCOLI. p. 288. COLUMBUS p. 219. LIND. p. 499. SCHALLING p. 12. PLEMP. *fundam. medic.* p. 108. CARTESIUS ubique: MICHELIUS p. 71. ZINN p. 128. BERTRANDI p. 69. WINSLOW n. 233. WALTHER c. 3.

(*g*) PETIT p. 4. in homine & simia. ZINN *Conim.* T. IV. *de oculo* p. 129.

(*h*) PETIT p. 5. BERTRANDI p. 70.

(*i*) IDEM. ibidem.

(*k*) PETIT ibid. Pene conica C. STEPH. *ic.* p. 303.

(*l*) p. 128.

(*m*) IDEM p. 128. 129.

(*n*) PLEMP. p. 108.

(*o*) PETIT p. 6.

(*p*) ZINN p. 129.

(*q*) BAYLE p. 465. BERTRANDI p. 10. ut demum in senibus anterior convexitas sit pars sphæræ, cujus diameter sit 25. & 30. lin. PETIT p. 5. & ex eo BERTRANDI p. 70.

(*r*) Fatetur PEIRESCUS l.c. PORTERFIELD I. p. 231. Confer. varietates a PETITO adductas *Mém. de l'Acad.* 1730.

(*s*) PETIT *Mém. de 1730.* p. 5.

(*t*) Conf. *tab.* p. 7. Radius convexitatis anterioris est 3. 3081. apud HELSHAM p. 402.

(*u*) PETIT p. 5. Radius convexitatis posterioris est 2. 5086. apud HELSHAM ibid. JUN. p. 134.

(*x*) *Dioptric. prop.* L. X. Conf. BERTRANDI p. 70.



Primus fere PEIRESCUS (*y*) lentem crystallinam dimetiri adgressus est, scrupulumque injiciunt, qui negant omnino perfecte sphæricas (*z*) superficies esse. WALTHERUS semidiametrum majorem (*a*) facit 12. minorem 11. Clifton WINTRINGHAM (*b*) sinum versum arcus anteriorem convexitatem metientis facit o. 189. posteriorem o. 266. Medius axis lentis, sive maxima diameter crassitie, inventa est,  $\frac{1}{100}$ . (*c*) poll. anglic. & duarum linearum (*d*) in Gallia. Diameter latitudinis est (*f*) 4. lin. & aliquantum ultra. Nimis ergo crassam lentem SCHREINERUS fecerat, ut nempe diameter transversa esset ad profunditatem, ut 4. ad 3. (*g*).

Circumferentia vulgo circularis sumitur, aliquando tamen inæquales sunt diametri (*b*). Ellipticam jam fecit MOLINETTUS (*i*).

Pondus, quod magnitudinem data densitate exprimit, est 4. gran. & paulo ultra ad  $4\frac{3}{4}$  (*k*).

Densiolem esse, quam est aqua, continuo adparet, cum in aqua etiam forti fundum petat: variæ vero ejus densitatis mensuræ factæ sunt. Diversitatem ab aqua minorem fecit Cl. WINTRINGHAM (*l*), ut esset lens quidem tota ad aquam uti 1106. ad 1000. nuclei vero ut 1148. ad 1000. Valde magnam rationem, in bubula quidem lente, facit F. HAWKSBEER, ut vires refringentes aquæ, & humoris vitrei, nam facit æquales, sint ad vires lentis ut 16. 50. ad 24. 10. Minoris paulo æstimat Cl. ROBINSON (*m*), qui mediocrem rationem fecit 11. ad 10. (*n*) in homine vero adsumsit, ut 11083. ad 10000. Cl. LUDOLPHUS

(*y*) In ove rationem convexitatis posterioris ad anteriorem esse sesquifextam, in bove sesquiquartam l. c.

(*z*) MARTINE in EUSTACH. p. 347.

(*a*) Diff. de lente crystall. c. 3.

(*b*) p. 284. in bove.

(*c*) PEMBERTON n. 8. Ad 1. 8255. JURIN & RICHARDSON l. c.

(*d*) PETIT p. 5.

(*f*) PETIT p. 4. Majorem & o. 575. WINTRINGHAM p. 284.

(*g*) p. 15.

(*h*) PETIT p. 4. TAYLOR p. 29.

(*i*) Diff. ed. I. p. 18. BRIGGS c. 4.

(*k*) PETIT p. 5. & ex eo BERTRANDI p. 71.

(*l*) p. 239. & ad humorem vitreum uti 10. ad 9. p. 246.

(*m*) Apud PORTERFIELD Eff. T. I. p. 232.

(*n*) HELSHAM l. c. p. 402.



PHUS rationem densitatis aquæ ad densitatem lentis fecit 39 ad 43, rationem densitatis vitrei corporis ad densitatem lentis crySTALLINÆ in bove ut 12. ad 13. in homine ut 9. ad 10. vel ut 7. ad 8. ( $n^*$ ). Quare vitro multo minus densa est, cujus pondus ad lentem crySTALLINAM fit, uti 2. 53. ad 1. 106. plus quam duplum ( $o$ ).

Neque ergo aut vitri ( $p$ ) habebit vim refractilem, ut vulgo sumitur: etsi aliquantum a particulis inflammabilibus adjuvatur: & multo minus adamantis ( $q$ ) cujus sinus refractus est dimidius sinus incidentis ( $r$ ).

Parvam esse, qua aquam superat, prærogativam, nuperi fatentur. Erit tamen aliqua, & ex ponderis ratione, quæ tamen fere sit ut 11. ad 10. & particularum inflammabilium. Angulum incidentiæ radii ex humore aqueo in lentem venientis, ad angulum refractionis, facit uti 87. ad 85. Cl. PORTERFIELD ( $s$ ): Eandem rationem æstimat Cl. PEMBERTONUS ( $u$ ) ut 13. ad 12.: & uti 21. ad 20. Clifton WINTRINGHAM ( $y$ ), & ad radium ex aere advenientem uti 7. ad 5. ( $z$ ), quam rationem Cl. PORTERFIELD non facit majorem, quam 1. 3645. ad 1. Literarum volumen satis insigni portione auget ( $a$ ). Fetui, ut facile exspectes, mollior est ( $b$ ), in adulto sensim durior ( $c$ ), dura seni ( $c^*$ ) homini etiam, quam ulli alteri animali minus dura ( $d$ ). In testudine tamen in aquam viscidam fere continuo dissolvitur ( $e$ ). In oto, uti grandis, ita mollis ( $f$ ) est.

Situs

( $n^*$ ) *Miscell. Berol. Cont.* III. p. 288. 289.

( $o$ ) WINTRINGHAM p. 242.

( $p$ ) Ita CARTESIUS *dioptr.* c. 2. WOLF *opt.* n. 61. PITCARNÉ *morb. ocul.* p. 12.

( $q$ ) WALTHER l. c. Manifestus est error cum facta vi refringente tanto majori, tamen focum æque distantem, ad tres & dimidiam lente diametros reperiat.

( $r$ ) Est tamen eo refracto major, & uti 5. ad 2. ita sinus incidentiæ ad sinum refractionis MARTIN *opt.* p. 60. 61.

( $s$ ) T. I. p. 290. quæ eadem est mensura refractionis radii ex vitreo in lentem advenientis.

( $u$ ) L. c. n. 8.

( $y$ ) L. c. p. 249. & ROBINSON apud HELSHAM p. 402.

( $z$ ) p. 248.

( $z^*$ ) L. c.

( $a$ ) HOFMANN *instit.* p. 166. Valde in serpente *Hist. de l'Acad.* 1706.

( $b$ ) BERTRANDI p. 71. PETIT p. 16. PORTERFIELD l. p. 228.

( $c$ ) PETIT p. 17. WINSLOW n. 234.

( $d$ ) PETIT *ibid.*

( $e$ ) CALDESI p. 17.

( $f$ ) ALDROVANDUS l. c.



Situs non perfecte est in axi oculi, paulo enim propius angulum internum, quam is axis (*g*), lentis axis est.

Recipitur autem in vitrei (*h*) corporis foveam sibi adaptatam, quam circulus PETITI replet. Vidi, & potissimum in nonnullis quadrupedibus, vitreum ante lentem undique prodire, ut quasi in ejus circulari valle sedeat, & antè uveæ ita sit proximus, ut contingere videatur, de qua re fufius agetur.

### §. XX. Capsula lentis crySTALLINÆ.

Lens crySTALLINA, quam diximus, constat capsula sua, & corpore.

Veteres ejus capsulæ aliquam, non plenam tamen historiam tradiderunt (*i*), nimisque tenuem & aranearum telis similem fecerunt (*k*).

Tota nempe lens non solum in anteriori (*l*) parte sua, sed undique, membrana continetur sibi propria (*m*), neque a vitrea tunica orta (*n*). Flatu enim inmisso adparet, circulum PETITI solum inflari, neque aerem aut in lentem subire, aut in vitreum corpus, eum ergo circulum versus lentem capsula claudi (*o*). Deinde sola lentis capsula facile inflatur, neque aer aut in circulum, aut in vitreum transit. Denique etiam vitreum corpus aerem recipit, qui neque in lentem transit, neque in PETITI anulum.

Ea porro capsula, antè potissimum corneæ (*p*) naturæ, pellucens & elastica, & crassa (*q*) est, quam a vitrea ea in sede includi non certum est (*r*).

E e, e 2

Poste-

(*g*) ZINN p. 126.

(*h*) Conf. VESAL. Exam. obs. Fallop. p. 162.

(*i*) Κρυσαλλοειδὲς RUFUS app. I. p. 37. II. p. 55.

(*k*) ORIBASIUS p. 42.

(*l*) Ut GALENUS de usu part. L. X. c. 6. ORIBAS. p. 42. VESAL. p. 801. etiam nuper DUNDELL. p. 136.

(*m*) MORGAGN. Epist. XVII. n. 25. FAZLOP. p. 214 a. b. Ex eo COITER tab. ocul. FABRICIUS de ocul. p. 86. LINDEN p. 488.

(*n*) Du HAMEL corp. anim. L. II. c. 5.

(*o*) Etiam ZINN p. 137.

(*p*) PETIT Mém. de l'Acad. 1723. p. 44. Pene cartilaginea DUVERN. I. p. 148.

(*q*) ZINN p. 136. COLUMB. p. 218. FABRIC. L. I. c. 5. L. III. c. 8. PETIT plurimis locis 1723. 1725. 1726. 1730.

(*r*) Totam vitrea includi MAITREIEAN c. 10. GUNZ de suffus. PALLUCCI p. 28. du HAMEL l. c. BERTRANDI p. 68. WINSLOW n. 229. 235. In pisce STENONIUS myolog. Spec. p. 82. MORGAGN. Epist. XVII. n. 26.



Posterior, qua vitrea tunica suscipitur, tenerior est (*s*), aque ea potest integra separari (*t*), cumque ea cellulosa (*u*) subtili tela revincitur. In duas laminas sunt qui diviserint (*x*).

Pellucida omnino est, etiam magis quam ipsa lens crystallina, hinc minus densa (*y*). A gelu (*z*), & ab humoribus acidis difficilius pariter sua limpida pelluciditate privatur (*a*). Et tamen non raro (*b*) & ipse opacam vidi in cataracta hominum & brutorum. (*c*), & nuper hæc adnotatio ita est aucta, ut frequenter omnino capsula sola in cataracta vitium patiatur, dum ipsum lentis corpus suam pellucidam flavedinem servat (*d*) exemptum. Quæ ipsa est ex causis cataractæ (*e*) membranaceæ, quam juniores chirurgi per sua experimenta restitunt: & hæc sunt cataractæ cum lente pellucida

(*s*) MORGAGNUS n. 25.

(*t*) PETIT. *Mém. de l'Acad.* 1730. p. 436.

(*u*) ZINN p. 136.

(*x*) TAYLOR p. 31.

(*y*) Cl. WINTRINGHAM reperit pondus specificum ad aquam uti 1046. 1000. p. 239.

(*z*) PETIT *Mém. de l'Acad.* 1723. p. 44.

(*a*) Negat PETIT *Mem. de l'Acad.* 1730. p. 443. RAHTLAUW de catar. p. 15.

(*b*) In cataracta opacam reddi negabat GUNZIUS, negabat PETIT *Mém. de* 1730. p. 436. 442.

(*c*) Vidit etiam MORAND *Hist. de* 1722. VALSALV. ap. MORGAGN. *Epist.* XVIII. n. 14. MAY *Comm. Lit.* 1733. *bebd.* 4. HUMMEL olim noster ibid. 1736. *bebd.* XI. HENKEL *Saml.* II. p. 56. 59. &c. In cataracta causa erat lacera capsula VALSALVA in PALFYN Edit. Ital. Et eam extraxit Cl. HOIN *assembl.* I. c. 1757. & BRISSEAU p. 64. Cl. collega noster TENON. de cataracta p. 6. 7. 8. & exstant exempla in K. *Svensk. Vet. handl.* 1756. *trim.* 3. apud Cl. DAVIEL ad HOIN p. 30. In fene opacam vidit HEUBERMANN *oper. chir.* II. p. 561.

(*d*) *Lett. de Mr. de VERMALE* p. 30. TENON. *Mém. des savans étrangers* T. III. p. 32. 35. 37. 42. 44. 49. 58. 59. de cataracta p. 7. 8. *Ess. of a Societ. at Edimb.* T. V. n. 54. Lentis in cataractis flavas jam LANCISIUS viderat apud HEISTER *vindic.* p. 203. MARINI p. 18. Flava lens in cataracta *Journ. de Médec.* T. II. n. 6. *Fränk. Anmerk.* T. VI. p. 252. seq. BENEVOLI *Epist.* ad COCCHIUM. RIBE K. *Svensk. vet. &c.* 1745. HENKEL *Saml.* II. p. 56. seqq. ACRELL K. *Sv. vetensk. Acad. Handl.* 1757. 2. HOIN *assembl. de Chir.* 21. avril. 1757. Conf. VALSALV. apud PALFYN. *Anat. Chir.* T. III. p. 45. Ante omnes CUNEUS *apol.* p. 42. & SCHEINERUS scripsit, suffusionem fieri a mutato aranæ colore *nerv. opt.* p. 237.

(*e*) TENON. *diff. de cataracta* & in T. III. *des mém. des savans étrangers.* Pelliculam albam retro iridem absque vitio lentis vidit VERUSSENIUS *trait. des liqueurs* c. 15. & simile exemplum habet PINSON *Journ. des sav.* 1722. Juill. Tuentur membranaceam cataractam WOOLHOUSIUS ubique. VOLTER. apud HENKEL II. p. 86. DEIDIER *Journ. des savans* 1722. Juil. GEISLER *Journ. des Trév.* 1718. Mai. LANCIS. apud HEISTER *vindic.* p. 206. IORMA p. 80. *Miscell. Berolin.* T. VI. p. 68. FIZES de cataracta p. 58. Rarius tamen malum esse credas, quod Cl. BRISSEAU, HEISTER, WINSLOW, MORAND & PETIT (*lettre* p. 8.), & ILL. LIEUTAUD (*précis* p. 520.) & frequens certe oculorum perterebrator TAYLORUS p. 137. nunquam viderint.



cida, quas sex produxit WOOLHOUSE (f). Etiam flocci cataractam comitantes capsulæ sunt fragmenta (g).

In ea capsula libere (h) lens hæret, ut vel in cadavere, vel in vivo homine in Cl. DAVIEL operatione, post aliqua (i) antiquiora exempla nunc luculentissime constituta, continuo exsiliat, quando capsula violata est (k). Casu excussa lens continuo vitalem naturam amittit (l), & opaca fit (m), tum a morte sponte sua (n).

Aquam ea sede aliquam (o), ad grani dimidium (p) inter lentis crystallinæ capsulam & corpus esse, inprimis inter capsulæ partem anteriorem, & lentem ipsam, fere apud optimos auctores (q) reperias, & ego passim ipse vidi in lupo manifestum, nuperque in anate lacteum, & in femina hydropica pultaceum (r) pro aqua humorem, cum ipsa lens pelluceret; si tamen quidquam meis possum oculis fidere, passim in aliis exemplis omnino nullam (s) in crystallina lente aquulam reperi. Ut fere

E e e 3

credam

(f) De cataracta p. 72.

(g) TENON. ibid. p. 37.

(h) PETIT lettre p. 5. Mém. de 1730. p. 436. MAITREIEAN c. XI. PORTERFIELD Ess. T. IV. p. 196.

(i) AVICENNA apud SCHURER disp. cit. p. 29. Merc. de France 1705. BURRHUS p. 52. & ROCCUS MATTHIOLI ibid. Mém. de l'Acad. 1706. 1707. 1708. 1709. BEISSAU p. 165. WOOLHOUSE p. 19. CHESLDEN p. 36. Phil. transf. n. 322. MORGAGN. Epist. XIX. n. 2.

(k) Ess. of a Societ. at Edimb. T. V. n. 54. S. YVES p. 275. 276. TRIOEN. p. 98. HEISTER de cataracta p. 186. KENNEDY p. 20.

(l) Journ. de Trévoux 1731. p. 641. DEMOURS ed. soc. I. p. 420. BOYLE final. caus. obs. 4. A vulnere, aut ictu cataracta GUIDO p. 386. Etiam sede non mota ab ictu in cataractam abit MAITREIEAN p. 252.

(m) DAVIEL lettre à M. HOIN p. 7. PETIT Mém. de l'Acad. 1730. p. 444. WOOLHOUSE p. 62. 63. HEISTER de catar. p. 63.

(n) HEISTER de catar. p. 338. PETIT Mém. de l'Acad. 1727. 1710. p. 449.

(o) PETIT l. c. PALLUCCI p. 42. 43. In pisce carcharia primus STRONNIUS vidit myol. spec. p. 81. 114. deinde du HAMBL habet l. g. c. 5. & GUNZ p. 12 de suffus. TAYLOR p. 32. PORTERFIELD T. I. p. 237. DUDDELL. app. p. 115. (saepè visam) RAHTLAUW p. 24. 30.

(p) PETIT p. 446.

(q) BERTRANDI p. 73. MORGAGNI Adv. VI. p. 90. Epist. XVII. n. 32. Cl. WINTRINGHAM p. 241. JURIN. distinct. vision. p. 139. ZINN p. 138. PETIT Mém. de 1730.

(r) Lens tamen flava erat, & pellucida. Habet similem humorem HEISTER de cataracta p. 225. Eph. Natur. Cur. Cent. IV. obs. 198. & in fele STÆHELINUS specim. 1724. n. 7. Hæ sunt cataractæ lacteæ BARTISCH p. 46. b. 64. FRIYTAG de cataracta p. 19. HEISTER l. c. p. 225. GARENHOLZ vis. per catar. imped. KENNEDY p. 83. 93. MORGAGN. Epist. XVII. n. 17. RIBE K. Sw. wet handl. 1745. p. 45. &c.

(s) Patetur etiam abesse BERTRANDI l. c. & PETIT p. 445.



credam, exhalantis de ipso lentis corpore aquulæ partem esse, cujus in sano corpore exigua copia fit, ad vaporis pericardii modum, & impediat (t) lentis ipsius cum capsula sua cohæsionem. Nam ea aquula emissa, lens crystallina collabitur, sicca fit, & opaca (u), & suæ capsulæ adhæret (x). Cæterum a morte augetur eadem, quando per capsulam quidem, sed minus expedite, quam in vivo animale, perspirat. Nam tota hæc nostra lens cum ab aqua penetretur, eam pariter videtur undique exhalare (y), in adulto minus (z): vicissimque etiam per poros capsulæ absorbet (a), in aquam dimissa. Totam dissolvi in similem liquorem exempla sunt (b).

Eam aquulam ab acidis liquoribus turbari lego, ut quæ sit lymphatici generis (c). In gelu bullas aereas ostendit (d).

### §. XXI. *Fabrica lentis crystallinae.*

Fabrica ob summam partium pelluciditatem obscura est. Id facile quidem, in piscibus (e) potissimum, sed etiam in serpentibus (f), quadrupedibus (g), avibus & in homine (h) internam partem duriores esse, molliorem, quæ extrema (i), ut illa omnino *nuclei* nomine distingui possit. In ea intima sede densitas major est (k), & prima flavedo (l), prima-

(t) PORTERFIELD T. I. p. 237.

(u) PETIT Mém. de l'Acad. 1730. p. 448.

(x) IDEM ibid. HEURMANN oper. T. II. p. 561.

(y) PETIT Mém. de l'Acad. 1730. p. 19.

(z) BRETRANDI p. 71.

(a) PETIT Mém. de 1730. p. 20. Major facta est crystallus ocularis, quæ in cameram anteriorem transierat Hist. de l'Acad. 1749. p. 104.

(b) Journ. de Trévoux 1726. p. 2209.

(c) PETIT Mém. de l'Acad. 1730. p. 447.

(d) IDEM ibid. 1723. p. 53.

(e) In piscibus: in Xiphia quasi gypseus MALPIGH. postb. p. 26. Extus mucilago, intus fere cornu PORTERFIELD l. p. 229. Phil. transf. n. 59.

(f) In ranis PETIT Mémoires de l'Acad. 1737.

(g) In hystrice PARISINI.

(h) POWER p. 81. la HIRE accid. de la vue Mém. de l'Acad. 1706. p. 611. PETIT Mém. de l'Acad. 1730. p. 20. 1726. BRISSEAU p. 100. ZINN p. 133. GUNZ suffus. p. 12. PALLUCCI p. 39.

(i) Extus gelatina, intus sebum PORTERFIELD Ess. of a Societ. at Edimb. T. I. p. 227.

(k) CL. WINTRINGHAM. RIZZETTI Giorn. de letter suppl. I. p. 392. Etiam in lupo vidi. add. RIBE de cataract. p. 13.

(l) Etiam ZINN p. 130.



primaque opacitas (*m*), & duritas, & cataracta incipit (*n*). In piscibus notissimum est, quando coquuntur, destructo in albas laminas externo cortice, nucleum pellucidum superesse.

Deinde sibi permixtæ lentes, capsula destitutæ, in trium (*o*), aut quatuor (*p*) fere radiorum stellam, aut plura etiam triangula (*q*) diffiliunt, quos radios in homine a margine venire, & ad centrum progredi, in animalibus a centro nasci, & ad margines exire (*s*) subtili discrimine lego. Optime succedit, si lens sub aquam data fuerit:

Paulo post, si in spiritu vini aut aceto maceraveris, non obscuræ sunt in eadem lente *laminæ* (*t*) concentricæ (*u*), sibi impositæ, quas possis etiam scalpello elevare, ut libri folia. Quæ primæ adparuerunt laminæ, eæ in alias aliasque subinde diffiliunt, ut numerus enormis, non centum (*x*), sed 2000. (*y*) laminarum natus sit. In parte posteriori sibi viciniore & tenuiores esse lego, quod de nucleo interpretor (*z*), cujus par est natura (*z*\*). Inventor creditur STENONIUS (*a*) in homine (*b*), quadrupede, pisce; sed prior in hyæna Petrus CASTELLUS (*d*) viderat gemmas oculares ejus animalis in tres quatuorve veluti squamas, lapidibus

(*m*) MARIOTTE *nouv. découvr.* p. 108.

(*n*) MORGAGN. *Epist.* XVII. n. 18. BRISSEAU p. 141.

(*o*) DRELINCOURT *præhud.* p. 192. PETIT *Mém. de l'Acad.* 1730. p. 20. 25. CASTELLUS in *hyæna*. CAMPER p. 10. MÜLLER *irrit. irid.* p. 9. In rupicapra PARISIINI. In lupo vidi, vitulo, aliisque. In phoca diffilit MARTENS p. 77. & in Xiphia SCHELHAMMER in fele BIRCH t. III. p. 476.

(*p*) *Mém. avant.* 1699. I. p. 431. DRELINCOURT.

(*q*) ZINN p. 132. MORGAGN. *Epist.* XVII. n. 30. PETIT *Mém. de* 1730. p. 21. Etiam in homine ZINN *ibid.*

(*s*) *Idem* p. 133. MORGAGN. l. c. PETIT *Mém. de l'Acad.* 1730. p. 24.

(*t*) LA HIRE l. c. CHROÛT *de trib. hum.* p. 27. LEEUWENHOECK *Phil. transf.* n. 108. ZINN p. 132. MORGAGN. n. 30 31. PETIT *Mém. de* 1730. p. 18. 19. 24. SEARAGLI *vigil.* p. XXXVI. SCHACHER *admin. anat.* p. 17. CAMPER f. 8. HOVIUS p. 46. *tab.* 5. f. 4. BURRHUS p. 59. In balæna LEEUWENHOECK *Phil. transf.* n. 293. p. 66. *arcan. nat. detect.* p. 64.

(*u*) Anterior planas, posterior ad centrum convergentes BERTRANDI p. 74.

(*x*) In cane centum SCHACHER *de cataracta*.

(*y*) LEEUWENHOECK l. c. p. 68.

(*z*) CAMPER. p. 10.

(*a*) *Myolog. spec.* p. 104. ZINN p. 133.

(*b*) ZINN p. 132.

(*c*) *Idem* p. 132. 133. MORGAGNUS *Epist.* XVII. n. 31.

(*d*) *De hyæna* p. 21.



bus limacum similes, dissilire. Negant aliqui in homine adparere, puto de minutori LEEUWENHOECKIANA fabrica locuti (e).

Quæque iterum harum lamiparum fibris (f) constat parallelis, quas transversæ fibrillæ cellulosæ (g) conjungunt, mirifica cum pulchritudine in vortices flexis, quorum alias tria (h) centra sint, illius stellæ causæ, alias duo in nonnullis quadrupedibus (i) ut ipse vidi, ut centrum esset anterius & posterius, & fibræ in circulo maximo terminarentur: tum in piscibus, in quibus axin terminant (i\*). In homine hæc non datur imitari (k), & de ipsis fibris dubitabat Elias CAMERARIUS (l). Sed in animalibus evidentia sunt, neque in capsula ulla adparent. Ajunt ad latera crassiores esse, quam anterius & posterius (l\*). Mihi anterius potissimum conspicuæ videntur.

Ultra nihil quidquam innotuit, & vasculorum obscura est memoria (m), quæ alias dicemus. Nervum lens nullum accipit, ut merito in depositione absque dolore transfigatur (n).

Cellulosam tamen telam (o) laminas conjungere, easque demum aquula tenerrima ebrias, esse, in exterioribus laminis manifestiori (p), legimus argumento bullarum acrearum, quæ a gelu nascuntur; interiores vero laminas minores esse (q), & fibras intus densiores (r). Cellulosam quidem telam vidi.

Cum

(e) *Physiol. Amst.* p. 504.

(f) Lineæ rectæ in lente crystallina cocta GREW apud BIRCH T. IV. p. 296. KENNEDY p. 19. Fibræ PETIT *Mém. de 1730.* p. 21. 24. 25. 26. 441. fulci MAITREIRAN p. 209. In lepore vidit MORGAGNUS *Epist. XVIII.* n. 28. In balæna dicuntur in *Phil. transf.* n. 293. ad 12. Habet etiam DUVERNEY l. p. 148. Radiatæ fibræ in cataractæ parte posteriori DAVIEL ad HOIN p. 3. In cataracta, sed ab anterioribus retrorsum extensæ MAITREIRAN p. 121. Ex centro anteriori in posterius PALLUCCI p. 41.

(g) TENON. p. 4. f. 4.

(h) In plerisque quadrupedibus LEEUWENHOECK l. c. p. 72.

(i) Lepore, cuniculo ibid.

(i\*) LEEUWENH. ibid. p. 75. Duo poli BRISSEAU p. 14. In balæna unus l. c.

(k) WINSLOW n. 233.

(l) *Med. elect. spec. diff.* IX.

(l\*) DUVERNEY l. p. 149.

(m) Negat PETIT *Mém. de l'Acad.* 1730. p. 440. seqq.

(n) DUDDELL. *app.* p. 50.

(o) ZINN p. 134. Filamenta MORGAGN. n. 30. & membranulæ n. 32. Fila transversa TENON. p. 4. tab. 4.

(p) ZINN p. 133.

(q) IDEM p. 134. PETIT *Mém. de l'Acad.* 1723. p. 53.

(r) TENON. p. 4.



Cum lens crystallina fabricam sibi propriam solidam habeat, neque humoribus ( $r^*$ ) debet accenseri, neque amissa renascitur ( $s$ ). Facile exsiccat ( $t$ ), induratur ( $u$ ) in cataractis, & cartilagineam ( $x$ ), demum osseam ( $y$ ) & lapideam ( $z$ ) naturam induit, qualia ipse vidi.

Oleum enim in ejus natura, & spiritum abunde ( $a$ ) contineri Cl. viri est observatio. Initis numeris reperit in drachmis sex, fuisse aquæ insipidæ guttas 40. spiritus penetrantis drachmas duas, salis volatilis grana 6. 7. olei fætidissimi scrupulos duos ( $b$ ), carbonis drachmas duas, qui calcinatus dederit sedimenti gr. 28. absque sale fixo.

### §. XXII. Humor aqueus.

Eum, cum primus se offerat, novissime ( $c$ ) a GALENO inventum esse mireris ( $d$ ): diceres priscos solos piscium ( $e$ ) oculos incidisse, in quibus est parcissimus, cum planissima cornea iridi incumbat. Aliquid tamen ( $f$ ) glutinosi, dum corneam removi, in omnibus piscibus extrahi, manifestissimus autem humor est in mustela fluviatili, lucio, trota, cyprino. Habent & ranæ ( $g$ ).

In

( $r^*$ ) Monet TASSIN *admin.* p. 36. HEUCHER p. 528. SCHACHER I. C. MARI  
TERRIAN C. 10.

( $s$ ) POZZI . p. 84.

( $t$ ) Etiam in animale Coatimondi K. *Swensk. wetensk. bandl.* 1747. p. 286. & fere similia BUFFON VIII. p. 349.

( $u$ ) VALSALVA. MORGAGN. *Epist.* XVIII. n. 29. Duras ut vitrum DAVIEL *Epist.* ad HOIN p. 4.

( $x$ ) MORGAGN. *Epist.* XVIII. n. 40. LANCIS apud PALEYN III. p. 173.

( $y$ ) DAVIEL K. *Sw. wetensk. bandl.* 1759. *Trim.* I. CHROUET p. 17. ZINN *Hamb. Magaz.* XIX. p. 439. & ego in *Opusc. pathol. obs.* 53. SUE ad MONRO p. 21.

( $z$ ) VARNETTES *f. es pierr.* p. 57. Arenulæ in lente crystallina MAUCHART *de lumbric. in duct. pancrat.* Pene lapidea lens MORANDUS. HENKEL *de cataract.* p. 11. MARY *Mém. de 1707.* p. 449. Gypsea PRCHLIN. II. p. 33.

( $a$ ) Plus quam in ullo alio humore humano CHROUET p. 18.

( $b$ ) IDEM p. 17. ed. I.

( $c$ ) Inanem locum dixerat CELSUS L. VI. n. 7.

( $d$ ) Adnotante MORGAGNO. Spiritum æthereum vocat ORIBASIUS p. 42.

( $e$ ) Nullum in mola PLANCUS *Comm. Bonon.* T. II. P. 2. p. 300.

( $f$ ) Pene nullus in aliis; ut tamen in aliis repetiatur PRIBESCU *in vita* p. 294.

( $g$ ) PATTI *Mém. de l'Academie* 1738. p. 151.



In avibus (*b*) vero & in quadrupedibus (*i*), & in homine, totum spatium, quod est inter cornæ faciem concavam, interque lentis crystallinæ faciem anteriorem, & aliquo usque inter liberam sedem radiorum corporis ciliaris, & uveam, totum id plenum est aqua limpidissima, in sano homine, & maxime decolore. In senibus opaciorem reddi adnotatum est (*k*). Fetus tamen aliquantum rubet (*l*), & in homine, inque animalibus a me turbida nonnunquam est reperta (*m*), aut sanguine mista (*n*). Copia est  $3\frac{1}{2}$ .  $4\frac{1}{2}$ . (*o*), 5. &  $5\frac{1}{2}$ . (*p*), granor. &  $4\frac{8}{100}$ . (*q*), & in fetu perparca (*r*), tum in moribundis (*s*), etiam in senibus parcior, quæ est inter causas collabentis oculi (*s*\*). Leviolem esse, quam est aqua fontana, in ratione 975. ad 1000. & etiam in fene ut 992. ad 1000. (*t*), mireris, cum in eo humore sal admixtus sit.

Naturæ est exhalabilis; ut absque reliquiis ad ignem avolet (*u*); neque ab ulla vi ignis cogatur, aut turbetur (*x*); sed neque ab alcohole, neque ab ullo acido spiritu cogitur, etsi sunt aliqui, a quibus ejus limpiditas turbatur, ut nitri spiritus, & aqua regia (*y*). Continet, ut alii humores, aerem (*z*), & salem fixum (*a*), in quo etiam marinus est, paucum quidem (*b*). Sponte putrescit, & fætet (*c*). In  
testudine

(*b*) Copiosus in nocturnis avibus P R I E S C U S l. c. & abundat certe in ulula.

(*i*) Leoni multus P A R I S I N I. Plurimus, ut mihi visum, feli.

(*k*) N U C K duct. aquos. c. 3.

(*l*) Etiam Z I N N p. 146.

(*m*) Turbidus in M A Y E R N I I historia prax. med. p. 115. M A U C H A R T paracentesi oculi. H E I S T E R de catar. p. 310. S C H A A R S C H M I D T Berlin. Nachricht. 1740. p. 48. In morbo M E R Y Mém. de 1713. p. 122. In senio. H O F M A N N med. consult. T. V. Dec. IV. c. 2.

(*n*) S. Y V E S p. 280.

(*o*) P E T I T Mém. de 1723. p. 45.

(*p*) I D E M lettre p. 5. Mém. de l'Acad. 1727. p. 248.

(*q*) P E T I T l. c. 1728. p. 209.

(*r*) I D E M Mém. de l'Acad. 1727. ad primum mensem. N U C K defens. p. 25.

(*s*) Z I N N p. 147.

(*s*\*) D U V E R N E Y l. p. 147.

(*t*) B E R T R A N D I p. 75.

(*u*) D E I D I E R l. c. S C H U R R diff. cit. p. 7.

(*x*) S C H U R R l. c.

(*y*) P E T I T lettre à un Méd. du Roi II. p. 31. Striæ albæ cum spiritu nitri S C H U R R. T. I. p. 22.

(*z*) M U S S C H E N B R O E C K l. c.

(*a*) D E I D I E R l. c. Lixivus Aët. Hafn. I. p. 153. Subsalsus N U C K duct. aquos. c. 3.

(*b*) C H R O U F T p. 15.

(*c*) P O R T E R F I E L D T. I. p. 319.



testudine gelatinosus est (*d*), et in piscibus. Glutinosum esse DUVERNEY (*d*<sup>\*</sup>) non recte certe in quadrupedibus, & avibus.

Eum humorem perpetuo novum gigni, & intra breve tempus reparari totum, certis experimentis innotuit. Non ignoravit vetustas aut casu, aut per experimentum in hirundinibus (*e*), & lacertis (*f*) captum, pertusa cornea membrana, humorem effluere, & eundem vulnere deligato reparari, etiam in homine (*g*).

Inter nuperiores alii Cl. viri vulnerum phaenomena adnotarunt (*h*). Alii curandi causa corneam pertebraverunt, ut meliori succo priorem repararent (*h*<sup>\*</sup>). Alii aut famam sectantes (*i*), aut lucrum, aut omnino ut in verum inquirerent, in variis animalibus (*k*) rem tentarunt. Constans eventus fuit, collabi oculum & flaccescere, emissio humore, sed intra sex (*l*), & 22. & 24. (*m*), & 36. (*n*), horas corneam membranam laesam coalescere, & repleri (*o*), & plenum humoribus, ut prius oculum esse. Denique si deletus fuerit humor vi-

F f f 2

treus

(*d*) PARISENI.

(*d*<sup>\*</sup>) p. 147.

(*e*) ARISTOTELES *hystor. anim.* L. VI. c. 5. *gener. anim.* L. IV. c. 6. PLIN. MAJOR. L. XXV. n. 50 add L. VIII. c. 27. PLIN. *val.* L. I. c. 18. ÆLIAN *anim.* II. c. 3. MARCELL. *Empir.* p. 57.

(*f*) ÆLIANUS *anim.* V. c. 47. Lacertis nempe oculis pertusis visum rediisse. Hirundinibus CARDANUS *variet.* L. VII. c. 36. p. 213.

(*g*) In puero GALIENUS *symptom. caus.* L. I. c. 2.

(*h*) COITER p. 112. VERBRUGGE ad GUILLEMEAU p. 43. RHOD *Cent.* I. n. 81. GLANDORP *specul. obs.* 15. 16. Eph. Nat. Cur. vol. VII. obs. 47. TULP. I. c. 30. BLANCAARD *Jaarreg.* C. IV. ZAMBECEARI ad SANCASSANUM. HAGEDORN *Cent.* I. *hyst.* 53. MAUCHART *fist. corn.* p. 18. HERBS *obs.* p. 80. 81. FRBYTAG apud MURALT *Chir. Gesch.* n. 7. GALMIN. IV. p. 244. Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. II. obs. 132. HIEDAN. *Cent.* I. obs. 26. MARCHETT *comp.* p. 133. le FEVRE *de venæ sect.* p. 74. Phil. trans. n. 453.

(*h*<sup>\*</sup>) p. 410.

(*i*) Ut Jos. BURRHUS.

(*k*) BRASSAVOLA *exam. simpl.* p. 203. Ant. MOLINETTUS apud MAJOREM. KERKRING *obs.* 100.

(*l*) MAJOR *coll. med. cur. spec.* VI. in anser.

(*m*) MAUCHART.

(*n*) MAJOR *spec.* VII.

(*o*) Habent similia COITERUS. HERBS in gallina: BURRHUS in *Epist. fda* p. 39. 40. 61. apud BARTH. *Epist.* IV. p. 17. Act. Hafn. Vol. I. n. 132. Zod. Gall. an. IV. m. apr. NUCK *de ductib. aquos.* REDI in *Esper. natur.* MORGAGN. *Epist.* XVIII. n. 40. RIVA Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. I. obs. 117. In anser etiam intra paucas horas renatus est ELSHOLZ *E. N. C. D. I. ann.* 6. 7. obs. 126. Ecce alios, si placet, ad reparatos



treus, totam nonnunquam oculi caveam ab aqueo humore late repleri ( *p* ). Superstitionem vanam herbarum & chelidonii ( *q* ), post veteres, BURRHUS addidit, de lente crystallina nimius promissor ( *r* ).

Vulgo nunc notissimum experimentum est; postquam nupera industria ea via docuit cataractam educere. Nam ii oculi, opaca lente crystallina liberati, & aqueo liquore exhausti, facillime iterum redivivo humore replentur. Die octavo ( *r*<sup>\*</sup> ), duodecimo ( *s* ), decimo quinto humor renatus ( *t* ) est, quem per incisam corneam ad eximendam lentem Chirurgus emiserat ( *u* ). In 12. minutis generata grana 23. ( *x* ).

Denique non rarissime nimia copia generatur, ut in hydropem abeat, corneamque cogat vitiose prominere ( *x*<sup>\*</sup> ).

Communis, puto, ut aliorum humorum, ita hujus aquæ ex arteriis ( *y* ) est scaturigo. Neque rarum exemplum est, aut impulsus in oculi vasa terebinthinae oleum in aqueum humorem exire, aut argentum vivum ( *z* ) ad cutem illitum, aut per vasa impulsus ( *a* ), aliumve liquorem in eum humorem se admiscuisse.

Quæ arteriæ eum humorem generent, non penitus potest definiri. Probabile est omnino, vascula fluitantia corporis ciliaris ( *b* ) hunc humorem de innumerabilibus suis osculis separare: A vasis anterioribus iridis ( *c* ) aliqui

paratos ab incisa cornea oculos auctores BENIVEN. *abdit. rer. caus.* p. 74. COLUMBUS p. 219. VALVERDUS p. 247. J. LANGIUS *Epist.* L. I. p. 32. ARANTIUS *observ.* c. 20. p. 70. VERZASCHA *obs.* 14. BRISSEAU p. 104. MAITREBIAN c. 12. HEISTER. *de cataract.* p. 310. KENNEDY p. 51. 56. PURMANN *Lorberkranz* p. 62. SCHOTT *techn.* p. 693. DROUIN p. 83. POZZI p. 84. In equo BOURGELAT T. II. P. 2. p. 164.

( *p* ) MORGAGNUS *Epist.* XVIII. n. 38. 40.

( *q* ) BURRHUS p. 42. &c. Conf. BARTHOLIN. *Cent.* II. *epist.* 89. 97.

( *r* ) Et eam lentem renasci *Act. Hafn.* I. n. 133. tum KERKRING *obs.* 100. MACEDORN l. c.

( *r*<sup>\*</sup> ) MAITREBIAN p. 188.

( *s* ) MERY *Mém. de l'Acad.* 1707. p. 494.

( *t* ) *Journ. de Trévoux* 1756. May.

( *u* ) MERY *Mém. de* 1707. GANDOLPHI *Mém. de* 1709. *Phil. transf.* n. 322. &c.

( *x* ) O HALLORAN p. 93.

( *x*<sup>\*</sup> ) Vide ophthalmiatros, & SCHERB. *calc. receptac. cbyli* &c.

( *y* ) Ex glandulis MYLIUS, quæ sint in sclerotica tunica positæ.

( *z* ) VIEUSSENS *obs. d'anat.* p. 280. 281. WOOLHOUSE. DUDDELL. *bor. mycoat.* p. 113.

( *a* ) HOVIUS p. 28. ZINN p. 149. VIEUSSENS l. c.

( *b* ) Ita in L. de *arter. ocul.* p. 48. suspicatus sum, tum B. ZINN p. 148.

( *c* ) ALBINIANI vide ZINN p. 248.



aliqui, a vasculis pellucidis uveae alii (*d*); ab arteriis anterioris camerae (*e*) oculi iterum alii derivant; a choroidea non nemo (*f*) generari suspicatus est. Ex humore vitreo (*g*) aliquid per membranae poros se admiscere, vetare videtur interjectus PETITIANULUS. Ab iride nasci prohibet, quod ejus arteriae non sint patulae, cum membrana pupillaris aciem iridis claudat; tum quod etiam pone eam membranam humor aqueus in fetu adpareat; quod clausa iride multus pone eam humor, ante eandem vix quisquam fuerit (*h*); quod flocci ciliares aptiores ad exhalandum videantur.

Denique NUCKIUS (*i*) in pisce galeo peculiarem ductum vidit; deinde plures, qui scleroticam perforarent, diversi ab arteriis (*k*), & fontes essent humoris aquei, quales & quadrupeda haberent, & homo, ex arteriis ortos. Addebat nigricare, absque ramis ad extremam ire corneam, tunc corneam perforare, circulum (*l*) facere, vehementem humorem loturae carniū similem. Adstipulatores paucos habuit (*m*).

Continuo WARNERUS CHROUET (*n*), bono licet parvo opusculo, ostendit, eos fontes esse arterias (*o*), & ab arteriis repleri, & vinculo (*p*) subjecto sponte sanguine turgere (*q*). Deinde & HOVIUS (*r*) peculiare ductus esse negavit, & HEISTERUS (*s*), & alii (*t*), & ostendi, ni fallor (*u*), quod vidisset NUCKIUS, esse ar-

F f f 3

terias

(*d*) HOVIUS p. 26. tab. 2. f. 2. *Physiol. Amst.* edita p. 507. la CHARRIERE p. 278. Ex iis vasculis profluxisse den APPEL. *de oculo* p. 43.

(*e*) KAAUW n. 734.

(*f*) Concolorem esse choroideae in homine, & cane, fuscum, in ove, & vitulo nigrum o HALLORAN p. 100. Sed is atror est a dissoluto pigmento nigro oculi.

(*g*) S. YVES p. 29. KENNEDY p. 21.

(*h*) MERRY *Mém. de l'Acad.* 1707. BONHOMME p. 144.

(*i*) *Duct. aquos. & in defens.*

(*k*) T. 4. f. 1.

(*l*) T. 6. f. 1. Ex ea nota adgnoscas arterias longas, quas alias dicemus.]

(*m*) MAGNOL. *de myopia* p. 7. DUVERNEY apud PALFYN p. 395. VEBDUE II. p. 296. RUYSCH *Ess.* XIII. p. 11. *Tbes.* II. obs. 1. n. 10.

(*n*) *De trib. ocul. humor.*

(*o*) p. 9.

(*p*) p. 10. 11.

(*q*) p. 29. & 11.

(*r*) p. 23. 47. tab. 2. f. 1. 2. 3.

(*s*) *De cataracta* p. 16. NOGUEZ. p. 295.

(*t*) SCHELHAMMER *analect.*

(*u*) *Art. ocul.* p. 45. ZINN p. 147. & olim DUVERNEY I. p. 152.



terias ciliares *longas*. Recte etiam monitum est, tenuissimis vasis opus esse, quæ humorem opacis particulis purissimum transmittant (*u*<sup>\*</sup>).

Uti celeriter generatur aquosus humor, ita necesse est, eum aut in venas resummi, aut per corneam membranam exhalare. Utrumque videtur fieri: nam & venarum ea communis natura est: et oculus morientis hominis tumidissimus, continuo pondere minuitur, & cornea subsidet (*x*), & humoris copia diminuitur, & sanguis sub corneam effusus in humorem aqueum resorbetur. Venas credas adesse, etsi non satis definitæ (*y*) sunt, quod ligata vena jugulari, oculi mire turgeant (*z*). Respondit tamen nuperus Chirurgus non augeri humorem aqueum ligatis venis, neque minui arteriis revinctis (*a*), sed ejus phænomeni causa alias dicta est (*b*).

### §. XXIII. Camera oculi.

Cum primum in lente crystallina sedem cataractæ recentiores ponerent, inter suæ causæ primaria argumenta posuerunt, cataractas longe plerasque pone uveam (*c*) esse: sed pone uveam, & ante crystallinam lentem, adeo exiguum spatium esse, ut omnino in eo cataracta locum non inveniat: Adversarii contra novæ sectæ, & membranacæ cataractæ defensores (*d*), inter uveam & lentem magnum intervallum admiserunt. Ad eam litem finiendam res est valde accurate examinata. *Cameram anteriorem* (*e*) dixerunt Cl. viri spatium, quod est inter corneæ concavam superficiem, & inter pupillam iridemque. *Posteriorem*, quæ est inter uveam, & lentem crystallinam, ciliaresque processus. Nunc anteriorem cameram, post aliqua DORSTENII (*f*) experimenta, recentiores

(*u*<sup>\*</sup>) PORTERFIELD T. I. p. 213.

(*x*) PETIT *Mém. de l'Acad.* 1723. & 1728.

(*y*) HOVIUS p. 97. t. 5. f. r. in uvea. ZINN p. 150. in iride, & in corpore ciliari.

(*z*) CHROUBT. NUCK p. 91.

(*a*) O HALLORAN p. 98.

(*b*) *Lib. X. Sect. VI.*

(*c*) LEAUSON. p. 123.

(*d*) WOOLHOUSE de cataract. p. 70. ad 74. addit latiore esse. Adhuc pro posteriori IDEMA p. 34. Error ex VESALII icone ortus fuerat.

(*e*) PETIT *Mémoire de l'Acad.* 1723. p. 32.

(*f*) De oculo p. 19.



res (g), longe majorem esse, pene communi consensu docuerunt. Potissimum vero PETITUS accuratis experimentis usus (h), in ea grana aquæ 2. cum  $\frac{1}{2}$ . & linearum 12.  $\frac{3}{4}$ . spatium: in posteriori camera non supra gr. 1.  $\frac{1}{100}$ . & spatium 6  $\frac{1}{100}$ . in fere (i) reperit.

Accuratius ea inquisitione defungi voluerunt, qui MERRETI (k) experimento usi, oculos frigori exposuerunt, ut in glaciem coactus humor aqueus se experimentis dociliorem præberet, eumque liceret, & metiri, & appendere. Sæpe & ipse experimentum feci, non semper eodem successu. Credibile est in universum, cameram anteriorem a gelu incrementum (l), tum ex natura gelu, quod aqueos humores dilatat, & in copiosiori humore anterioris cameræ prævalet super parciorem aquulam cameræ posterioris: tum ex vitrei (m) humoris congelatione, qui rarefactus posteriorem potissimum cameram arctat. Quando tamen recte omnia successerunt, adparet in segmento sphaeræ cameræ anterioris satis copiosa glacies, crassa in medio ad dimidiam lineam: ad ejus duas tertias ad lineam integram (n) lata, denique ad lineam  $\frac{5}{4}$ . (o), ad angulum utique corneæ in aciem extenuata. Inter uveam, & corpus ciliare, subtilis zona glacialis se interponit, quæ eo angustior fit minusque crassa, quo est exterior, pene foliacea, inque aciem denique imminuitur, fulcis inscripta radiorum ciliarium. Crassitiem facit  $\frac{1}{3}$ ''' BERTRANDI (p). Reperit PETITUS  $\frac{1}{8}$ .  $\frac{1}{6}$ . raro  $\frac{1}{4}$ ''' & demum ad ambitum lentis  $\frac{2}{3}$ . &  $\frac{3}{4}$ . lin. (q). Est, ubi in bubulo oculo nulla

(g) HEISTER. *compend.* n. 51. VERHEYEN *ic.* t. 27. f. 5. MORGAGN. *Epist.* X. WINSLOW *Mémoire de l'Acad.* 1721. *Expos. anat.* IV. n. 239. SHARPE in *icone tab.* X. f. D.

(h) Anno 1723. & 1728.

(i) Anno 1728. p. 299.

(k) Post BOYLE de frigore p. 5. & ap. BIRCH T. I. p. 354. Experimentum factum anno 1663. Habet & MONCONIS *Voyag.* P. II. n. 87. Non bene negat cogi du HAMEL *corp anim.* L. II. c. 5. Experimenta etiam fecerunt DORSTENIUS de oculo p. 19. VERHEYEN *Epist.* II. p. 31. MORGAGNI apud HEISTER *compend.* not. 51. *Epist.* XVII. n. 19.

(l) Oculi enim dilatantur PETIT *Mém. de l'Acad.* 1723. p. 46. 47.

(m) WOOLHOUSE monuit l. c. p. 75. add. PETIT *Mém. de* 1723. p. 42. 51. BERTRANDI p. 76.

(n) PETIT l. c. ann. 1721. p. 41. Lineam TENON. p. 6.

(o) PETIT *lettre* p. 6. *Mém. de l'Acad.* 1722.

(p) p. 75.

(q) PETIT *Mém. de* 1728. p. 212. add. ann. 1723. p. 42. Inter lingulas  $\frac{1}{4}$ . ad pupillam  $\frac{1}{2}$ . TENON. p. 6.



nulla fuit (*r*). Rationem ad glaciem anterioris camerae uti 1. ad 2. aestimat (*s*) Vir Cl. In fetu, quando membrana pupillaris integra est, pone eam aliqua etiam est (*t*) aquula, argumento cameram posteriorem non penitus nullam esse.

Lens ipsa ab uvea membrana proxime abest. In cadaveris collapsio oculo intervallum nullum videtur: sed in oculis gelu constrictis interpositam aliquam vidi (*t*<sup>\*</sup>) glaciem, quam inter  $\frac{1}{4}$ . &  $\frac{1}{2}$ . partem lineae (*u*) PETITUS aestimavit, & in vivo cane acum inter lentem & uveam agitavit BERTRANDI, neque potest nullum spatium esse, nisi velis a succo nigro lentem deturpari.

A cornea lentem o. 355. pollicis distare Cl. WINTRINGHAM (*y*), & paulo ultra HELSHAM (*y*<sup>\*</sup>).

#### §. XXIV. Musculi oculi recti.

Partes, quæ oculum ipsum constituunt, hactenus diximus: sequuntur musculi, quibus regitur. Sola insecta oculos immobiles (*a*) nacta sunt, pleraque vero ita numerosos, ut nihilo secius plurima una corpora possint inspicere. In cancris (*b*) & limacibus ex mobili bacillo præferuntur (*c*). In mobili etiam vecte late ad exteriora capitis utrinque diducto zygæna oculos gerit. In pisce *Angelo* lego, oculum alio modo mobilem esse, ut super nervum opticum articuletur (*d*). Quadrupeda frigida, pisces (*d*<sup>\*</sup>), aves, quadrupeda calida musculos habent, in universum

(*r*) Nullam faciunt WINSELOW *Mém. de l'Acad.* 1721. p. 317. SENAC p. 693. LEBUTAUD p. 131. & ante omnes DORSTENIUS. Nullam etiam aliquando vidit PETIT 1723. p. 42.

(*s*) PETIT *ibid.* p. 52.

(*t*) p. 76.

(*t*<sup>\*</sup>) Etiam PETIT *Mém. de* 1723. p. 39. add. 1728. p. 209. seqq.

(*u*) *Mém. de* 1723. p. 42.

(*y*) p. 283.

(*y*<sup>\*</sup>) o. 358.

(*a*) DERHAM l. c. VIII. c. 1. p. 363.

(*b*) ARISTOTELES *hist. anim.* L. IV. c. 2. PUGET & c. Lamia nervum opticum in stylo peculiari gerit SCENONIUS p. 111.

(*c*) In monoculo musculus oculum movens SCHAEFFER *Wasserfob* p. 30.

(*d*) PERRAULT *Essays*. T. III. p. 40. t. 15. f. 1.

(*d*<sup>\*</sup>) Rectos reperio quatuor, obliquos duos, quorum uterque antrorsum introrsum oculum trahit. Duos habet PORTERFIELD p. 425. Sex musculos habet galeus *Merc. de France* l. c. tr. IV.



sum fatis similes, quibus oculum gubernant; illa quidem, quæ primo loco dixi, dextrum absque sinistro (*e*), vel in contrarios ductus, gnara convertere (*e\**), dum aves & homines fere utrumque simul movent.

Hi muscoli non quidem ab ossibus nascuntur, ut possis hic, si severitate summa uti visum erit, eos auctores corrigere (*f*), qui dixerunt, ab osse sphenideo venire. Rem ipsam vidit EUSTACHIUS (*g*), & VESALIUS (*h*), & prior Jacobus BERENGARIUS CARPENSIS (*i*), & A. M. VALSALVA (*k*) annulumque dixit.

Singulatim musculus *superior*, vel *levator*, quem etiam *superbum* dixerunt, & potuissent *admiratorem* (*l*) dicere, oritur a vagina nervi optici, quæ est a dura membrana, paulum, quam levator palpebræ interior, partim (*m*) etiam ex periosteo orbitæ, fibris cum abductore paulum confusis (*n*), uti certo vidi. Inde ex tendineis fibris facit carneas, & sensim bulbum oculi conscendit, cellulositate multa ad seum revinctus.

Superat circulum oculi maximum, & iterum descendens denuo tendinescit, tendine latiori, fere quadrato (*o*), qui in scleroticam membranam, cis corneam (*p*), laxè prius, postea vehementer innascitur.

Quin

(*e*) RONDELET p. 189. 47. KLEIN *miss.* III. t. 2. f. 3. 4. JACOBÆI *Mus.* p. 18. du TERTRE *tom.* IV. Panapana eo, ut puto, pertinet THEVETO dicta *franc antartique* p. 49.

(*e\**) In rana PETIT *Mém. de l'Acad.* 1738. p. 153. in chameleonte RADZIVIL *Itin.* p. 119. PARIS. PEIRESCUS p. 345. VALISNERI. PANAROLUS II. p. 396. PERRAULT *Eff.* T. III. p. 64. SPON. *Voyag.* I. p. 375. WHEELER I. p. 274. PORTERFIELD I. addit de lepore & cuniculo.

(*f*) ARANTIUS c. 19. Alii, & nuper Cl. GIRARDI *refes. anat.* p. 51. Etiam ILL. ALBINUS ab osse derivat p. 178. Verum utique muscoli dicuntur ab osse oriri, qui in periosteum magis proprie fibras suas inmerguat.

(*g*) Tab. 39. f. 2. 3. 4. 5.

(*h*) p. 265.

(*i*) p. CCCCLXXV. b. Habet etiam originem a dura matre WINSLOW n. 244. EMILIUS PARISIANSUS. ZINN *tab.* 5. f. 3. d. f. 2. q. f. 1. f. p. 171. 172. MOR. GAGN. *Epist.* XVI. n. 16. 22.

(*k*) *Diff.* II. n. 2. p. 142. *Comm. Bonon.* T. I. p. 377. qualem fere icones EUSTACHI repræsentant, & COWPER t. 25. f. 3. 4.

(*l*) PARSONS p. 53.

(*m*) Habet etiam duas origines ALBINUS p. 178.

(*n*) Cum adductore & levatore palpebræ ALBINUS p. 178. Una agere cum levatore PARSONS p. 16. 53.

(*o*) ZINN p. 173. ALBIN. t. XI. f. 13. seqq.

(*p*) ZINN f. 5. b. ALBIN. p. 178. in omnibus figuris.



Quin oculum levet, dubitari non potest, non quod originem habeat, quam insertio, superiorem, sed quod circa bulbum oculi, tamquam circa hypomochlion, reflexus descendendo ad suum finem veniat. Reliquis oculi musculis tenuior est, & debilior (*q*), quem levator palpebræ adjuvet.

Tres recti reliqui, interior, inferior, & exterior (*q*\*) commune habent principium (*r*) inferiori loco, sub nervo optico situm, tendineum, natum ex eadem dura membrana, obvolvante nervum opticum, in parte intima fissuræ laceræ, qua rotunda est, inque propria ossis multiformis crena (*s*).

Ex eo ligamento (*t*) utcumque circa cardinem quisque suum oculi circumflectitur, & simili modo, ut de levatore dixi, in tendineam telam conversus, fere quadratus, suo in globo oculi puncto præcipuo inseritur.

Habent tamen sua discrimina, & est primum *Adductor*, sive *interior* (*u*) reliquis crassior, rectior & brevissimus (*x*), cum & origo, & nervus opticus in orbitæ parte interiori sint. In principio suo cum dura matre, nervum opticum ambeunte, conglutinatur (*y*). Aliquanto propius corneam inferi vidi, tum MORGAGNUS (*z*).

Deinde *Externus*, sive *abductor*, omnium rectorum est longissimus (*a*), qui ex foramine optico, nempe ex sede orbitæ interiori adveniat, & in exteriorem partem oculi se inmittat. Idem duplici origine provenit; majori a ligamento; quod diximus (*b*); minori gracili a periosteo nervi optici,

(*q*) ZINN p. 176.

(*q*\*) Solum internum & inferiorem eo loco osiri vidi.

(*r*) Inde forte duo VALSALVÆ anuli, major nervi optici moderator, minor nervi oculorum motoris *Comm. Bonon. T. I. p. 377.* Nimis ornata fabricam & editor MORGAGNUS deferuit, & BERTRANDUS p. 80.

(*s*) ZINN p. 164. 165. t. 5. f. 3. f. Videtur de eo dicere MORGAGNUS *Epist. XVI. n. 23.* & ALBINUS in adducentis & abducentis origine f. 25. 26. qui paulo tamen aliter hanc rem describit. Rectos a periosteo LIBURAUD p. 124. t. 3. f. 3.

(*t*) ZINN p. 165. t. 5. f. 3. De abductore videtur velle ALBINUS p. 178.

(*u*) ZINN f. 3. k. f. 2. i.

(*x*) IDRM. ALBIN. p. 178. f. 17. 18. 19. 20. EUSTACH. in omnib. figur. WINSLOW *Mém. de l'Acad. 1721. p. 314.* MORGAGN. *Epist. XVI. n. 24.*

(*y*) ZINN f. 3. Duplicem hinc facit ALBINUS f. 25.

(*z*) *Epist. XVI. n. 24.*

(*a*) ZINN. ALBINUS p. 178. EUSTACHIUS l. c. f. 2. 3. 4. 5. ESCHENBACH p. 598. WINSLOW *Mém. de l'Acad. 1721. p. 314.*

(*b*) ZINN *tab. 5. f. 3. b. f. 2. n. f. 1. m.* Adde ALBIN. f. 26.



optici, & denique ex arcu (*b\**), quem hæ duæ originēs ad angulum aliquem conjunctæ efficiunt. Idem descendit eundo (*c*).

*Inferior*, *deprimens* recta satis via (*d*) antrorsum tendit, mediis fibris ex ligamento natis, lateralibus ex tendinea portione ligamenti cum externo & interno communi. Cum interno paulum cohæret.

Hos musculos valde irritabiles esse WHYTTIUS acu comperit (*e*), & memini, cum JOHANNES TAYLOR proprio rastello oculum lacefferet, in amaurosi, in vehementem tremulumque motum eos conjectos fuisse.

Dum recti oculi muscoli conjuncti agunt, motus faciunt obliquos. Non enim dubium est, si una & superior contractus fuerit, & interior, quin oculus per diagonalem lineam moveatur, cujus latera sunt duæ hæ potentia, in obliqua directione (*f*) inter elevationem & adductionem.

Quando iidem ex ordine sibi in agendo succedunt, oculus rotatur (*g*), & pupilla fursum (*h*) deorsumque variis modis, & denique integre in gyrum circumducitur.

Nervum opticum a rectis musculis incurvari, & aliquantum, sed minus, ab obliquis, MORGAGNI (*i*) est adnotatio.

De vi, qua dicuntur retinæ a lente distantiam mutare, alias dicitur. Id habent perpetuum, ut uterque oculus in sano homine similiter moveatur, neque possis volendo alterum levare, dum alterum de primis. Etiam cæcus oculus sanum in motu imitatur (*k*).

### §. XXV. Musculi obliqui. Major, superior, trochlearis.

Hic inter oculi musculos artificiosissimus & longissimus, idemque gracilissimus.

G g g 2

(*b\**) ZINN f. 2. o. Conf. fig. 1. 1.

(*c*) IDEM p. 176.

(*d*) IDEM p. 168. EUSTAGH. ALBIN. f. 18. 19. 20. 24.

(*e*) On vital motions p. 236.

(*f*) PERRAULT du mouvem. des yeux p. 574. HARTERY p. 217. WINSLOW n. 250. MAJOR spec. 3. coll. med. DUVERNSY posth. I. p. 139.

(*g*) PARSONS p. 22. etiam eodem tempore IDEM; tantum ut v. c. intimæ fibræ elevatoris cum proximis fibris adductoris una agant p. 20. Rotat Chamæleon FABER ad Hern. p. 723.

(*h*) n. 31.

(*i*) Epist. XVIII. n. 3.

(*k*) MOEHRING de visu p. 25. contra tamen, & diverso modo moveri PORTERFIELD auctor est T. II. p. 169.



cilissimus ( *l* ), & ipse oritur a dura membrana, non a vagina nervi ( *l*<sup>\*</sup> ), exterius quam internus; idemque antrorsum secundum os planum, sequitur orbitæ marginem; inque planum tendinem abit ( *m* ).

Ad eum tendinem natura cartilaginem ( *n* ) propriam, & elegantem præparavit, posterius truncatam; anteriùs tumidam, sine utroque latiori: intus levem, cavamque, & per proprium ligamentum ad orbitæ marginem suspensam.

Nunc per eum trochleæ sulcum tendo hujus obliqui libere mobilis transit: deinde per conum cavum, membranaceum ( *o* ), ligamentosum, scleroticæ tunicæ insertum.

A fine trochleæ extrorsum, & paulum retrorsum ( *p* ) tendit, fit in tendinem triangularem, & pone ( *q* ) rectum superiorem, proximus, paulo inferior inseritur in scleroticam, posterius, quam est circulus anteriùs oculi hemisphæricum a posteriori separans.

Oculum introrsum ducit, & antrorsum, ad nares ( *r* ); sic facit, ob insertionem posteriorem circulo maximo, ut pupilla ( *s* ) & pars oculi interior, descendat. Idem cum inferiori obliquo una agens oculum quasi suspendit, & ex orbita educit ( *t* ). Tunc enim, viribus lateralibus destructis, sola superest, qua oculus antrorsum ducitur.

## Secundus

( *l* ) FALLÖPIUS p. 70. EUSTACH t. 39. f. 3. 3. 4. ZINN p. 178. f. 4.

( *l*<sup>\*</sup> ) Ab eo LIEUTAUD l. c.

( *m* ) CARCANUS *Anat.* L. II.

( *n* ) FALLOP. p. 70. 71. b. EUSTACHIUS l. c. VESAL. *Exam.* p. 51. Cartilaginem esse CARCANUS. ALBINUS p. 176. paulo aliter describit; iterum aliter & utrinque æque tumidum marginem ZINN f. 1. 2. 4. & p. 180. Denuo aliter WINSLOW n. 246. Ego meas adnotationes sequor, & videtur res varietatem admittere.

( *o* ) FABRIC. *de visu* L. III. c. 12. p. 121. MORGAGN. *Advers.* VI. p. 98. WINSLOW n. 245. ALBINUS p. 176. ZINN p. 180.

( *p* ) Nimis retrorsum WINSLOW *Mém. de l'Acad.* 1721. t. 16. EUSTACH. l. c. COWPER *tab.* 25. f. 3. 4. & si monuisse fas est in tanto viro ALBINUS t. XI. f. 22. p. 175. Similius nostris ZINN f. 1. 2. 4. Antrorsum in mea tabula f. 2. Sed ea non ob musculos facta est, eosque habet ex suo situ dimotos.

( *q* ) Sub eo CARCANUS.

( *r* ) WINSLOW *Mém. de l'Acad.* 1721. p. 316. MORGAGN. *Epist.* XVIII. n. 2. PARSONS.

( *s* ) ALBIN. p. 176. COWPER in *myotom. ann.* 1694. p. 50. DOUGLAS n. 5. PORTERFIELD l. p. 189. PARSONS p. 21.

( *t* ) COWPER l. c. p. 50. MORGAGN. *Advers.* VI. p. 100. *Epist.* XVIII. n. 2. St. Vvès p. 11. CANT. p. 10.



Secundus musculus trochlearis nonnunquam adfuit (*u*), aut musculus origine simili, sed in vaginam hujus obliqui insertus (*x*).

Nullam in avibus & piscibus trochleam dari jam SCHNEIDERUS (*y*).

*Minor obliquus* ex foveola anguli orbitæ imæ interni, ad exteriora fulci ossis unguis (*z*), a processu orbitario ossis maxillæ superioris oritur. Ascendit extrorsum, inter orbitæ oram & musculus inferiorem (*a*); & circa globi oculi rotunditatem circumflexus, inseritur inter nervum opticum, & insertionem musculi externi, paulo posterius, e regione obliqui superioris, adeo non remotus, ut aliquando coaluerint (*b*), sed tamen posteriori (*c*) oculi fini propior.

Oculum extrorsum deorsum ducit, ita pupilla sursum (*d*) & introrsum convertitur, estque adeo hactenus sodalis obliqui majoris, ut una cum eo oculos de orbita protrahat (*e*).

Musculus bulbosus oculi, quadrupedibus proprius, aque antiquis (*f*) & VESALIO (*g*) additus, neque in avibus, neque in piscibus, neque in homine reperitur. Recte rejecit FALLOPIUS (*h*). Ad situm erectum pertinere videtur. Etiam pygmæus (*i*), qui erectus incedit, eo musculo destituitur (*k*).

Membrana innominata (*k*\*) vel *albuginea* (*l*) ex conjunctis rectorum musculorum & obliquorum tendinibus composita est aponeurosis, quæ &  
G g g 3 brevis

(*u*) Duos trochlearis tendines facit WOOLHOUSE *Mém. de Trévoux* 1728.

(*x*) F. R. BALDRINUS apud MOLINETT. *diff.* ed. I. p. 45. WINSLOW l. c. p. 319. ALBIN. p. 176. IDEM forte dicitur CL. BERTRANDI p. 79. 80. Nihil vidit simile ZINN p. 180. Duos fuisse, quorum alter brevior & tendinosus per duplicem trochleam transiret KULMUS de *monstr.* p. 48. Puto eandem esse adnotationem URATISLAV. 1722. m. dec.

(*y*) De *catarrh.* L. III. p. 342. tum PETIT *Mém. de l'Acad.* 1736. p. 135.

(*z*) F. *nostr.* 3. ALBIN. p. 182. WINSLOW n. 247. ZINN p. 181.

(*a*) ZINN f. 5. WINSLOW n. 248.

(*b*) FALLOPIUS p. 71. RIOBAN. in LAURENT. p. 644.

(*c*) Etiam ZINN p. 181. COURCELLES *tab.* 3. f. 5. EUSTACHIUS *fig.* 5.

(*d*) ALBIN. p. 182. COWPER. DOUGLAS & C.

(*e*) CHESLDEN p. 75.

(*f*) GALEN. *loc. affect.* L. IV. c. 2. C. STEPHANUS p. 295. 296. ORIBASIVS tamen quatuor rectos habet, & duos obliquos p. 126.

(*g*) L. II. c. 12. & in lib. de *radice Chinæ* repetit, eosdem in oculo humano esse musculos p. 227. Etiam monitus pergit adfirmare, se in muliere hujus musculi vestigia vidisse *Exam. obss. Fallop.* p. 126. atque marcori tribuit, quando defuit p. 51.

(*h*) p. 68 b. tum G. CUNEUS *Apol.* p. 40.

(*i*) TYSON p. 54.

(*k*) Habet ursus DUVERNEY l. p. 139. quadrifidum.

(*k*\*) COLUMBI p. 217.

(*l*) WINSLOW n. 240.



brevis est, cum ab adhæsione eorum tendinum incipiat, & in cornea terminetur (*m*), & certa tendinum continuatio, & validissime scleroticae tunicae innata, ut propria oculi tunica dici non debeat (*n*). Olim veriora CASSERIUS docuerat (*o*).

§. XXVI. *Nervi oculi. Iter per receptaculum.*

Oculus omnes in corpore humano partes nervorum copia, & diversitate superat, & in homine, & in omnibus animalibus mihi notis. Pisci novem decimæ partes cerebri oculum adeunt. Nam & grandissimus nervorum opticus basin, verumque cerebri fundamentum efficit, quod calamo scriptorio distinctum, in basi cerebri & cranii, ad medullam spinalem continuatur: & præterea ad eam columnam duæ in arcum flexæ luculentæ radices adveniunt, ex tuberculo posteriori trigemino, exque tuberculis quatuor latentibus natæ: & denique thalami, qui avium ad modum ovati sunt, & cavi, medullam suam ad opticum nervum addunt. Præter eos vero nervos, & alius ciliaris est, unicus, sed major; & oculorum motorius.

Etiam insecta habent egregiam semicircularem pulpam, cui nervi illi innumerabiles cornearum tunicarum adaptantur (*p*).

Merito ergo oculus acutissime dolet. Solusque lucem sentit (*p*<sup>\*</sup>).

Quatuor in homine paria, cum ramo quinti huc pertinent.

Eorum qui dicitur *tertium* par (*q*), ortus, ut alias dixi, per proprium canalem (*r*) duræ membranæ, supra sinum superiorem petrosum & supra cavernosum, aque isto septo membranaceo (*s*) divisus, incedit ad foramen lacerum, omniumque intimus, exterior tamen, & inferior optico nervo orbitam subit (*t*).

Nervus

(*m*) BRISSEAU t. I. f. 1.

(*n*) RUYSCH. *Epistol.* XIII. p. 10. WINSLOW. MORGAGN. *Epist.* XVI. n. 25.

(*o*) c. 22.

(*p*) SWAMMERDAM. *Tab.* 22. f. 6. *tab.* 29. f. 7.

(*p*<sup>\*</sup>) Ab instillato spiritu vini camphorato dolores in oculo enormes & pene cæcitas COSCHWITZ *de hypopyo* p. 19.

(*q*) Repete a L. X. p. 207.

(*r*) *Tab. art. cran.*

(*s*) p. 208.

(*t*) *Tab. art. cran.*



Nervus *Quartus* (*u*) per proprium pariter canalem duræ meningis, supra superiorem sinum petrosum, exterior quam tertius, per foramen lacerum orbitam adit, trans tertium & opticum (*x*).

Nervus a Quinto *ophthalmicus* (*y*) five primus ejus grandis trunci ramus, reliquis ejus trunci ramis minor, proprii septi (*z*) ope a cavernoso receptaculo separatus, ad interiora quarti, sed inferior (*a*), adit rimam laceram & orbitam.

Nervus *Sextus* (*b*) omnium infimus (*c*), & una extimus, solus per canalem duræ meningis, venit in receptaculum, duobus etiam trunculis, & per medium sanguinem (*d*) carotidis circumfusum, parallelus nervo quinti primo, sed humilior, posterius quam carotidis truncus, pergit per extremum angulum foraminis laceri, in orbitam iturus.

### §. XXVII. Nervus, Quartus & Sextus.

Horum nervorum simplicissima est natura: *Quartus* equidem interiora tenet orbitæ, solumque musculus trochlearem (*e*) adit, inque eum consumitur, neque alio ramo (*f*) dato, neque aliqua cum ophthalmico (*g*) nervo Quinto paris facta anastomosi, aut ad levatorem palpebræ (*h*) edito furculo, ut in repetitis experimentis vidi (*i*).

Ita *Sextus*, externum latus orbitæ legens, etiam absque ulla cum alio quocunque nervo anastomosi, & absque ramo ullo (*k*), solum musculus oculi externum (*l*) adit. Neque enim furculos ad ciliare ganglion

(*u*) Repete a L. X. p. 208. *tab. art. cran. o.* ZINN p. 198.

(*x*) p. 208. VAROLIUS. ZINN t. 6. f. 1.

(*y*) Conf. L. X. p. 209.

(*z*) *Tab. art. cran. & n.* 27. MEKEL p. 30.

(*a*) Not. 26. BERRETTIN *tab. 21. f. 2. 3.* *Tab. art. cran.*

(*b*) Repete a *Lib. X.* p. 222.

(*c*) Vide *tab. art. cran. r. not. 26.*

(*d*) *Tab. art. cran.* ZINN p. 201.

(*e*) FALLOPIUS p. 155. b. ZINN t. 6. f. 1.

(*f*) Ut COLUMBUS p. 198.

(*g*) Suspiciatur J. B. WINSLOW *Expos. T. III. n. 27.* Habet BARBAULT p. 468.

(*h*) BONHOMME p. 71.

(*i*) Negat nobiscum ZINN p. 199.

(*k*) Negat iterum nobiscum ZINNIUS p. 201. MEKEL p. 30. 38.

(*l*) ZINN *tab. 6. f. 1. 2.*



glion (*m*), aut ad ophthalmicum nervum (*n*) quisquam nuperior incisor vidit.

Qui Cl. viri intercostalem nervum non oriri a *Sexto*, sed ad oculum tendere (*o*), natum ex spinali medulla, fatis nuper docuerunt, eorum rationes alias expendimus. Quæ certe ab oculi per ejus nervi vincula facta inflammatione sumuntur, ea facile solvunt similia phænomena nata a nervis, oculum certo non adeuntibus, sed aut communi cum oculari aliqua nervo trunco ortis, aut omnino nulla, nisi valde remota cum oculo sympathia conjunctis. Ejusmodi est oculorum a nervo octavi paris ligato diminutio, turbatio, inflammatio Cl. viro dicta (*p*). Ita a læso nervo secundo Quinti in maxillæ fistulæ, palpebræ inversio [ *eraillement* ] & cataracta (*q*). A vulnere nervi superciliaris oculus ejus lateris excæcatus, alternus caligans (*r*). Et contra ab eo nervo irritato amaurosis sanata (*s*).

§. XXVIII. *Nervi Quinti paris ramus I. Ophthalmicus* (*t*),

Commodum nomen WILLISIUS (*u*) imposuit, etsi alias etiam partes corporis humani idem nervus adit.

Trium ramorum etsi minimus est, trunci tamen ductum potissimum tenet (*x*).

Ad anteriorem receptaculi terminum natus, optico nervo inferior, prius sæpe, quam lacrumalem, alias posterius (*y*), ramum *inferiorem* edit, qui tertio pari incumbit, & ad interiora nervi optici trans eum (*z*) nervum, transque tertium transit. Addit idem pene perpetuo longam, gracilemque radicem (*a*), antrorsum euntem in ganglion ciliare.

Paulo

(*m*) TAYLOR p. 52. le CAT p. 299. PETIT.

(*n*) Quem potius ex sexto derivat le CAT l. c.

(*o*) L. X. p. 224.

(*p*) MOLINELLI *Comm. Acad. Bonon.* T. III. p. 283. 284. 289. 290.

(*q*) FAUCHARD *chir. dentiste*.

(*r*) PLATNER *de vuln. supercil.* MORGAGNUS *Epist.* XVIII. n. 7.

(*s*) VALSALVA *diff.* II. p. 144.

(*t*) PRIMUS FALLOPIO p. 141.

(*u*) p. 154. *Leges descriptionem WINSLOWI VERDIER* II. p. 378.

(*x*) *Tab. art. cran.* BERRETTIN t. 21. f. 2.

(*y*) SERIUS ZINN *tab.* 6. f. 1.

(*z*) IDEM *tab.* 6. f. 1. 2.

(*a*) DUVERNEY l. p. 87. WINSLOW n. 36. VIEUSSSENS p. 171. T. 22. g. h. i. EUSTACH. l. 18 f. 3. 5. ZINN f. 1. 2. t. p. 204. MEKEL p. 37. *Tab. art. cran.* A trunco nondum diviso ortum habet ESCHENBACH p. 974. & WINSLOW n. 37.



Paulo post ciliarem unum, duosve dat ( *b* ).

It per orbitam, comes pathetici musculi.

Inde edit nervum nasalem ( *c* ), qui per proprium foramen ethmoidum anteriùs super cellulam ( *d* ) ethmoideam in cranium redit, alioque ramo antrorsum decurrit ( *d*\* ), & per foramen cribrosi ossis anteriùs ( *e* ) in septum narium, & frontalem sinum ( *f* ) descendit: alio ramoso per multa foramina cribrosa nares adit ( *g* ).

Ab eo nervo cum surculo ganglii ciliaris proprium nervum ciliarem nasci vidi.

Porro trunco suo in angulo interno oculi, sub trochlea ( *h* ), ad orbicularem palpebræ, & carunculam lacrumalem, saccum ejus nominis, & procerum musculum pergit. Cum duro nervo, & cum sequente habet anastomoses ( *k* ).

Paulo post edit una duabusve radicibus ( *l* ) nervum lacrumalem ( *m* ) superiorem, exteriorem, qui per proprium canalem duræ matris orbitam subit. Ab eo continuo ramulus abscedit, aut duo etiam surculi, qui per foramen ossis ( *n* ) malæ de orbita in temporalem fossam exeunt, cum ramis Secundi a Quinto trunci conjuncti ( *o* ), & cum Tertio ( *p* ). Ipse trunculus lacrumalis ramosus, ramis per glandulæ cognominis intervalla

( *b* ) ZINN f. 1. 2. Jam FALLOPIUS ad oculum ramos venire viderat, & EUSTACHIUS tab. 18. f. 3. & 5. ramum habet, quem non alio referas.

( *c* ) FALLOP. p. 142. EUSTACH. l. c. Nasalis ROLFINK p. 229. RAU p. 37. VIEUSSSENS t. 22. PETIT. PALFYN p. 408. WINSLOW. le CAT l. c. lat. fin. PETIT ad PALFYN p. 408.

( *d* ) Tab. art. cran.

( *d*\* ) MEKEL p. 42. EUSTACH.

( *e* ) Tab. art. cran. MEKEL p. 43.

( *f* ) IDEM ibid.

( *g* ) Foramina anteriora WINSLOW n. 41.

( *h* ) Tab. art. cran. Inde infratrochlearis MEKEL p. 44. Mém. de Berlin 1752. n. 24.

( *i* ) MEKEL p. 44. & f. 25. seqq. WINSLOW n. 40. VIEUSSSENS p. 171.

( *k* ) MEKEL l. c.

( *l* ) IDEM p. 35.

( *m* ) WINSLOW n. 42. Tab. art. cran. ZINN f. 1. VERDIER II. p. 378.

( *n* ) BERTRANDI p. 93. WINSLOW n. 43. VIEUSSSENS p. 171. t. 22. S. YVES p. 21.

( *o* ) MEKEL p. 35.

( *p* ) IDEM ibid.



valla transmissis descendit, quorum aliqui, pauci ut puto, in glandula manent (*q*), alii in tunicam adnatam exeunt (*r*).

Truncus Primi Quinti, sive *ramus superior*, duplex (*s*) per orbitam antrorsum rectus migrat (*t*). Exit de orbita, ramo exteriori, & interiori. *Exterior* (*u*) major ad frontem venit, per fulcum (*x*) orbitæ insculptum. Ejus alter grandis furculus adit palpebram superiorem (*y*), extrorsum flexus, pene transversus, cumque nervo a duro pare conjunctus (*z*). Reliqui longe per frontem adscendunt, in sinciput usque, alii subcutanei (*a*), alii profundi (*b*), pariter pene ad occiput protensi. Profundissimi alii sub ipso pericranio in frontem tendunt (*c*), ut ea certe sede absque dolore incidi nequeant.

Ramus *interior* minor, trochleæ proximus (*d*) est. Ejus duo rami in glabellam eunt ad procerum, & corrugatorem (*e*).

Alius in palpebrarum commissionem supra ligamentum orbicularem tendit. Alius in palpebram superiorem (*f*).

Truncus aut per fulcum insculptum margini orbitæ, aut absque eo fulco ad frontem adscendit, frontali musculo tectus, ad usque sinciput (*g*).

Surculum habet cum nervo nasali coalescentem (*h*).

Tertius nonnunquam ramus accedit exterior, quem *anastomoticum* MEKELIUS dixit (*i*), qui ad frontem, & per ossis malæ sedem distributus, cum duro nervo (*k*) coit.

Merito

(*q*) MEKEL p. 36.

(*r*) IDEM ibidem.

(*s*) FALLOPIUS p. 141. etiam MORGAG. *Epist. anat.* p. 233. EUSTACHIUS t. 18. f. 3. 5.

(*t*) ZINN f. 1. *Tab. art. cran.*

(*u*) Frontalis MEKEL p. 31. *Mém. de Berlin* n. 1.

(*x*) IDEM *fig. cit.* WINSLOW n. 36.

(*y*) MEKEL *fig. cit.* 15. 16.

(*z*) IDEM p. 33. *fig. cit.* 19. 159. WINSLOW n. 36. FABRIC. *anat. pract.* p. 80.

(*a*) MEKEL p. 32. *Mém. l. c.* 9. 12. EUSTACH. *tab.* 19.

(*b*) MEKEL 10. BERRETTIN. *tab.* 5. f. 1. VIEUSSSENS *tab.* 22. d. c.

(*c*) MEKEL p. 34.

(*d*) Supratrochlearis MEKEL p. 31. 39. *Mém. de Berlin* n. 14.

(*e*) MEKEL p. 32. *Mém. de Berlin* n. 2.

(*f*) Conf. MEKEL p. 31.

(*g*) IDEM p. 32. *fig. cit.* 20.

(*h*) IDEM p. 31. 32.

(*i*) *Mém. de Berlin* n. 3.

(*k*) MEKEL *ibid.* 7. 118. 8. 84.



Merito ergo eo nervo læso palpebræ superioris paralyfis (l). Grandes cum sint nervi, funesta aliquando vulnera fuerunt, quæ sunt passi (m).

§. XXIX. Nervus III. Paris.

Hic, præter opticum, princeps est oculi nervus, & magnitudine, & editis ad intima oculi ramis. Hinc ab eo nervo convulso cornea tunica fursum extrorsum versa est, & oculus in orbitammersus (n), agentibus interno & inferiori musculo.

Quando continuo nunc orbitam subibit (o), edit ex parte inferiori exteriori nervi optici ramum *Superiorem* minorem (p), qui, trans nervum opticum, superiorem oculi musculum adit; ex quo ipso ramus, perforato eo musculo, palpebræ Levatorem adit.

Trunco suo pergit optico nervo inferior, & ex eadem pene sede tres confertos emittit ramos (q), ad inferiorem oculi musculum (r); ad obliquum inferiorem (s); ad internum (t); vel paulo alio modo primum ramum dat adductori, alterum maximum depressori, & ipse in obliquum inferiorem longe productus terminatur (u).

Reliquus truncus, vel ramus obliqui inferioris (x), est radix præcipua, crassa (y) brevisque ganglii, eademque extrorsum incedit, inque nervo optico, sub musculo abductore, efficit *Ganglion ciliare*, sive *ophthalmicum* (z), ovale, perpetuum, perminutum. Est ubi id a solo

H h h 2

tertio

(l) SPIGEL p. 190.

(m) GENG A anat. Chir. p. 239.

(n) MONRO on nerves p. 388.

(o) ZINN p. 196. add. FALLOP. p. 138 b.

(p) ZINN p. 196. tab. 6. f. 1. p. FALLOPIUS p. 138. b. EUSTACH. t. 18. f. 1.

VIREUSSENS p. 167. WINSLOW III. n. 19 20.

(q) ZINN p. 197. tab. 6. f. 1. 2. Tab. art. cran. Habet etiam EUSTACHIUS t. 18. f. 1. 3.

(r) WINSLOW n. 21.

(s) IDEM ibid. EUSTACH. t. 18. f. 3. FALLOPIUS.

(t) FALLOP. 138. b. WINSLOW n. 21.

(u) Conf. ZINN p. 197.

(x) Fere semper ZINN p. 197. tab. 6. f. 1. 2. WINSLOW n. 22.

(y) MEKEL p. 38. ZINN p. 204.

(z) Tab. art. cran. ZINN p. 203. PLATNER vuln. supercil. III. n. 22. PETIT Mém. de l'Acad. 1727. p. 10. WINSLOW IV. n. 302. le CAT p. 300. NOGUEZ p. 443. 445. BONHOMME t. 10. DUDDALL p. 17. VERDIER II. p. 376. 377. S. YVES p. 21. WILLIS ed. 8. p. 151. qui & ganglion cognitum habuit, etsi minus plene descripsit, rectius a Cl SCHACHER de cataracta propositum, puto ex DUVERNEYI scholis. Inter ejus enim posthuma, exstat l. p. 86.



tertio nascitur (a). Neque deesse unquam vidi (b), neque duo, aut plura fuisse, ut nuperi aliqui habent (c).

Ex eo ganglio tres, quatuor (d), plures (e); & alii ex ramo nasali Quinti (f), & nonnunquam ex trunco Tertii, ut vidi, exeunt nervi interni oculi, sive ciliares (g), quatuor, quinque, cum nervo aliquo a nasali quinti sæpe coalescentes (h). Ii flexuoso ductu circa opticum nervum ludentes, scleroticam tunicam perforant, partim cum arteriis longis, in media sclerotica (i), partim propriis (k) foraminibus, decem, duodecim (l), quatuordecim (m) absque ullo plexu, aut anastomosis (n).

Alii a ganglio ciliari furculi, non majores aranearum filis (o) d. 19. Nov. 1741. primum a me visi, scleroticam adeunt, plenius a Cl. meis auditoribus, postea ILL. viris expositi (p).

### §. XXX. Nervi interni oculi.

In homine, & in omnibus animalibus (q) mihi notis, nervi ciliares oblique (r) scleroticæ tunicæ laminam utramque perforant, adque choroideam se adglutinant, perque ejus faciem anteriorem, plani (s) quasi

(a) Etiam MEKEL p. 38.

(b) GUNZ *humor.* p. 223. Rejicitur ab aliquibus ut a Cl. ESSCHENBACH p. 971.

(c) P. LOBB n. 35. *Physiologia Amst.* p. 513.

(d) *Tab. art. cran.* add. MEKEL p. 39.

(e) Ad novem usque PETIT p. 11. Novem describit ZINNIVS add. t. 6. f. 1. 2.

(f) p. 425.

(g) Aliquot fibræ FALLOPIUS p. 139. Habet MANFREDI *bibl. anat.* MANGET p. 189. VIEUSSSENS p. 186. RUYSCH. *Epist.* XIII. f. 11. 12. MORGAGN. *Epist.* XVI. n. 59. DUVERNEY l. c.

(h) Habet & MEKEL p. 40. ZINN p. 209. WINSLOW n. 24.

(i) RUYSCH. *Epist.* XIII. f. 11.

(k) ZINN p. 207. 211. Conf. t. 4. f. 1. 2. tab. 6. f. 1. 2. WINSLOW n. 24.

(l) MEKEL p. 40.

(m) ZINN p. 210. tab. 4. f. 1. 2.

(n) Qualem pingit le CAT. ZINN *ibid.*

(o) Eorum aliquis dissectus cum abnormi globulo a Cl. le CAT utrinque pingitur, alius quasi musculus adeunt *ibid.* Nihil simile vdi.

(p) Descripti a MEKELIO p. 41. ZINNIO p. 208.

(q) Habet in omnibus animalibus A. MOULINS p. 50. BIRCH T. IV. p. 547. In piscibus unicus, sed grandis truncus est. In avibus multi & egregie conspicui, non tamen nisi in una parte oculi. Habet C. BARTHOLIN. *specim. anat.* p. 16. in ulula T. III. f. 1. in ovo f. 2. In avibus ligamenta sua vidit A. MOULINS p. 50.

(r) ZINN p. 211. MEKEL p. 41.

(s) ZINN p. 211. t. 4. f. 1. 2. *Physiologia batava* p. 514.



quasi, decurrunt, quæ quidem plana figura, etsi minime in nervulis rara, tamen fecit, ut peculiari nomine *ligamentorum* (*t*) passim descripti sint. Ramos ad choroideam membranam conspicuos nullos dant (*u*). Inæqualis eorum est diameter (*x*), aliquæ aliis insigniter latiores.

Quando nunc ad orbiculum ciliarem venerunt, dividitur quisque in duos fere furculos, iique furculi, tecti cellulosa tela ciliaris orbiculi, tendunt in uveam (*y*) fibrarumque radiatarum partem aliquam, sed exiguan, faciunt (*z*), eoque, dum cornea sola remota reliqua suo in situ sunt, possunt ab incisore scalpello deduci.

Nullos, etsi MANFREDUS (*a*) ita descripsit, & alii (*b*), ad processus ciliares furculos emittunt (*c*).

In lente crystallina RUYSCHIANA, vitreo corpore, & cornea membrana, nemo nervos hactenus vidit.

Ad palpebras, earumque musculos, aliqui accessorii nervi veniunt, ad superiorem a duro (*d*), ad inferiorem & a duro (*e*), & ab infra-orbitali (*f*), qui est propago secundi rami Quinti paris.

### §. XXXI. *Arteriæ oculi.*

In istis quidem propriis licebit observationibus uti, in quibus plurimum laborem posuerim. Arteria oculi propria constanter unica est, *ophthalmica*, propago carotidis internæ, inque cranii cavea nata, in ipso receptaculo ad latus sellæ equinæ posito (*g*). Neque ab infra-orbitali

H h h 3

trunco

(*t*) A. MOULINS *anat. obs. on the eyes* p. 49. seqq. add. BIRCH. l. c. BLANCAARD. Pro musculis dilatatoribus pupillæ MANFREDUS p. 190. Istos monuit nervos esse C. BARTHOLINUS *anal.* p. 165. 166.

(*u*) ZINN.

(*x*) IDEM p. 211. t. 4. f. 1. 2. RUYSCH *Thes.* II. *Aff.* I. n. 7. etiam A. MOULINS p. 49.

(*y*) MANFREDI *l. c.* II. RUYSCH *Epist.* XIII. f. 12. BARTHOLIN *in analect.* RIDLEY p. 145. WINSLOW IV. n. 303. MEKEL p. 41. ZINN p. 212. f. 1. 2. DEMOURS *ad vers. Act. Edimb.* T. I. p. 372.

(*z*) ZINN *ibid.* MEKEL *ibid.* Sed infinita in ratione plures fibræ sunt, quam nervi.

(*a*) p. 149.

(*b*) RAU p. 38. & apud CANT. p. 10. RUYSCH *Thes.* II. *Aff.* I. n. 7. HEISTER *de Choroid.* p. 19. S. YVES p. 23.

(*c*) ZINN p. 212.

(*d*) Vid. *Iconem MEKELIANAM* in *Mém. de Berlin.* l. c.

(*e*) *Ibidem.*

(*f*) *Lib. X.* p. 211.

(*g*) *Fascic. I.* p. 38. *Tab. art. cran. f. f. Fasc. VII. tab. 6. f. 2.* ZINN p. 214.



trunco nascitur (*b*), neque a lacrumali (*i*), neque ab arteria aliqua per deliquium fissuræ laceræ subeunte. Neque hac in re varietas ulla est, quam J. Philippo INGRASSIÆ debemus.

Ita nata, sensim supra nervum opticum introrsum & antrorsum migrat (*l*).

Rami, ut sim brevis, lectoresque ad fusissimam historiam (*m*) remittam, quam alibi dedi, sunt, parvuli ad duram matrem receptaculi, nervum Quintum, origines musculorum oculi (*n*): lacrumalis (*o*), quæ nonnunquam ex meningeæ prodit, in orbitæ aditu nata, divisa ad duram matrem (*p*), glandulam lacrumalem (*q*); ad fossam temporalem per foramina ossis mæ-læ (*q*<sup>\*</sup>); porro ad palpebras, ex quibus arcus tarseus superior (*r*), & inferior (*t*); ad conjunctivam denique tunicam.

Porro eadem generat ciliares (*x*) aliquot, duas (*y*), tres (*z*), quatuor (*a*), quinque, incerto numero, quas sensim persequemur; *centralem retinae* (*b*): *superorbitalem* (*c*), ad musculos oculi superiores, & per sulcum in orbitæ margine late per os frontis (*d*) dispersam. Reliqui rami sunt *musculares* duo fere, superior (*e*), inferior (*f*): *ethmoidæ* duæ, posterior, parva, ad cellulas posteriores, sinum sphenoidæum duram matrem (*g*); & anterior major (*h*) in cranium cum nervo re-curren-

(*b*) Lege Fascic. VII. p. 37.

(*i*) Ibid.

(*l*) F. 2.

(*m*) Fascic. VII.

(*n*) p. 38. f. 2. ZINN p. 214.

(*o*) Nostr. fig. 2. p. 38. & ZINN p. 214. tab. 3. f. 1. f.

(*p*) Fasc. VII. p. 40.

(*q*) F. 2. & tab. art. cran.

(*q*<sup>\*</sup>) p. 40.

(*r*) F. 1. 2. p. 40.

(*s*) F. 3.

(*t*) F. cit.

(*x*) p. 38. tab. VI. Fascic. VII. f. 2. 3. 4.

(*y*) p. 45.

(*z*) Plerumque p. 45.

(*a*) Quatuor p. 44. & etiam sex ibid.

(*b*) p. 45. f. 2. 4. 7.

(*c*) p. 43. f. 2. ZINN p. 215. f. 1. t.

(*d*) p. 44. f. 1. MEKRL l. c.

(*e*) F. 2. ZINN r.

(*f*) F. 2. 3. ZINN p. 215. & g.

(*g*) p. 41.

(*h*) F. 2. 3. p. 50. Ejus foramen VESAL. p. 68. t. 5. f. 1.



currente primi Quinti redux, eadem per duram matrem, falcemque regnatura & partem cranii orbitæ inpositam (*i*), tum per cellulas ethmoideas (*k*), & narium septum (*l*): Deinde *palpebralis* nascitur *inferior* (*m*), ad faccum nasalem, palpebras, arcum tarseum inferiorem; & superior (*n*) ad palpebram, supercilium, arcum tarseum superiorem (*o*), conjunctivam (*p*): nasalis, ad faccum lacrumalem, finum frontalem, narium anteriora, nasum (*q*), cum angulari magno arcu connexa (*r*): frontalis (*s*) aliis ramis profundis, aliis superficie propioribus late ad frontem sparsa.

Etsi in ordine varietas subest, quo nascuntur, tamen hi constantes nostræ arteriæ sunt furculi (*s*<sup>\*</sup>).

Inter eas peculiari cura recenseri merentur ciliares posteriores, anteriores, centralis retinæ.

### §. XXXII. Arteriæ ciliares I. Posticæ.

*Ciliares majores* (*t*), dudum notæ, oriuntur aut a trunco ophthalmicæ; aut ab arteria musculosa inferiori (*u*); aut a supraorbitali; aut a lacrumali (*x*); aut ex conjunctione ethmoideæ posterioris cum ramo ophthalmicæ (*y*). Majores, aut minores sunt, & quando majores, numerosissimis furculis scleroticam membranam perforant, etiam ex uno trunculo sedecim: minores duobus (*z*), vix ultra.

Flexuoso

(*i*) p. 50.

(*k*) Icon. 6.

(*l*) Ibid.

(*m*) p. 50. 51. add. Fig. 1.

(*n*) p. 51. f. 1. 2.

(*o*) p. 51.

(*p*) Fig. 1.

(*q*) p. 51. 52. f. 1. tab. art. fac. MEKEL l. c.

(*r*) MEKEL l. c. Fascic. VII. tab. art. fac.

(*s*) p. 52. f. 1. & Tab. art. fac. & corp. tot. MEKEL l. c.

(*s*<sup>\*</sup>) Animalia præter hæc omnia habent rete admirabile oculi in bulbo, sub elevatore oculi positum, arteriosum DUVERNEY *postb.* I. p. 577. ab HUVIO pictum p. 12. t. 1. f. 1. alterumque venosum t. 1. f. 2. t. 2. f. 1.

(*t*) VESAL. L. VII. c. III. f. 16. 17. CASSEB L. X. t. 12. f. 2. RUYSCH. *Epist.* XIII. t. 16. f. 6. 8.

(*u*) Ic. nostr. & ZINN t. 3. f. 1.

(*x*) p. 44. 45. ZINN t. 3. f. 1.

(*y*) Conf. p. 44. 45.

(*z*) p. 44.



Flexuoso itinere circa nervum opticum ludunt, & ad ejus cum sclerotica plicam ramos dant, qui in circulum irretiti (*a*), coronam eo loco faciunt, in quam etiam furculi a centrali retinæ, & a ramulis piæ membranæ nervi Optici propriis veniunt.

Inde in numerosos ramulos (*b*) subdivisæ, facile quadraginta, aliæ quidem *posteriores* sunt, ingressui optici nervi viciniore, duorum & ultra ordinum.

Eæ ad choroideam membranam tendunt, sanguine plenæ, dum in ea sunt membrana, & antrorsum prodeunt, ad angulos valde acutos (*c*) divisæ, ut rami truncis pene paralleli sint.

Sensim, uti antrorsum tendunt, ita magis magisque teguntur cellulosa tela, & ab anteriori facie ad posteriorem (*d*), sive RUYSCHIANAM declinant. Aliquæ equidem circulo uveæ se inmittunt (*e*), aut cum ramis ciliarium anteriorum communicant (*f*).

Longe pleræque tamen, tectæ ad microscopium mirifico vasorum in quadrangulares areolas conjunctarum reticulo (*g*), & undique flocculos vasculosos emittentes (*h*) veniunt ad corpus ciliare, in lepore manifesto & ibi sanguinæ, pluresque in unum (*i*) trunculum coeunt, quorum bini sibi paralleli accumbunt, & ultimo fine uniuntur in arcum (*k*) ducto, tum aliis ante finem (*l*) anastomosibus.

Ab iis trunculis in flocculos processuum ciliarium ramuli undique fecedunt, & fluitant. Totos vasis constare olim DUVERNEYUS (*l*<sup>\*</sup>).

Ad

(*a*) p. 45. t. 6. f. 4. i. ZINN in Epistola de vasis subtil.

(*b*) A. MOULINS t. 2. f. 5. RUYSCH l. c. p. 30. tab. nostr. f. 4. 6. p. 45.

(*c*) p. 47. F. nostr. 4. 8. ZINN tab. 1. f. 1.

(*d*) p. 46. ZINN p. 42. 45. 46.

(*e*) Fig. nostr. 5.

(*f*) F. 4.

(*g*) ZINN p. 47. 48. t. 1. f. 2.

(*h*) p. 48.

(*i*) Tria, quatuor A. MOULINS p. 57. triginta, in duos truncos ZINN Ep. p. 17. viginti de oculo p. 73.

(*k*) p. 46. Conf. RUYSCH Thes. II. t. 1. f. 7. HOVIUS tab. 2. f. 4. tab. 4. f. 3. & imprimis ZINN p. 73. t. 2. f. 3.

(*l*) ZINN Epist. p. 17. de ocul. p. 73. t. 2. f. 3.

(*l*<sup>\*</sup>) Possib. I. p. 159.



Ad lentem crySTALLINAM ramos dare (*m*), etiam B. ZINNIO probabile videbatur (*n*), cum imprimis anterior facies lentis pariter vasculis egere videatur, quæ vero hæcenus visa sunt, ea unice ad faciem posteriorem veniant. Nunc autem, postquam satis me convici, radios ciliares ad lentem crySTALLINAM non adhærere, non audeo fidere experimentis, dum uberius repetantur. Nam certe per ea vascula lentem æquum fuerit ad processus ciliares adhærere. Sed neque ad retinam membranam a vasis choroideæ furculos dari (*o*) in ullo animale reperi, cum ea tunica integerrime a Choroidea in omnibus possit separari.

Neque ad vitreum (*p*) humorem vascula, quæ ajunt in balænæ oculo ab ALBINO inventa esse, in homine (*p*<sup>\*</sup>), inve piscibus minoribus reperiuntur. Alia in piscibus integerrime detecta fuerunt (*p*<sup>\*\*</sup>) tantum ut interiora non videam subiisse. In milvo visus sum mihi vasa a vitreo corpore in circulum retinæ euntia vidisse. Vasa vero, quæ ex circulo vitrei corporis suspicor ad lentis crySTALLINÆ anteriorem convexitatem ire, nondum satis certa sunt.

### §. XXXIII. *Arteriæ ciliares longæ, & anteriores.*

*Longæ ciliares* sunt inter arterias ciliares posticas, sed majores, rariores, fere duæ (*q*), quas diximus esse fontes aquosos NUCKII (*r*).

Eæ anteriorem semper choroideæ membranæ sedem tenent, adque eam dant exiguos aliquos ramos, cæterum truncis suis, orbiculo ciliari tectæ, adveniunt in eam sedem, ex qua uvea nascitur.

Ibi

(*m*) Allen. MOULINS p. 57. 58. HOVIUS t. 5. f. 4. p. 44. seqq. BERTRANDI n. 39. p. 68. MOEHRING *de visu*, de uno ramo arterioso, sed ramoso p. 52. & imprimis PETIT *Mémoire de l'Acad.* 1730. p. 438. 439. in tursione. Addit se in fele & fetu humano replevisse.

(*n*) *Epist.* p. 25. & GATAKER p. 64. lentem alere DUVERNEY I. p. 150.

(*o*) AQUAP. L. I. c. 4. BERTRANDI p. 60. n. 27. Negat jam DUVERNEY I. p. 151.

(*p*) LOBE p. 29. MOULINS p. 58. HOVIUS p. 56. t. 3. f. 9.

(*p*<sup>\*</sup>) Plenum vasis rubris perpulchris vidit ILL. FABRICIUS *Samlung* II. p. 58. truncum non addidit.

(*p*<sup>\*\*</sup>) p. 293.

(*q*) *Fascic* VII. p. 45. f. 4. 5. 6. ZINN p. 219. t. 4. f. 2. t. 3. f. 2.

(*r*) p. 413. 414. DUVERNEY I. p. 152. & p. 582.



Ibi earum utraque fere in duos ramos (s) discedit, qui ad maximum angulum hinc & inde divaricati; iterumque in alios divisi, demum recipiunt sibi insertas arterias *ciliares anteriores* (t).

Æ sunt ramuli arteriarum musculos (u) rectos sequentium, ab ophthalmica, ejusque trunco, a ramo supraorbitali, inferiori, palpebrali superiori (x), & lacrumali nati, qui ad lineæ fere a cornea distantiam dividuntur in tres, quatuorve ramulos, qui scleroticam tunicam perinde perforant, ut posteriores: eas arteriolas a sex ad decem numeravi (y). Penetrant, per cellulofam telam, in ciliarem orbiculum, & divaricati, cum longis ciliaribus circulum uveæ constituunt (z); aliquæ etiam absque circulo uveam adeunt, etiam choroidea, ejusque partem anteriorem (a).

Denique aliquæ arteriolæ ex choroideis posticis ad circulum veniunt (b).

Ita fit, ut non simplex circulus, sed alter posterior ex longis ciliaribus anulus, imperfectus adsit, five duo semicirculi (c); & alter anterior perfectior ex anticis & longis compositus, & ipse aliquando duplex (d).

Hic circulus est inter pulchriores corporis humani particulas. Eum NUCKIUS (e) primus quasi obiter, deinde ex balæna RUYSCHIUS (f) depinxit: melius fere HOVIUS, qui & originem a vasis longis habet (g), & indolem flexuosam (h), & ramos serpentinos ad iridem (i) euntes. Nunc quidem satis notus est (k), & pro sphinctere uveæ

(s) p. 46. f. 5. 6.

(t) Fascic. III. p. 16. Fasc. VII. p. 46.

(u) Fascic. VII. l. c.

(x) ZINN p. 220.

(y) F. 4. m. n.

(z) F. 5. 6.

(a) p. 46.

(b) Ibidem.

(c) F. nostr. 5. ZINN t. 3. f. 2.

(d) ZINN p. 220. & ibid. F. nostr. 6.

(e) Tab. 6. f. 1. Habet in fele DUVERNEY *postb.* l. p. 532. & iterum arteriam circula-  
rem iridem arctantem l. p. 151.

(f) *Thef.* II. Aff. I. n. 7. t. 1. f. 6.

(g) T. 2. f. 1. G. G. conf. p. 56.

(h) F. 3. C. C.

(i) F. 2. E. G.

(k) WINSLOW n. 299. DUDDELL. p. 25. BERTRANDI n. 28. HEISTER n. 21. 29.  
o HALLOBAN p. 72. f. 1. 2. ZINN p. 219. Circulus, puto, exterior, Cl. TENON. p. 3.  
An plenus sanguine ligamenti ciliaris circulus KENNEDY p. 15.



uveæ a Cl. viro traditus (l). Ego talem depinxi, qualem soleo in humano corpore reperire. In multis etiam bestiis perinde fere adest, etiam pulchrior (l\*), in avibus perpulcher, ut in pica.

Ex eo porro circulo numerosa vascula in uveam veniunt, in variis animalibus, & imprimis in piscibus (l\*\*) sanguine plena, in homine pellucida, neque RUYSCHIO (m) ignota, neque VIEUSSENIO (n). Cum tamen Cl. FERRENIUS (o) ea descripsisset, & Cl. viri discipuli pro memorabili invento haberent (p), unico nempe exemplo arteriolarum minoris generis, alii contra rem passim cognitam esse reposuerunt (q).

Ea porro vasa (r) per uveam multo villo antèrèus tecta, posterius nigro pigmento, flexuosa, & inter se connexa tendunt versùs pupillam, & in secundum circulum divaricata & conjuncta, meant in principia circuli interioris uveæ (s). Fabrica non est perpetua, neque circulus semper integer (t). Nam vascula membranæ pupillaris (u) absque circulo secundo ex uveæ anulo veniunt.

Ab eo circulo vascula recta pergunt pupillam versùs, semper radiata (x).

#### §. XXXIV. Arteria centralis retinae.

Celeberrima sunt vasa, quæ ab ista arteriola prodeunt, cujus originem dixi. Ex ophthalmica quidem provenit, non ex cranio (y), sed in or-

I i i 2

bita

(l) VIEUSSENS *tr. des liqueurs* p. 211. MAUCHART *de synizesi*.

(l\*) Tres in ove, choroideæ, iridis, & internus ejusd. ZINN *Comm. Gott. T. IV. tab. 8. f. 1.* In lucio vidi.

(l\*\*) Arborum similia vidi, sanguine plena in cyprino.

(m) *Epist. XIII. tab. 16. f. 17. 18.* Ex balæna *Thes. II. Aff. I. n. 6.* Habet BERTRANDI p. 63. & MULLER l. c. p. 8.

(n) *Tr. des liqueurs* p. 211. *Obs. d'anat. & de mèd. prat.* p. 286.

(o) *Hist. de l'Acad.* 1739.

(p) MONTAGNAT *Lettre à M. BERTIN.* p. 8. 9, *Suplèmt. à la lettre de M. BERTIN.* p. 68. GAUTHIER *ergo ut sanguis ita lymphæ alibilis datur* Paris 1761.

(q) *Lettre à Mr. D. . . . sur le nouveau système de la voix* p. 37. *Lettres sur les artères lymphatiques* p. 13.

(r) p. 46. 47. ZINN *Epist.* p. 23. *de oculo* p. 92. t. 10. f. 2.

(s) F. 6. p. 46. Add. ZINN t. 3. f. 3. RUYSCH *Thes. II. t. 1. f. 6. Epist. XIII. t. 16. f. 17. 18.* BERTRANDI n. 30. p. 62. HEISTER n. 24. ZINN *Epist.* p. 24. *de ocul.* p. 92. HEUERMAN p. 889. Circulus interior TENON. l. c. Conf. in ove ZINN l. c.

(t) Fatetur ZINNIUS p. 93. 221. add. t. 3. f. 3. Integrum pingit RUYSCHIUS.

(u) WACHENDORF *Comm. Lit. Nor.* 1740. *tab. 1. f. 7. 8. Opusc. anat. t. 10. f. 3. 4.*

(x) p. 47. ZINN *Epist.* p. 34. RUYSCH *Epist. XIII. tab. 16. f. 17. 18.*

(y) EUSTACH. *de mult.* p. 141.



bita, ex ejus arteriæ trunco, prius (z) quam ciliares, aut iis mista (a), etiam a ciliari inferiori, aut interna, aut muscolari inferiori oculi arteria.

Est etiam, ubi duo vel tres ejusmodi trunci nervum opticum adeunt (b). Eorum præcipuus (c) axin tenet nervi optici, idemque cum nervo dissectus sulcum inanem relinquit, qui veteribus *porus* (d) dictus est. Etiam in animalibus sæpe plursculi trunculi sunt (e), & coram octo in bobus video, in fele, lupo, ove, aliisque tres, quatuor, etiam sex (f).

Ea sive unica arteriola, sive multæ fuerint, perforat laminam cribrosam alias dictam, & per retinæ interiorē, vitreo humori conterminam faciem incedit ramosa (g), sanguine in plerisque quadrupedibus conspicua (h), aut vivis (i), aut mortuis. Rubra pauca sunt (k), & major pars aut pallet, aut decolor est. Divisio nullam habet elegantiam, priusquam ars accessit. Cæterum hæ arteriæ etiam antiquæ scholæ notæ fuerunt (l), & in iis plurima experimenta fecit Cl. MEISTER (m), qui & ramos, & globulos rubros in ramis vidit. Easdem pulsare ostendit F. de SAUVAGES (n).

Quando vero injectio artificiosa accessit, tunc quidem magis & magis eorum vasculorum numerus crescit (n\*), & denique integra fit membrana vasculosa, quam medulla exterius circumfusa tegit.

Denique

(z) Fasc. VII. l. c. f. 2. & 7.

(a) F. 4.

(b) Fascic. VII. p. 42.

(c) ZINN p. 222. MORGAGN. p. 299. 300.

(d) Conf. BERTRANDI p. 65.

(e) MORGAGNI *Epist.* XVII. n. 44. BERTRANDI p. 65. 66.

(f) Sex in cane MOELLER n. 20.

(g) EUSTACH. t. 40. f. 3. 5. 8. & 10.

(h) In gazella PARISINI; leone IDEM; in bove du HAMEL *corp. anim.* L. II. c. 5. Vidi in lepore, ove, bove, fele. In avibus non memini nisi truncum me vidisse; qui ramos in pectinem dat. Neque in piscibus memini retinam vasis aliis pictam, præter truncum lenti crystallinæ, & vitreo corpori communem.

(i) In viva, sed aquis merfa, fele MERY *Journal des Savans étrang.* 1684. n. 17. *Mém. avant.* 1699. T. X. p. 656. In cane EVERS. p. 2. in fele ib. p. 5. & in nostris *Exper.* Hominem similiter factum, in cujus viventis retina vasa rubra adparebant, dixit Cl. de SAUVAGES *suffus.* p. 23.

(k) Fascic. VII. f. 7. 8.

(l) GALEN. de *us. part.* L. X.

(m) Hamburg. *Magazin.* T. 23.

(n) *Nov. Eph. Nat. Cur.* vol. I. obs. 36. ex alterna obscuratione parietis albi & ejusdem vicissim illustratione

(n\*) RUYSCH *Epist.* XIII. t. 16. f. 7. 16. MOELLER l. c.



Denique ea vasa in nonnullis animalibus ( $n^{**}$ ), cum ambitu anteriori retinæ circulo quodam terminantur ( $o$ ), ex quo aliqui rami ad retinam redeunt, alii lentem versus inter processus ciliares, & vitreum corpus ferri videntur. Iidem furculi crediti sunt per retinam ad anteriora lentis venire ( $p$ ). Ea sede in cyprino, aliisque piscibus luculentus circulus factus est, ex duobus, ortum retinæ anteriorem amplexis, arteriæ illius centralis ramis natus, quam continuo dicemus. Sed ejus circuli rami manifesto ad humoris vitrei membranam redeunt, ipseque circulus loco est anteriori.

Alii ramuli in nonnullis animalibus a media retina ad humorem vitreum ( $q$ ) veniunt, ex rubris vasis nati, aliquando rubri ( $r$ ).

Sed inprimis celebris est ramus lentis crystallinæ, quem paulo uberius ex magna varietate animalium liceat descripsisse.

In avibus pecten, sive flabellum ( $r^*$ ), bis tot rubra vasa habet, ex retinæ vasis orta, quot plicæ sunt, eaque vasa denique in caudam exeuntia pectinis lentem adtingere videntur, etsi ea nunquam eo usque persequi potui.

In piscibus fere avium est fabrica, sed pulchrior, quam descripsimus ( $s$ ), anteriores nempe, & posteriores vitreæ tunicæ arteriolæ.

In quadrupedibus, cane ( $t$ ), vitulo ( $t^*$ ), porcello, demum in homine ( $u$ ) arteria perfimilis illi trochæ penetrat per medium vitreum humorem, cui furculos dat, capsulæque lentis in posteriorem convexitatem se infigit, per eam capsulam, & demum in ipsam lentem ( $x$ ) distributa, pulcherrimum ALBINI ( $y$ ) inventum, nisi ante eum ILL. DU-

l i i 3

VERNEYUS

( $n^{**}$ ) In milvo, porcello.

( $o$ ) ZINN *Epist.* p. 26. *de ocul.* p. 223. *Comm. Gott.* T. IV. t. 8. f. 2.

( $p$ ) EUSTACH. t. 40. f. 9. PALLUCCI p. 47.

( $q$ ) p. 43. ALBIN. apud LOBE' n. 51. In bove MORGAGN. *Epist.* XVII. n. 18. BERTRANDI n. 74. In bove vidi & ove.

( $r$ ) In vitreo humore vasa rubra DAUBENTON T. III. p. 237. Adde in lepore BERTRANDI p. 74.

( $r^*$ ) p. 413.

( $s$ ) p. 414.

( $t$ ) MOELLER. ZINN p. 141.

( $t^*$ ) ZINN.

( $u$ ) ALBIN. ZINN p. 144.

( $x$ ) ZINN. *Physiol. Amst.* ed. WINSLOW IV. n. 301. absque trunco.

( $y$ ) *Essays at Edimb.* vol. I. p. 337. P. LOBE' n. 51. 60. MOELLER n. 21. STELT *de amaurosi* HEUERMANN p. 891. MOEHRING *de visu* p. 52. *Holl. Physiol.* p. 511. APPEL. *de ocul. fabr.* CAMPER. Et ipse vir ILL. *adnotat. anat.* L. I. t. 1. f. 4. 5. p. 31. 32.



VERNEYUS vidit, in cujus *posthumis* certe describitur (*y*\*). Nihil tamen inde ALBINO decedet, primo ostensori. Sed & ego in catello vidi sanguine etiam in capsula plenum per ejus posteriorem convexitatem ramosum, paulo ad latus centri insertum.

In porcello duobus ramis lentem subiit. Deinde G. HUNTERUS addidit, ex iis vasculis ramos teneros ad anteriorem planitiem venire; indeque cum subtili velamento, de capsula lentis abscedere, inque membranam pupillarem adhærere (*y*\*\*). Et memini certe me de membrana pupillari abscedentia vascula fluitantia vidisse. Etiam alii Cl. viri, aut idem (*z*), ut videtur, vasculum (*a*) trunco non nominato, aut certe vasa, quæ repleri possint, in lente crystallina viderunt (*b*).

Ita evincitur, per vasa, ut alias corporis animati partes, ita etiam lentem crystallinam ali, ut non sit necesse, contra analogiam, huic soli particulæ ejusmodi nutritionem (*c*) tribuere, quæ per imbibitionem fiat. Rubrum autem in sano corpore humorem vehere non sit probabile (*d*). Nunquam sanguis in lente visus est, etsi in humore aqueo adparet.

Ex vasis eam lentem constare nimia etiam est affirmatio (*e*).

#### §. XXXV. *Arteriæ accessoriæ.*

Has breviter tangemus. Plurimas dat arteria *infraorbitalis*, non ideo præcipua (*f*) arteria oculi, quem ipsum vix tangat. Multos tamen furculos edit, tum in orbitam (*g*), ejusque periossteum, etiam ad scleroticam, varie cum ophthalmicis connexos: inque arcum tarseum inferiorem.

Quando

(*y*\*) *Posth.* I. p. 151. Et eo referrem, postquam ILL. SENACUM testem habeo, nihil ab editore codicibus DUVERNEYI additum fuisse: aut ad F. S. quem non totum nominat HUNTERUS, ut tamen id inventum ei tribuat l. c.

(*y*\*\*) *Medic. Com.* I. p. 63.

(*z*) BERTRANDI p. 74. O'HALLORAN p. 45. 55. f. 5. ex cane jugulari ligata suspenso. Addit ad vitreum corpus dare ramulos p. 45.

(*a*) RUYSCH *Thes.* II. tab. 1. f. 8. ZINN t. 7. f. 2. 3. ex LIEBERKUHNIO.

(*b*) In lentis membrana vascula vidit GUNZIUS *de suffus.* p. 12. & vasa in ea sanguinea DAUBENTON l. c. In fele & fetu humano PETIT *Mémoire de l'Acad.* 1730. Ante 20. annos FRANCISCUS NICHOLLS vascula lentis crystallinæ replevit JENTY *Compend. hist.* p. CLIV. In equo vasculum lentis crystallinæ vidit ILL. SENAC ed. 1735. p. 694.

(*c*) PETIT *Mém. de l'Acad.* 1730. p. 439. TENON. p. 4. PORTERFIELD T. I. p. 239. 445.

(*d*) S. YVES p. 280. Vasa pellucida lentis *Journ. de Trévoux* 1721. Febr.

(*e*) *Holl. Physiol.* p. 503.

(*f*) WINSLOW III. n. 60. IV. n. 297. &c. BOENNEKERN *Frank. Anmerk.* &c.

(*g*) *Fascic.* VII. p. 53. t. VI. f. 1. V. & P. f. 3. p. 6. &c.



Quando vero nunc in facie est, dat denuo ramos ad palpebram inferiorem ejusque arcum tarseum, & ad orbicularem (*b*), quorum alter internus est, ad totam palpebram alter (*i*).

Temporalis arteria profunda per foramen (*k*) ossis malæ furculos dat ad glandulam lacrumalem, arcumque tarseum utrumque, aliquando ita grandem, ut trunci fit loco.

Superficialis etiam temporalis arteriæ ramus non minimos (*l*), duos, furculos edit, ad orbicularem anguli minoris oculi, & arcum tarseum utrumque.

Plures alicujus momenti arterias oculi non novi. Superestque certe aliquid, in humano oculo nondum confectum, de arteriis humoris vitrei, & lentis crystallinæ vasis anterioribus. Cornea membrana quæ habet, accipit a conjunctivæ furculis (*m*).

§. XXXVI. Venæ oculi.

Venæ, quam arteriæ, minus notæ sunt, neque satis hætenus plena existat earum historia, etsi aliqua ego protuli, & plura ZINNIIUS. Nondum vero de venis vitrei corporis, & lentis crystallinæ, & corporis ciliaris satis constat.

Truncus venæ oculi præcipuus, etsi finis quidem nomen non mereatur (*n*), habet tamen cum sinibus cranii luculentum nexum (*o*).

Finis ei ergo posterior est ex receptaculo sellæ equinæ, fere ad inferiora (*p*) aliquando cum vena duræ membranæ principe connexus (*q*). Est ubi ex sinu potius circulari provenit (*r*), aut ex petroso superiori (*r*\*). Dat centralem (*s*) retinæ, in ipso receptaculo.

Subit

(*b*) p. 53. f. 1. Q. [ male in editis legitur O. ]

(*i*) f. 1. S. male 5.

(*k*) p. 53.

(*l*) p. 53. 54. tab. 6. b. & c.

(*m*) p. 362.

(*n*) Monui Fascic. III. tab. art. fac. n. 26.

(*o*) PETIT *Epist.* I. p. 12. WINSLOW n. 29. Emissarium primum SANTORINI Lib. X. p. 154. 155.

(*p*) ZINN p. 228. Pluribus ramis DUVERNEY.

(*q*) BERTIN. II. p. 339.

(*r*) Lib. X. p. 157.

(*r*\*) Syllab. part. corp. hum. t. 16. f. 5.

(*s*) PETIT l. c. Syllab. part. corp. hum. t. 16. f. 5. n. 109.



Subit orbitam, vel integra, vel jam tunc divisa (*t*), edit duræ matri furculum (*u*), tum ramum ethmoideum posteriorem (*x*); & ciliarem superiorem (*y*).

Inde finditur. Ramus *Superior*, magis notus, edit primo venam lacrimalem, arteriæ cognominis similem, nisi quod venoso more anastomoses cum aliis sui trunci ramis habet (*z*); eadem etiam ciliarem & musculosos aliquos ramos dat.

Porro truncus superior, præter ramos musculosos ad levatorem oculi, & palpebræ, internum, & trochlearem, edit ciliarem internam (*a*), ramos palpebrales, frontalem, & nasalem, trans nasum cum altera sodali varie inosculatam. Truncus, qui de orbita nunc erepsit, in angularem venam valde conspicua anastomosi terminatur (*b*).

Inferior ramus edit alios musculosos furculos (*c*), & ciliarem propriam (*d*); & ramulos ad choroideam, quorum alii in vasa vorticosa inosculantur (*e*); alii in ciliares longas.

Præcipuo ramo de orbita exit, inque truncum superiorem redit (*f*).

Cum superiori anastomosis ita unitur, ut quasi venosus circulus oculum ambeat (*g*).

#### §. XXXVII. *Venæ ciliares.*

Venulæ adeo ciliares quatuor (*h*), etiam quinque (*i*), aut sex (*k*), scleroticam oblique perforant, inque ea ita dividuntur, ut duodecim etiam trunculis ad choroideam veniant (*l*), minora alia, vorticumque quædam

(*t*) ZINN p. 229. Tunc duæ venæ sunt, ut PETITUS habet.

(*u*) *Fascic.* III. l. c.

(*x*) ZINN t. 3. f. 4 b.

(*y*) IDEM *ibid.* f.

(*z*) ZINN *ibid.*

(*a*) p. 230

(*b*) Conf. *Fascic.* III. *tab. art. fac.*

(*c*) ZINN K.

(*d*) p. 229.

(*e*) p. 230.

(*f*) *Ibid.*

(*g*) p. 231.

(*h*) *Fascic.* VII. p. 47.

(*i*) ZINN p. 232.

(*k*) RUYSCH *Thes.* II.

(*l*) ZINN p. 233.



quædam imitamenta factura (*m*); alia majora non facile supra quatuor, vorticosa illa STENONII (*n*), unica vocula indigitata vasa, quæ mediam fere choroideam (*o*) adeunt, & curvis ex truncis in unum latus, & unum semicirculum, ramis emissis (*p*) divisa absumuntur. Vortices bini binique se suis ramis respiciunt (*q*). Eorum ramorum alii antrorsum tendunt (*r*); alii varie in transversum cum vasis minoribus uniuntur (*s*), & demum alii retrorsum redeunt (*t*).

Non sunt arteriæ, etsi per arterias replentur, & ab HEISTERO (*u*), & a RUYSCHIO (*x*), & aliis (*y*) pro arteriis recensentur: venas esse & ipse monui (*z*), & ZINNIUS (*a*).

Ex iis vorticibus vascula recta (*b*), cum ramis longis conmixta, iridem radiata adeunt, nullo veri nominis circulo facto.

Alterum genus venarum *ciliarium longæ* (*c*) sunt, ZINNII inventum. Nervorum longorum similes, sed exiguæ, rectæ, anteriores, sive exteriores, adeunt orbiculum ciliarem, inque eo divaricatæ ad angulos maximos, omnino ut arteriæ cognomines, cum surculis vorticum irritæ, adeunt iridem, sanguineæ (*d*).

Denique *venæ ciliares anteriores* (*e*), cognomium arteriarum pariter similes, a musculosis ramis natæ, cumque sodalibus in arcus conjunctæ, scleroticam tunicam perforant, ad orbiculum ciliarem veniunt, & partim cum vorticosis venis coeunt (*f*), partim rectæ iridem adeunt (*g*).

Circulum

(*m*) p. 233. t. 4. f. 2. h. l. n.

(*n*) *Diff. can. carch.* p. 83.

(*o*) ZINN p. 233. ic.

(*p*) Ibid. Nimis in ambitum radiata pingit RUYSCH *Epist.* XIII. t. 16. f. 8.

(*q*) ZINN p. 236. f. 1. 2.

(*r*) IDEM f. cit. p. 235.

(*s*) Ibid. f. cit.

(*t*) Ibid.

(*u*) L. c.

(*x*) *Epist.* XIII. t. 16. f. 8. 9. 10.

(*y*) *Petrus LOBB* n. 40. *BERTRANDI* n. 27. &c.

(*z*) *Prim. lin.* n. 520. *Fascic.* VII. p. 49.

(*a*) p. 234.

(*b*) F. 2.

(*c*) p. 237. t. 4. f. 1. 2.

(*d*) Ibid.

(*e*) Et ipsæ a ZINNIO detectæ p. 238. f. 2.

(*f*) Ibid.

(*g*) Ibid.



Circulum verum in bove visum ( *b* ), inque avibus conspicuum, in homine non faciunt ( *i* ).

§. XXXVIII. *Venula centralis.*

Dudum, & primus puto ( *k* ) dixi, & in omni quadrupedum genere reperi. Arteriarum enim retinæ rami non sunt simplices, sed omnino duplices, venasque majores cum arteriis habent mistas. In receptaculo orta ex trunco ( *l* ) ophthalmicæ provenit, imo omnium loco, & longe per involucrum nervi optici pellucens, sensim demersa, pariter laminam cribrosam perforat ( *m* ), majoribusque quam arteria, furculis per retinam dividitur ( *n* ), quam sæpe in variis quadrupedibus conspicuam vidi. Non tamen ideo omnia vasa rubra retinæ venæ sunt ( *o* ).

§. XXXIX. *An oculus vasa lymphatica habeat.*

Et si subtilissima & pellucidissima hujus organi natura pellucida vasa fere promittit, nondum tamen experimento confirmata sunt. Magna, aqueum humorem revehentia DUVERNEYUS dixit ( *o\** ). In boum retina vidisse se credebat VALSALVA ( *p* ), in iride & choroidea nominaverat STENONIUS ( *q* ), in uvea VIEUSSENIUS ( *r* ). In eadem, & in utraque lamina & pellucida absque nodulis vascula, etiam in retinam, & vitreum corpus, & versus lentem educta; tum alios ramulos ( *s* ) nodosos, albidos, flexuosos ( *t* ) nuper Cl. BERTRANDI dixit. Verum tot in animalibus, oculis vitris convexis armatis, vascula quidem sæpe decolora vidi, ut tamen ex truncis rubris manifesto continuarentur. Bullas etiam aereas aliquando laminæ cribrosæ insidere vidi, quas pro ejusmodi vasculis haberes.

S E C T.

( *b* ) A RUYSCHIO, pictum *Thes.* II. t. I. f. 6. aque aliis repetitum, etiam a CASSEBOHMIO, HEISTERO *de choroid.* ed. nov. n. 26. Fatetur tamen rem difficilem esse. Habet & BERTRANDI p. 61.

( *i* ) p. 239. 240. 241.

( *k* ) *Prim. lin.* n. 520.

( *l* ) p. 243.

( *m* ) p. 244.

( *n* ) Habet etiam BERTRANDI p. 65. 66.

( *o* ) Suspiciatur ZINN p. 244.

( *o\** ) *Postb.* I. p. 144.

( *p* ) p. 50. Habet & BERTRANDI p. 68.

( *q* ) L. c.

( *r* ) *Obss. d'anat. & de méd. prat.* p. 286. 287. quos ductus ab arteriis distinguit.

( *s* ) BERTRANDI p. 61. & puto 68. nisi ea vascula iterum alia sunt a prioribus.

( *t* ) *Idem* p. 62. 63.



## S E C T I O I I I.

## L U X E T C O L O R E S.

## §. I.

**T**antum oportet de physicis decerpere, quantum erit ad visionem interpretandam necesse. Brevitatem imperat, & longus alioquin labor, & quod propria hic inventa nulla promittam, id curaturus, ut bonos sequar auctores.

§. II. *Lux.*

Pulcherrima rerum ita ad corpora pertinet, ut quodammodo (*u*) ad naturam materiei expertem propius accedat. Tanta nempe est tenuitas, ut per acus ocellum possis inmensum illud DEI INCOGNITI templum dimidium adspicere; & radii a tot solibus (*x*), ad distantiam nullis exponendam numeris remotis, adeo infinite pene magnis, in orbem advenientes, absque ullo incommodo, aut confusione ulla, possint per tantillum, decima parte lineæ non majus, foramen transire. Sæpe etiam ea meditatus, quæ fiunt in videndo, timidus utique, tamen vix me potui continere, quin penetrari a luce lucem admitterem. Sint, nam res adeo simplex est, ut absque demonstratione eam sibi sumere liceat, sint, inquam, in conclavi mille specula, in eorum speculorum superficie pingentur objecta obposita, alia & alia, ut oculus in speculum insipientis aliter erit dispositus. Ea objecta ad oculum perveniunt pyramidum specie, quarum vertex est cornea spectatoris tunica, tota superficies speculi pro basi. Ubique nunc, & in omnibus atomis conclavis, oculos ponas, videbunt omnes, & accipient suam quæque pyramidem, quam necesse est per aerem iter suum ad oculum absolvere. Nunc ex pyramides mille milleque modis se penetrabunt, ut nullum possit in conclavi punctum cogitari, per quod

K k k 2

centum

(*u*) Spiritum esse, & semiincorporeum du C l. o s princip. des mixtes p. 37. & nuper D. du CHATELET. Corpus non esse, neque ea ratione diffundi FRANZ. curios. med. phys. p. 16.

(*x*) MUSSCHENBROECK p. 460 In eo exemplo radios ostendit, tenuiores esse capillo, in ratione 1. ad 5. 000. 000. 000. 000, sive ad 5000. billiones.



centum iterumque centum non transeant, magis latæ minusve, pyramides. Et tamen quæque suam ad oculum absque confusione, absque aberratione, aequæ plena, aequæ vivida, & aequæ fidelis advenit. Et tamen in eadem speculi superficie non idem, sed alia & alia objecta pinguntur, ut rectus aut obliquus, dexter sinisterve, oculos inspexerit.

Cæterum corpoream ( $y$ ) tamen lucem esse aliquæ ejus adfectiones demonstrant: iter in aliquo demum temporis spatio relectum ( $z$ ); mutatio a medio transmittente constans; adtractio ad corpora varia ( $a$ ); motus per alia impeditus ( $b$ ); angulus incidentiæ ( $c$ ) æqualis angulo reflexionis; vis summa corporea, quam in foco suo lux exercet; & qua ipsa levia corpuscula dispellit ( $d$ ), & elastum facit vibrare; speculorum concavorum & solidorum variæ vires, quibus lucem ab itinere detorquent, inque unum cogunt, aut vicissim dissipant. Nam augere quidem pondera corporum, dum a luce in focum concentrata calcinantur ( $f$ ), etsi speciem habet experimenti ( $g$ ), in tanta tamen subtilitate radiorum, & in conspicua levitate foci eorundem vitrorum ( $h$ ), nullo pondere carbonem urgentis, nondum admisero.

### §. III. *An cum igne eadem.*

Multum est de ea quæstione dudum dubitatum, cum alii idem esse utrumque ( $i$ ) elementum contendant, differre alii ( $k$ ).

Et certum quidem est, lucem in lineis rectis [ad sensum], ignem in omni perinde directione progredi, eoque modo augeri ( $l$ ).

Porro

( $y$ ) NEWTON *queries* n. 29.

( $z$ ) PORTERFIELD T. I. p. 252.

( $a$ ) S'GRAVEZANDE p. 706.

( $b$ ) PORTERFIELD I. C.

( $c$ ) S'GRAVEZANDE n. 1241. seqq.

( $d$ ) BUFFON *Hist. natur.* T. III. p. 355. HOMBERG *Histoir de l'Acad.* 1708. p. 211.

( $e$ ) HOMBERG *ibid.*

( $f$ ) PORTERFIELD T. I. p. 251.

( $g$ ) MUSSCHBROECK *Essays* p. 471.

( $h$ ) Etiam ignis nullum pondus est HILLARY *on fire* p. 17.

( $i$ ) S'GRAVEZANDE p. 658. LIEUTAUD *Prolegom.* p. 23. NOLLET *Leg. de phys.* T. V. p. 14. MUSSCHBROECK *Instit.* n. 1082.

( $k$ ) WALLERIUS ad HIRNE p. 27. Calor a sole HILLARY *properties of fire* p. 61. seqq.

( $l$ ) S'GRAVEZANDE n. 2414. 2415.



Porro lucem intensissimam (*m*) reperiri, absque ullo calore, in foco potissimum speculi cavi, quod lunæ (*n*) radios colligit, & contra calorem amburentem absque luce ulla, in metallis candescentiæ proximis (*o*) obtinere.

Et lucem reflecti ad angulos æquales incidentiæ, ignem non reflecti (*p*). Ignem ab adritu, lucem a sole (*q*) excitari.

Lucem non perinde, ut ignis, omnia corpora penetrare (*r*).

Particulas ignis se repellere (*s*), non ita lucis.

Et tamen sunt manifesta alia rerum testimonia, quæ videntur demonstrare, ignem & lucem idem esse elementum, etsi utique lucis aliquæ peculiares sunt adfectiones.

Lux sola purissima solis, calorem excitat in aere, inque omnibus corporibus nobis notis: ejusque caloris efficacia augetur (*s*\*), quo directior, purior, fulgidior, densior lux est, donec denique in ea densitate, quam specula concava efficiunt, omni alio igne sit acrior. Nam & omnia metalla (*t*) in eo foco funduntur, & pleræque gemmæ (*u*), & ipse ada-

K k k 3

mas

(*m*) A lunæ fulgore cæcitas H E R R E S observ. p. 45. seqq.

(*n*) VILLETTE in sui speculi descriptione. H O O K E of light p. 80. du CHÂTILLET physiq. HILLARY p. 63. W O L F Versuche T. II. p. 409. SMITH optiks n. 95. 96. BOUGUER Degrad. de la lum. p. 32. Crediderat cal fieri MONTANARIUS. (COGROSSI saggi della med. Ital. p. 29.) Sed neque frigus faciunt, ut credebatur W E P P E R apoplex. p. 239.

(*o*) p. 64.

(*p*) p. 65.

(*q*) p. 67.

(*r*) p. 68. 13.

(*s*) p. 35.

(*s*\*) Ex ratione superficiæ ad circulum, quem focum vocant, vis exurens speculi concavi æstimata est a C I W O L F I O.

(*t*) Aurum in TSCHIRNHAUSIANO lenticulari vitro, & metalla vitrificari Hist. de l'Acad. 1699. p. 90. 92. Act. Erud. 1691. p. 517. seqq. & ferrum fundi atque minui 1707. p. 41. In (VILLETTIANO speculo), cujus focus est 4". ferrum, & chalybem uno momento liquefcere Journ. des Savons n. 9. 12. 24. & in descript. du miroir de Mr. de VILLETTES Lion 1715. 8. & apud du HAMEL l. c. p. 178. Phil. transf. T. I. p. 311. MUSSCHENBROECK eff. p. 485. Calorem esse 7396es majorem aere 600. calente QUESNAY Oecon. anim. p. 31. De auro in vitrum converso PLUCHE Hist du Ciel. II. p. 119. HARTSOEKER physique p. 76. 177. etiam experimento prolato & cours de physique p. 70. tum des LANDES Mém. II. p. 39. De fumo forte non recte. Sed cur aurum in vitrum non abeat?

(*u*) Smaragdus, & aliæ gemmæ Phil. transf. n. 360. Galer di minerv. T. VI. p. 111. seqq.



mas (x), quem nulla vis ignis in fluidam mobilitatem resolvit, tamen in micæ impalpabiles adtritæ dissipatur.

Et lucet ignis, omniaque corpora, quæ ejus elementi satis absorbserunt, reddit lucida: si ad definitum gradum calefacta fuerint (y).

Si luminosa sunt animalia marina numerosissima, magna alia, & pisces (z) plerique, minuta (a) alia de insectorum (b) genere: Si pyralides (c), cicindelæ (d), lampyrides (e), si carnes (f), & ligna putrida, & oculi insectorum (g) absque calore notabili lucent, videtur causa esse, quod lucis densitas definita requiratur, ut calorem faciat, & carniæ effluvia lucida nimis sint tenuia (h), & rara.

Haftenustamen utrumque elementum consentit, quod lumen, perinde ut ignis, corporibus adhæreat (i), & se aqua aut muco inviscari (k) patiatur, in quo lux habitet, & nixu aliquo vitali excitetur (l), & sup-  
prima-

(x) In *Phil. transf.* n. 360. *Galer di minerv.* l. c.

(y) NEWTON *Queries* 8.

(z) Hirundo piscis RONDELET p. 285. Asellus, stellæ marinæ VALISNER t. III. p. 460. Penna marina RONDELET *Comm. Bonon.* II. P. I. REAUMUR 1723. dactyli PLIN. L. IX. c. 61. etiã mortui.

(a) Vermes ostreorum *Journ. des Savans* 1666. n. 15. PLOT *natur. hist. of Staffordshire* p. 117. 118. Insecta Cl. VIANELLI, a quibus aqua marina lucem habet. Nereides, & medusæ LINN *Amant.* Acad. T. V. p. 71.

(b) Scolopendra (*flammarisch*) DIPPEL *morb. med.* p. 103. Elater duabus in capite lucentibus glandulis BROWNE *Jamaic.* p. 432. Scarabæus laternarius in rostro lucem præferens MERRIANIN *insect. surin.* p. 49.

(c) Pyralides luce abdominali.

(d) Cicindelæ BORTONI in *pyrosophia* PISO *hist. natur. ind.* p. 292. PLOT l. c. ALLEN de cicindela.

(e) MALPIGH. *posth.* p. 85. 86. *Com. n. Nor.* 1736 hebdom. 16. Luciolæ volantes italicæ NOLLBT *Mém. de* 1750. p. 56. Astacorum reliquiæ SACHS *gammareol.* p. 211.

(f) F. ab AQUAP. *Musc. act.* p. 86. 87. *Mém. des Sav. étrang.* T. II. p. 613. C. BARTHOLIN. *Cent. H. h.* 12. & de luce p. 241. Eam lucem putredo exstinxit, Add. *Phil. transf.* n. 125. PEIRESC. *vit.* p. 69.

(g) LYONNET T. II. p. 27. glandulæ BROWNE.

(h) MUSSCHENBROECK *Ess.* p. 485. Hinc lumen lunæ non calefacit. Et si enim lumen a superficie 306. ampliori cogatur in unum, tamen ea millies est, quam lumen ordinarium solis, debilior, BOUGUER *degrad. de la lumière* p. 10. 32. Conf. SMITH n. 96. Est enim lux lunæ 180000es, ut SMITH n. 95. aut 300000es, & BOUGUER luce solis debilior.

(i) Splendor orbis piscis BARTHOLIN. *Cent. II. obs. 1.* De dactylis REAUMUR *Mém. de* 1723. de carniæ *Phil. transf.* n. 125.

(k) MALPIGH. *posth.* p. 85. 86. BORTONI *Pyrosoph.* 141.

(l) NOLLBT *Mém. de l'Acad.* 1750. p. 56. de luciolis italicis.



primatur (*m*), uti vita animalis exstinguitur (*n*). Idem in aquam transit (*o*), & perinde, ut ignis, in vacuo spatio destruitur (*p*).

Id utique hoc elementum habet proprium, quod minime luceat, nisi per rectas lineas (*q*) a solis, vel a lucentis corporis vi ordinetur: calorem tamen etsi nulla in ejusmodi linea dispositum efficiat. Neque hic quidquam est absconditi, idem elementum aliter & aliter adfectum, effectus edere diversos. Diversissimas dotes aqua a vapore habet, qui & aqua fuit, & in aquam redit. Ostendetur porro, quantum a se ipsa lux dissentiat, ut per alia media transit.

Denique lux videtur ipsa sibi, ut luceat, sufficere, calorem vero tum demum nasci, quando ea lux in corpora solida agit, quorum particulas in motum agat vibratorium, vehementem. Ut in luce solum a sole elementum sit, in igne id elementum, cum corpore alio, & crassiori conjunctum. Et lux cum igne conjungitur, quando in eo corpore & motus est particularum minimarum, & lucis a superficie valida reflexio.

Lux etiam pervadit omnium corporum minimas partes (*r*), non vitra sola, sed omnino metalla quaelibet (*s*), & notis in experimentis etiam hominum digitos (*t*), ceram figillatam, & opacorum corporum lamellas tenues penetrat, eademque opaca pellucida fiunt (*u*), quando in tenuitatem extenduntur, & sub microscopio colores pereunt, ipsæque auri tenuis squamæ pellucunt (*x*). Nunc alio loco quidem demum ostendetur, quare pellucidis ex laminis factum corpus opacum fiat: sit interim exemplo & aqua, & vitrum, pellucida corpora, quorum tamen nimis densa strata lucem suffocant, & opaca redduntur.

§ I V.

(*m*) ALLEN de cicindela. BROWNE *Jamaic.* p. 432. de elatere.

(*n*) PLOT. *nat. hist. of Staffordshire* p. 117. 118. du TERTRE *Hist. natur. des Am. ill.* II. p. 281.

(*o*) RE'AUMUR l. c. *Comm. Bonon.* T. II. P. I.

(*p*) *Phil. transf.* n. 31. 32. etiam, quod mireris, aqua adfusa in ligno putrido  
IDEM ibid.

(*q*) BOERHAAVE *Elem. Chem.* s'GRAVEZANDE n. 2414. 2415.

(*r*) s'GRAVEZANDE n. 3443. WOLF *Versuche* T. II. n. 54. HOOKE p. 72. 73. & conf. NEWTON *optiks* L. II. part. 3. prop. 2. BAKER *microscop.* p. 53.

(*s*) HOOKE. WOLF T. III. n. 72. de auro, & BOYLE de color. p. 202. STURM *phys. gener.* p. 393.

(*t*) MUSSCHENBROECK *eff.* p. 42. 43.

(*u*) GOTTSCHED de luce n. 10.

(*x*) POWELL p. 72. 73. Add. WOLF l. c.



§. IV. *Radii lucis.*

Ea est natura lucis, ut ex sole, & ad solis imitationem ex omnibus corporibus lucentibus, lineæ rectæ in omnem ambitum exeant, tamquam ex centro ( $y$ ), & pariter æquales, similesque, cum iisdem affectionibus progrediantur, sintque infinita in eodem corpore puncta radiantia ( $z$ ), & colorata corpora pariter in puncta radiantia abeant ( $a$ ). Nondum autem inquirimus, num vere radii effluant, num unice a puncto radiante, aut vibratione aliqua incitentur, aut alio modo in rectitudinem corrigantur.

Cum rectæ eæ lineæ sint, & ex centro prodeant, adparet densissimum jubar in eo centro fore, inde lucis densitatem perpetuo minui, ut augentur sphaerarum diametri quadratæ ( $b$ ), quas radii replent; atque adeo debilitari vim lucis eundo, etsi omnino lux ipsa non debilitatur ( $c$ ). Facile enim intelligitur, cum similes sui radii sint, & pariter omnes luceant ( $d$ ), vim lucis fore ut numerum radiorum. Hæc ergo causa est, quare demum objecta etiam lucida, nimis remota nobis aut non lucida videantur, ut via lactea, & varii stellarum nebulosarum acervi, aut denique visum omnino fugiant. Oculus enim noster certo lucis robori adfuetus, a minori copia radiorum non emovetur. Multum addit huic debilitationi lucis opacitas interpositorum corporum, quæ etiam in aere non minima est ( $e$ ). Minuitur autem lumen, dum per opacas *laminas* transit, non ut earum densitates, sed ut densitatum logarithmi ( $f$ ).

Id etiam ex matheſeos indulgentia habent hi radii, quod valde procul si advenerint, habeantur pro parallelis ( $g$ ). Notum est enim pro parallelis lineis sumi absque errore notabili, quæ in infinita demum distantia

( $y$ ) SCHEINER p. 133. &c.

( $z$ ) HOOKE *posth.* p. 120.

( $a$ ) S'GRAVEZANDE n. 3057.

( $b$ ) MUSSCHENBROECK *Instit.* n. 1075. PORTERFIELD II. p. 398. 399. 400. &c. Longe vehementius alii, in ratione eelerius crescente. Ut octava dignitas numeri distantiam designantis *Hist de l'Acad.* 1735. p. 7.

( $c$ ) SMITH n. 93. 94.

( $d$ ) S'GRAVEZANDE n. 3123.

( $e$ ) PORTERFIELD I. p. 399. SMITH n. 93. 94. Perfectam a solo aere opacitatem nascituram, si atmosphæræ crassities esset 227. leucarum BOUGUER p. 85.

( $f$ ) BOUGUER *Seçt.* II

( $g$ ) KEPLER *dioptr. postul.* 23.



tia concurrunt, & repetita accommodatione distantia, a qua radii adveniunt, habetur pro infinita.

Cum præterea oculi nostri perparvi sint, & tamen basin constituent radiorum luminosorum [aut coloratorum], factum est, ut demum a modica distantia advenientes radii, tamen pro parallelis absque magno errore habeantur, dum a 200. (*b*), aut a 104. (*i*) demum pedibus, & demum a sex pedibus advenerint (*k*).

Denique & hoc condonant Mathematici, quod radii utique per diversas aliter & aliter densæ atmosphære sphæricas superficies curvati, inque lineam propriam curvam inflexi, tamen pro rectis sumantur.

### §. V. *Motus lucis.*

Multa de hoc motu est disputatio, cum alii primæ famæ viri, lucem pro torrente haberent, qui ex sole, exque stellis fixis perennis effluat (*l*). In eo torrente etiam celeritatem metiebantur, mensura, qualem rei majestas (*m*) admittit. Satellites enim Jovis (*n*) observantur tardiores facere suos cursus, & ferius emergere, quando a terra remotiores, celerius, quando propiores sunt.

Ex eo experimento, cum aliqui (*o*) in minus regulares eorum satellitum observationes causam discriminis retulissent, confectum est satis communi ex sententia, lucem a sole ea celeritate exire, ut a sole ad terram in 8. minutis primis, & secundis 13. perveniat.

Ostensum

(*b*) BAYLE' p. 447. addit in artificiali oculo diversitatem non facere.

(*i*) WOLF &c.

(*k*) LA HIRE *accidens* p. 616.

(*l*) NEWTONUS *Quer.* 29. MUSSCHENBROECK n. 1076. 1077. S'GRAVEZANDE p. 704. seqq.

(*m*) Neque enim in exiguis, ad milliarem unicum factis, experimentis aliqua retardatio sperari potest, qualem se vidisse crediderint BARTOLUS *de sono* p. 47. & HARTSOEKERUS repetiit *dioptr.* p. 16.

(*n*) ROEMER *Journ. des Savans* 1676. du HAMEL *Hist. de l'Acad.* 1675. p. 145. 172. S'GRAVEZANDE p. 705. seqq. NEWTON *Opt.* L. II. P. 2. *prop.* XI. MUSSCHENBROECK n. 1076. 1078. HUGEN *de la lum.* p. 6. Conf WARGENTIN K. *Swenska vetensk. handling.* 1744. n. 2.

(*o*) HOOKER *de lumin.* p. 78. CASSINUS apud du HAMEL p. 172. MARALDUS *Mém. de l'Acad.* 1707. Conf. S'GRAVEZANDE p. 706. 707.



Ostenfum est etiam, stellarum fixarum ( $p$ ) nonnullas esse aberrationes, quas non aliunde liquidius interpreteris, quam a lucis ad terram non subito, sed certum tempus requirente itinere.

Est equidem incredibilis celeritas lucis, quæ ex his calculis sequitur, ut in minuto secundo percurrat pedes 873, 497, 531 ( $q$ ), & ex alio calculo 1000, 000, 000 ( $r$ ), & omnino tormenti globum ( $s$ ) prævertat in ratione :: 642500 cupla ( $t$ ), sonum vero 500, 000 cupla ( $u$ ), aut 731, 907pla ( $x$ ).

Et tamen non fatigantur eundo lucis alæ, & perinde velox est reducis lucis & reflexæ iter, ut neque celerius lux feratur, quæ a sole recta via advenit, eo lumine, quod a satellitibus Jovis reflectitur ( $y$ ).

Sunt tamen alii Cl. viri, qui cum CARTESIO ( $z$ ) malint, non exire de stellis fixis lucem, nimis celeriter etiam maximos consumturam globos ( $a$ ), sed vel pressionem ( $b$ ), vel pulsationem ( $c$ ) ab iis corporibus unice pati, quæ lucem per ætherem in motum cieat, fere ut in aere pulsus sonori excitantur, alterne compressis, & se restituentibus ejus medii corpusculis ( $d$ ). Unde, ob naturam multo tenuiorem ( $e$ ) medii elastici, celeritas ætheris absque admissio torrente similis obtineatur.

Videtur autem hæc pulsatio, aut quæcunque demum est corporis radiantis in lucem potestas, facere, ut lux prius dispersa, nunc in radios parallelos cogatur ( $f$ ), feriatque oculos, sive unice premendo proximas particu-

( $p$ ) BRADLEY *Phil. transf.* n. 406. SMITH. *optiks* L. IV. c. 7. s'GRAVEZANDE p. 709. seqq.

( $q$ ) COURTIVRON *tr. d'optique* p. 25. 26.

( $r$ ) MUSSCHENBROECK *Instit.* p. 465.

( $s$ ) Iter globi tormentarii est 3220. pedum in minuto secundo ROBINSON *oper. of med.* p. 10.

( $t$ ) PORTERFIELD l. p. 261. & plus omnino MUSSCHENBROECK n. 1072. 1078. nempe ut l. 634 683. ad 1.

( $u$ ) EULER p. 195.

( $x$ ) ROBINSON l. c. p. 8.

( $y$ ) BRADLEY apud MUSSCHENBROECK p. 468.

( $z$ ) *Dioptr.* l. n. 3. WOLF *Wirkung.* l. p. 21. PLUCHE *Hist. du Ciel* T. II. p. 356. EULER *opuscul.* T. I. p. 169. seqq. 178. &c. *Hist. de l'Acad. de Berlin* l. p. 17. seq. le CAT p. 410.

( $a$ ) p. 179.

( $b$ ) CARTESIUS.

( $c$ ) EULER.

( $d$ ) p. 181.

( $e$ ) p. 89. seqq.

( $f$ ) BOERHAAVE *Elem. Chem.* l. p. 208. 209. 210.



particulas ætheris ad vicinas impellat, has in alias, ut in soni generatione fit, five alio modo quocunque natura ad suos fines pervenit, neque enim nostrum fuerit inter NEWTONUM judicare & EULERUM.

Id experientia ostendit,, Occultato sole, five a perfecta ellipsi, five ab obstaculo quocunque subito nato (*g*), subito etiam lucem quasi aboleri, & æque subito restitui, postquam obstaculum remotum est. Id videtur utique ostendere, non torrentem fuisse lucis, quem sol submitteret, quem adeo subito a luna ad terram non æquum fuisset noviter ad oculos advenisse. Sed omnino lucis elementum dudum præsens, nunc capax factum fuisse feriendi, cum sensu necessario, oculi. Pressionem autem aliquam esse, vel percussionem, quam sol in lucem exerceat, vel ex simplici experimento videtur, quo in tenebris, quæ nobis perfectæ videntur, animalia aliqua vident, quibus exiguus lucis, ut videtur, motus sufficit, ut videant, contraria eorum hominum, qui nisi in sole perfecto non vident, alias dicendi.

§. VI. *Est solidissima.*

Lucis radii ab infinito fere spatio adveniunt, minimi sunt caloris (*b*); & tamen obiter in angustius spatium (*i*) conjuncti, pene omnia corpora nobis nota destruunt, si carbonem (*k*) exceperis, quem crusta nigra exusti olei defendit. Imperfecta metalla in apyris quibusdam terris foco exponere suffecerit (*l*).

Iidem reflexi pari cum robore operantur, siquidem ad ARCHIMEDIS (*m*) modum, & post aliquot nuperorum tentamina (*n*), ut MANFREDI SETTALA (*o*), GAERTNERI (*p*), REGNAULT (*p*<sup>\*</sup>),  
L I I 2 aliorum

(*g*) BOERHAAVE ibid.

(*b*) Nam glaciali speculo MARIOTTE pulverem pyrium accendit *Journ. des Savans* 1672. p. 55.

(*i*) Conf. WOLF *Versuche* T. II. n. 135. Focus est  $\frac{f}{3}$ . crassitie lentis, a qua cogitur ROUHAULT *not.* II. c. 27. L I.

(*k*) *Histoire de l'Acad.* 1705. p. 3. 4. TSCHERNHAUSEN *Act. Erud.* 1697. Mens. Sept.

(*l*) *Histoire de l'Acad.* 1709. p. 37.

(*m*) Conf. BILFINGER varia.

(*n*) De viribus parabolæ CARDAN. *subtil.* L. III. p. 127.

(*o*) Speculum habuisse ustorum ad quindecim pedum distantiam urens PASCH *not. antiq.* p. 732.

(*p*) Speculis parabolicis ligneis auro obductis usum fuisse HAASE *de tub. stentor.* p. 33.

(*p*<sup>\*</sup>) Speculi ope cavi, & speculi plani ad sexcentos pedes se posse incendere *orig. ancienne de la physiq. modern.* II. p. 185.



aliorum (  $q$  ), nuper D. de BUFFON meris speculis planis, utcumque in cavam machinam adaptatis (  $r$  ), vetusta. Syracusanorum miracula imitatus est.

Perfecta etiam æqualitas (  $s$  ) anguli reflexionis cum angulo incidentiæ: & immutabilis per quascumque reflexiones (  $t$  ), & refractiones (  $u$  ), natura, in duobus unius radii lateribus diversa (  $x$  ); eandem in materie lucis soliditatem demonstrant.

### §. VII. Reflexionis leges.

Subtilissimum NEWTONI ingenium priscorum placitis hic varia addidit. Radios nempe invenit ante contactum adtrahi ad superficiem (  $y$  ) corporum solidorum, & prius curvari, quam ejusmodi corpus adtigerint, adque vitrum adhærere, quando in vacuum spatium penetrant (  $z$  ). Eamque vim adtractilem maximam esse, infinite pene majorem, quam est vis ponderis (  $z^*$  ).

Neque corpora ea solida tangere, sed a superficie corporum ad quandam distantiam (  $a$  ) *virtuali* vi repellendi præditam, ad angulos reflexionis æquales incidentiæ angulis repelli.

Esseque illam vim, qua reflectuntur, in ratione ejus vis, qua refringuntur (  $b$  ), ut radii magis *refrangibiles* magis adtrahantur, propiusque ad superficiem corporis inflectantur, qualis est violaceus; rigidiores autem, ut rubri, remotius a corpore incurvante circumstantur (  $c$  ).

Quare

- (  $q$  ) De speculis parabolicis, aliisque ad 50. pedes exurentibus *Mém. de l'Acad.* 1726.  
 (  $r$  ) *Mém. de l'Acad.* 1748. p. 305. Ad 200. pedes se lignum incendere, ad 120. plumbum liquefacere *Phil. transf.* n. 489.  
 (  $s$  ) S'GRAVEZANDE n. 3241.  
 (  $t$  ) IDEM L. V. c. 22.  
 (  $u$  ) IDEM L. V. c. 21. HELSHAM p. 300. NEWTON *query* 29.  
 (  $x$  ) NEWTON *optiks* p. 364. & *query* n. 25. 26. ex phænomenis crySTALLI Islandiæ ( aliorumve filicum & crySTALLORUM ) qui lucis radios dividunt in duos, quorum alter solita lege, sua & peculiari alter refringatur.  
 (  $y$  ) *Query* 1. & 4. 29. Conf. S'GRAVEZANDE p. 706. n. 3518. &c. *Phil. transf.* n. 67. *Mém. de l'Acad.* 1710. p. 341.  
 (  $z$  ) *Query* 29.  
 (  $z^*$  ) PORTERFIELD I. p. 321.  
 (  $a$  ) L. II. Part. 3. prop. 8. p. m. 237. seqq.  
 (  $b$  ) L. I. Prop. III. theor. 3. p. m. 53. seqq. & ibid. *exper.* 9. 10. S'GRAVEZANDE n. 3551.  
 (  $c$  ) L. III. fin. p. 312.



Quare videri, omnino communem legem esse reflexionis, quam dimittimus, & adtractionis, ad quam transimus (*d*).

§. VIII. *Refractio* (*d*\*).

Omnis refractio ad vim adtrahentem pertinet, quam nullum non corpus in lucem exercet; pellucida vero corpora fere in ratione suæ densitatis (*e*), ut adamas, qui omnium pellucidorum corporum ponderosissimus sit, etiam habeat vim refringentem maximam (*f*): tantum, ut ea corpora, quæ ad flammam concipiendam aptiora nata (*g*) sunt, etiam lucem majori robore adtrahant. Aquæ pondus est ad spiritum vini ut 1000. ad 927. (*h*), & tamen angulus incidentiæ in aqua a  $41^{\circ}$ ,  $35'$ . in spiritu vini a  $42^{\circ}$ .  $45'$  ad  $30^{\circ}$ . refringitur (*i*). Aquæ ad spiritum terebinthinæ densitas est, ut 8. ad 7. sed vis refringens spiritus terebinthinæ ad aquam uti 11. ad 10. (*k*), & vis particularum terebinthinæ ad vim particularum aquæ, ut 5. ad 3. Maxima refractio est olei lini. Etsi enim aquæ densitas se habet ad olei densitatem ut 1000. ad 939. tamen refractiones se habent ut 3, 442, 060. & 3, 889, 277. (*l*). Olei terebinthinæ refractio major est, quam spiritus vini (*m*). Exceptiones aliquas dari ostendit Cl. s'GRAVEZANDE, uti in alumine & vitriolo Gedanenfi, in quo exemplo densitas est eadem, sed refractio tamen in vitriolo major (*n*). Oleum olivarum pondus habet ad oleum lini :: 6. 11. & tamen refractiones sunt æquales (*o*). Inter inflammabilia corpora ea tamen magis refringunt, quæ densiora sunt (*p*). Ab hac in universum

L 11 3

lege

(*d*) NEWTON *princip. philos. not. prop.* 96. *theor.* 50. COURTIVRON p. 45.

(*d*\*) Remun. in aqua curvum habet ARISTOTELES, plura ALHAZEN & VITELLIO. Instrumentum descripsit HOOKIUS præf. quo vis refringens mensuratur. Habet etiam experimenta hic non repetita RIZZETTUS *Act. Erud. suppl.* T. IX. f. 3.

(*e*) NEWTON L. II. P. 3. *prop.* 10. p. m. 245. Aqua falsa magis refringit quam dulcis. HOOKE l. c.

(*f*) Vis adamantis est ad vim aquæ, ut 4. 949. ad 7845. *Optiks princ.* 9.

(*g*) s'GRAVEZANDE n. 2836. NEWTON *ibid.*

(*h*) DESAGULIERS II. p. 198.

(*i*) HOOKE p. 219.

(*k*) s'GRAVEZANDE n. 2851.

(*l*) HELSHAM p. 292. Ut 1845. ad 1948. NEWTON l. c.

(*m*) HOOKE *præf.*

(*n*) n. 2823.

(*o*) n. 2846.

(*p*) NEWTONI *tab.* p. 247.



lege omnia sequuntur, quæ nos in refractionibus interpretandis tenere est necesse.

Quando nempe radius lucis ex medio rariori, & minus habente adtrahentis materiæ, ad superficiem medii densioris accedit, sequitur ut idem adtrahatur eo fortius, quo magis densius medium superat densitatem medii rarioris. Ab ea adeo adtractione accelerabitur ejus iter, & inflectetur: illud, quod ad celeritatem radio propriam vis continuo increfcens adtractionis accedat (*q*); hoc quod directio radii nunc componatur ex radii ductu priori, & ex adtrahente vi medii: nempe si obliquus advenit. Radius enim ad superficiem medii perpendicularis non refringitur.

Ea vis jam in distantem, sed vicinum tamen radium agit, eumque cogit decedere de suo itinere, magisque accedere ad lineam, quæ ad corpus densius perpendicularis est. In ipso aere radius, qui per inanium ab aere spatium advenit, nunc ad perpendicularum accedit, subtili experimento (*r*), quod nec omnibus ex voto successit (*s*).

Uti vis densioris medii radios obliquos ad perpendicularum in superficiem limitaneam medii densioris ductum cogit; ita ab eadem vi radios retinente, & debilitante celeritatem (*t*), qua radius progreditur, efficitur, ut radius idem obliquus ex densiori medio in rarius ductus de perpendicularo refringatur. Ejus contrarii effectus causæ & leges, sunt eadem.

Quæcunque sit radii obliquitas (*u*), & quicunque angulus incidentiæ, vis refringens semper est eadem, sive a densiori medio radii colligantur, sive dispergantur a rariori. Omnis enim motus obliquus potest in duos separari, uti notissimum est, qui sint ejus quadranguli latera, cujus ipse est diagonalis. Nunc si id fiat in radio utcunque refracto, fient ex obliquo ductu radii, ductus alius perpendicularis ad superficiem medii utriusque: alter ad eam superficiem parallelus. Sed vis adtractionis medii non mutat ductum parallelum, cum contrariæ utrinque vires se æquibrent. Mutat autem distantiam perpendiculararem radii ab ea linea, qua radius ad eam adtrahitur, si medium densius fuerit,

(*q*) S. GRAVEZANDER n. 2779. seqq. HELSHAM p. 292. MUSSCHENBROECK n. 1085.

(*r*) Tuetur eam HAWKSBEER in *exper.* MUSSCHENBROECK *orat. de philos. experim.* p. XXIII. RIZZETTI *Act. Erud. Suppl.* t. III. S. 3.

(*s*) *Negat. Journ. des Sav.* 1699. n. 20.

(*t*) MUSSCHENBROECK n. 1089.

(*u*) Conf. MUSSCHENBROECK n. 1099.



fuerit, aut ab ea recedit, si fuerit rarius. Ea ergo distantia diminuta in densiori medio, aucta in rariori, erit mensura refractionis. Est autem ea perpendicularis. Ipse ergo sinus anguli refractionis, qui in convergente radio diminuitur, is in divergente augetur. Sed is sinus in eodem medio constans est, oritur enim a densitate, aut ab ondæ inflammabili medii, earum vero utraque ab advenientis radii ductu nihil mutatur. Constans ergo est ratio sinus anguli refractionis ad sinum incidentiæ ( $x$ ). Inventor legis est S N E L L I U S, ab eo C A R T E S I U S habuit ( $y$ ).

Denique ex multis experimentis, quæ in tabula NEWTONIANA exstant, ad rem nostram pauca suffecerint, quæ ad oculum nostrum utcumque possis adplicare.

Radii ex aere in aquam transeuntis sinus incidentiæ sunt ad sinum refractionis, ut 9434. ad 7071. ( $z$ ), vel uti 4. ad 3. ( $a$ ). Ex aere in oleum lini, uti 40. ad 27. ( $b$ ). Ex aere in vitrum, uti 114. 76. ( $c$ ), uti 8097. 5240. ( $d$ ), vel uti 17. & 11. ( $e$ ), sive 31. 20. ( $f$ ), sive, brevitatis causa, ut 3. ad 2. ( $g$ ). Ex aqua in vitrum, uti 51. ad 44. ( $h$ ), vel uti 9. ad 8. ( $i$ ).

§. IX. *Refractionis leges in superficiebus curvilineis.*

Radii, qui paulo a longiori distantia adveniunt, habentur pro parallelis ( $k$ ). Ejusmodi radii, quando in superficiem convexam medii densioris incidunt, conlectuntur versus perpendicularum, & in unum punctum conveniunt. Nam cum eo obliquius incidant, majoresque angulos faciant in perpendiculararem producti, quo sunt exteriores, & cum constans sit ratio sinus anguli refractionis ad eum incidentiæ, eo major ergo

( $x$ ) MUSSCHENBROECK.

( $y$ ) HUGENIUS *dioptr.* d. 2. 3. MUSSCHENBROECK n. 1101. 1102.

( $z$ ) NEWTON L. I. P. II. n. 30. 35.

( $a$ ) S'GRAVEZANDE n. 2811. la HIRE *accid.* p. 577.

( $b$ ) NEWTON.

( $c$ ) HUGENIUS.

( $d$ ) NEWTONUS.

( $e$ ) S'GRAVEZANDE n. 2811.

( $f$ ) NEWTON p. 247.

( $g$ ) la HIRE.

( $h$ ) S'GRAVEZANDE n. 2857.

( $i$ ) HUGENIUS

( $k$ ) p. 448. 449.





ergo illa erit, quo radius obliquius in curvam refringentem incidit; nempe cum distantia radii cujusque a perpendicularo crescat vis, qua ad perpendicularum refringitur, eritque demum punctum concursus centrum sphaeræ, in qua omnes infiniti radii in superficiem illapsi conveniunt. Id punctum concursus vocatur *Focus*, qui equidem non mathematicum punctum est. Proximi enim axi radii soli in focum torquentur, nimis remoti in aliis semper punctis axin secant (*l*). Inde prima species aberrationis (*m*). Est autem eo propior centro, quo vis refringens major. In sphaera vitrea (*n*) radii per aerem advenientes concurrunt ad distantiam dimidiæ semidiametri sphaeræ (*o*). In sphaera aquea concurrunt ad distantiam semidiametri ipsius.

Si lentes fuerint, quæ fiant ex duobus segmentis ejusdem sphaeræ sibi adplicatis, vel ex segmentis duarum sphaerarum inæqualium, refractionis quidem etiam focum habebit, sed longius remotum, quia vis refringens minor est, & radiorum incidentium obliquitas minor.

Sumitur tunc, si ejusdem sphaeræ (*q*) fuerint segmenta, distantia foci æqualis semidiametro, a facie posteriori, & sesquidiametro a facie anteriori lentis. Si inæquales sunt sphaeræ (*r*), fit analogia, & distantia foci a lente habetur, dum fit ad duplum alterius semidiametri, ita altera semidiameter ad summam semidiametrorum. Si utrum plane convexum fuerit (*s*), focus erit ad distantiam duorum radiorum.

Hic nunc ille focus est, in quo radii cum colligantur, etiam & lux densatur, ut incendat, quoties paulo major lens fuerit. Vetusta res est, nam ignem vitro accendi THEOPHRASTUS (*t*) auctor est; & ante eum in ludicra re ARISTOPHANES (*u*) vim exurentem vitri rotundi aqua pleni citat, veteresque pila ex crystallo pro cauterio utebantur. CLEMENS ALEXANDRINUS lucem e sole procedentem per vas vitreum aqua plenum scripsit ignescere (*x*).

Id

(*l*) HEKMANN *Serm.* in secund. *Consens.* Acad. habit.

(*m*) PORTERFIELD I p. 378.

(*n*) HUGEN. *prop.* 13. SMITH n. 26. COURTIVRON p. 75.

(*o*) HUGEN. *ib.*

(*q*) MUSSCHENBROECK n. 1146. KEPLER *propos.* 39.

(*r*) MUSSCHENBROECK n. 1144. P. d'ORLEANS p. 61.

(*s*) S'GRAVEZANDE n. 3033.

(*t*) *De igne ad fin.*

(*u*) In comœdia *nubium*.

(*x*) *Stromat.* L. VI. Conf. HOOKE *Exper.* p. 341.



Id unicum oportet addere, ex foco tanquam ( $y$ ) puncto radiante, radios iterum continuo dispergi.

§. X. *Refractio vitrorum concavorum.*

Habet omnia contraria & eadem priorum unice conversa ( $z$ ). Qui in vitrum cavum radii ad perpendicularem paralleli incidunt, ii recedunt a perpendiculo, & divergunt, focumque suum habent in axi, sive perpendiculi in lineam refringentem ducta, prius quam eo radii veniant, progrediunturque ex vitro concavo, tamquam radii, qui ex eo puncto nati essent, cujus eadem sunt a centro distantiae, tantum ut omnia citra superficiem refringentem sint, uti in priori casu ultra eam erant.

Estque focus vitri plano concavi diameter sphaerae, cujus pars est facies concava, & si concavo concavum fuerit, semidiametro superficiei si utraque aequalis est, & si inaequalis, omnino, ut in formula, quam praediximus, tantum quod focus sit citra superficiem ( $a$ ).

§. XI. *Qui radii non subeant superficies refringentes.*

Nullum medium pellucens admittit radios ( $b$ ), qui ad angulum majorem illabuntur. Si vis refringens major est, radii etiam sub minori angulo advenientes reflectuntur, quo diversitas virium refringentium major fuerit. Itaque radii ex aere in vitrum, vel ex vitro in aerem ( $c$ ) incidentes magis reflectuntur ( $d$ ), quam ii qui ex aere in aquam veniunt ( $e$ ).

§. XII.

( $y$ ) S'GRAVEZANDE n. 3014.

( $z$ ) IDEM n. 3020. seqq. ROBINSON post HELSHAM. MARTIN *in princ.*

( $a$ ) p. 456. SMITH n. 64.

( $b$ ) NEWTON *opt.* L. II. p. 3. *prop.* 1.

( $c$ ) Nam haec reflexio fere major est COURTIVRON p. 3. &c.

( $d$ ) Ad 40. gradus minuta 10. NEWTON. l. c. Not. 8. ad ROUHAULT p. m. 187. SMITH p. 4.

( $e$ ) Reflectuntur, qui ad angulum  $48^{\circ} : 30'$  adveniunt SMITH *ibid.*



§. XII. *Radiatorum Lucis divisio.*

Antiquitas lucem pro homogeneo elemento habuit, cujus quæque imaginabilis particula aliis omnibus similis esset. CARTESIUS (*f*) equidem, indeque GRIMALDUS (*g*) aliquas de divisione radiorum conjecturas tradiderunt; *Isaaco* tamen NEWTON (*h*) reservatum fuerat, ut ostenderet, lucis radium quem libet, etiam simplicissimum, ex septem aliis diversarum proprietatum radiis componi.

Ergo primum in camera obscurissima (*i*), per foramen exiguum, radium lucis (*k*) admisit, quem prismaticè excepit, cujus axis ad radios incidentes perpendicularis esset. Id per prisma radius transit, & in opposito pariete imaginem solis pingit, sed oblongam, parallelogrammam, & superne semicirculo terminatam, & inferne.

Deinde ne ea imago (*l*) concolor foret, radium per angustissimam rimam admisit, per lentem vitream purissimam, demum per prisma pariter nitidissimum, perfecte rectilineum: ita spectrum longius & angustius in pariete camerae depictum est, suis coloratis circulis distinctum.

Colores sunt violaceus, indicus, cæruleus, viridis, flavus, aurantius, cinnabarinus, non cum eorum ipsorum colorum gradibus innumerabilibus (*m*), sed nitidi, purique, si cura adhibita fuerit (*n*).

Hi radii immutabilem (*o*) naturam habent, neque ulla, etiam maxime repetita, refractione, aut reflexione (*p*), aut in alia elementa resolvuntur (*q*), aut colorem mutant (*r*), quod quidem experimentis numerosis confirmatum est. Omnibus etiam radiis simplicibus duo diversæ indolis latera esse videtur.

Deinde

(*f*) *De meteor.* c. 8.

(*g*) *Ars lucis & umbr.*

(*h*) Ab anno 1666.

(*i*) *Optiks* L. I. *prop.* 2. *theor.* 2. f. 21. seqq. f. 13.

(*k*) Etiam scintillæ lignæ, sive stellæ fixæ p. 234.

(*l*) *Prop.* IV. *probl.* I. p. 54. *exp.* II. f. 24. S'GRAVEZANDE n. 3507.

(*m*) BUFFON *Mém. de l'Acad.* 1743. p. 147. *Journ. de Trévoux* 1739. p. 2578.

(*n*) MUSSCHENBROECK n. 1155.

(*o*) BUFFON *Mém. de* 1743. p. 148.

(*p*) DESAGULIERS *Phil. transf.* n. 348. HELSHAM p. 300. &c.

(*q*) Viride non componitur ex cæruleo & flavo p. 356.

(*r*) RIZZETTUS crediderat, colores fieri radiis mutatis, dum per varia media transeunt.



Deinde non sunt inter se similes, sed diverso gradu se ab iisdem mediis refringi patiuntur. Eorum qui rubri ( *s* ), ii, ab iisdem causis, omnium minime de via se detrudi patiuntur ( *t* ), aut refringi ( *u* ), atque omni experimento validiores ( *x* ), vel oculorum sensu iudice, & taurorum, aut hominum maniacorum ( *y* ), qui ab eo colore iras concipiunt. Hinc melior est oculus, cui objectum rubicundius videtur ( *z* ).

Sinus refractionis radii rubri ( *a* ) ex aere in vitrum transeuntis, est ad finem incidentiæ, uti 50. ad 77. ad usque.  $77\frac{1}{3}$ . Aurantiorum radiorum aliquanto major est refractionis, sinusque iidem, ut 50. ad  $77\frac{1}{8}$ , & ad usque  $77\frac{1}{5}$ .

Sinus radiorum viridum ut 50. ad  $77\frac{1}{5}$ . ad usque  $77\frac{1}{2}$ .

Sinus radiorum cæruleorum uti 50. ad  $77\frac{1}{2}$ , & ad usque  $77\frac{2}{3}$ .

Sinus radiorum indicorum ut 50. ad  $77\frac{2}{3}$ . ( *b* ), usque ad  $77\frac{7}{8}$ .

Sinus radiorum violaceorum ut 50. ad  $77\frac{7}{8}$ , usque ad 78. qui iidem radii omnium debilissimi, & maxime flexiles sunt ( *c* ), & maxime refringuntur.

Ab iis diversis gradibus, quibus radii refringuntur, fit difficillima fororum puritas ( *d* ), & aberratio difficilis evitatu ( *d*\* ).

Hi cæterum numeri proportionales radiorum exprimentes non adeo sunt simplices, ut ex facilitate ineundi proportionum calculi anima delectationem capiat ( *e* ).

Omnes hi radii continentur in lucido ( *f* ) radio, nam ex eo fisso nascuntur, & conjuncti jubar lucis purum restitunt, sive spectrum coloratum

M m m 2

raturum

( *s* ) NEWTON p. 112. s'GRAVEZANDE n. 350r.

( *t* ) Le CAT p. 366.

( *u* ) HELSHAM p. 312. MARTIN opt. p. 255. MARIOTTE Prop. I. DESAGULIERS. MUSSCHENBROECK n. 1158.

( *x* ) Le CAT p. 353. HARTSOEKER p. 33.

( *y* ) FISCHER de miro sens. augm.

( *z* ) La HIRE accid. de la vue p. 543.

( *a* ) Omnia ista habet NEWTONUS p. 112. s'GRAVEZANDE L. V. c. 20.

( *b* ) Valde debile est lumen cæruleum STURM

( *c* ) Conf. EULER opusc. n. 91. Mém. de l'Acad. des sciences 1743. p. 150. HARTSOEKER p. 34 HELSHAM p. 313. MARTIN l. c. MARIOTTE. DESAGULIERS. MUSSCHENBROECK. Hinc cærulei colores in vacuo evanescunt, qui ex spiritu salis ammoniaci & cupro nascebantur BOYLE phys. méch. exp. p. 159.

( *d* ) PORTERFIELD l. p. 378.

( *d*\* ) Nuper superata a Cl. DOLLOND.

( *e* ) NICOLAI von der Schönheit p. 40.

( *f* ) L. 8. prop. II. DESAGULIERS.



ratum ope lentis (*g*) convexæ vitreæ in focum collegeris, aut eorum colorum plerosque (*h*): five sola veloci rotatione, eos in unum collegeris (*i*).

Exque eodem foco dispersi radii denuo colores gignunt (*k*).

Hinc intolerabilis lux hydrophobis (*k*\*). Hiuc validissimus colorum albus, quem in tenebris omnes, & quem ultimum adgnoscent qui cæcutiunt (*l*). Hinc remota corpora, ex nigro & albo mista, tota alba adparent (*m*). Hinc a dealbatis parietibus cæcitatem, certe acceleratam vidi (*n*), & a nive oculi debilitantur (*o*). Sed etiam tinctorii colores (*p*), qui neque puritatem lucis, neque nitorem habent, tamen commisti alborem faciunt eminus spectati.

Hæc omnia, post aliquas dubitationes, in gallia fere (*p*\*) ex imperfectioribus vitris (*q*) natas, nunc post F. HAWKS BEE, J. Theophilus DESAGULIERS, G. I. s'GRAVEZANDE, Petri v. MUSSCHENBROECK, ZANOTTI & ALGAROTTI (*r*), quod ad simplicem eventum experimenti, ab omnibus sunt recepta, & in Gallia (*s*) confirmata a doctissimo Cardinale de POLIGNAC, & a P. de BUFFON.

Deinde etsi nuper VIR ILLUST. Leonhardus EULER docuit, colores differre vibrationum velocitate (*t*), quæ olim GREWII (*u*), & MARIOTTI (*x*) fuit cogitatio, rubrosque radios celerius in dato tempore

(*g*) NEWTON. DESAGULIERS. MARIOTTE p. 218. s'GRAVEZANDE n. 3564. 3568. WOLF. *Versuche* T. II. n. 156.

(*h*) s'GRAVEZANDE n. 3572.

(*i*) Pectinis ope NEWTON p. 126.

(*k*) WOLF l. c.

(*k*\*) Journ. de medec. T. VIII. n. 3.

(*l*) BOYLE *final causes* obs. XI. Cæci vident lucem & album CHESLDEN p. 300.

(*m*) HARTSOEKER *physique* p. 127.

(*n*) Ab ea causa pene cæcum factum WHISTONUM, viridibus tapetibus sanavit BOYLEUS.

(*o*) BOYLE *color.* p. 100. 101.

(*p*) NEWTON.

(*p*\*) Radium violaceum in rubrum & flavum findi dixerat MARIOTTE *des couleurs*, neque constantem manere radiorum secundo refractorum colorem: Inde P. CASTELL. colores componi ex simplicibus renovavit. Neque le CAT, neque NOLLET, neque du FAY potuerunt colores septem separare p. 359. 360. Add. *Journal de Trévoux* l. c.

(*q*) s'GRAVEZANDE n. 3534.

(*r*) *Comm. Bonon.* T. I. p. 199.

(*s*) DESLANDES *Mém* T. I. p. 218. *Mém. de 1743.* p. 148.

(*t*) *Mém de Berlin* T. X.

(*u*) *Cosmolog* p. 38.

(*x*) *Mém. de 1699.* p. 26. *Opusc.* n. 84.



tempore vibrare ( $\gamma$ ), ut cum sono acuto convenient ( $z$ ), violaceos infrequentius ( $a$ ); & radios simplices esse, quorum pulsus spatiis æqualibus inter se dissident ( $b$ ), compositos contra; & hæc tamen ad causam potius intimam discriminis colorum pertinent, neque evertunt quidquam in experimentis.

A frictione oculi olim, & nuper, argumentum pro ea sententia sumtum est, quæ a vibratione diversitatem colorum repetit. Fricto enim oculo, & excitatis vibrationibus succedit sibi lux, ruber color, flavus, viridis, cæruleus ( $d$ ). Sic etiam a valido solis fulgore imago prima lucida est, quæ inde in rubram, flavam, cæruleam, nigram degenerat ( $e$ ).

§. XIII. *Causa diversitatis colorum.*

Per experimenta in laminis aeris tenuibus ( $f$ ), & bullis saponaceis capta ostendit NEWTONUS, quod alioquin ex ipsa rerum natura sequebatur, laminas eas diversos radios potissimum reflectere, uti crassiores sint, aut vicissim densiores ( $g$ ), & a fortioribus radiis solis penetrabiles, aut tenuiores eadem laminæ, a quibus ne debiles quidem radii reflectuntur: & iis etiam tenuiores esse laminas, a quibus lumen nullum omnino reflectitur, nempe quæ corpora nigra constituunt ( $h$ ), aut certe profunde violacea, exemplo atramenti, panni nigri ( $i$ ), nam ea nigra vocamus, etsi saturate cærulea sunt.

Ergo crassissimas laminas ( $i^*$ ) esse, quæ lucem, albumque; quæ rubros ( $i^{**}$ ) radios reflectunt, proximos duritate luci integræ, & denique tenuissimas, quæ solos debiliores violaceos ( $k$ ) radios reflectere aptæ sunt ( $l$ ).

M m m 3

Albas

( $\gamma$ ) 10000es in minuto secundo *Hist. de l'Acad. de Berlin*. T. I. p. 20. *Opusc.* n. 84. Fortius vibrare: NEWTON *Quer.* 13.

( $z$ ) EULER n. 84. Olim ita scripserat GREWIUS.

( $a$ ) Logarithmum velocitatis in vibrationibus radii rubri esse ad logarithmum velocitatis radii violacei uti 133. ad 137. Duplo frequentius vibrare HARTLEY p. 192.

( $b$ ) n. 67.

( $d$ ) *Psycholog.* p. 71. MARIOTTE *Mém. de 1699.* l. c.

( $e$ ) WOLE *Wirkungen* n. 128.

( $f$ ) NEWTON L. II. P. I. & P. III. *Prop.* 1. p. 226. s'GRAVEZANDE L. V. c. 25. MUSSCHENBROECK n. 1173. seqq.

( $g$ ) HRLSHAM p. 302. 303.

( $h$ ) s'GRAVEZANDE n. 3640. NEWTON p. 235.

( $i$ ) MUSSCHENBROECK n. 1172.

( $i^*$ ) Conf. NEWTON p. 233.

( $i^{**}$ ) Maximam crassitiem [albore omisso.] s'GRAVEZANDE n. 3671.

( $k$ ) IDEM n. 3672.

( $l$ ) Tabulas vide crassitiei diversæ NEWTON p. 239.



Albas adeo chartas plurimam lucem inter omnes reflectere, deinde rubras, minimam purpureas & virides (*m*).

Hinc alba corpora a sole parum incalescunt, quod lucem reflectant, plurimum nigra, in quæ radii omnes absorbeantur (*n*). Prima in foco lentis TSCHIRNHAUSIANÆ nigra ardescunt, alba ultima (*o*).

Certum vero colorem, a quo nomen fortiantur, corpora habere (*p*) putat NEWTONUS, quando particulas habent ita factas, ut radios ejus coloris reflectant plurimos; dum alii radii, aliterque colorati, aut transmittuntur, aut internis reflexionibus suffocantur. Esse vero in omni corpore particulas aliquas, quæ omnes colores reflectant, sed abundare eas, quæ suum colorem congenerem potissimum reflectant.

Radium autem solitarium, si in corpus sibi concolor incidit, id reddere colore illustriori & vivido; debiliori vero colore tingere, si in corpus alterius coloris inciderit. Hinc si lux jam colorata in corpus incidit, fucantur inde colores, & ab admisto cæruleo flammæ spiritus vini hospites pallent. A candelæ flavescente lumine omnia aliter (*q*) tinguntur, cæruleusque inprimis color cum viridi confunditur.

Compositos vero & intermediarios colores nasci addit vir summus, quando in eodem corpore, & rubrum, & colorem reflexuræ particulæ abundant, & cæruleum; aut præterea, quæ nullam lucem reflectant, & nigrorem admisceant. Ostenditur autem facile, vel ex septem (*r*) NEWTONIANIS

NIANIS

(*m*) BOYLE *de color.* p. 100. S'GRAVEZANDE n. 3663. seqq.

(*n*) NEWTON *Query* 7. BOYLE p. 127. S'GRAVEZANDE n. 3663.

(*o*) *Histoir. de l'Acad.* 1699 p. 90.

(*p*) NEWTON L. I P 2. *Prop.* 10. p. 156. 161. MUSSCHENBROECK n. 1181.

(*q*) PORTERFIELD T. I. p. 127. la HIRE *accidens de la vue* p. 534.

(*r*)  $\frac{n}{1} \frac{n}{2} \frac{n}{3} \frac{n}{4} \frac{n}{5} \frac{n}{6}$

$\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{4}{4} \frac{5}{5} \frac{6}{6} \frac{7}{7}$   
 $\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{4}{4} \frac{5}{5} \frac{6}{6} \frac{7}{7}$

$\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{4}{4} \frac{5}{5} \frac{6}{6}$   
 $\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{4}{4} \frac{5}{5} \frac{6}{6}$

$\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{4}{4} \frac{5}{5}$   
 $\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{4}{4} \frac{5}{5}$

$\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{4}{4}$   
 $\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{4}{4}$

$\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3}$   
 $\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3}$

$\frac{1}{1} \frac{2}{2}$   
 $\frac{1}{1} \frac{2}{2}$

$\frac{1}{1}$

In hoc exemplo *n* est 7. fit adeo ex hac formula septennio unus, sexenniones septem, quinterniones 21. quaterniones 35. terniones 35. biniones 21. uniones 7. qui conjuncti efficiunt 127. *Comm.* ad BOERHAAV. T. IV. p. 218. 219.



NIANIS coloribus, absque umbra & albore jam 127. colores generari, & multo plures, si cogites non sola æquali pro portione combinari posse, sed rubri tres partes esse, flavi unum, & ita aliter & aliter temperata portione in numerabilem, & nulla formula definiendum numerum colorum compositorum posse oriri (s). Et omnino ex rubro, flavo & cæruleo omnes componi possunt (t) etiam tinctorum experimento.

Ob eam faciecularum minimarum, certos colores reflectentium, diversitatem posse fieri, ut nonnulli homines cæci colores diversos tactu distinguant (u).

Reflectentia corpora esse minimis poris prædita, & superficie valde repelente, valde polita (x).

Demum opaca esse corpora, quorum pori interni replentur materie diversæ densitatis, ut & reflexiones & refractiones (y) multiplicentur, quæ lumen suffocant, cum neque transire possit, neque ad oculum redire (z), sed pene omne in corpore intercipiatur, de quo dicimus, esse opacum.

E contrario pellucere ea corpora, quorum pori replentur materie, cujus densitas & vis refringens non multum a densitate, aut a vi refringente particularum ipsius corporis differunt. Ita neque refractiones fiunt ullæ, neque reflexiones. Utræque enim fiunt potissimum, quando duo corpora diversæ densitatis (a) se contingunt. Ita opaca corpora pellucida fiunt, dum eorum pori materie replentur, quæ æqualem cum ipso corpore in lucem actionem exercent (b). Ita charta, cujus poros aer replet, opaca est, & pellucida fit, quando pori aqua replentur (c), & contra liquor quicunque perfecte pellucidus opacus fit, quando cum aere agitur, ut ejus pori aere repleantur. Aqua pellucet, spuma opaca est (d).

Hic

(s) Aquæ marinæ color *Seladon* fit ex cærulei & viridis partibus æqualibus. *Purpura cramoisi* ex una parte cærulei, & 4. partibus rubri. *Violet cramoisi* ex 3. partibus rubri, duabus cærulei CASTELL.

(t) S'GRAVEZANDE n. 3574.

(u) L. XII. p. 94.

(x) MUSSCHENBROECK *Ess.* p. 604. *Instit.* n. 1279.

(y) Olim SANCTORIUS in *artem medic. Gal.*

(z) S'GRAVEZANDE n. 3448. 3449.

(a) NEWTON L. II. P. 3. *prop.* 1. p. 220.

(b) IDEM p. 224. S'GRAVEZANDE n. 3449. MUSSCHENBROECK *Ess.* p. 604. *Instit.* n. 1280.

(c) MUSSCHENBROECK. S'GRAVEZANDE n. 3450. &c.

(d) S'GRAVEZANDE. NEWTON.



Hic cæterum, ne quid dissimulemus, imprimis a NEWTONO Cl. EULERUS dissidet. Colorem nempe tinctorium corporis cujusque negat a refractione (*e*) nasci, sed oriri mavult, quando particulae corporis a luce percussae intra datum tempus eundem numerum vibrationum (*f*) reddunt, quem radius quisque proprium habet; purum equidem nullum esse, sed eum dominari, nomenque corpori imponere, cujus particulae dominantur. Ad album colorem omnis generis tensiones in corpore aliquo reperiri (*g*): opaca demum corpora debere a reflectentibus distingui (*h*). Hæc objecta alias opaca se ipsa repræsentare, quorum particulae a radiis lucis incidentibus in motum vibratorium aguntur, qui in medio pellucido circumfuso pulsus & radios visivos excitat (*i*); pellucida esse, quæ pulsus non reflectunt, sed ad interiora transmittunt (*k*). Et ea quidem partim cum prioribus conveniunt, partim & a nobis in universum, & hoc imprimis loco dijudicari nequeunt.

## S E C T I O I V.

## V I S I O.

## §. I. Cornea.

**R**Adii lucis aut recti ex corpore radiante nati, aut reflexi, ita incidunt in corneam membranam, ut conum faciant peracutum, cujus vertex est in radiante puncto, basis in corneæ superficie. Idem, si paulo remotius advenerint, poterunt pro parallelis haberi (*l*).

Qui radii ex aere adveniunt, eorum qui obliquiores sunt, & ad magnos angulos in corneam incidunt, ii ab ea membrana reflectuntur, neque oculum subeunt. Angulus, sub quo qui adveniunt, in oculum recipiuntur,

(*e*) Opusc. n. 108.

(*f*) n. 114.

(*g*) n. 120.

(*h*) n. 107.

(*i*) n. 111.

(*k*) n. 100.

(*l*) p. 448. 449.



ciuntur, habet inter 40. & 48. gradus ( $m$ ). Cornea enim membrana utique refringentem vim possidet ( $m^*$ ), majorem quam aqua ( $n$ ), aut humor aqueus, cum qua alii comparaverunt ( $o$ ). Suspicio etiam majori ratione corneæ vim refringentem superare: multo enim ponderosior est, solidisque fit partibus, ut a septem demum atmosphæris frangi potuerit.

Deinde convexitatem habet in homine quidem majorem, quam est anterior convexitas lentis crystallinæ, minorem, quam convexitas posterior. Est enim sphaeræ segmentum, cujus diameter est septem linearum ( $p$ ). Lentis autem convexitas anterior est ejusmodi, ut pertineat ad sphaeram, cujus radius sit 3''' lin. ( $q$ ) & tertiæ partis: adeoque planior. Convexitas vero posterior ut sphaeræ, cujus radius sit 2. lin. cum dimidia ( $q^*$ ) hæc convexior. Cum ergo corneæ convexitas quam illa major sit, & quam ista minor ( $r$ ), & cum soliditate ad minimum lentem adæquet, non male ejus vis refringens cum lente comparabitur ( $s$ ), neque negligi debet in theoria visus.

Nunc lentis crystallinæ vires majores sunt, quam aquæ, minores, quam vitri: erunt ergo & corneæ vires inter eos limites. Adeoque radios recipiet aliquanto majores, quam 40. grad. & minores, quam graduum 48. ( $u$ ). Reliqui reflexi facient *pupulam*, quæ non a lente crystallina generatur, sed a cornea utique ( $x$ ).

Per eadem principia radii ab aere advenientes confringentur in cornea convexa, magis quam ab aqua, & quam a vitro minus; & erit focus longius

( $m$ ) Le CLERC *point de vue* p. 28. 30.

( $m^*$ ) DUVERNEY *postb.* I. p. 161.

( $n$ ) Tantillo majorem quam aquæ, ut radii ex aere advenientis anguli incidentiæ & reflectionis sint uti 81. & 60. JURIN. *dist. vis.* p. 141.

( $o$ ) SCHEINER p. 69. PLEMP. L. III. c. 13.

( $p$ ) Radius est 3''' 3294. JURIN p. 134. ROBINSON apud HELSHAM p. 302.

( $q$ ) 3''' 3081. JURIN. ROBINSON.

( $q^*$ ) 2''' 5056. JURIN. p. 134.

( $r$ ) MOLINETTI p. 143.

( $s$ ) WINTRINGHAM p. 255. PORTERFIELD I. p. 123.

( $t$ ) Passim negligitur, & de industria negatur *Elem. de physiol.* p. 529. Receptit SCHEINER *ocul.* p. 62. CARTESIUS *hom.* p. 75. 76. MOLINETTUS Ed. I. p. 13. Ed. II. p. 143. COLLINS p. 900. VERHEYEN L. II. p. 224. CHESELDEN p. 298. THOMSON *of senses* p. 208. PORTERFIELD I. p. 356. BAYLE' p. 469. 470. HOOKE *postb.* p. 125. NEWTON p. 13. Et monentur ne negligent optici *Comm. Lit. Nor.* 1737. *hebd.* 3.

( $u$ ) Ad 47°. 48°. exclusionem refert NOLLET L. V. p. 312. de lentibus.

( $x$ ) SCHEINER p. 195. 196. PLEMP. L. IV. *probl.* 35. Hinc morientium pupillæ imaginem non reddunt, quia non nitent REINES, *var.* p. 294.



longius ab ea convexitate remotus, quam dimidius radius sphaerae ( $y$ ), cujus pars est, & propius quam quarta pars ejus radii, liceatque sumi  $\frac{3}{8}$ . Est autem radius corneae  $3\frac{1}{2}$ . focus adeo ad  $2\frac{1}{8}$ . lineae. Sed lentis a cornea distantia est lineae ( $z$ ) cum  $\frac{5}{12}$ . focus ergo corneae ultra convexitatem lentis cadit, & radii ex cornea in lentem convergendo concurrunt ( $a$ ).

Etiam id commodi habet corneae vis refractilis, ut plures radii ( $a^*$ ) in pupillam conveniant, pauciores in iridem illabantur.

Avibus diximus etiam convexiorem ( $b$ ) corneam esse, cum planiori sclerotica: piscibus perplana est, cum magis sphaerica lente ( $c$ ). Non improbabile ergo erit, lentis crystallinae, & corneae, convexitates se compensare: ejus nobis P. de la Hire auctor est ( $d$ ). Corneae etiam tunicae convexitas facit ad augendam copiam lucis in oculum admissae; a superficie enim ampliori recipitur ( $e$ ), quam foret planioris iridis.

## §. II. Lentis crystallinae refractione.

Qui per corneam membranam penetraverunt radii, eorum aliqui ex maxime lateralibus & obliquis inter uveam & lentis partem extimam illapsi, in pigmento nigro suffocabuntur, quod ea sede in omnibus est animalibus: tum pone uveam, tum pone ciliare corpus.

Ita fit, ut ii soli radii ad lentem crystallinam veniant, quorum anguli cum cornea 28. gradus non superant ( $f$ ). Parciores ergo aliquanto, sed fortiores, & perpendiculari lineae proximi, in lentem crystallinam adveniunt. Quando accuratissime videre volumus, pupilla fit angustior ( $g$ ), ita denuo obliquiores radii excluduntur.

Per

( $y$ ) p. 456.

( $z$ ) Ad r. 0358. ROBINSON l. c.

( $a$ ) Focum facit in lentis superficie posteriori le CLERC *Système de la vision* p. 117. *point de vue* p. 85.

( $a^*$ ) DUVERNEY l. c.

( $b$ ) PORTERFIELD *Edimb. eff.* T. IV. p. 135. *of the eyes* II. p. 260.

( $c$ ) p. 401.

( $d$ ) *Accid. de la vue* p. 532. PORTERFIELD l. c. T. II. p. 261. 262.

( $e$ ) In ratione quadrati radii pupillae ad quadratum radium corneae PLEMP p. 100. *Comm.* T. IV. p. 235.

( $f$ ) Perpendiculares solos le CLERC *nouv. systèm. de la vue* art. 18.

( $g$ ) p. 375.



Per aqueum quidem humorem transeuntes radii parum mutantur, cum ejus refringens vis a vi corneæ non ita multum distet, & paulo minor sit, neque adeo ad eam addat quidquam.

Inveniunt in lente crystallina materiem refringentem, aqua fortio- rem, debiliorem vitro (*b*), cujus per optima experimenta vis refringens sit ejusmodi, ut fiat sinus incidentiæ ad sinum refractionis :: 13. 12. cir- citer, cum ex aqua radii adveniant.

Ejus materiei duo inæqualia segmenta circuli sibi adaptantur, cujus an- terioris quidem diameter sit  $\frac{1}{2}$  lin. posterioris 5. linearum (*i*).

Convergent ergo radii, qui in lentem inciderunt, & focus eorum esset ad tres lineas, si lens oculi nostri vitrea foret, & radii paralleli ex aere advenirent (*k*).

Verum distantia partis postremæ lentis a retina est, in homine = 6". 2617. (*l*), Et tamen in retinam focus incidit: tanto ergo debilior oculi, quam vitri, vis est refringens, quanto remotior a lente focus in oculo cadit, quam a lente vitrea natus caderet. Erit autem etiam alio ex phænomeno debilior vis lentis, neque enim verus in retinam focus unci puncti incidit, sed qui aliquam latitudinem habeat, cum dextri & fini- stri fines objecti visibilis distinguantur (*m*). Ita etiam nimium robur lu- cis minuitur.

Vitreum corpus, cujus refractionis parum, quam aqua major sit (*n*), quam lentis aliquanto minor, nihil valde (*o*) in motu radiorum mutat, qui per lentem adveniunt. Tunc vero utique vires suas expedit, quando ea deleta locum ejus occupat: ita enim & ipsum radios in retina co- git convenire.

Facile intelligitur, quo magis globosa lens fuerit, eo refringere po- tentius, & focum esse propiorem, & etiam obliquos aque latere adve-

N n n 2 nientes

(*b*) p. 401. 402.

(*i*) p. 400.

(*k*) Per priora p. 456. erit foci a lente distantia  $\frac{300}{25} + 4 = 6$ .

(*l*) HELSHAM l. c.

(*m*) Le CLERC *sistem.* art. 9. qui focum lentis valde latum facit, ut producti ejus fines angulum 25°. ad 30°. comprehendant p. 116.

(*n*) p. 395.

(*o*) Credit Cl. FLEMYNG facere, ut penicillus radiorum citius & propius convergat *Physiol.* p. 328. Refringere utique SENACUS *Ess. de phys.* ed. 1735. p. 701. nempe si ab aere advenerit.



nientes radios posse in focum, aut certe in minorem lineolam confringi. Hinc piscibus, in minus illuminato elemento viventibus, quorum radii ex aqua advenientes, non ex aere, in oculo minus refringuntur, quam aliis in animalibus, lens pene (*p*) sphaerica, & durus in ea nucleus (*q*). Hinc opossum, cui lens pene sphaerica fit, alto sole, quando plurima lux est, minus bene videt (*r*).

Nescio an non primus KEPLERUS (*s*) lentis crystallinae naturam refringentem detexerit; exque eo sumserit FELIX PLATER (*t*). Inde SCHEINERUS (*u*): & ÆMILIUS PARISANUS (*x*) pro renova eandem ejus lentis naturam defendit. Erant tamen jam VESALII tempore, qui in retina organum visus ponebant (*y*): & demonstrat ipse, se non credere in lente esse crystallina, obscure tamen (*z*). Veteres enim eam lentem habebant pro organo visus (*a*): quod facile refutatur, cum deleta per cataractæ extractionem lente, visus superstes sit (*b*), neque valde deterior (*c*). Tantum cum vitrei corporis, quam crystallini, minus fortis sit refractio, & cum vitreum corpus nunc convexum (*d*) lentis locum teneat, vires convergentes oculi debiliores oportet adjuvare lentis vitreae convexae (*e*) usu. Nam animalibus, quibus humores emissi fuerunt, & quibus lens crystallina non reparatur, visus tenebrosus, si ullus redit, etiam regenerato humore aqueo (*f*).

Nullam vero refractionem esse in oculo (*g*) de radio unico verum est, & de reliquis falsum esse tum per vires refringentes (*h*) oculi demonstratas ostendatur, tum per experimentum, quod continuo dicemus.

Vitrei

(*p*) SMITH *remarks* p. II. PORTERFIELD II. p. 263. Conf. DUVERNEY *posth.* I. p. 154.

(*q*) PORTERFIELD T. II. p. 265. 266.

(*r*) *Phil. transact.* n. 290.

(*s*) *Dioptric. Prop.* 60.

(*t*) p. 187.

(*u*) Toto libro.

(*x*) *De visione* p. 231.

(*y*) p. 517.

(*z*) p. 806.

(*a*) ORIBAS p. 32. CELSUS L. VII. c. 7. n. 13. adhuc MICHAELIUS p. 70.

(*b*) DE LA SONE & ARCELIN *Paris.* 1743. &c.

(*c*) O'HALLORAN p. 43.

(*d*) MORGAGNUS *Epist.* XVIII. n. 23.

(*e*) THOMIN *de l'usage des lunettes* p. 91. REGHELLINI p. XXXVI. BOYLE *post final* *conf. obs.* 1. PEMBERTON *de fac. ocul.* &c. n. 3. Aequè bene videre amissa lente RIBE *omn.* *ögenen.* Sed ne vitris quidem seniores adjuvari THOMIN l. c.

(*f*) POZZI *comm. pist.* p. 84.

(*g*) RIVINUS *de visu.*

(*h*) p. 461. &c.



Vitrei corporis princeps utilitas videtur retinam expansam sustinere, in legitima amplitudine oculum sustentare, cum mobilitate lentem crystallinam fulcire: ejus, quando perit, locum hactenus replere.

§. III. *Imago in retina.*

Omnibus computatis corpus quod videmus, tamquam linea considerari potest, a qua undique producti radii, conjunctis in unum corneæ tunicae, & lentis crystallinae refractionibus, convergentes, & paulo post in focum coituri, per vitreum corpus in retinam incidunt (*i*), inque ea tunica imaginem corporis conspecti depingunt.

Ita se rem habere omnino experimento constat, non quidem valde facili, tamen a multis instituto (*k*). Debet locus perfecte obscurus esse, & lux omnis in solam corneam tunicam illabi. Deinde de sclerotica portionem aliquam, & de choroide demere oportet, ejusque locum charta oleo madida, aut membrana de ovi testa interiori sumpta replere, ut ne vitreum corpus elabatur. Ita fiet, ut in parte retinae, de qua involucra opaca demsimus, corporis corneæ objecti imago, ut flamma candelæ, depingatur.

Ejusmodi etiam imago in oculo artificiali (*l*) depingitur, cujus humores vitro & aqua imitatur.

Denique in noctuæ oculo (*m*), etiam integro, inspiciendo objecta corpora in retina depicta adparent, quia sclerotica posterius pellucet. Ipse experimentum repetii. De quodam le M A I R E legitur, eum certi microscopii ope imaginem & in sui oculi, & in alieni retina vidisse de-

N n n 3

dictam

(*i*) KEPLER *prop.* LX. PLATER p. 187. SCHEINER, CARTESIUS. PLEMP. L III. c. 12. &c SANCTORIUS in I. *Fen. Avic.* p. 755 761.

(*k*) BERIGARDUS apud REGNAULT *orig. ant.* T. I. p. 173. KEPLER *Prop.* L. X. SCHEINER p. 11. CARTESIUS *Dioptric* p. 4 PLEMP. L II. p. 81. BOYLE *de util. phil. exper.* MOLINETTI p. 111. BRIGGS c. 8. BOHN p. 372. HOOKE apud BIRCH T. III. p. 500. in *fele* & in *postb.* in *hadulo* p. 127. STURM *ocul. Geomet.* p. 12. & de *compar. oculi cum cam obscur.* p. 9. *presb. & myop.* p. 23. *colleg. exper.* p. 9. in *bove* WOLF *Versuche* T. II. POLINIÈRE *exp. de phys.* p. 505. PORIERFIEDL. p. 352. 358. 374. & *ess. of a societ. at Emb.* T. IV. p. 126. KRUGER *physiol.* p. 650. in *catulo* NOLLET *lec. de phys.* T. V. p. 101. in *vitulo* le CAT p. 408.

(*l*) SCHEINER HOOKE *postb.* p. 17. le CAT p. 452. CAMPER *de visu* p. 2. HAMBURGER p. 166. VERDUC *usag.* l. p. 38. Conf. de ejusmodi oculo J. VERLE tractatum, & ROSSIUM. p. 21.

(*m*) MALPIGH. *postb.* p. 151. BRIGGS p. 134.



picam (*u*). Veram ergo *cameram obscuram* (*o*) esse in oculo, in cujus albo pariete corporum extra cameram positorum per lentem vitream trajecta imago depingatur, dudum quidem innotuit.

§. I V. *Picturae locus.*

Est ea imago ad latus exterius ingredientis nervi optici, qua axis oculi retinam fecat, & qua radii maxime vicini perpendiculari cum ipso perpendiculari radio conveniunt, & validissimi sunt. Creditur etiam ea sede retinam sensiliorem (*p*) esse. Certe fibrarum ea pars percellitur, quæ propius a cerebro distat (*q*), & experimentis demonstratur, unicuique in retina punctum vere sensile esse, in quo bono cum effectu objecta pingantur (*r*).

Ipse vero nervi optici aditus in oculum neque est in oculi axi, neque omnino aptus factus est ad imaginem recipiendam, neque demum eo in loco videmus. In quadrupedibus is nervi optici aditus cellulosa membrana (*s*) tegitur, procul dubio, ut aliæ cellulosæ telæ, insensili. In avibus de ipso axi rimæ nervum opticum admittentis niger pecten (*t*) exsurgit. In piscibus bene multis rotundus nervi finis (*u*) fuscis vasis & penicillis pilorum obducitur.

Experimento satis subtili accuratius ostensum est, eam sedem nervi optici non videre. Id solent *Edmundo MARIOTTE* (*x*), tribuere, est autem non unum. Prius experimentum Cl. viri est ejusmodi. Duas chartas albas in eadem fere cum suis oculis altitudine fixit in obscuro pariete, ut duobus pedibus inter se distarent, & altera charta paulo humilior esset. Tunc oculum sinistrum clausit; dextrum vero direxit in objectum sinistrum, atque retrorsum regrediendo locum quæsit, in quo accurate ob-

jectum

(*u*) *Journ. des Trévoux* ann. 1727. m. Febr.

(*o*) SCHEINER p. 161. 162. PLEMP p. 81. 82. S'GRAVEZANDE n. 3060. 3071. 3075. *Hamb. Magaz.* T. VIII. p. 426. T. XXIV. SANCTOR. l. c. Olim laternam magicam J. B. PORTA invenerat L. XVII. c. 6.

(*p*) PORTERFIELD l. c. T. II. p. 222. CAMPER *de visu* p. 8.

(*q*) Ob insertionem obliquam p. 352.

(*r*) REGHELLINI p. XLI.

(*s*) p. 363.

(*t*) p. 391.

(*u*) p. 386.

(*x*) Factum ann. 1668. coram S. Reg. Maj. T. BIRCH. T. II. p. 281. Exstat oper. MARIOT. p. 496. ed. Holl.



jectum responderet ei puncto, in quo uterque oculi axis se fecat. Reperit ad novem pedum distantiam, & eo loco evanuit charta, quæ tamen esset quatuor unciarum diametro, ut præter parietem nihil videret. Id experimentum etiam alii repetierunt (y), & paulum diverso modo HAMBERGERUS (z), cui ad sex pollices circuli evanuerunt, & ad octo pedes Cl. Nicolao le CAT (a).

Inde PICARDUS (b) paulo alio iterum modo experimentum repetiit. In pariete chartam albam adplicavit, unciam, duasve uncias latam, ad ejus latus duas notas fecit, a charta duobus distantes pedibus. Ita re præparata, e directo stabat, pariter ad novem pedum distantiam, & digitum inter oculos ponebat, qui oculo dextro sinistram notam tegeret, sinistro dextram. Porro utrumque oculum in digitum dirigebat, ut is digitus duos axes opticos interciperet; ita tota charta alba evanescebat.

Iterum paulo aliter idem periculum E. MARIOTTE repetiit (c). Duas chartas albas tribus pedibus distantes parieti adfixit. Ipse duodecim pedibus a chartulis remotus, pollicem inter oculos ponebat, sed erectum & octo pollicibus distantem, & ad eum pollicem duos oculos convertit. Ita utraque charta evanescit.

Cl. STANCARIUS, cum negare vellet cæcum esse aditum nervi optici, & experimentum MARIOTTI repetiisset, ostendit locum cæcum distare a centro optici nervi tribus partibus undecimis inter id centrum & centrum lentis crystallinæ (d) sumtis. Verum id experimentum potius faveret MARIOTTO. Nam utique locus cæcus a nervi optici centro versus nasum distat.

Ex omnibus his experimentis, & ex subtiliori alio Danielis BERNOULLI (e) constat, tunc evanescere objectum, quando ingressui nervi optici e directo obponitur, nempe eum ingressum cæcum esse (f), in

(y) REGIS. ROUHAULT c. 35.

(z) p. 537.

(a) p. 387.

(b) Ex Oper. MARIOTTI p. 506.

(c) p. 56. PORTERFIELD l. c. T. II. p. 228.

(d) Giorn. de Letter Vol. XVII. p. 195.

(e) Comm. Acad. Petrop. T. I. p. 314. seqq.

(f) HAMBERGER p. 538 539. PORTERFIELD l. c. p. 224. &c. KRUGER de sensat. p. 21. CAMPER de visu p. 8.



in latitudine, quam quartæ parti lineæ, alii (*g*); BERNOULLIUS septimæ parti diametri bulbi oculi comparavit (*h*).

Facile ergo intelligitur, quare axis opticus non sit e directo ingressus nervi optici. Ita enim si se haberet, omnia objecta perforata videremus, quod Petrus HERIGONIUS olim sensit ex pori, qui eo aevo dicebatur, insertione & cæcitate sequi. Neque valde credo, aut in phoca (*i*), aut in hystrice exceptionem esse a regula, & insertionem optici nervi axi optico respondere.

Interius vero, quam axis optici finis, potius cæcus locus positus est, quam exterius, quia plerumque, quando accurate volumus videre, oculum introrsum convertimus, ut legamus, minuta opificia exsequamur, & utroque oculo possimus uti. In ea conversione nunquam objectum amittimus, nisi impedimento, quod est rarissimum, in naso posito; in omni enim alio casu certe altero videmus oculo. Multo etiam minus fatigatur nervus opticus, qui interiori loco inseritur, quam quidem tenderetur & fatigaretur, si exterius insertus eum motum sequi oporteret, quo axes optici uniuntur (*k*).

#### §. V. *Tamen in retina pingitur imago.*

Experimento suo ita usus est vir industris, ut crederet omnino se ostendisse non in retina, sed in choroide tunica visus esse organum. Eum nempe solum locum cæcum esse in oculo ajebat, in quo retina quidem, sed nulla chorioides esset.

Novæ theoriæ PECQUETUS se opposuit, & PERRALTUS, iste quidem quod tunica chorioides nimis dura sit, & inæqualis, neque apta, in qua imago depingatur: iste (*l*), quod retina tunc fere cæca sit, quando imago ipsum punctum percellit, ex quo fibræ expanduntur (*m*): deinde pariter, ut nuperi, arterias retinæ (*n*) proposuit, quæ cæcæ essent, & radios in nervi optici ingressu reciperent. Addidit etiam, chorioidem

(*g*) Le CAT p. 390.

(*h*) p. 315.

(*i*) PARISINI. PORTERFIELD l. c. T. II. p. 252.

(*k*) HAMBERGER p. 544.

(*l*) p. 519.

(*m*) p. 504.

(*n*) BOERHAAVE l. c. LOBE' de oculo &c.



rioidem tunicam in multis animalibus ita vivide coloratam esse, ut radios reflectat, cum retina in omnibus animalibus alba, simplex & opaca sit ( *o* ).

Fortiter se tuitus est M A R I O T T U S , & facile ostendit, vasa retinæ nimis parva esse, & adeo amplis in exigua distantia chartis abscondendis imparia ( *p* ) ; & ea objecta minora esse, quæ videantur ob eos vasorum truncos evanescere ( *q* ). Denique chorioidem membranam perfecte ad speculi modum objecta corpora depingere ( *r* ) neque adeo iniqua esse superficie.

Inter nuperos Gallos plusculi ( *s* ) pro M A R I O T T O senserunt, ususque est Cl. de S. Y V E S eo argumento, quod a luce nimia iris constringatur, iridem vero non retinæ, sed chorioidis esse propaginem, & manifesto constare impressionem lucis in eandem membranam exerceri, in qua motus ab ea luce sequatur. Id ex hypothese sua ita ornavit Cl. N ic. le C A T , ut retina tamquam cerebri propago, sensu careat ( *t* ), & pellucida radios transmittat ( *u* ) ; sit vero in chorioidea sensilis natura, & nigra, radiosque recipere apta ( *x* ).

Alii retinam eo detruserunt, ut epidermis ( *y* ) sit Chorioideæ, quæ radios lucis illapsos moderetur.

Credit etiam Cl. de S. Y V E S , se vidisse imaginem in oculo artificiali trans retinam in chorioidem conjiciam ( *z* ), & si pellucidus est paries, in quo cameræ obscuræ idolum pingitur, imaginem trans eum parietem conjici S T U R M I U S dixerat ( *a* ).

Varia responderunt varii ( *b* ) : Subopacam esse retinam in quibusdam anima-

( *o* ) p. 499.

( *p* ) p. 526. 527.

( *q* ) p. 529. 530.

( *r* ) p. p. 530. 531.

( *s* ) S. Y V E S c. 8. le C A T p. 397. etiam TAYLOR c. 26. tot. p. 210.

( *t* ) p. 392.

( *u* ) p. 394.

( *x* ) p. 396. GRANDCLAS E Chorioides visus organum immediatum.

( *y* ) Le C A T p. 399. RIBE' om'ogonen p. 9. TAYLOR p. 263. SIMSON obs. p. 254.

( *z* ) p. 38. 39. sed in loco non obscurato experimentum factum est.

( *a* ) De camer. obscur. p. 9.

( *b* ) P. de la Hire apud du HAMBL p. 73. Mém. de l'Acad. 1709. BAYLE' p. 468. MORGAGNI Epist. XVII. n. 35. Ange CHERUBIN optique. BOERHAAVIUS. PORTER-FIELD &c.



animalibus (c) etiam magis, aut certe semi diaphanam (d): pul-  
pam nervi optici (e) non in choroideam, sed in retinam produci, quam  
pro epidermide dare sit ab omni experimento alienissimum: esse eam  
tunicam in omni animali similem (e\*), subcineream (f), ad omnes co-  
lores adiaphoram: choroideam, ut coloratam, aliter a suo colore radios co-  
loratos maligne recepturam: eandem lucem in plurimis quadrupedum re-  
flectere, nervos paucos, vasa habere numerosissima, quorum nullus sen-  
sus sit, & potissimum in origine sua nervos vix ullos accipere, in qua ta-  
men oporteat objecti imaginem pingi. Puerum chorioidea rubra tamen vi-  
disse (g), & cuniculos rubra chorioidea videre (h), & alium hominem,  
in quo nigrorē amiserat, lucis habuisse sensum. Iridem, chorioideæ  
propaginem, non irritabilem esse (i), parumque sensilem (k), & ejus  
motum, nullo cum ejus proprio vitio, deleri, si nervus opticus con-  
pressus fuerit, cum quo nusquam jungatur; neque recipi posse ab iride  
choroideam nasci (l). Nervi optici sedem cavam esse, quæ cæca sit, ut  
lux non cadat in fibras (m); aut retinam ibi callosam & duram (n).

Verum fortiora habemus argumenta, & quæ cogant ad adsensum.  
Primo totum experimentum MARIOTTI nihil ad rem facit. Nam in loco  
cæco, sive ingressu nervi optici nulla retina est (o); Sed alba est, ut  
ante 20. annos monui (p), membrana, cellulosa & porosa: cujus ad  
visum inidonea natura nihil retinæ potest derogare.

Deinde certissimum argumentum est, quo ostenditur in plurimis ani-  
malibus lucis radios ad Choroideam omnino non pervenire. Et in ho-  
mine vidi, & in avibus, ut in ardea, sed in piscibus imprimis, totam inte-  
riorem faciem tunicæ chorioideæ obliniri muco nigerrimo, qui in oculo  
rite

(c) Leone du HAMEL *corp. anim.* L. II. c. 5.

(d) HAMBERGER p. 523. ne comburatur a radiis.

(e) RAHTLAUW *de cataract.* p. 32. CAMPER *part. ocul.* p. 15.

(e\*) DUVERNEY I. p. 164.

(f) Alborem vel nigrorē requiri HARTLEY p. 191.

(g) DUDDEL. *supplem.* p. 51.

(h) p. 20.

(i) p. 371. 372.

(k) p. 372.

(l) OEHM *de amaurosi.* Conf. p. 367.

(m) MUSSCHENBR. n. 1233.

(n) PORTERFIELD T. II. p. 254.

(o) Habet inde KRUGER *de sensatione* p. 21. *physiolog.* p. 562.

(p) Comm. in BOERHAAV. T. IV. p. 467.



rite parato crustam hemisphæricam ( $r$ ) efficit, qua retina ita obducitur, ut credas membrana nigra ( $s$ ) velari, & qui mucus nullum a radiis ad RUYSCHIANAM chorioideæ laminam commercium permittit.

Id vallum, si lux superaret, sed omnino superare nequit, tamen in RUYSCHIANÆ fuscæ, villosæ, coriaceæ superficiem offenderet, subque ea incredibilem vasorum vim, nervos aut nullos, aut rarissimos, qui nusquam continuam latitudinem imagini recipiendæ idoneam efficiant. In plerisque etiam feris tapetum partem nervi optici proximam exterio-rem, quæ vere videt, undeque obtegit, quæ radios utique reflectit, non absorbet ( $s^*$ ).

Cæterum cum objectum evanescat potius quam nigrum adpareat, habemus exemplum, ex quo constat, objectorum externorum impressiones non unice id punctum, quod percusserunt, emovere: Sed etiam proximam aliquam particulam percelli, ut per eam sedem retinæ credas album, nigrumve parietem te videre, quæ nihil videt, sed cum exigua sit, repleatur imagine vicina ( $t$ ), ejusque quasi penumbra.

Incidit autem imago in retinæ fibrosam membranam, non in pulposam, ut quidem videtur. De fibrosa enim certum est, eam radios lucis primos accipere: non vero per eam penetrare crediderim, tum quod hæ fibræ in multis piscibus albæ sunt ( $u$ ), non pellucidæ; eo magis quod circa ingressum nervi optici densiores sibi accumbant: in homine vero bonam partem hujus membranæ vasa rubra retinæ tegant: tum quod fibræ ex centro ipso nervi optici prodeant ( $x$ ): tum quod accurata distinctio in fibra facilius videatur, quam in pulpa molli. Ex conjectura, fateor, omnia.

#### §. VI. *Ejus imaginis magnitudo.*

Quando per oculi fabricam imago in fundo retinæ depicta est, functus is est suo munere, neque quidquam porro experimentum docet. Ea

O o o 2

imago

( $r$ ) p. 383.

( $s$ ) Videtur ea nigra membrana esse, quam in asello *cabeljauro* Cl. GUENELLON inter retinam & chorioideam ponit *Nouv. de la Répub. des lettres* 1686. m. Mars. p. 321. Habet et nuper Cl. GAFAKER p. 57.

( $s^*$ ) In lupo totum nervum opticum ambit exigua particula excepta. In mele & ibice exteriora tenet, qua imprimis visio suam sedem habet.

( $t$ ) *Comm.* in BOERHAAVE, T. IV. p. HAMBERGER p. 541. 542.

( $u$ ) p. 389.

( $x$ ) Ibid.



imago menti ( $\gamma$ ) repræsentatur, quocunque demum modo, non aliquo intuitu, nam luci quidem liberum iter ( $z$ ), ad cerebrum requiritur, si aliquid in cerebro emovere debet.

Cæterum in hac nunc imagine contemplanda accurate est versandum. Et primum de ejus magnitudine. Parvam esse facile intelligitur non tamen verum punctum, ut in quo partes non possint cogitari ( $z^*$ ). Erit autem, cum arcus exiguus retinæ pro chorda haberi queat, ut vera magnitudo objecti conspecti, ducta in longitudinem oculi axis, & divisa per distantiam oculi ab objecto ( $a$ ). Quando hæc imagines inter se invicem comparantur, tum distantia inversim vulgo sumuntur pro mensura, cum oculi longitudo parvi nunc momenti sit ( $b$ ). Et pro mensura habetur angulus opticus, quem uterque finis objecti cum retinæ puncto vidente intercipit ( $c$ ).

Quare eorum, quæ valde remota sunt, debilis erit impressio, cum in angusto angulo lucis parum contineri queat ( $d$ ). Limites distantiarum etiam Cl. viri adgressi sunt definire, ad quas distincte videre possimus. Non ultra 5156es suam diametrum SMITHIUS ( $e$ ), & ultra 3436es alii ( $f$ ).

Id vero hic potissimum poscitur, ut limes ponatur minimi objecti, quod videri possit, unde de minima etiam possibili imagine conjectura fiat. Olim *Robertus Hooke* invenit raros esse homines, qui objectum distinguant, quod sub minori angulo adpareat, quam est minuti primi, etsi sint, qui acrius videant, & sub angulo 20. secundor. ( $h$ ). Negat de angulo 40. sec. minori R. SMITH ( $i$ ), sub eo objectum conspici posse.

Et

( $\gamma$ ) Mens videt ARISTOTELES *de anima* L. II. c. 4. PLINIUS L. X. c. 39. CICERO *Tuscul.* L. I. PORTERFIELD L. I. p. 371. CASSIUS n. 22. le CAT p. 429.

( $z$ ) p. 347

( $z^*$ ) Ita le CLERC *point de vue* p. 57. & ipse *de perfecta visione* JURINUS, quam a distincta separat *distinct. vision* p. 116.

( $a$ ) MUSSCHENBROECK n. 1240. t. 16. f. 9. & paulo aliter, pro oculo sex lineis sumtis PORTERFIELD T. II. p. 339.

( $b$ ) Le CAT p. 451. 452.

( $c$ ) SMITH n. 91. s'GRAVEZANDE n. 3117.

( $d$ ) BUFFON l. c. T. III. p. 323. 324. BOERHAAVE *morb. ocul.* p. 157.

( $e$ ) SMITH n. 97.

( $f$ ) de BUFFON T. III. p. 322.

( $h$ ) BIRCH T. III. p. 120. & in confesfu sodalium HOOKE *Præf. & postb.* p. 12. 97. Etiam minus objectum conspici posse BUFFON T. III. p. 325.

( $i$ ) n. 97.



Et remota quidem, neque lucida, quæ debiliter adpareant, objecta vix possunt conspici, quæ angulum 60. (*k*), 40. (*l*), 30. (*m*), 20. (*n*) secundis minorem subtendunt.

Partem trecentessimam pollicis distingui alii, inde imaginem fieri non majorem  $\frac{1}{800}$ . uncia (*n*\*).

Proxima ut potentiora, si præterea lucida fuerint, & in visionis distinctæ distantia ponantur, ad angulum  $3\frac{1}{2}$ . &  $2\frac{1}{3}$ . (*o*) minutorum secundorum conspici possunt; & denique ad angulum minuto secundo aut non majorem, aut minorem, si & lucida fuerint, & radios miserint per tubum longum parallelos (*p*). Nempe filum sericeum  $\frac{1}{7248}$ " crassum, ad quadraginta ab oculo pollices tamen conspici potest, cum angulum subtendat  $2\frac{1}{2}$ . secundorum.

Et minora mihi videntur conspicua esse, sectionem enim deaurati fili argentei distincte videmus, & aurum ab argento distinguimus, quando crassities auri in ea acie est  $\frac{1}{1050000}$ . lineæ, nempe 541 es (*q*) breviorē lineam, quam ea est, de qua JURINUS.

Quod si nunc ex priori regula objecti magnitudinem & distantiam in formulam retuleris, fiet imaginis in retina parvitas eo insignior, quo minori sub angulo posueris id corpus conspectum fuisse. Ex molendini alae sepedali a 4000. orgyis visa, fecit ejus magnitudinem  $= \frac{1}{8000}$ . pollicis olim P. de la HIRE (*r*), eamque mensuram alii retinuerunt (*s*). Minori angulo admissio Cl. PORTERFIELD minorem imaginem reperit, æqualem  $\frac{1}{7200}$ . pollicis (*t*), & demum  $\frac{1}{32400}$ . capilli, sive pollicis parti  $\frac{1}{388800}$ . sumtis capillis decem pro linea una (*u*). Eam esse magnitudinem invenit, quando angulus subtensus est tertiæ partis minuti primi,

O o o 3

inque

(*k*) Tobias MAYER vir Cl. Comm. Gott. T. IV. p. 134.

(*l*) MUSSCHENBROECK. SMITH n. 97. MAYER ibid. pro minima mensura distincte visibilis objecti.

(*m*) In stellarum exemplo MUSSCHENBROECK n. 1241.

(*n*) NOLLET *Lec. de phys.* T. V. p. 126.

(*n*\*) In cerebro Hamb. Magaz. T. XXI. p. 357.

(*o*) JURIN. n. 163. p. 149.

(*p*) BUFFON l. c. p. 325.

(*q*) RE'AUMUR *Hist. de l'Acad.* 1713. p. 13.

(*r*) *Des accidens de la vue* p. 566.

(*s*) SMITH n. 97.

(*t*) T. II. p. 63.

(*u*) Ibid.



inque parvis animalibus, ob oculi minorem diametrum  $= \frac{1}{128.400}$  pili & unciae  $\frac{1}{128.400}$ .

JURINUS, quando ex fili argentei ad  $\frac{1}{1248}$  pollicis craffi, & a 10. pedibus distincti, sub angulo  $2\frac{1}{2}$ . secundi, conspecta magnitudine ratiocinatur, invenit  $\frac{1}{144000}$  (x) pollicis pro homine. Ex nostra demum observatione subtilitas sequitur, quæ priora omnia superat.

Eandem credunt Cl. viri (y) esse parvitatem fibræ retinæ, cum commodum videatur ab una imagine unum, & totum, filum nerveum occupari. De filo adeo invisibili, & solo rationis usu dimenso agunt. Nam fila retinæ grandia sunt, & conspicua, capillo quidem, non tamen magna ratione, minora, in tinca quidem crassissima, tenerrima in lepore.

### §. VII. Ea imago inversa adparet.

Cum ex objecti conspicui fine ductas lineas oporteat convergere, & in minimam lineolam uniri (z), non potest evitari, quin ex fine dextro medius radius, qui axis nervus opticus dicitur, in sinistrum finem imaginis ducatur, inque dextrum, qui a dextro fine ejus objecti advenit (a).

Quare etiam in artificioso oculi (b) imitamento, vel in animalis (b\*) cujuscunque, etiam noctuæ (c) oculo, imago inversa in retina pingitur. Neque est a lente crystallina (d) hæc inversio: etsi enim ea utique, ex facili demonstratione, inversa ostendit, microscopiorum (e) exemplo, tamen in oculo, exempta lente (f), retento solo corpore vitreo, nihil in objectorum situ mutatur, neque minus objecta invertuntur.

Dudum

(x) L. c.

(y) PORTERFIELD l. c. p. 63. MONRO on nerves CLIFFORD of the exility &c. p. 20.

(z) p. 467.

(a) MUSSCHENBROECK t. 16. f. 9. STURM colleg. curios. p. 13. &c.

(b) In camera obscura SCHEINER p. 135. Hamb. Magaz. T. XXIV. In oculo artificiali STURM de presbyop. & myop. p. 22. CAMER. de visione p. 2. Non bene negat GOTTSCHED de visus modo fiend.

(b\*) STURM ocul. Θεωρητ. p. 12. in bove WOLF Versuche T. III. p. 111. in fete HOOKE ap BIRCH T. III. p. 500 in vitulo NOLLET leçons T. V. p. 101.

(c) MALPIGH. posth. p. 151. Experimentum feci, & flammulæ utique imago in sinistram partem cadit, quando candela dextra oculo adsidet. Nunquam tamen nitidam imaginem vidi.

(d) Vide PEIRESC. vit. n. 292.

(e) De lente KEPLER prop. 44. s'GRAVEZANDE n. 3047 2978. de microscopio s'GRAVEZANDE n. 3184 &c.

(f) GAUTIER obffe T. IV. p. 160.



Dudum quæsitum est, quomodo hic in corporis organis radicans error ab anima corrigatur. Sunt, qui oculi errorem ab experimento tactus emendari crediderunt (*g*), & hodie plerumque ita docetur.

Alii, ex legè lata (*b*) recta videri maluerunt, quod anima objecta non in retina videat (*i*), sed in eo loco & situ, a quo radii adveniunt (*k*). Accuratius in eum sensum *Georgius BERKLEY* rem ex iisdem principiis interpretatur: aliam esse terram visibilem, aliam tangibilem: hanc inferiori loco videri, quia caput hominis erecti ab ea longissime distat (*l*), pedesque ei esse proximos, tum in vera terra veroque homine, tum in terra visibili & homine visibili in oculo pictis. Et superiora puncta objecti utique in parte oculi infima depicta distincte tamen adparere, dum oculus elevatur, inferiora, dum deprimatur (*m*), cum in parte superiori oculi picta sint. Erectum vero vocamus hominem, cujus caput a terra longissime distat, pedes sunt proximi.

Contra ea *Cl. Nic. le CAT* credit se experimento posse ostendere, animam utique inversa videre. Nam si oculo unico, minus adtento & relaxato, in punctum luminosum inspexeris, & digitum ad dextra oculi aperti positum moveris sinistra versus, omnino tunc videri (*n*), digitum a sinistris ad dextra venire, & vicissim: inque alio experimento aciculam per exiguum foramen (*o*) adspectam vere inversam adspici. Cæterum animam in oculo videre, non in loco vero, uti in digito tangit (*p*).

Difficilia hæc certe sunt, cum aliis in exemplis recte videamus, in aliis inversa: & levi oculo distortionem convexa videamus, quæ sunt in figillis concava, & vicissim si directe inspexeris & microscopium plerumque convexa faciat concava (*q*) adparere, [nam convexitatem a concavitate solo situ umbræ ad dextra, aut sinistra objecti distinguimus]. A consuetudine

(*g*) *HARTSOEKER dioptriq.* p. 82. *s'GRAVEZANDE* n. 3101. *SMITH popul. tract.* n. 136. *le CAT* p. 117.

(*b*) *HOOKE l. c.* p. 502.

(*i*) *PORTERFIELD T. II.* p. 298. 329. 330. *Hamburg. Magaz.* T. VIII. p. 426.

(*k*) *SCHNEIDER* p. 215. *ROUHAULT T. I.* p. 22. *REGIS L. VIII.* c. 28. *MOLINEUX ap. DERHAM phys. theol.* p. 113. *MARIOTTE P. I.* *Suppos.* IV. *CONDILLAC tr. des animaux* p. 46. *NÖLLET leg. de phys.* T. V. p. 104. seqq.

(*l*) *Theory of vision* p. 312.

(*m*) p. 299.

(*n*) p. 419. 420.

(*o*) p. 507. 508. Habet etiam *SCHNEIDER* p. 146. 147.

(*p*) p. 429.

(*q*) *Phil. transf.* n. 476. n. 50.



tudine tamen non esse certissimum videtur: Nam pulli, quos citavimus, nuper de ovo nati ad cibum recto cursu properant, quem in vera tangibili terra quærunt, non in visibili terra, quæ esset in aere. Sed etiam anser e directo ad ea, quæ quærunt, volat, & homines cæci nati objecta non videntur inversa (*r*), quando nuper cataracta est deposita.

§. VIII. *Simplex ex duplici pictura sensatio. I. Unum punctum distincte videmus.*

In plures quæstiones hujus phænomeni explicationem dividere oportet. Primo quidem satis certum est, minimam particulam esse, quam eodem tempore distincte videmus: majorem, quam confuse. Ut omnino imago quidem multorum corporum eodem tempore in oculo pingatur; sed mens unicum (*s*) distincte percipiat. In librorum lectione res est evidens. Videmus quidem confuse totum librum, distincte ut literae (*t*) vitia accusare possimus, unicam: demum unicam in ea litera maculam; ut omnino qui legit, tacite oculo suo literarum ordinem sequatur, & unam post aliam pronunciet. Probabile est punctum id, quod distinctissime videmus obverti axis optici fini, qua omnino fortissimi & perpendiculares radii retinam faciunt (*u*). Si quando credimus nos multa, & tamen distincte videre (*x*) error est, ex duratione impressionis natus, quam oculus noster recepit. Neque enim subito, absque temporis intervallo, ut corpus conspectum remotum est, ita & imago ejus deletur; superest, & eo diutius, quo fuit fortior. Nihil notius est baculo, cujus solus finis ignitus lucet (*y*). Eum, si paulo rapidius rotaveris, non sub baculi, sed sub circuli ignei specie percipies: manifesto argumento, impressionem baculi tamdiu superfuisse, donec ejus apex absoluto circulo in idem punctum redierit, ex quo primum

(*r*) Ex adnotatione ILL. WERLHOFII. Pueros inversa videre, sed nescio, quo experimento ILL. de BUFFON, *hist. natur.* T. III. p. 317.

(*s*) CARTES *de homine* p. 80. Seb. le CLERC *point de vue* p. 62. *Système de la vue art.* 8. BOERHAAVE *I. R. M.* n. 541. *morb. ocul.* p. 144. 153. PORTERFIELD *Act. Edimb.* l. c. III. p. 184. IV. p. 130. S'GRAVEZANDE n. 3107. PARSONS *physiogn.* p. 23. Nulam rem totam nos simul videre STOICI docebant, apud HELIODORUM *optic.* n. 11.

(*t*) Le CLERC *point de vue* p. 79.

(*u*) SCHEINER p. 248. PORTERFIELD T. I. p. 103.

(*x*) SCHEINER p. 244. S'GRAVEZANDE n. 3107.

(*y*) PLEMP. IV. *probl.* 20. MARIOTTE p. 524. PORTERFIELD *Essays* T. III. p. 186. & in eodem diario II. p. 70. 71. NEWTON p. 123.



inum est conspectus. Eodem modo radii colorati, per rotam circumacti, album jubar restituant (*z*). Id tempus, quo durat imago, ad unum minutum secundum æstimatum est (*a*).

Ita diu a sole nimisve lucido corpore inspecto macula lucida nobis obversatur (*b*), & lente colores obscurantur, quorum ordo est ex ordine decrefcentis roboris cujusque coloris, nempe jubar, & flava macula, tunc viridis, inde cærulea, denique violacea adparet: eodem ordine, quo colores ex frictione (*c*) nati oculi sibi succedunt, & in suspenso homine (*d*).

Alii homines imagines varias (*e*), etiam quadras fenestrarum aliquamdiu cum clathris suis, coram præsentibus retinent, ut etiam numerare possint.

Quare oculo nostro celeriter circumlato, credimus, multa nos objecta una distincte vidisse; primorum enim imago nondum de mentis præsentia depulsa est, quando ultima supervenit (*f*).

§. IX. II. *Et unico oculo.*

Uti unicum punctum objecti distincte videmus, ita ad distinctam visionem unico fere oculo utimur (*g*). Pictorum (*h*) id experimentum est, qui experiendo cognoverunt, non imitari se recte visionem, neque tabula sua picta eandem in oculo sensationem excitare, quæ excitaretur ad ipsa

(*z*) *Phil. transf. abrigd by LOWTHORP* T. I. p. 352.

(*a*) *NEWTON Quer.* 16. *MUSSCHENBROECK* p. 418. Vide *LOCKE* II. c. 14.

(*b*) *MARIOTTE Mém. de l'Acad.* 1699. p. 26. & *oper.* p. 318. *PORTERFIELD* I. p. 343. *ROBERG de cataract.* p. 6. add. *Nov. Eph. Natur. Cur.* vol. I. obs. 41. *HAMBERGER* p. 166. & inprimis *BUFFON Mém. de l'Acad.* 1743. p. 151. 152.

(*c*) *Psychologie* p. 31.

(*d*) *VERULAM Hist. vit. & ment.* p. 394. et si paulo deterius narrat.

(*e*) *PIRESCUS vit.* p. 296. *le CLERC point de vue* p. 79. & *MICHAELIUS in paralipom.* *MARIOTTE* p. 314. A depositione cataractæ ejusmodi nimia impressionum constantia fuit in casu, quem *WARNERUS* narrat *case* 4.

(*f*) *BOERHAAVE* I. c. *SCHEINER* p. 244.

(*g*) *GASSENDI vit.* *PIRESC.* p. 297. *CAMER. mem.* I. Cent. IV. n. 65. *le CLERC Systeme de la vision.* qui *HUBERIUM* citat auctorem, du *HAMSL Corp. anim.* L. II. c. 6. Plerumque *le CAT* p. 421. 422.

(*h*) *Le CLERC*, in utroque libello.



ipsa corpora, nisi ita distribuerent umbras, & luminosas sedes, & laterales adspectus, uti distribuuntur, quando unico oculo inspicimus. Solet is oculus, ob opportunitatem dextræ, puto, manus, dexter oculus (*i*) esse, qui ideo etiam in me, & puto in aliis mortalibus, ex multo usu obtusioris sensus est. Experimenta etiam protulerunt, quibus constat multo distinctius uno oculo videri, quam duobus (*k*); & ejusmodi pericula dudum venatores aliqui fecerunt, qui accuratissime punctum visibile volunt distinguere. Nam dum collimant, uno oculo utuntur. Negant etiam omnino oculos convergere (*l*) unquam, axesque opticos volunt parallelos procurrere, & una utrumque oculum, aut ad dextra converti, aut ad sinistra. Et homo ignoravit cataracta se laborare, donec clauso aliquando bono oculo subito in tenebras se vidit constitutum (*m*). Uno oculo etiam videbat homo, quem citat le CLERC (*n*): uno & meliori, quibus oculi sunt inæquales (*o*), & lusi (*p*). Experimentum etiam feci, quo convincor, me utroque oculo aperto tamen unico uti. Aciculam pono ante oculum dextrum, eum claudo, eamque aciculam video oculo sinistro. Subito claudo oculum sinistrum, & dextrum aperio, ita evidenti saltu acicula ad sinistra transfilit. Aperio tum utrumque, nihil mutatur situs aciculæ, quem in medium inter duos oculos spatium oportuisset transmisisse, si duobus axibus oculorum convergentibus ad videndum uterer.

Non ideo nunquam (*q*) utroque oculo videmus, nam sinistro ea videmus (*r*), quæ dexter videre non potest, & adeo ampliorem, quem vocant, *campum* duobus oculis occupamus, & ejusdem objecti plures partes, & plura objecta detegimus, & de distantia melius judicamus (*s*),  
&

(*i*) Etiam le CLERC art. 5. Etiam in equo debilior est LOWER *Phil. trans.* n. 32. & de homine CAMERAR *memor.* L. XIV. n. 27. Sinister melior, eoque utebatur J. A. BORELUS in *diario TINASSI* 1669. p. 11. *Journ. des sav.* 1672. m. Nov. Mutari oculum quo videmus le CAT p. 422. Mihi constans est uti dextro oculo.

(*k*) Art. 1. 2. *point de vue* p. 48.

(*l*) Du HAMEL *corp. anim.* L. II. c. 6. tum GASSENDUS & TACQUETUS.

(*m*) BOYLE *post caus. final. obs.* 7.

(*n*) *Point de vue* p. 54.

(*o*) BUFFON *Mém. de l'Acad.* 1743. p. 239.

(*p*) Le CAT p. 436.

(*q*) Nonnunquam duobus oculis nos videre IDEM p. 423.

(*r*) JURIN. p. 41. Utroque oculo homo duplicia videbat, bene si unico FICHET de FLECHY *obs.* p. 129.

(*s*) Le CAT p. 474. DES MOURS *Mém. d'Edimb.* I. p. 365. LEVRET *art. de l'accouch.* p. 277.



& demum clarius ( *t* ) non quidem duplo, sed aliquantum ( *u* ) videmus. Quare & nostro ævo Cl. nonnulli Viri utroque oculo se ajunt-uti ( *x* ).

Ego manifesto unico ad legendum, aut scribendum, aut microscopia quæque utor, neque possem sinistro uti, quem illa antiqua quies ita fecit delicatum, ut a minimo labore offendatur. Aves ( *y* ) necesse est uno oculo videre, quibus oculi ad latera disponuntur, ut axes conjungi nequeant; sic multi pisces ( *z* ). Et homines viderunt, in quibus nulla conjectura fuit, ullo modo utriusque oculi sensationes una potuisse exsistere. Ejusmodi fuerunt homines, quibus per varios casus nullus nisi per nasum visus fuit ( *a* ), qualis ille fuit, qui per solam narem sinistram videbat, cum palpebræ ejus conglutinatæ fuissent ( *b* ). Sed etiam fuit, qui oculo erecto & pendulo vidit ( *c* ); aliusque, cui pupilla introrsum ita tracta, ut pupilla angulum internum oculi pene contingeret ( *d* ). Neque rari sunt, quibus tumor aliquis alterum oculum extra orbitam urget, neque ii ideo duplicia vident ( *d*\* ). His omnibus, nisi unicus oculus videret, certe duplex visio fuisset.

§. X. III. *Similes impressiones non distinguuntur.*

Etsi non distincte utroque oculo videmus, tamen videmus utroque, & duæ adeo imagines conspecti corporis depinguntur. Quæsitum est, quare unica inde in anima sensatio, & simplex ejus corporis repræsentatio nascatur.

P p p 2

Veteres

( *t* ) JURIN. PORTERFIELD T. I. p. 71. 101. BUFFON *Mém de* 1743. p. 240. Add. CHERUBIN *vis. parfaite* Paris 1677.

( *u* ) PORTERFIELD I. p. 73. Add. LEVRET *art d'accouch.* l. c.

( *x* ) Add. WEDDEL *de visione*, quæ fit oculo gemino NOLLET *leçons de phys.* T. V. p. 497. le CAT p. 425.

( *y* ) PORTERFIELD T. II. p. 275. *Ess. of Edimb.* T. IV. p. 291. LEVRET p. 274.

( *z* ) Ut in pisce flünder HANOV. *Seltenb.* T. III. p. 142. inque Zygæna aliisque. Etiam in Rhinocerote C. Aug. a BERGEN.

( *a* ) PLEMP. *probl.* 64. CRATO *Epist.* T. VI. n. 34. HAMBERGER *vitia ocul.* p. 210. THUMMIG *erläuter.* T. II.

( *b* ) SMETIUS *Miscell.* L. V. *Epist.* 13. L. X. p. 531.

( *c* ) H. de HEERS *obs.* p. 49. & alias de la VAUGUYON *oper.* p. 838.

( *d* ) BOYLE *post. caus. final.* *obs.* 7.

( *d*\* ) PAW *obs.* 23.



Veteres ( *e* ) ad id phænomenon interpretandum usi sunt unione duorum nervorum opticorum.

Alii unicum apparere putent, quod omnino uno ( *f* ) oculo videamus, duplicia visuri, si uteremur utroque.

Alii, quod anima objectum videat in axium ( *f* \* ) utriusque oculi intersectione.

Alii, quod fibræ retinæ diversis modis tensæ sint, & extimæ dextri oculi cum extimis sinistri similiter tensæ, tum intimæ cum intimis, & reliquæ cum comparibus. Quare quando in dextro, & in sinistro oculo, chordæ ( *g* ) harmonicæ ab objecti conspicui radiis feriuntur, nasci unicam sensationem: duplicata vero adparere, quando aliæ in dextro oculo fibræ, aliæ in sinistro percelluntur. Quæ ita molliunt nuperi, ut fibras omittant, cæterum puncta sibi respondentia retinæ nomenclant ( *h* ), quæ in utroque oculo a radiis coloratis adficiantur, & duplicia nos videre credant, quando non in analogo puncto utriusque oculi imago pingitur ( *i* ).

Alii negaverunt omnino in oculo visum fieri, aut extra oculum, sed intus in animæ sede ( *k* ), quæ non sit duplex.

Alii demum in universum simillimas sensationes non distingui, & utrumque oculum perinde adfici ( *l* ).

Alii denique duplicia nos videre, sed per experimenta ( *m* ) vitium oculi corrigere. Consuetudine etiam sola fieri ( *n* ), ut in unum punctum axes opticos dirigere discamus.

Adde aliquos plures harum conditionum conjunxisse.

Ego

( *e* ) GALENUS *de us. part.* L. X. c. 14. & nostro ævo TAYLOR *mecan.* p. 106. 107. Refutat PORTERFIELD I. p. 195.

( *l* ) Le CLERC *Système art. 2. point de vue* p. 42.

( *f* \* ) MUSSCHENBROECK. PORTERFIELD *Essays of Edimb.* T. III. p. 233. *on the Eye* I. p. 195.

( *g* ) BRIGGS *nov. vision theor.* REGIS. ROUHAULT.

( *h* ) La HIRE *accidens de la vue* p. 623. SMITH n. 137 BUFFON T. III. p. 310. KLAUHOLD *vis. dupl.* S'GRAVEZANDE n. 3105. HARTLEY p. 265. PORTERFIELD II. p. 309. & per experimentum le CAT p. 427.

( *i* ) De la HIRE p. 540. &c.

( *k* ) CONDILLAC *tr. des anim.* p. 46. qui ob eandem causam objecta non inversa nobis adparere scripsit.

( *l* ) PLEMP. L. IV. *probl.* 14. KEPLER *prop.* 62. S'GRAVEZANDE n. 3104. le CAT p. 435.

( *m* ) *Mém. de l'Acad.* 1743. p. 245. BUFFON T. III. p. 309. CONDILLAC *des sensat.* II. p. 47.

( *n* ) HARTLEY p. 221.



Ego quidem morbis expensis invenio, posse etiam in unico oculo duplicem esse visionem, & multiplicem. Coram est vir generosus, cui ob cataractam extractam, in cornea tunica (o) cicatrix est lucida. Is duplices faculas videt, plane uti per polygonum vitrum (p). Et si remotiores fuerint, etiam quadruplices, cætera objecta non item. Ita etiam si per duo, triave foramina proxima in objectum inspexeris, quod in puncto sit visionis distincto, simplex (q) adparet, multiplex vero, si extra (r) id punctum. In diversa enim retinæ utriusque puncta nunc imagines cadunt. Alia etiam sunt exempla visus duplicis, cujus causa videtur fuisse in pupilla præter naturam nata (s), in pupillis tremulis (t), in lente crystallina situ mota (u), adhærente uveæ (x): denique a violentia fulgidæ nimis lunæ imagine id vitium natum est, quæ videtur alterius oculi retinam ita feriisse, ut multo altero tenerior & debilior aliam sensationem perceperit (y).

Deinde aliud vitium est, in quo unico oculo simplex, duobus duplex adparet objectum (z). Id fit, quoties oculi, quacunque de causa, non ita convertuntur, aut possunt convergere, ut axes optici concurrant, adeoque in similia puncta retinæ utriusque oculi imagines cadant, & tamen homo utroque oculo vult inspicere (a). Id fit distortionem voluntaria, & quisque potest experiri; vel digito (b) facta, vel morbo (c), vel pupilla distorta (d), vel ab altera pupilla sursum

P p p 3

altera

(o) Ita & la HIRE p. 550.

(p) Huc forte visio geminata ex frusto vitri in oculo relicto FALLOPII vuln. p. 264.

(q) La HIRE p. 623. Add SCHEINER p. 165.

(r) Accidit myopi Danzig Gesellsch. Versuche T. II. n. 6.

(s) REGHELLINI p. XXXIII. XLI.

(t) Visus multiplex SOMIS *raggionam* p. 52.

(u) S'GRAVBRZANDER n. 3105.

(x) WARNER *cas* 4.

(y) HEERS *observ.* p. 45. seqq.

(z) *Act. Lit. Succ.* 1721. p. 230. KLAUHOLD *vis. dupl.* p. 33. MARC. DONAT. L. II. c. 8. BRIGGS *theor. vis.* p. 308. VATER *vis. duplic.*

(a) Duobus oculis in unum objectum conversis alterum duplex adparet le CAT p. 427. BUFFON T. III. p. 309. 310. Conf. PORTERFIELD I. p. 197. 408. Voluntarie lufcus, qui duo objecta videbat le CAT p. 439. FERREIN 12. *quest.* ob lentes crystallinas in utroque oculo diverso modo positas.

(b) KLAUHOLD. STURM *de sensu unius gemin.* PORTERFIELD I. p. 194.

(c) Ex convulsione KLAUHOLD p. 33. add. CHESELDEN p. 296. ALBERTI *med. leg.* L. III. c. 10. BOYLE *post caus. final.* STURM *de sensu unius gemin.*

(d) Ex fulgure VATER.



altera deorsum flexa (*e*) ; vel ab exostofi (*e*<sup>\*</sup>) aut ab arteriis pulsantibus nervum opticum (*f*), quo forte, sed etiam ad minus firmam musculorum in unum punctum conflexionem, duplices ebriorum & meticulo-  
forum thebæ pertinent. Qui enim præaltorum turrium tecta emendant, si duplicia viderint, fere continuo, resoluti & vertiginosi cadunt. Similis est visus duplex, ex vitio musculi, qui motum suum amiserit (*g*).

Hæc omnia eo redeunt, ut unicum objectum videamus, quoties sensationes sibi similes sunt, duplex, quando dissimiles, & perinde sive in uno oculo dissimiles sensationes nascantur, sive in duobus. Nascitur autem alia sensatio, si vel in eodem oculo in duo diversa retinæ puncta oculis imagines illabuntur, vel in duobus oculis anguli optici inæquales sunt, atque adeo imaginum est discrimen (*i*). Nec aliquam peculiaris oculi naturam subesse adparet, cum etiam duabus naribus unum odorem, duabus auribus unum sonum percipiamus.

Nervorum huc conjunctio nihil facit, cum in auditorio nervo nulla sit (*k*), neque in erucarum oculis (*l*), aliorumve insectorum: neque consuetudine hic egetur. Nam nuper nata apis cum suis mille oculis æque accurate ad destinatum alveolare volat, ut volaret dudum exercita: neque duplicia viderunt, quibus cum cataracta natis subito visus restitutus fuit. Si qui strabones, post duplicem visum, simplicem recuperaverunt (*m*), eos credibile est ob musculi alicujus vitium duplicia vidisse, idque vitium contrario conatu sustulisse, ut vulgo possint se ipsos conando corrigere.

Insectorum simplex visus difficilem habet interpretationem. Cum enim & reticulati oculi (*n*), veri sint oculi, & glabri (*o*): cum corneæ in eodem

(*e*) KLAUHOLD *obs.* 20. add. BIERZING *adv.* MEARA p. 169.

(*e*<sup>\*</sup>) PETIT *mal. des os* II. p. 392.

) *f*) VATER.

(*g*) De la HIRE p. 614. PORTERFIELD T. II. p. 313. MEARA l. c.

(*i*) PLEMP. L. IV. *propof.* 16.

(*k*) L. XV. p. 299. 300.

(*l*) vid. p. 351.

(*m*) BUFFON *Mém. de l'Acad.* 1743. p. 245.

(*n*) CATALAN. *Journ. des sav.* 1680. p. 24. SWAMMERDAM p. 501. ROESSEL *Insect. Belustig.* p. 49. von Fliegen und Schnaken.

(*o*) CATALAN *Journal des savans* 1680. n. 24.



eodem oculo numerosissimæ ( *p* ) sint, quarum quælibet suam recipiendæ imaginis facultatem habet ( *q* ); cum eæ corneæ in hemisphærii specie ad omnes partes disponantur, nullo modo fieri potest ( *r* ), ut axes optici conveniant, neque in eodem nervo possunt adfectiones a corpore viso natæ confluere. Cum præterea in erica ( *s* ) saligna, inque cochlea fere aquatica ( *s*\* ) manifesto nervus opticus ad modum alterius nervi, & sex ramos ad sex oculos emittat, & præterea ad alias partes corporis furculos edat.

Solvere nodum conati sunt Cl. viri, quod inter suos innumerabiles ocellos musca tamen paucis videat, uno quidem e directo, duobus vel tribus proximis oblique ( *t* ). Et credunt numerum illum oculorum compensare perfectam oculorum ipsiusque capitis immobilitatem ( *u* ).

### §. XI *Imago ut distinctissima fiat. I. Humores pellucidi.*

Nulla unquam imago in retina ( *x* ) absque omni confusione est. Nam & sphærica quæque lens inæqualiter radios confringit, cum laterales radii nimia vi debeant in idem punctum cogi, in quod medii conveniunt, parum aliunde a perpendiculari devii. Deinde quod alia lege radius ruber, alia radius violaceus refringatur, atque ( *y* ) adeo vis lentis, quæ radium violaceum ad definitum axis punctum cogit, non sufficiat, ut ad idem punctum radium rubrum cogat.

Sunt tamen sui gradus, suæque & in oculo conditiones, & extra oculum, quæ faciunt, ut distinctior imago, aut confusior in retina pingatur.

Et primum quidem perfecte puri humores & pellucidissimi requiruntur, qui vel paulum turbidi amblyopiam faciunt; corneam vero tunicam hic adnumero humoribus. Nunc ejusmodi humores in homine adulto

( *p* ) In musca 1000. HODIERNA, & 14000. HOOKE *micrograph. obs.* 39. GRIENDEL f. 8. JOBLOT in musca notonecta 32000. p. 24. In cancro 1260. PUGET p. 109. In astaco 2500. in pollice quadrato BASTER *uyt spann.* T. II. p. 7. In papillione 34650. PUGET p. 118 t. I. f. 3. & 22000. & ultra LYONNET *chenille* p. 586.

( *q* ) PUGET *Lettre au P. LAMI Journ. des sav.* 1704. n. 5. HOOKE *obs.* 39.

( *r* ) PUGET L. II. p. 62.

( *s* ) LYONNET *chenille* p. 561.

( *s*\* ) *Bibl.* p. 165.

( *t* ) PUGET L. II. p. 88. HOOKE p. 179.

( *u* ) HOOKE p. 179. POWELL p. 78. 79. DURHAM *physico-theol.* p. 459.

( *x* ) PORTERFIELD I. p. 374. 388.

( *y* ) p.



ulto nunquam reperiuntur, cum lens crystallina sponte flavescat, & demum insigniter flava (*z*) sit in senibus. Non ideo flava videmus, uti neque icterici (*a*) flava vident. Si quidem unquam satis certo tunica cornea in icterico flava fuit (*a\**). Piscibus bene multis subflava, & subrubra est cornea, estque fere animalibus nuper natis. Quin tamen per lentem flavam pallidiora omnia videant, & colores minus puros, dubitari nequit, uti in senibus (*b*) debiliores perpetuo objectorum colores, & confusiora omnia percipiuntur.

§. XII. II. *Oculus undique obscurus præter axin.*

Deinde requiritur perfecta camera obscura, ut nulli radii advenire queant, nisi in fundum retinæ, ad exteriora ingressus nervi optici. In homine certe, & in avibus (*c*), & in piscibus, inque porco & lepore inter quadrupeda, summo studio natura omnes lateralis lentis crystallinæ terminos atro pigmento replevit, omnemque internam RUYSCHIANÆ faciem atravit (*c\**), ne aliqui radii, ab ea membrana reflexi, præter illos legitimos, in oculo nascerentur.

An etiam ideo sint facta ea cola, ut nigræ particulæ de sanguine secederent (*d*), & puriores in oculo humores possent generari?

In aliis animalibus quadrupedibus noctu prædam quærentibus (*e*), aut pascentibus (*f*), choroidea membrana utique lucida refulget (*g*), ut in fele

(*z*) p. 397.

(*a*) Videre flava CASSIUS n. 79. SUIDAS III. p. 690. & de se ipso PHARTON medicus ex Academia Cæsarea apud FEHR *de absinth.* p. 130. HOFMANN *med. syst.* T. IV. P. IV. p. 353. de lente flava NOÛET *Leçons de phys.* T. V. p. 505. & PORTERFIELD I. p. 354. Sed negat, in se ipso expertus FEHR l. c. Negavit COLLEADO *advers.* p. 313. & ENTIUS *oper.* p. 505. & SAUVAGES *de suffus.* p. 21. & rarissimum esse MAU-CHARTUS testis est, neque unquam exemplum vidi, neque ILL. WERLHOFFIUS. Non vidit MORGAG. *sed. & caus. morb.* T. II. p. 75. et si ex aliis scriptoribus exempla citat. Consuetudine ajunt animam amittere sensum coloris non naturalis la HIRE l. c. p. 539. SAUVAGES l. c. Verum eo argumento a sensu viridis coloris per vitrum viride visi sensim elanguescentis sumto, non est opus. Icterus enim sola aliqua adnatæ vascula tingit, quæ tenuissima ante corneam versantur, ut ea flavedo sit dilutissima.

(*b*) S. YVES p. 267.

(*c*) Du HAMEL l. c. L. II. c. 5.

(*c\**) De FIEU *physiol.* p. 751.

(*d*) PORTERFIELD T. I. p. 206. II. p. 211. & de Marsupio avium nigro II. p. 273.

(*e*) Fele, ulula.

(*f*) Ruminantia animalia, & imprimis oves & equi, sibi permitti, parum dormiunt, & noctu pascentur.

(*g*) p. 365. 366. ДЕРНАМ l. c. p. 102. PECQUET apud MARIOTTE p. 499.



fele etiam splendor de oculo exfilire videatur, inque lupo ( *b* ), & nonnullis infectis ( *i* ). His in animalibus non possunt penitus puræ ( *k* ) imagines in retina pingi, cum radii, qui in lucidam partem tapeti inciderunt, in alienam retinæ sedem per secundam refractionem conjiciantur. Splendor vero, quem nonnulli homines de oculo suo ( *l* ), ad eorum animalium imitationem, exire crediderunt, & cui amabat AUGUSTUS intuentes oculos submitti, est unice a reflexa de cornea tunica purissima, & tensissima imagine. Nam homini nullum tapetum est ( *m* ), nihilque in oculo coloratum; minus etiam quam alia animalia noctu videt, & equus equitem melius ducit, quam eques equum. Oportebat autem hominem minima accurate videre, eratque ei ratio, & ignis potestas, ut noctu lucem sibi parare posset.

Sed & palpebris nictamus, & pupillæ constringuntur ( *n* ), ut radios inutiles excludamus, & observatum est, oculos profunde latentes, cavos, vehementer obumbratos, optimos esse ( *o* ), ut etiam fuerint, qui interdum stellas viderent eo solo præsidio ( *p* ) adjuti.

§. XIII. *Retina neque nimis sensibilis, neque parum.*

Debet porro certa esse retinæ sensibilitas; non nimis pruriens, neque nimis callosa, eaque ad quodque animal, ejusque vitæ genus peculiari-ter definita. Non potest fieri, ut idem oculus & ad magnam lucem, & ad minimam, etiam ad radios solum violaceos, & rubros perinde sit idoneus ( *q* ).

Si

( *b* ) VALISNER. *opusc. scientif.* II. p. 18. *Oper. suor.* III. p. 216. 217. Acerrime noctu videt ÆLIAN *anim.* L. X. c. 27. De ejus bestię oculis dudum dictum est, ut inspicientes terreant. Ad eorum lucem legi posse VALISNERIUS.

( *i* ) LYONNET *insector. theol.* T. II. p. 27. Sed his alia fulgoris causa est.

( *k* ) PORTERFIELD I. p. 152.

( *l* ) TACK apud TEICHMEYER *anthrop.* p. 254. a CASTRO *ign. lamb.* p. 11. PLEMP L. IV. prop. 58.

( *m* ) MONRO *compar. anat.* p. 8.

( *n* ) JURIN. p. 145.

( *o* ) PORTERFIELD I. p. 181.

( *p* ) IDEM I. p. 182.

( *q* ) HALES *Wisdom of GOD in the formation of man.*



Si nimis parum retina sentit, ut in senibus, inque animalibus ( *r* ), tunc nisi cum magna luce visio confusa est, & debilis. Malum non est infrequens, ut nonnisi fulgente sole homines videant, & in ipso crepusculo, atque ad candelam plane cæcutiant ( *s* ). In China ( *t* ) ajunt frequens esse malum, tum in Barbado ( *u* ), & Maldivensibus ( *x* ), & Moluccis ( *y* ) insulis, & Mosambica ( *z* ), & Brasilia ( *a* ) etiam in Polonia ( *a*\* ). Accidit etiam senibus ( *b* ), & in morbis nonnullis ( *b*\* ). Hinc sanatur irritatione, & vesicatoriis ( *b*\*\* ), omnino ut eodem auxilio ( *b*† ) nervosa amaurosis curatur, & laceffito oculo tentatur a TAYLORO. Ejusmodi oportet esse Brachmanum ( *c* ) oculos, qui in solem fulgidissimum toto die inmoti inspiciant.

Causa communis videtur, quod a fulgido sole perpetuo illustrati oculi negent a minori luce adfici ( *d* ), eademque est causa, quare quisque nostrum ex lucido loco in minus illustratum veniens non videat ( *e* ). Qui lunam inspexit, ei charta alba obscura videtur ( *g* ). Ex inspectione in solem hebetudo visus ( *i* ), & nubeculæ ( *k* ), & nigra puncta ( *k*\* ). In ægypto frequentes cæci

- ( *r* ) Obtusius vident, quibus oculi duri RONDELET p. 48.  
 ( *s* ) *Phil. transf.* p. 159. *Obs. of a societ. at London.* T. I. n. 13. *Mercur de France* 1756. Fevr. VANDERMONDE *Journ. de Méd.* 1756. Mars. HOECHSTETTER *cas.* 7. dec. 9. *Bresl. Samlung* 1720. Sept. 1725. Mart. *Eph. Nat. Cur.* Vol. VII. *obs.* 28. in tota familia. SPORI *Itin. descr.* p. 9. BEANCARD *Cent.* I. n. 10.  
 ( *t* ) *Recueil d'observ. cur.* p. 358.  
 ( *u* ) HILLARY *ndtur. hist. of Barbado.* p. 299.  
 ( *x* ) PIRARD *Voyages* p. 132.  
 ( *y* ) SAAR *Ostind. Reise* p. 39. Ambo WURFBAIN p. 42. 43.  
 ( *z* ) *Hist. de l'Ethiop. occid.* 1684.  
 ( *a* ) RICHSHOFER *Brasil. Reise.*  
 ( *a*\* ) Ex calore æstivo *Primit. Polon.* I. p. 236.  
 ( *b* ) KRAMER *morb. milit.* I. p. 92. SAUVAGES *amblyop.* p. 41.  
 ( *b*\* ) DEFIU *physiol.* p. 790.  
 ( *b*\*\* ) SAUVAGES l. c.  
 ( *b*† ) STORK *ann.* I. p. 57. Setaceo WEPFER *cicut.* p. 127.  
 ( *c* ) PLINIUS *hardeni* L. VII. p. 372.  
 ( *d* ) HILLARY l. c. p. 301.  
 ( *e* ) MUSSCHENBROECK n. 1244. *Giorn. de letter. suppl.* I. p. 134. PORZ  
 TREF. II. p. 190.  
 ( *g* ) La HIRE p. 541.  
 ( *i* ) SALMUTH L. III. n. 83. SOMIS *raggion* p. 42.  
 ( *k* ) MAITREJEAN p. 275.  
 ( *k*\* ) *Mém.* 1743. p. 156. BIRCH T. IV. p. 241.



cæci ( *l* ). Ex nivis splendore multi milites visum amiserunt ( *m* ). Ex fulminea nocte ophthalmiæ pene epidemicæ ( *n* ). Nocturnum etiam lumen multo debilius est ( *n*\* ). *Johannes* SWAMMERDAM ( *o* ), post multum microscopiorum usum, videbat quidem sub meridiano sole: postea non satis habebat in luce diurna claritatis, ut videret. Sed cur Gallinæ ( *o*\* ) nyctalopes sint.

Alia causa est in pupilla angusta, ut parum lucis admittat ( *p* ), & parum mobili ( *q* ).

Nyctalopiam hanc in minori luce ad videndum ineptitudinem recte dixit *Antonius* MAITREIEAN ( *r* ), & *Jac.* GUILLEMEAU ( *s* ), interque veteres ORIBASIUS ( *t* ), & *Alexander* TRALLIANUS ( *u* ). Amblyopiam crepuscularem SAUVAGES ( *u*\* ).

Nam alii Hemeralopiam vocant ( *x* ); & olim HIPPOCRATES ( *y* ), & PRISCIANUS ( *z* ), & JANUS DAMASCENUS ( *a* ); & GALENUS ( *b* ) diverso modo ea voce est in diversis operibus usus.

Huic contrarium morbum facit retina nimis pruriens, nimisque sensilis ( *c* ), hemeralopiam nempe, in qua interdiu minus bene, & noctu rectius videmus. Is morbus natus est nonnullis animalibus noctu præ-

Q q q 2

danti-

( *l* ) PERRY.

( *m* ) XENOPHON *αναβασις*. L. IV. HANAWAY *it. persic.* T. I. p. 165. de cursoribus regis add. BOYLE *de color.* p. 100. 101.

( *n* ) Mille in una nocte WOLF *obs.* p. 53.

( *n*\* ) THOMIN. p. 41. 42. Vitra foci 18. pollicum non plus noctu dant claritatis, quam vitra 20. poll. interdiu.

( *o* ) In *vita* a BOERHAAVE scripta.

( *o*\* ) SAUVAGES *ibid.*

( *p* ) La HIRE p. 587. WHYTTP. 144. GORTER *chir.* 1080.

( *q* ) WHYTTP. l. c. *Journ. de Médec.* 1756. m. Mars.

( *r* ) P. II. c. 3.

( *s* ) *Morb. ocul.* c. 10.

( *t* ) *Synops.* L. VIII. c. 46.

( *u* ) L. II. c. 6.

( *u*\* ) *De amblyopia* p. 12.

( *x* ) BOERHAAVE *morb. ocul.* p. 125.

( *y* ) WEDDEL *nyctalop.* p. 5.

( *z* ) n. 19.

( *a* ) L. IV. c. 10.

( *b* ) In *Introductione* Nyctalops est qui noctu videt. In *method. medend.* c. III. qui noctu non videt, dicitur nyctalops. Conf. CAGNATUM *obs.* L. II. c. 9.

( *c* ) BOERHAAVE *morb. ocul.* p. 125. PORTERFIELD II. p. 198. SAUVAGES. MAITREIEAN l. c.



dantibus, quibus cum retina procul dubio sensili perampla & convexa cornea (*d*), magna pupilla (*e*), pellucidissimi humores (*f*), & magna lens crystallina & pellucidissimi humores (*g*) conjunguntur, aut certe earum conditionum adsunt aliquæ. Noctu vident insecta, quia non habent iridem (*h*), & radii liberrime in intimum oculum veniunt. Scarabæus nyctalops prægrandem habet nervum opticum (*i*). Opossum lente globosa alto sole minus bene videt (*k*). Est *Amblyopia meridiana* SAUV. (*k*<sup>\*</sup>).

Integræ etiam gentes nyctalopes sunt, quæ rosea sunt choroidea, rosea iride, lucis ergo nulla parte suffocata. Ejusmodi sunt Leucæthiopes (*l*) Africani (*m*), & Americani (*n*), & Asiatici (*o*): toto die enim oculi eorum lacrumantur, ut noctu recte videant. Omnino probabile fit ejusmodi esse heliophobos cuniculos cum choroidea rubra (*p*).

Passim etiam alii homines fuerunt, qui noctu melius viderent (*q*), eorumque aliqui ex inflammatione (*r*); ut etiam ea sublata sanarentur (*s*). Ita homo a vino calidior nocte literas legebat (*t*); & qui parva objecta non bene videbat, vidit post oculi inflammationem (*u*).

Idem

(*d*) Hooke posthum. in ulula.

(*e*) Feli la Hire apud du Hamel p. 323. accideris de la vue p. 612. PORTERFIELD II. p. 209.

(*f*) Conf. NOBLETT T. V. p. 85.

(*g*) SCHNEID vis. vitiat. p. 36. PORTERFIELD II. p. 198. In fele ROBINSON of the spleen p. 124. 125.

(*h*) SWAMMERDAM biblior. p. 502.

(*i*) IDEM p. 338.

(*k*) Phil. transf. n. 290. omnino uti in tenebris lente convexa adjuti legimus, quando nudo oculo non possumus nunc literas distinguere Hooke method. &c. p. 13.

(*k*<sup>\*</sup>) p. 18.

(*l*) LUDOLF ad Hist. æthiop. p. 197.

(*m*) v. de GREUBEN Guineische Reise p. 78. 96. Hist. de l'Acad. 1744. n. 5. 1734. n. 7. BUFFON T. III. p. 503. Nigre blanc toto libro

(*n*) WATER of the isthmus p. 134. 136. bistoir. de l'Acad. 1734. p. 15. 16. Venus physique &c.

(*o*) CAMELLI Phil. transf. n. 307. Venus phys. In insula Java dicuntur Chacrelas BUFFON bist. nat. T. III. p. 399.

(*p*) DUDDELL p. 145.

(*q*) PLIN. L. VII. c. 1. in Albania glauci. In Anglia & Barbados HILLARY p. 302. WALDSCHMID Epist. de rebus medicis & philosophicis. BEANCARD Cent. II. n. 13. BARTISCH Augendienst P. VII. c. 13. BOYLE obs. post caus. fin. XI. Phil. transf. n. 164.

(*r*) LeCAT p. 311. ex Journ. des savans. Epb. Nat. Cur. Dec. I. ann. I. obs. 92. THUMMIG Versuch einer gründl. Erläuterung &c. SAUBER obs. med. pract. 3. NEBOER vom Schmerze n. 48.

(*s*) THUMMIG l. c.

(*t*) WILLEIS accens. sang. p. 100.

(*u*) La Hire p. 588.



Idem malum, & lucis intolerantia ex sensibilitate per diuturnas tenebras nata ( $\alpha$ ) provenit, vel ex pupilla lata ( $\gamma$ ), aut immobili ( $z$ ).

Ob sola candida cilia aliquando id malum adfuit, ut atratis pilis homo melius videret, si fides potest adhiberi ( $a$ ).

Minori gradu, sed nimis tamen sensibili retina, esse credas animalia, & homines, qui interdiu vident, sed tamen etiam noctu.

In hominibus exempla numerosa sunt. TIBERIUM ajunt noctu vidisse, quando expergiscebat: tum idem privilegium fuisse eruditis viris bene multis: ASCLEPIODORO ( $c$ ), SCALIGERO patri & filio ( $d$ ), CARDANO ( $e$ ), CÆLIO RHODIGINO, J. Baptiste PORTÆ, SABELLICO, S. PETITO ( $f$ ), TACKIO ( $g$ ), D. de MAIRAN ( $h$ ), aliis obscurioris famæ hominibus ( $i$ ), quorum nonnulli dicuntur quindecim minutis ( $k$ ), & integris horis noctu legisse.

Ejusmodi homines credibile est cum sensibili retina fuisse myopes, quibus cornea convexior ( $l$ ), plus receperit in eadem luce radiorum ( $m$ ): & tamen pupillam habuisse egregie mobilem, ut a diurna luce se defenderet. Pupilla enim ex rotunditate in fissuræ angustam speciem ( $n$ ) contracta, felis oculum interdiu tuetur, & eadem ex fissura in rotunditatem dilatata noctu, quantum est satis, lucis recipit. Non tamen ejusmodi in rimam pupillam contrahi necesse est ( $o$ ), cum ululæ pal-

Q q q 3

pebra

( $\alpha$ ) BOYLE l. c. obs. 14. Lond. Mag. 1735. p. 627.

( $\gamma$ ) SCHEID. l. c. la HIRE p. 612. SAUBER ib. FOURNIER, ni fallor, Journ. Encyclop. 1756. Aug. neque enim ad manus est. GORTER Chir. l. c.

( $z$ ) HEURMANN II. p. 495.

( $a$ ) PORTERFIELD I. p. 10. ex MONALTO.

( $c$ ) BARTHOLIN. de luce anim. p. 206.

( $d$ ) IDEM l. c.

( $e$ ) Variet. p. 315. contradict. L. II. p. 47.

( $f$ ) De motu anim. spont.

( $g$ ) L. c.

( $h$ ) Apud EARTHES Decad. quest. p. 4.

( $i$ ) GEMMA charact. p. 124. de CASTRO ign. lamb. p. 25. 114. R ASCZYŃSKI hist. nat. Pol. I. p. 339. Mém. avant. 1699. II. p. 21. BIRCH T. IV. p. 387. Conf. MARIOTTE p. 319. BRIGGS c. 5. BOYLE de natur. determ. effluv. p. 131. Bresl. Saml. 1720. m. Aug. VALISNERI oper. T. II. p. 16.

( $k$ ) Virgo Parmensis Giorn. di Parma 1687. p. 16. 214..

( $l$ ) Ut in ulula HOOKER posth. p. 126.

( $m$ ) BORRHAVE morb. ocul. p. 185.

( $n$ ) PORTERFIELD II. p. 269. la HIRE p. 612. KRUGER physico. theol. Ged. p. 28.

( $o$ ) PORTERFIELD II. p. 272.



pebra tertia sufficiat. Lucidam Choroideam in aliis animalibus aliquid conferre creditur (*p*).

Id nisi præsidium haberent ex tenebris redditi continuo excæcarentur (*q*), aut certe percellerentur quasi fulmine tacti (*r*), aut animo linquerentur (*s*), & vehementer dolerent (*t*). Inter cauti Tyranni, DIONYSII (*u*), tormenta erat, hominem in carcerem tenebri-  
cosum trudere, deinde subito luci exponere fulgidæ. Pupilla enim in tenebris vehementer dilatata, non ita subito stringi potest, & lux ad sensissimam retinam subito admissa, teneram nerveam pulpam pene amburit. Ideo etiam iis, quibus a deposita cataracta intus oculus lucem admittit, necessaria sunt umbracula (*x*). Nam & bonus oculus, qui clausus fuit, quando aperitur, fulgorem quasi adamantis videt (*y*), a luce reduci.

In perfectis enim tenebris ita dilatantur etiam homini pupillæ, ut denique in subterraneo carcere homo ille BOYLEANUS (*z*) mures ipsos distingueret, obscuri coloris animal. Hinc etiam pro nocturnis observationibus Telescopicis minor lux requiritur (*a*). Et oculo, qui relaxatus fuit, objectum nitidius adparet, quam per telescopium (*b*). Ea est ratio, cur ex tenebris in lucem insipientes melius videamus, quam ex luce respecturi in tenebras. In tenebris enim ampla pupilla est, lucido loco angusta. Ex cuniculo prospicienti diurnum lumen fulgere videtur.

Sæpe autem iniquum duorum oculorum robur esse legimus, ut alteri oculo flava (*c*) aliter quam alteri adparerent, & viridia subcærulea viderentur: alterive rubicundiora, nempe magis sentienti (*d*). Dexter nempe fere callosior (*e*).

#### §. XIV.

- (*p*) PECQUET apud MARIOTTE p. 495. BRIGGS c. 3.  
 (*q*) LA HIRE p. 613. Diu cæci manserunt Lond. Mag. l. c.  
 (*r*) GALILÆUS apud BARTHOLINUM l. c. p. 69. add. BOYLE *final. caus. obs.* 14.  
 (*s*) KLOECKHOF *morb. anim.* p. 53.  
 (*t*) SOMIS *raggionam* p. 42. cum tremore pupillarum & visu obtusiori. Dolor capitis vehemens & glaucoma S. YVES p. 267.  
 (*u*) TROPHILUS L. IV. c. 19.  
 (*x*) SUE *bandages* p. 266.  
 (*y*) PORTERFIELD II. p. 115.  
 (*z*) *Post l. of final causes obs.* 14. Habet simile exemplum SAUVAGES *amblyop.* p. 4. sed scena in arce *bastille* ponitur.  
 (*a*) S'GRAVEZANDE n. 3224.  
 (*b*) PORTERFIELD I. p. 128.  
 (*c*) ROUHAULT c. 27 n. 6.  
 (*d*) PORTERFIELD I. p. 131.  
 (*e*) p. 482. 483.



§. XIV. *Punctum visionis distinctæ.*

Perfectio quidem visus in eo est, ut imago & maxima sit, ut multas in ea partes distinguamus, & tamen distinctissima, ut cujusque partium imaginis proprietates innotescant, & vividissima, ut anima, quoad ejus fieri potest, quam potentissime adficiatur, neque tamen lædatur oculus.

Denique ad eum optimum visum requiritur, ut corpus, cujus imaginem in retina pingi oportet, ad eam ab oculo distantia sit, in qua vires refringentes oculi simul sumæ focum radiorum ab eo corpore advenientium faciant cadere in retinæ sedem sensibilem, in axin nempe & vicinam proxime oculi sedem.

Facile enim ex prioribus intelligitur, quo longius radii adveniunt, eo magis esse parallelus; eo minus ergo differre ab axi, & eo minoribus viribus corneæ, & lentis crystallinæ in focum cogi. Ut enim corpus magis distat, ita sub minori angulo radii adveniunt (*f*).

Contra si corpus conspicuum valde vicinum fuerit, radiorum ab eo advenientium angulus est major, & adeo magis divergentes in oculum incidunt, & viribus egent refringentibus majoribus, convexiori cornea tunica, lente crystallina magis gibba, his omnibus densioribus.

Nunc cuique homini ejusmodi est distantia radiorum a corpore conspicuo advenientium, a qua dum in oculum penetrant, focum in retina faciunt. Id vocatur *punctum visionis distinctæ*.

Adparet consideranti, si remotius corpus fuerit, quam id punctum, tunc magis parallelus radios prius convergere in focum, quam retinam adtingant, sic ex foco radii iterum disperguntur: advenient ergo sparsi in retinam, & maculam facient, non focum. Inde visio confusa (*g*).

Contra si nimis propinquum id corpus fuerit, in quod inspicimus, radii ab eo nimis divergentes advenient, neque sufficiunt oculi vires, ut in unum punctum conveniant, focus ergo erit pone retinam, & in eam radii advenient, nondum collecti. Proxima nemo distincte videt, neque ea, quæ oculum contingunt (*b*).

Nunc

(*f*) p. 448. 449.

(*g*) S'GRAVEZANDE n. 3088. SCHEINER p. 173.

(*b*) BOERHAAVE *morb. oculi*. p. 159.



Nunc quidem & in diversis hominibus id punctum diversum est, & in eodem sæpe homine (i) duo oculi diversas vires habent, ut alter remota, propiora alter rectius videat. Alterum oculum 7. alterum 13. pollices (k) pro ejus puncti distantia habuisse: & in alio exemplo 12. pollicum & trium eas distantias fuisse (l), idonei exstant auctores. In strabonibus diversitas est a 20. unc. ad 3. pedes (m), & a 4. pedibus ad 12.

Ad  $5\frac{3}{4}$ , (n), sex (o), sex cum dimidio, & septem (p) pollices, & septem cum dimidio, & octo (q) in bono oculo punctum visionis distinctæ ponunt, & in juvenibus ad quinque (r). A 5. ad 7. pollices JURIN (s); ad pedem la HIRE (t).

Cum vero aliter parva subjecta melius videantur, aliter magna, & illa remotius oporteat ponere, hæc propius, est aliqua visionis distinctæ in eodem homine latitudo (u). A novem uncis ad quinque videbat Cl. PORTERFIELD (x), alii ab 8. ad 20. pollices posuerunt (y). Inter pedem & ultra, & semipedem S. YVES. Si valde lucida fuerint objecta, etiam ad 14 pedes unc. 5. distincte videbat JURINUS (z).

Præstiterit autem ad usus humanæ vitæ habere oculos æquales, & simul latitudinem inter diversa puncta visionis distinctæ maximam (z\*).

#### §. XV. Myopes.

Quibus punctum visionis distinctæ valde parum ab oculo distat, ii Myopes vocantur (a), a connivendo, cum enim iis cornea ampla, pupilla

(i) J. Alb. BORELLUS in diarie TINASSI ann. 1669. PHIL. la HIRE p. 542. s'GRAVEZANDE n. 3098. BUFFON Mém. de l'Acad. 1743. p. 239. RIZZETTI suppl. al Giorn. de letter l. p. 139. Sinister oculus Sebastiano le CLEEC presbyops dexter myops. Systeme &c. art. 27.

(k) LEIDENFROST apud ZIMMERMANN variat.

(l) THOMEN. p. 77.

(m) BUFFON Mém. de 1743.

(n) HELSHAM fin.

(o) LYONNET Verbaud. van de holland. maatschappy T. III. p. 402. MARTIN. dioptric. p. 144.

(p) PORTERFIELD l. p. 419.

(q) HUGENIUS & WOLF dioptr. n. 408.

(r) LYONNET l. c. anno 35. Quinque JURIN. p. 144.

(s) p. 134.

(t) p. 585.

(u) Literæ majores distinctæ sunt, quando parvæ jam confusæ adparent JURIN. p. 116.

(x) T. I. p. 419. & prius a sex ad octo in Eff. of Edimb. IDEM ultimum limitem posuit ad 227. pollices.

(y) BUFFON l. c. p. 233.

(z) JURIN. p. 136.

(z\*) BUCCAN Mém. de 1743. p. 242.

(a) SUIDAS III. p. 588.



pupilla lata sit, & multum lucis ad retinam veniat, solent se palpebris & superciliis a nimia luce tueri. Recte puto primus AETIUS defini-  
nit myopes esse, qui parva & proxime oculis admota vident ( *b* ).  
Est eorum punctum visionis distinctæ a contactu nasi ad quatuor  
pollices.

Myopibus ea omnia majora sunt, quæ lucem recipiunt, & confrin-  
gunt: cornea membrana magis convexa ( *c* ), ut memini in myopum in-  
tegris familiis nudo oculo me hoc vitium distinxisse.

Qui oculis sunt prominentibus non possunt longe adspicere ( *d* ).  
Infantes ob corneam convexiorem myopes sunt ( *e* ).

Porro ad myopiam faciunt lens crystallina gibba magis ( *f* ), ut ejus  
convexitates sint partes sphaeræ minoris; eademque densior; forte &  
alii humores densiores ( *g* ). Utraque causa potest conjungi ( *h* ).

Oculus demum ( *i* ), ab incumbente humorum pondere, & a sanguinis  
in oculos congestione ( *k* ) longior, ad id vitium plurimum confert, quæ  
forte causa fuerit, quare artifices in minutis operibus occupa-  
ti ( *k*\* ), ut figillorum scalptores, deinde homines multum legentes ( *l* )  
frequenter myopes sint. Estque hæc forte causa, cur in gentibus bene  
moratis & eruditis ( *m* ) plures myopes dentur, quam in venatorum, &  
montiva-

( *b* ) L. VII. c. 45.

( *c* ) HELSHAM p. 326. ROUHAULT l. c. 31. NEWTON p. 13. BOERHAAVE *morb. ocul.* p. 175. HAMBERGER *physiolog.* p. 535. PORTERFIELD l. p. 168. MUSSCHENBROECK. *le Cat* p. 493. KENNEDY p. 24. 25. Oculum vocat nimis tensum SMITH n. 89.

( *d* ) ARISTOTELES *gener. anim.* l. V. c. 1.

( *e* ) BOERHAAVE *morb. ocul.* p. 175. BUFFON *Mém. de l'Acad.* 1743. p. 241. & *hist. natur.* III. p. 331. JURIN p. 147. PORTERFIELD l. p. 168. *Essays* T. IV. p. 234.

( *f* ) KEPLER *dioptr. prop.* 72. SCHEINER p. 22. 131. 163. SANCTOR. in l. *Fen.* p. 763. HAMBERGER l. c. CHERUBIN p. 4445. STURM *de presbyop. & myop.* p. 32.

( *g* ) Turbidi PLEMP. p. 163. du HAMEL *hist.* p. 38.

( *h* ) La HIRE p. 532. HAMBERGER.

( *i* ) BOERHAAVE *morb. ocul.* p. 174. STURM l. c. p. 33. KRUGER *physiol.* n. 368. la HIRE p. 559. SCHEINER l. c. JURIN p. 146.

( *k* ) *Hamb. Magaz.* T. XXIII. p. 279.

( *k*\* ) Eam causam esse mali KEPLER l. c. *prop.* 64. Ab ea augeri SMITH *remarks* p. 10. STURM p. 32. Addit JURIN, ex sua hypothese, sphincterem uveæ robustiorem reddi *ibid.*

( *l* ) KRUGER.

( *m* ) Plures nunc myopes quam olim HALLE *Geschichte der Thiere* p. 107.



montivagorum nationibus, aut in Americæ indigenis (*m*\*). Hinc aliqui demum circa 25. annum (*n*) myopes fiunt, oculo ab his causis sensim longiori facto.

Non repugno a copia humoris vitrei, retinam a lente crystallina separantis, posse fieri myopes (*o*).

Plerumque etiam latiori sunt pupilla (*p*), humorum enim copia pupillam dilatat, paritas restringit (*q*).

Ex omnibus hisce causis fit, ut remota obscura videant, proxima distincta. Nam *imago* illorum, quæ a radiis pingatur pene parallelis (*r*), a sano quidem oculo in retinam cogeretur. Nunc myopis oculus plus habet virium refringentium, convexitatem, & densitatem majorem; imago ergo, sive focus, fit prius, quam in retinam radii perveniant; sed ex foco radii collecti iterum disperguntur. Remota ergo confusa vident.

Proxima iidem optime & distinctissime cernunt, quia proximorum angulus, quo in oculum incidunt, magnus est, & radii valde divergunt, in quibus uniendis vires illæ nimix oculi myopis utiliter consumantur. Proxima subtilissime video, sæpe cum aliis expertus.

Majora videre dicuntur (*s*), & credas, ob corneæ convexitatem (*t*); quæ altera causa est, quare subtilius videant. In majori imagine plures partes distinguuntur.

Minori luce egent (*u*), quia ob eandem corneæ & pupillæ amplitudinem, plures ipsi radii in oculi intima recipiuntur, & ob retinæ acutiorem sensum. Myopes sunt populi novæ Hollandiæ, quia ob muscarum vim perpetuo convivent, unde retina tenerior (*x*).

## §. XVI.

(*m*\*) *Lettres sur les physionom* p. 100.

(*n*) La Hire p. 559. PORTERFIELD II. p. 10. Conf. HAMBERGER *vit. ocul.* p. 191. Se ipsum nunc absque vitro convexo videre, quo prius usus esset, pistor le CLERC l. c. art. 27.

(*o*) La Hire p. 558.

(*p*) PORTERFIELD I. p. 178. BUFFON *Histoire natur.* T. III. p. 331. la Hire apud dū HAMEL p. 310. SAUVAGES *amblyop.* p. 20. Addit etiam in opticis instrumentis, quando apertura diaphragmatis latior fit, focum esse propiorem p. 24.

(*q*) p. 376.

(*r*) p. 448. 449.

(*s*) BOERHAAVE *morb. ocul.* p. 189. Minora videre BUFFON T. III. p. 329.

(*t*) Inter ejusdem hominis duos oculos myops majora videbat LEIDENPROST l. c. PORTERFIELD T. II. p. 368.

(*u*) BOERHAAVE *de morb. ocul.* p. 185. PORTERFIELD *Ess.* T. IV. p. 230.

(*x*) DAMPIER *travels* l. p. 521.



§. XVI. *Remedia mali.*

Vel ipsa frequentia morbi facit, ut veniam sperem, si paginam his forte non satis physiologicis contemplationibus dederō.

Prima medela est, quam ab ipsa ætate sperare licet, si a convexa nimis aut lente crystallina, aut cornea tunica malum ortum fuerit.

Cum enim per ætatem omnes partes firmæ corporis animalis indurentur, fluidæ vero diminuuntur, paulatim diminuto humore aqueo, diminuta parte aquea vitrei humoris, diminuto etiam humore lentis crystallinæ & corneæ, fibræ solidæ, in arcus magis convexos prius flexæ, nunc breviores abeunt in arcus, minus convexos, atque adeo & cornea, & lens crystallina complanatur. Hinc infantes myopes, paulatim, dum adolescunt, remotiora vident (*y*).

Non quidem eo usque ea curatio perficitur, ut qui in juventute myops fuit, facile (*z*) vel mediocrem visum (*a*) recuperet, vel ad presbyopiam usque producat. Nam cum per easdem causas & humores densentur, & membranæ, sintque ut densitates, ita fere vires refringentes corporum, ita eadem ætas, quæ partem morbi minuit, auget alteram. Nocet etiam, quod pupilla minus nunc mobilis sit, & nimiam lucem admittat, ut confuse videant, & cum debilitate (*b*): nocet quod retina fiat callosior (*b\**). Quare meliores myopes, quibus pupilla parva (*c*). Id vero obtinetur utique, ut malum non augeatur. Hinc constantes myopum oculi, olim jam *Conr. Gesnero* (*d*), dicti. Mei certe, post plurimum usum microscopii in adfulgentibus solis radiis adhibiti, & post lectionem & scriptitationem non mediocrem, nihilo sunt deteriores facti, quam erant juveni.

Deinde adjuvantur myopes abstinencia ab artificiis cominus laboriosis, & efficiendo, ut radios quam maxime parallelos accipiant. Ita enim si quidem aliquæ sunt in oculo vires, quæ oculum breviorē reddant, reddent paulatim, & malum non augebitur, & demum diminuetur. Obtinetur autem id officium vel inspiciendo per tubos denigratos (*e*) abs-

R r r 2

que

(*y*) BUFFON *Mémoire de l'Académie* ann. 1743. p. 241.

(*z*) Fieri tamen THOMIN. p. 120. seqq.

(*a*) Negat meliores fieri AYS COUGH *of the eye* p. 13. Rarum esse la HIRE p. 627.

(*b*) BOERHAAVE *de morb. ocul.* p. 193.

(*b\**) Eo in statu vitrum concavum non juvat la HIRE p. 553.

(*c*) De la HIRE p. 562.

(*d*) *Epist.* p. 136. b.

(*e*) *Phil. transf.* n. 37.



que ullis vitris inanes: vel absque tubis adtentione in distantia corpora directa, & ejusmodi vitæ genere, ut vel remotissima inspiciant, vel certe, quæ inspiciunt, ponant in ultimo limite suæ visionis distinctæ (f).

Juvantur etiam iis omnibus, quæ oculum planiorem reddunt, etiam digito (g): potissimum vero extracta vel deposita lente (h) crystal-  
lina, quo fit, ut vires radios in oculo cogentes magna parte sui di-  
minuantur.

Præsens etiam est solatium per exiguum foramen (i) videre. Ita ex proximo quidem inspiciunt, ut solent, & tamen distinctius vident, quia pauciores nunc radios accipiunt, quos ejusmodi foramen transmiserit.

Dudum (k) tamen cogitatum est de præsentiori remedio, quod equi-  
dem morbum non tollit, &, nisi caute adhibetur, lædi potius oculum;  
sed facit tamen, ut possint myopes remota corpora minus confuse videre,  
hinc plantas decerpere, homines obvios agnoscere, & quæ sunt ejus-  
modi. Nempe, cum vitra cava radios dispergant, & extrorsum faciant  
divergere, faciunt ut angulus exterior ab objecto cum oculo major sit,  
quam angulus interior, qui fieret absque lentis cavæ usu (l); faciunt  
adeo ut a remotis corporibus plane similes adveniant, quales veniunt a  
proximis, ut magnos nempe cum cornea tunica angulos faciant; hinc  
magnas & nimias illas vires refringentes oculi myopis consumant, fo-  
cusque remotius (m) nunc & in retina conveniat. Minor tunc est pi-  
ctura, & minus lucida, cum pars radiorum dispersa perierit (n), cæ-  
terum ad incantamenti modum nitida. Nunquam certe vel decem stir-  
pes didicissem nominare, si absque eo fuissém præsidio: cum eo & mi-  
nimas detexi, & muscos & fungulos ægre conspicuos.

Oculi vero ab eorum vitrorum usu dolent, & sensim occallescent;  
quod focus ille exiguus vividus tamen sit, ob radios in punctum coeun-  
tes,

(f) STURM *presbyop. & myop.* p. 38. HAMBERGER *ocul. vit.* p. 199. seqq. PORTER-  
FIELD II. p. 15.

(g) La HIRE *accidens de la vue* p. 562.

(h) WOODHOUSE *de cataract. & glaucom.* p. 64.

(i) SCHEINER p. 141. 149. PORTERFIELD *Ess. of Edimb.* T. IV. p. 233. *of the eyes* II.  
p. 42. NOLLET *leçons de physique* T. V. p. 487. SAUVAGES *amblyop.* p. 31.

(k) Utebatur GESSNERUS conspicio, quo minuiora adparent l. c.

(l) KEPLER *prop.* 45. 46. S'GRAVEZANDE n. 3144 &c. & 3140. la HIRE p. 556.  
HELSHAM p. 334.

(m) Id etiam præstat in camera obscura, si inter lentem convexam & picturam in-  
terponantur.

(n) SCHEINER p. 160. HELSHAM p. 334.



tes, qui in maculam confluebant. Quare cavendum est a vitris nimis concavis, quæ morbum augent ( *o* ), dum retinæ sensum minuunt. Quo minus enim sentit retina, eo magis eget acutissimo penicillo, ut nervi efficaciter emoveantur. Artifices, qui in subtilissimis corporibus occupantur, utuntur vitris convexis, longi foci, iisque oculos credunt conservari ( *p* ).

Uti tota hæc theoria mire ab hominum industria perfecta habetur, ita & accurate tenemus mensuram sphaeræ, cujus oportet partem id vitrum esse, quo quisque myops distinctissime videt. Si nempe utraque facies cava fuerit, radius debet æqualis esse distantiae visionis distinctæ, & duplus ejus ( *q* ). si hinc plana fuerit, inde concava. Longior formula alia est, distantia nempe visionis distinctæ oculi armati, divisa per differentiam utriusque distantiae armato & inermi oculo aptæ ( *r* ).

Denique vires oculorum duorum hominum aut ejusdem hominis in diversis vitæ suæ temporibus, explorantur inspiciendo in objectum remotum sex certe pedibus, quæ proxima distantia sit, a qua radii hætenus paralleli adveniunt, & oculos dirigendo per duo foramina exigua chartæ. Ita oportet experiri, num nudo oculo corpus idem simplex videat; num convexo vitro aut concavo opus habeat, ut videat simplex; cujusque demum radii id vitrum feligere sit necesse. Ita & presbyops ex radio vitri convexi, quo egebit, suorum oculorum vitium metietur, & ex vitri concavi radio myops: eruntque oculorum comparatæ vires in ratione inversa eorum radiorum ( *s* ).

#### §. XVII. *Presbyopia.*

Senibus, nisi myopes fuerint, hoc vitium commune est, ut corpora valde remota recte videant, cæcutiant in proximis. Ajunt, nescio an per experimenta, artificia, quæ in remotis objectis occupantur; id vitium facere ( *t* ).

R r r 3

vexa

( *o* ) SMITH *remarks* p. 9.

( *p* ) THOMIN. p. 16.

( *q* ) HUGEN. *prop.* 32. BOERHAAVE *de morb. ocul.* p. 129. Pro valde remotis HELSHAM p. 328.

( *r* ) HELSHAM p. 327. PORTERFIELD II. p. 41.

( *s* ) Conf. la HIRE p. 626. *Journ. des sçavans* 1685. n. 21. Optimum vero oculum vocabat la HIRE, qui ad quatuor pollicum distantiam objectum simplex videret.

( *t* ) KEPLER *prop.* 64. STURM *de presb. & myop.* p. 35.



vexa ( $u$ ), lens crystallina ( $x$ ) planior, oculus brevis ( $y$ ), ut fundus retinæ corneæ vicinus sit. Dicitur autem presbyops, cujus punctum visionis distinctæ est ad pedem: inde vero ad duos ( $z$ ), & tres ( $a$ ) pedes, & paulo ultra ( $b$ ), in aliis & aliis extenditur.

Causa mali ex converſa priorum manifesta est. In oculo plano vires refringentes sunt minores, est enim sphaeræ majoris portio ( $c$ ), cujus focus longius distat. Ex exiguae vires sufficiunt, quando radii eminus adveniunt, ut pro parallelis haberi queant ( $d$ ), atque adeo a vi minori cogi possunt. Proximorum corporum radii adveniunt sub angulo majori, & magis divergunt: focus retinæ adeo, in quo coguntur, remotior est, & cum oculus præterea brevior sit, cadit is focus pone retinam; eamque tunicam radii prius ( $e$ ) feriunt, quam sint in penicillum uniti. Etiam in camera obscura vitra planiora remotiorem chartam exigunt ( $f$ ).

Solet præterea senibus ex defectu humorum ( $f^*$ ) pupilla angustior ( $g$ ) esse, ita minus luminosa vident, uti debilior est impressio pupillæ parte obstructa ( $h$ ). Pupilla etiam instrumentorum optidorum decreſcente focus remotior fit ( $h^*$ ).

Sed

( $u$ ) In se ipso JURIN p. 143. BAYLE p. 474. le CAT p. 494. SCHEID *vis. vit.* p. 25. Addit Cl. BUFFON corneam duriores, quæ difficilius gibba fiat T. III. p. 332. Dare tamen presbyops cornea convexa la HIRE p. 584.

( $x$ ) Solam hanc causam veteres habent, ut in myopia solam etiam lentis crystallinæ convexitatem nimiam, ut SCHEINERUS p. 113. PLEMP L. I. c. 17. L. IV. p. 165. HONORATUS FABRI l. c. p. 92. BRIGGS. SCHOTTUS. WOLF *dioptr.* n. 399. 402. CHERUBIN p. 44. 45. Habent, sed non solam, nuperi le CAT p. 494. STURM de *presb. & myop.* p. 35. BAYLE, la HIRE p. 584. BOERHAAVE &c. Plus ei tribuit de la HIRE p. 585.

( $y$ ) CARTES *dioptr.* c. I. p. 96. PLEMP L. IV. *prop.* 40. L. V. c. 27. & olim PLATER, & WOLF n. 398. 401. le CAT p. 494. STURM l. c. BUFFON III. p. 332.

( $z$ ) PORTERFIELD T. II. p. 420.

( $a$ ) PLEMP. *prop.* 55.

( $b$ ) JURIN; focum sibi ad 38. & 39. uncias extendi p. 148.

( $c$ ) p. 456.

( $d$ ) p. 448.

( $e$ ) SCHEINER l. c. s'GRAVEZANDE n. 3139. 1

( $f$ ) SCHEINER p. 127.

( $f^*$ ) La HIRE apud du HAMEL p. 320. Aqueus humor diminutus presbyopiæ causa est MAITREJEAN p. 90. add. PORTERFIELD I. p. 164. 165. Hæc est ratio, cur senibus, cum obtuso sensu non ampla pupilla sit IDEM p. 175.

( $g$ ) PORTERFIELD *Edimb. Ess.* T. IV. p. 254. La HIRE p. 587. Ponit inter causas presbyopiæ SAUVAGES l. c. p. 33. Mali presbytæ quibus pupilla angusta est la HIRE p. 563.

( $h$ ) PLEMP L. IV. *probl.* 24.

( $h^*$ ) Adde SAUVAGES l. c. p. 24.



Sed etiam lens ipsis opaca (*i*) est, & colorata, ut debilior visus sit, & lux ægrius penetret.

Denique ex ipsa natura senii retinæ sensus minus acutus est: ita denovo minus distincte vident, cum & nondum collecti radii in retinam veniant, quam debilius percutiunt, & ea ipsa tunica præterea minus sit sensilis (*k*). Inde forte presbyopia fomentis vesicas adtrahantibus sanata est (*l*).

Iterum hoc malum per ætatem augetur, dum lentis crystallinæ, & corneæ membranæ laminæ vim distendentem vasorum & humorum superant, quorum alioquin portio decrevit, ita eæ membranæ ex convexitate in planitiem se contrahant (*m*).

Etiam per consuetudinem in remota intuendi ligamentum ciliare robustius, lentemque planiorem fieri, sic malum increescere JURINUS suspicatur (*n*).

Contra etiam mali progressus a sua causa moram accipit, cum ex ea ipsa senili siccitate, densitas membranarum & lentis ipsius, & vis refringens augeatur. An forte ex ejusmodi emendatione factum est, ut subinde presbyopes sponte convaluerint. Non rarum est, vitris convexis bene nunc carere, quibus juniores eguerint. Coram video virum amplissimo magistratu defunctum, qui 93. anno absque vitri convexi auxilio legit.

#### §. XVIII. Remedia mali.

Etiam hic non inutile est, per tubos nigros convergentes inanes inspicere (*o*). Ita enim retina ad minorem lucem adsuescens tenerescit.

Solacium autem mali dudum in convexis vitris & perspicillis quæsi-  
verunt, sive id sit Rogerii BACON (*p*) inventum, sive (*q*) is ab ALHA-  
ZENIO (*r*) habuerit, sive patris ALESSANDRO (*s*) SPINA, anno  
1313. Florentiæ mortui industria invenerit, vel SALVINUS de-  
gli

(*i*) p. 397.

(*k*) Presbyopes, quibus oculus callosus & durus est. KEPLER prop. 64.

(*l*) BRIGGS c. 4.

(*m*) HILL fabrik of the eye p. 24.

(*n*) Distinct. vision p. 146.

(*o*) Phil. transf. n. 37. Ab amblyopia BOERHAAVE de morb. ocul. p. 138.

(*p*) PLOT natur. hist. of Oxfordsh. p. 220.

(*q*) SMITH remarks p. 13. seqq.

(*r*) Opt. L. VII. n. 7.

(*s*) Gal di minerò.



gli ARMATI (*t*), sive M. GERALDUS, qui vitro convexo literas legebat minutissimas (*u*). Neque penitus veteribus ignotum fuit artificium. Etsi enim PLAUTI conspiciillum (*x*) fabula est (*y*), SENECA (*z*) tamen literas per sphaeram aqua plenam grandescere scripsit.

Vitra equidem convexa vere non augent, & unice faciunt (*u*), ut oculus ad perexiguam distantiam distincte videat, ad quam absque eo praesidio confuse videret. Nam cum proxima objecta vehementer divergentes radios in retinam mittant, vires oculi ad punctum visionis distinctae sex unciiis distans aptae, non sufficiunt radiis adunandis a duobus pollicibus advenientibus, qui adeo vehementer divergunt, penicillus ergo radiorum retro retinam demum focum habet.

Nunc vitra convexa cogunt radios, eo vehementibus, ut sunt convexiora, medentur ergo oculi ad proxima objecta ineptitudini (*b*).

Eadem ideo, quia convexa sunt, ex majori spatio radios (*c*) accipiunt, & in focum illustriorem cogunt, augent ergo lucem, & clariorem faciunt visum, ut omnino lentis ope noctu legas, quando absque lente legere non potes (*d*). Callosa etiam senum retina multa luce magis eget.

Denique cum soleat a magnitudine anguli optici mensura magnitudinis sumi, ab eo nempe angulo, quem duo fines corporis (*e*) visibilis cum puncto vidente oculi intercipiunt, facile ex conversa prioris conficitur, uti parvus est in remotis angulus (*f*), ita in proximis esse magnum. Propior enim quisque remotiorem comprehendit (*g*). Nunc faciunt vitra convexa, ut proxima tamen distincte videamus, ut ea ergo, quae sub angulo magno depinguntur, sint distincta. Ita fit, ut credatur, ea convexa vitra magnitudinem apparentem augere, etsi nihilo majorem

(*t*) MANNI opusc. IV.

(*u*) Apud EROTEM c. 63.

(*x*) Apud PANCIROCUM II. p. 268.

(*y*) SMITH p. 12.

(*z*) *Quest. natur.* L. I.

(*a*) Conf. la HIRE p. 580. SCHEINER p. 163.

(*b*) BOERHAAVE *de morb. ocul.* p. 200.

(*c*) S'GRAVEZANDE n. 3131. BOERHAAVE *morb. ocul.* p. 200.

(*d*) HOOKE *method. &c.* p. 13.

(*e*) PORTERFIELD II. p. 376. HELSHAM p. 331.

(*f*) p. 448.

(*g*) S'GRAVEZANDE n. 3133. Conf. MARTIN p. 174. 175.



forem faciant, quam oculus nudus, cui corpus idem proxima adaptaretur ( *b* ).

Est vero lentis convexæ aptæ presbyopibus, radius æqualis distantiae visionis distinctæ nudi oculi, ductæ in eandem distantiam armati oculi, divisæ per differentiam utriusque distantiae, omnino ut de lente concava diximus ( *i* ), eo planior adeo, quo oculus minus presbyops.

Cavere etiam oportet, ne nimis convexæ lentes adhibeantur, cum alioquin oculus, perinde uti in priori exemplo, a penicillo valde acuto percussus occallescat ( *k* ).

§. XIX. *Microscopii potestas.*

Ad proxima omnes presbyopes sumus ( *l* ), ipsique myopes ea confuse vident, ut quisque literis libri alicujus ad oculi contactum adaptatis experiri potest; & denique nimis propinqua omnino evanescent, ut in acicula expertus est BOERHAAVIUS ( *m* ). Proxima vero ut videamus, utimur valde convexis lentibus aut sphærulis, etiam aqueis ( *n* ), sed ut constantiores sint, & ad usum habiliores, vitreis. Cornelio DREBBELIO aliqui *microscopia* inventa tribuunt, scripserat tamen Rogerius BACON, fieri posse, ut minima maxima adpareant, quod non alio modo fieri potest.

Iterum eadem hic redeunt, quæ jam monuimus. Hæ sphæraulæ non eorum, quæ inspicimus, augment ( *o* ) magnitudinem, sed faciunt, ut propinquissima tamen distincte videamus. Poteritque fere, præter lucem minimam, quodque foramen microscopii usum supplere, per quod inspexeris, & cum eo facili auxilio æque magna objecta adparebunt ( *p* ), tantum minus illustria. Lucis enim vim auget utique convexitas, Ad æstimandum id augmentum repetere

( *b* ) S'GRAVEZANDE n. 3178. le CAT p. 455.

( *i* ) HELSHAM p. 328. PORTERFIELD II. p. 67.

( *k* ) SMITH *remarks* p. 9.

( *l* ) SCHEINER p. 208.

( *m* ) De morb. ocul. p. 34. 35.

( *n* ) Phil. transf. n. 228. POLINIÈRE exp. de phys. p. 553. Comm. Noric. 1743. hebdom. 12. Rubiginem fieri ex pluviae guttis, quæ sint pro speculis causticis. Philos. transf. n. 456.

( *o* ) ADAMS of microscop. p. 21.

( *p* ) IDEM l. c.



tere oportet, sphæras convexas vitreas focum habere ad quartæ partis radii ( $q$ ) distantiam. Si sphærae eæ valde parvæ fuerint, focus erit ad minimam distantiam, lineæ, semilineæ & minus, denique, in minima distantia partis  $\frac{1}{15}$ . lineæ.

Ita fiet, uti quisque focus erit propior, ut acrius acriusque microscopio conspecta corpora videantur augeri.

Ita simplicissima nascitur regula, ex qua vis augens microscopii æstimatur. Ut enim puncti visionis distinctæ distantia, ad longitudinem foci, f. distantiam objecti per microscopium visi ab ejus lente, ita diameter objecti per microscopium visi, est ad diametrum oculo nudo adspecti ( $r$ ); & cubum ( $s$ ) diametri, si de tota magnitudine quærat. Ita si punctum visionis distinctæ abfuerit ad 8. pollices, & focus objecti microscopii ope visi abfuerit ab ea lente ad decimam partem pollicis, rationes magnitudinis armato oculo visæ, & magnitudinis simplici oculo adparentis erunt ut  $80^3$ .  $1^3$ . ut 512000. 1.

LEEUWENHOEKIUS ( $u$ ) utebatur vitris simplicibus modice augentibus. Maxima in ejus apparatu lens focum habebat ad  $\frac{1}{20}$ . pollicis, augebat diametrum 160<sup>es</sup> ( $x$ ). Anglorum vero microscopia focum habent ad  $\frac{1}{40}$ ",  $\frac{1}{50}$ ", usque, ut diametrum augeant 320<sup>es</sup> ( $y$ ), & quadringies ( $z$ ), & ad  $\frac{1}{80}$ , ut augeant 640<sup>es</sup> ( $a$ ) & ad  $\frac{1}{100}$ , ut 800<sup>es</sup> augeant ( $b$ ).

Demum G. a TURRE, vitris foci longitudinem non majorem habentibus, quam  $\frac{1}{10}$ , lineæ, & demum non majorem, quam  $\frac{1}{5}$ . partis, obtinuit augmentum 1280. & 1920plum ( $c$ ).

Sed

( $q$ ) p. 456.

( $r$ ) NOLLET *leg. de phys.* T. V. p. 562. HELSHAM p. 317. SMITH c. 118. vel nam eadem est ratio, ut angulus opticus microscopicus ad angulum opticum nudum n. 104. 108. NOLLET T. V. p. 317.

( $s$ ) BAKER *microscop. made easy* c. 8.

( $u$ ) MOLYNEUX apud BIRCH T. IV. p. 365. BAKER *microsc. mad. easy* p. 8. *Phil. transf.* n. 456.

( $x$ ) *Employement* p. 432. 436. *Phil. transf.* l. c.

( $y$ ) BAKER *ibid.*

( $z$ ) *Phil. transf.* l. c.

( $a$ ) *Ibid* n. 284.

( $b$ ) BAKER II. p. 36.

( $c$ ) *Epistola ad NOLLETUM* p. 8.



Sed ejusmodi vitra ob lucis difficultatem raro adhibentur ( *c\** ), & detrudere de nimia ea vi oportet aliquid, cum 8". ( *d* ) pro puncto visionis distinctæ nimium sit ( *e* ). Ex ea consideratione vires omnes  $\frac{3}{8}$ . minuentur, & TURRIANA maxima augmenta ad 1000 redibunt. Rarum esse, experientissimus vir addit, supra 86 $\frac{2}{7}$ plum augere ( *f* ).

Solaris microscopii etiam major vis est, a LIEBERKUHNIO inventi ( *g* ). Pisorum mole globulos sanguinis vidi. Laborat iridum vitio minusque nitidi ambitus.

Cæterum, quam minuta sint, quæ microscopii ope distinguuntur, possis æstimare ex his ipsis viribus 1000, 000<sup>es</sup> ( *h* ) augmentibus, & cum nudo oculo videamus corpora non longiora, quam  $\frac{1}{2700}$ . ( *i* ) pollicis, videbimus microscopio non longiora, quam  $\frac{1}{7.200.000}$ . ejusdem uncix, five superficiem = 1. 584 000. 000. 000. 000. pedis quadrati ( *k* ). Sed LIEBERKUHNIANO microscopio longe minora corpuscula conspicua fient, etsi nunc mensuram non addo.

#### §. XX. Oculi internæ mutationes.

Plerique Physiologi, & ii inprimis, qui mathemata præterea edocti fuerant, persuadentur, naturam ejus remedii aliquid ipsi oculo largitam esse, quo presbyopiæ & myopiæ subvenitur. Oculum nempe homini, quadrupedi, & pisci fecisse per suas insitas vires mutabilem, & ita mutabilem, ut & proxiora distincte videre, & vicissim ad remotiora videnda se accommodare possit.

Et omnino absque ejusmodi viribus visionem perfici non potuisse ( *l* ). Nam & in camera obscura ( *m* ), & in artificiali oculo ( *n* ), ut imago

S s s 2 in

( *c\** ) Quare lentes convexæ sphaerulis præferuntur MARTIN *dioptr.* p. 177.

( *d* ) Ita sumit ADAMS p. 24. BAKER & C.

( *e* ) LYONNET *Verhandel. van de Hollandsemaatschap.* T. III. p. 409. 410. Plerumque non excedere quinque pollices IDEM.

( *f* ) Ibid.

( *g* ) ADAMS l. c.

( *h* ) a TURRE Ad 71,583,750. JOELOT *descript. des microscop.* Ad 16,003,008plum PERRET p. 103.

( *i* ) p. 476. 477. 478.

( *k* ) Ad  $\frac{1}{4.000.000.000.000}$ . ejusdem mensuræ Cl. WINTRINGHAM *inquiry* p. 304.

( *l* ) SCHEINER L. III. P. I. c. 18. LeCAT p. 489. PORTERFIELD I. p. 390. SMITH n. 85. S'GRAVEZANDE n. 3089. MUSSCHENBROECK n. 1209. scq.

( *m* ) SCHEINER. p. 125.

( *n* ) BAYLE p. 476.



in retinam cadat, oportere retinam mobilem esse, ut ad lentem adducatur, quando remota sunt videnda, & contra removeatur, quando propinqua, & quidem in ejusmodi oculo majorem, quam in vivo, mutationem requiri. Et certe lentem addi oportere, si objectum removeas, nisi velis confusam fieri imaginem (o). Sic neque in oculo humano fieri posse, ut idem oculus & propinquiora distincte videat, & remotiora (o\*) nisi mutari queat, cum nullo modo fieri possit, ut remotiorum objectorum a tribus pedibus advenientes radii focum habeant in idem retinæ punctum incidentem, in quod incidit focus objectorum vicinorum, quorum distantia est trium unciarum (p). Propiorem illum, hunc necesse est remotiorem esse a cornea.

Nunc tamen hominem manifesto & cominus distincte videre, & remotiora (q). Ipsos myopes typum exiguum ad distantias legere posse, quarum altera sit alterius dupla, etiam eorum ergo hominum oculos adhuc ad propiora se accommodare posse (r). Et filum ferreum contra turrim remotam oppositum uno oculo distincte adparuit, turris confusa: & distincte etiam vicissim turris, cum filo confuso umbræ simili, manifesto argumento mutati oculi (s), & modo ad proxima ita videnda accommodati, modo ad remota; neque ad utraque aptiuna videnda.

Necesse esse adeo, ut oculus ad proxima recte videnda sit myopis similis, longus (t) adeo, & convexa lens (u) crystallina, convexa tunica cornea; ad remota presbyopis, brevis nempe oculus, & eadem lens & cornea planior. Ita fieri in propinquorum visione, quorum focus eo in casu longius a cornea distat, ut per priora is focus tamen in retinam cadat. Id fiet si vires confringentes radios propiorem focum fecerint, si mutata oculi figura retinam a cornea removerit, si utramque vim conjunxeris.

Contra

(o) Le MOINE *diff.* cit.

(o\*) Simul vicinum & remotum intuentes, istud confusum videmus le CAT p. 492.

(p) KEPLER *prop.* 63. SCHEINER p. 173 JURIN. p. 133. 134. S'GRAVEZANDE l. c. MUSSCHENBROECK *Eff.* p. 570 SMITH *remarks* n. 13. 14. DERHAM *physic. theol.* p. 103.

(q) Le CLERC *point de vue* p. 79.

(r) PORTERFIELD II. p. 3.

(s) Le CAT p. 511.

(t) SCHEINER *ibid.* p. 23. 167. 244. KEPLER *prop.* 64. PLEMP p. 103. MOLINETTI ed. I. p. 18. 19. le CAT p. 466. 491. 495. HELSHAM. S'GRAVEZANDE n. 3093.

(u) SCHEINER p. 244. CARTES. *dioptric.* c. 3. de *hōmine* 78. HARTSOEKER p. 77. HELSHAM p. 325. S'GRAVEZANDE n. 3094. le CAT p. 491. 495.



Contra in remotis ( $x$ ) videndis, quorum focus cis retinam est, in oculo breviori retinam se in foci sedem conferre, dum una figura oculi mutatur, cum ejusdem nunc planioris oculi minores vires confringentes focum a cornea faciant remotiorem.

Reperire se etiam in omnibus fere animalibus organa mutationis ejusmodi ( $y$ ), & in nonnullis motum ipsum conspici ( $z$ ), ipsamque libellam oculos inflasse, ut convexiores fierent ( $a$ ). Contra insecta, quibus immobiles sint oculi, sola remota videre ( $b$ ), & ad proxima antennis uti: muscas tamen aliqui excipiunt, & tres oculos glabros pro remotis, maximos vero illos convexos & reticulatos pro proximis objectis credunt servire ( $c$ ).

Hæc fere satis communi consensu recipiuntur, in modo discedunt auctores, & in causis hujus mutationis.

§. XXI. *Corporis ciliaris actio.*

Hujus elegantissimi corporis cum lente crystallina nexus primum KEPLERUM ( $d$ ) movit, ut eo potissimum in phænomeno interpretando uteretur; quem virum, tot aliis inventis celebrem, multi Cl. viri, sed eorum aliqui aliis modis sunt secuti. KEPLERUS ergo id corpus, tamquam musculum mobilem lenti crystallinæ impositum, credebatur oculum longiorem reddere, dum repulso humore vitreo lens antrosum exsilit. Quod ita confirmat ZINNIVS ( $e$ ), ut ciliares radii humore turgidi repellant vitreum corpus, & lentem faciant antrosum emicare. Ornavit eam hypothesein Cl. PORTERFIELD, ut naturalis oculi status sit

S s s 3

laxitas

( $x$ ) Le CAT p. 467. 490. 496. CARTESIUS &c.

( $y$ ) CHÉSELDEN p. 296. in piscibus. In avibus & piscibus DERHAM l. c. p. 105.

( $z$ ) BIDLOO in avibus.

( $a$ ) FOUPART. Locus excidit.

( $b$ ) DERHAM p. 364. De cochleis SWAMMERDAM p. 107. 131.

( $c$ ) HILL *essays* p. 217.

( $d$ ) Prop. 64. SCHEINER p. 163. PLEMP. L. III. c. 9. VESLING *Syntagm.* p. 102. HORTENSIVS *de oculo* p. 15. HIGHMOR *disquis. anat.* p. 274. MOLINETTUS Edit. I. p. 18. 19. Ed II. p. 147. COLLINS p. 885. VERHEYRN II. p. 213. STURM *presbyop. & myop.* n. 13. *ocul. Oecon.* p. 14. tantum paulo obscurius. DERHAM l. c. p. 101. PERRAULT l. c. p. 580. PORTERFIELD *Ess. of Edimb.* IV. p. 197. *of the eye* p. 446. MUSSCHENBROECK n. 1209. BARTHES *duodecim quæst.* n. 3. S'GRAVEZANDE n. 3093. 3094. Eo etiam animum induxit PLATNER *de process. ciliar.* HEISTER.

( $e$ ) *De lig. ciliar.* n. 10.



laxitas ejus ligamenti, cum quo oculi brevitās conjungatur, & ad remota inspicienda facilitas: contra propiora cum labore distinguamus, & cum fatigatione (*f*), quia ad ea objecta ciliaris corporis actione egemus: sitque hic animæ in oculis confirmandis ad remota & proxima conatus (*g*).

Quæ ita alii mutaverunt, ut potius a corpore ciliari crederent lentem retrorsum duci, & distantiam a retina minui, ut oculus ab ea actione brevior fiat (*h*).

Ex iisdem ligamentis ciliaribus hinc paralyticis, inde sanis strabismum fieri (*i*) IDEM; & corpus ciliare musculum esse, etsi colorem non habet (*k*).

Contra Cl. MOULINS a suis ligamentis lentem crystallinam ad lentem adduci, sic penicillum radiorum breviorē fieri (*l*) persuadetur.

In avibus addunt pectinem (*m*), in vitreo corpore latentem, manifesto lentem ad retinam adducere; & una introrsum (*n*) ducere, dum animal ad latera prospicit, ut oculus objecta e directo ante se posita melius videat; verumque demum esse musculum (*o*) & in ista classe tuerentur.

Alia SCHEINERI (*p*), & CARTESII (*q*) theoria fuit. Et ipsi nempe corpore ciliari contracto oculum ad proxima aptiorem reddi docuerunt; sed ita, ut lens crystallina convexior redderetur, quam quidem mutationem etiam experimento aliquo SCHEINERUS confirmavit, multosque (*r*) habuit sequaces: ut omnino BIDLOUS (*s*) eam figuræ mutationem in avibus oculis ipsis conspici posse adfirmaret.

Etiam

(*f*) *Of the eye* T. II. p. 4. 5.

(*g*) IDEM *Ess. of a Societ. at Edimb.* T. IV. p. 154. 155. 164.

(*h*) La CHARRIERE p. 284. PERRAULT p. 579. HARTSOEKER p. 76. BRISSEAU p. 77. DERHAM l. c. L. IV. c. 2. p. 101. si recte intelligo.

(*i*) PORTERFIELD T. II. p. 14. & olim du HAMEL *corp. anim.* L. II. c. 5. ut etiam in glaucomatica lente id vitium manifesto viderit.

(*k*) p. 450. Videtur etiam favere MORGAGNUS *Epist.* XVII. n. 16.

(*l*) MOULINS p. 51.

(*m*) *Journ. des savans* 1699. n. 5. DERHAM *physic. theol.* p. 105.

(*n*) *Journ. des sav.* PORTERFIELD II. p. 276.

(*o*) PORTERFIELD I. p. 248. 249.

(*p*) *Dioptric.* c. 3. de hom. p. 78.

(*q*) Posse ea ligamenta lentem conglobare p. 163. 201.

(*r*) GREW *Cosmolog. sacr.* COLLINS p. 906. BIDLOO *de oculis* p. 30. HEUCHER *oper.* p. 528. Nuperi fere hanc oculi mutationem cum priori consideratione conjungunt DERHAM p. 101. GORTER *Chir.* p. 1032. le CAT p. 960. 967.

(*s*) Ibid.



Etiam hic penitus contraria alii docuerunt, lentemque maluerunt ab iisdem processibus reddi planiorem, quæ P. A. MOLINETTI (*u*) fuit hypothesis, & aliorum, & nuper SANTORINI, qui etiam vestigia impressorum radiorum ciliarium in lente vidit, cum homo cæcus fuisset. Eo JURINI (*x*) pertinet opinio, qui ad remota inspicienda lentem crystallinam a ligamentis in medio deprimi, ad latera elevari, deinde suo se elatere restituere docet.

Iterum Cl. PEMBERTON fibras musculosas (*y*) in ipsa lente crystallina posuit, quæ possint ejus lentis figuram mutare, ut anterior diameter minuatur, posterior augeatur (*z*), & fieri myopiam, quando ex diminuta contractione fibrarum lentis id princeps organum se ad distantiarum discrimina nequit accommodare (*a*). In ipso canale PETITI (*b*) præsidium aliquod ad lentis crystallinæ figuram mutandam quæsitum est: qui fluido electrico turgeat, quando cum studio aliquid intuemur (*c*).

#### §. XXII. *Musculorum oculi actio.*

Alii scriptores omissis viribus, quas culter anatomicus ægre ostendat, in oculo mutando adhibuerunt musculorum oculi certe conspicuorum potentiam.

Et primum quatuor musculos rectos conjunctis suis viribus oculi partem anteriorem ad posteriorem adducere, oculumque totum breviorē reddere, corneamque planiorem MOLINETTUS (*d*) proposuit, ejusque sequaces. Ita oculus ad remotiora videnda accommodaretur. In piscibus choroideam musculum (*e*) habere addunt, qui oculum reddat breviorē, in sturione quidem ad duas uncias (*f*).

Directe

(*u*) p. 147. BRISSEAU p. 77. PHELIPEAUX apud STENONIUM *Can. Carchar. diff.* p. 82. WINTRINGHAM p. 30. S'GRAVEZANDE n. 3094. MUSSCHENBROECK n. 1212.

(*x*) p. 140.

(*y*) *De facultate, qua oculus se accomm.* c. 2.

(*z*) P. m. 171.

(*a*) IDEM.

(*b*) CAMPER p. 24.

(*c*) SAUVAGES *suffus.* p. 16.

(*d*) L. IV. c. 2. p. 147. BRIGGS c. 2. BRISSEAU p. 23. ROUHAULT P. I. c. 28. p. 208. BERGER p. 411. VERHEYEN L. II. p. 214. le CAT p. 495.

(*e*) *Leipzig. æconom. Abhandl.* X. p. 114. ARDERON *Phil. transf.* n. 486. DERHAM *phys. theol.* p. 104.

(*f*) RICHTER *ichthyothol.* p. 53.



Directe contrario modo alii docent, scleroticam retrorsum duci, ut cornea exiliat, & oculus longior fiat. BOHNIIUS (*g*) ita sensit, & BOERHAAVIUS (*h*), & alii.

Contra ab obliquorum musculorum conjuncta vi oculum longiorem fieri (*k*), turgidumque, & lentem a retina abduci, multi docuerunt, ut etiam inter myopiæ causas sit spasmodica eorum musculorum contractio (*k*<sup>\*</sup>).

Sed neque hæc opinio absque contraria sententia mansit. CHESLENIUS (*l*) enim obliquos musculos lentem ad retinam adducere, & lentem planiorem reddere maluit.

### §. XXIII. *Sphincter uveæ.*

Imaginarium sphincterem in uvea denique JURINUS adoptavit, postquam ostendit, mutationes in lente crystallina, quæ vulgo proponuntur, ad explicanda phænomena & magnam diversitatem puncti visionis distinctæ non sufficere (*m*). Eum sphincterem credit vir Cl. contrahi, & corneam tunicam convexam reddere ad videnda proxima, eamque vim sufficere, ut visionis distinctæ distantia a septem uncis ad quindecim augeatur (*n*). Satis vero esse, si  $\frac{3}{100}$ . cornea magis convexa reddatur (*o*). A suis ligamentis, in tunicam corneam insertis, [quæ sunt nervi] corneam turgere, MOULINUS credebatur, dum humorem aqueum antrorsum urgerent (*p*). Eadem putabat pupillam dilatare (*q*).

Addit JURINUS, quando necessitas nunc nulla est, corneam tunicam dimissam ex proprio elatere resilire & explanari (*r*).

### §. XXIV.

(*g*) p. 367.

(*h*) n. 510. tum BAYLE' p. 472. CAMPER *part vis.* p. 21. HELSHAM p. 324. unitis sex musculis oculi, MÖHRING *de visu* p. 27. compressione sua.

(*k*) ROUHAULT p. 209 BRIGGS. KRILIUS. BERGER l. c. HÄMBERGER *de ocul. vit.* p. 180. & filius Georg EHRHARD *physiol* p. 517. Le MOINE & CAMUS *in disp.* Paris. 1743. E. *obliqui oculi musculi retinam a crystallina remouent* TAYLOR p. 112. HELSHAM p. 325.

(*k*<sup>\*</sup>) Apud SAUVAGES *de amblyop.* p. 22. qui conjecturam istam rejicit.

(*l*) p. 75.

(*m*) p. 137. 138.

(*n*) p. 141.

(*o*) p. 142.

(*p*) p. 53. Add. HARTLEY p. 238. WINTRINGHAM p. 300. & *exp.* 54.

(*q*) p. 52. BIRCH T. IV. p. 547.

(*r*) p. 139.



§. XXIV. *Pupillæ contractio.*

Dudum ostendimus, & a nemine negatur, pupillam ad propiora objecta videnda angustari, ad remota dilatari.

Ita ea arctatione quidem (*s*) pupillæ fiet fere, quod fit ex visione per foramen (*t*) exiguum, confusa nempe imago corrigetur, uti in camera obscura angustatio foraminis, lucem admittentis, ad propiora objecta nitide depingenda sufficit (*u*).

Ita enim minuitur radiorum copia, & in retinam vis: avertuntur radii laterales (*x*), quibus, ut in retina convergant, non sufficiunt oculi vires, & soli admittuntur radii oculi axi proximi, quos exigua adeo vis in eum axin faciet coire.

Contra pupilla dilatata (*y*) multamque lucem admittens, medetur necessariæ palliditati objecti, quæ in remotis objectis ex parvitate anguli visorii, atque adeo ex paucitate radiorum oritur.

Quare quibus pupilla per morbum coaluit, iis facultas ad diversas distantias distincte videndi redditur pupilla aperta (*z*).

Hæc aliqui ita cum mutatione figuræ oculi conjunxerunt, ut a contracta pupilla oculum longiorem reddi (*a*) putarent. Arctatam ad proxima objecta videnda pupillam, lentem crystallinam in medio convexiorem reddere, B O U R D E L O T I conjectura fuit (*a*<sup>\*</sup>).

§. XXV. *Animadversiones ad has hypotheses.*

Quod ad ciliarium radiorum in mutanda lente crystallina vires adtinet, de iis quidem vehementer dubitamus, etsi eas ad eam lentem adhærescere recepimus.

In

(*s*) CARTES. *de hom.* p. 79. BAYLE' p. 477. DERHAM *physico-theol.* p. 101. PORTERFIELD I. p. 169. II. p. 97. 175. *Mém. de l'Acad.* 1755. p. 599. 601. la HIRE.

(*t*) ROUHAEUT P. I. c. 35. p. 247.

(*u*) *Mém. de l'Acad.* 1755 p. 598.

(*x*) PORTERFIELD T. II. p. 175. &c.

(*y*) CARTES *de hom.* p. 79. PLEMP L. IV. prop. 59. BAYLE' l. c. DERHAM l. c. la HIRE. *Mém. de* 1755. l. c.

(*z*) TAYLOR p. 207.

(*a*) O HALLORAN p. 79.

(*a*<sup>\*</sup>) DENIS. *confer.* 4.



In omni certe animalium genere processus ciliares absque ulla musculosa sunt fabrica, mere vasculosi (*b*), vasculis serpentinis percursi, molli facti membrana (*c*). Eorum adhesio ad capsulam lentis crystallinæ exigua est, & solo muco (*d*) stabilitur, qui omnino, si distraheretur, divelleretur facile, & constantia lentis periret irreparabilis. Insetio vera radiorum in nonnullis animalibus, ut in lepore, manifesto est in uveam.

Si quidquam possent, figuram tamen lentis ægre mutarent (*e*), capsulam lentis crystallinæ elasticam ægerrime deprimerent (*f*): & si quidem vasculosa (*g*) aliqua actio admitti posset, contrarius esset effectus ejus, qui desideratur. A sanguine enim recepto tumerent ea vascula, inque arctiores flexus implicata, lentis capsulam distenderent, & explanarent. Nunc si conatum aliquem in videndo edimus, certe edimus in intentione accurata ad objecta proxima.

Adde in piscibus nullum esse processum ciliarem (*h*), & parem ad varias distantias videndi necessitatem. Et lente ob cataractam extracta vel deposita oculum tamen ad varias distantias (*i*) videre, ut coram in nobili viro video absque ullo experimento, quo eam facultatem recuperaverit. Et si enim tunc (*k*) ob diminutas vires, quæ radios uniunt, æger lente vitrea opus habet, eadem tamen lens in omni distantia sufficit.

Mathematici etiam ostenderunt lentis crystallinæ neque situm mutatum (*l*), neque figuram (*m*) aliam, ad eandem puncti visionis distinctæ mutationem sufficere, quæ in sano homine potest expectari.

Tantum

(*b*) A. MOULINS. A. LAURENTIUS *de l'oeil* c. 4.

(*c*) RUYSCH. *Thes.* II. *aff* l. n. 15. LA HIRE p. 522. HOVIUS. *Le Roi Mém. de l'Acad.* 1755. p. 597.

(*d*) p. 381. 382.

(*e*) Duram esse MOULINS p. 55. Etiam PORTERFIELD mutationem figuræ lentis refutat *Eff.* T. III. p. 187.

(*f*) Mollitiem crustæ exterioris lentis adducit ILL. MORGAGNUS *Adv.* VI. p. 91. *Epist.* XVIII. n. 19. & C. WINTRINGHAM p. 249. Sed ipsa capsula decies processuum ciliarium membrana durior est.

(*g*) ZINN

(*h*) p. 381.

(*i*) LA HIRE *Mém de* 1706. KENNEDY *suppl.* p. 58. TAYLOR *disease of the crystallin* c. XI HAMBERGER *physiol.* p. 519.

(*k*) PEMBERTON n. 3.

(*l*) JURIN. p. 137. debere percurrere o. 87.

(*m*) *Ibid.*



Tantum ergo abest processus ciliaris a præcipui instrumenti ( *n* ) in mutando oculo dignitate, ut omnino nullæ ejus partes sint, videnturque lentem unice sustinere ( *o* ) : quod ipsum officium uvea membrana in piscibus tuetur.

Nullas omnino vires reperio neque in lente crystallina, neque extracam, quæ ejus figuram mutant. In piscibus credas campanulam ( *p* ) lenti insertam esse posse ad latus internum trahere, utique si musculosa foret. Verum neque iste motus locum habere potest, cum uvea membrana ad vitream connascatur, & vitrea ad lentem adhærescat, neque adeo lens ad latus moveri possit, quin late vitrea membrana distrahatur; quam, si voluisset natura lentem mobilem esse, cum vitrea tunica non conjunxisset.

Pecten avium millies a me visus mera membrana est, nihilo, quam processus ciliaris durior, magisque musculosa ( *q* ), ne in pica quidem, ut coram video.

#### XXV I. *De musculis oculi.*

Oculorum internam figuram a circumpositis musculis mutari posse vix credas: in avibus certe & piscibus ( *r* ) nihil quidquam potest mutari, quibus cartilagineæ, & ossæ sint scleroticæ, etiam antè & circa uveam.

Sed neque in homine credas, musculos rectos scleroticam tunicam retrahere, quin cornea adeo vehementissime colligata sequitur ( *s* ).

Quando enim inter duo conjuncta corpora alterum solum vis emovere, oportet ita esse connexa, ut in sede unionis sit mobilitas. Ea hic nulla est.

Ita neque obliqui musculi scleroticæ partem anteriorem possunt a posteriori abducere. Eorum tendines pene transversi sunt.

T t t 2

Observa-

( *n* ) PORTERFIELD T. II. p. 10.

( *o* ) *Physiologia* Amstelodami edita p. 499.

( *p* ) p. 391. 392.

( *q* ) p. 391.

( *r* ) De la HIRE p. 622. S'GRAVEZANDE n. 3091. PLANCUS *Comm. Acad. Bonon.* T. II. P. 2. p. 300. le CAT p. 497. PORTERFIELD I. p. 429. 143.

( *s* ) Conf. WINSLOW *Mém. de l'Acad.* 1721. p. 310. PORTERFIELD I. p. 427. MAITREJAN p. 98. 99. BOHN p. 367.



Monuerunt Mathematici, nimis rudes a tantis viribus fore motus, qui tenerrimam visionem confunderent (*t*). Oculi vero longitudinem mutatam non sufficere, nisi tota parte decima mutetur (*u*). Et cum inmoto oculo aliqui recte viderunt (*x*).

Choroideæ in piscibus musculus videtur oculum vere breviorē reddere (*y*). Nam ea animalia immotam habent pupillam, eoque adeo præsidio destituuntur, quod NATURA reliquis animalium classibus impertiit.

Circulus uveæ utique alius in avibus cartilagineus & osseus, aliusque vasculosus est, sed ab eo circulo in corneam, adeo duram tunicam, nullus effectus potest sperari, neque ullo modo licet fabricam aliquam ad suppositam necessitatem fingere.

### §. XXVII. Sufficit pupillæ motus.

Causa earum omnium hypothesium excogitandarum fuit, quod crederint Physiologi, hominem in valde diversis distantis distincte videre; hinc mutationem in viribus refringentibus requiri.

Nunc quidem hæc omnia minora sunt, quam vulgo fiunt. Centies camera obscura usus ad delineandum, ut tunc erat in animo hortum & agrum Gottingensem, semper eodem cum vitro & remota & proxima vidi, pulcherrime & distinctissime, hætenus a pictorii penicilli opera diverso modo depicta (*a*), quod remota viciniora essent proximis, & tota planities brevem valde ab horizonte ad oculum haberet latitudinem. Sed & oculus remota & proxima simul videt, etsi cum gradibus distinctionis trans punctum (*b*) distinctæ visionis perpetuo diminutis.

Deinde oculum omnino ad diversas distantias se non accommodare. Nam nostrum quemque vel accedere ad objectum, vel recedere, aut idem propius ad oculum adducere, & quærere punctum visionis distinctæ, quoties objectum accurate non dignoscimus (*c*). Oculi vero uteremur

(*t*) PEMBERTON n. 2. TAYLOR p. 112.

(*u*) NOLLET *leg. de phys.* T. V. p. 481.

(*x*) BOYLE *post final. caus.* obs. 8.

(*y*) p. 164.

(*z*) p. 135.

(*a*) Le CLERC *système &c.* p. 50. *point de vue* p. 78.

(*b*) Le CLERC *système* art. 7.

(*c*) IDEM *système* art. 27.



remur mutatione ad eum laborem vitandum, si ea esset in potestate nostra.

Porro certum est, nos per chartam duobus foraminibus pertusam objectum in puncto visionis distinctæ simplex, in omni alio puncto duplex (*d*) videre, manifesto argumento, certum esse & definitum oculi statum, ut ad certam distantiam distincte videat: sed eum statum non posse mutari, ut ad aliam etiam distantiam distincte cernat.

Video excusationem Cl. PORTERFIELD (*e*). Animam sapientem non mutare oculum, quando alioquin distincte videt, distincte vero videre per exiguum foramen.

Video etiam, quæ Cl. SMITHIUS (*f*) de radiis scripsit, qui per exiguum foramen extrorsum flectantur, ut adeo videantur a propiori corpore advenire. Verum omnino figuræ ipsæ a Cl. viro productæ videntur mihi ostendere, contra hypothesin, remoti corporis simplicem, proximi duplicem debere fieri sensationem.

Si nunc repetieris, quæ dudum ostendimus, nullas vires (*g*) esse, quæ lentis vel figuram, vel curvitatē mutant: nullumque certum motum in oculo perpetrari, præter pupillæ arctationem: Si addideris, etiam in camera obscura arctationem (*h*) pupillæ, sive foraminis lucem admittentis facere, ut objecta propinquiora distincte adpareant, probabile mecum invenies, sufficere pupillæ arctationem, quæ fere locum in homine habeat, & phænomeno respondeat (*i*). Causa vero receptæ passim necessitatis (*k*) factæ in lente mutationis, oculove interno, in nimia latitudine puncti visionis distinctæ esse videtur, quam Cl. viri admiserunt. Quicumque librum minutiorum typorum legerit, satis reperiet, exiguam esse distantiam innoxiam, in qua eum librum propius oculum remotiusve ponere liceat, absque visionis distinctæ jactura. Mihi ne pollicis quidem

T t t 3 est.

(*d*) De la HIRE p. 628. 629. 630. variis modis apud du HAMEL p. 324. & *Journal des Savans* 1685. MAITREIEAN p. 95. 96. Hinc mensura boni vitri concavi est, quod imaginem per foramen chartæ simplicem facit adparere, quæ duplici visu fuerat la HIRE p. 623. *Journ des Savans* 1685. n. 23. uti diximus p. 501. Ita etiam SCHEINERI phænomenon explicatur *Danziger Gesellsch. Versuch.* T. II. n. 6.

(*e*) *Ess. of Edimb.* T. II. p. 7.

(*f*) *Remarks* p. 3. f. 6. 7.

(*g*) p. 515.

(*h*) *Le Roi* p. 598.

(*i*) *La HIRE. le Roi.*

(*k*) SMITH *pop. tract.* n. 85. *remarks* n. 13. 14. PEMBERTON. DERHAM p. 103.



est. Ad producendum autem sensum duplicis objecti major distantia requiri videtur ( *l* ).

Denique Cl. JURINI habemus hactenus confessionem, pupillæ adstrictionem solam nonnunquam ad visionem distinctam sufficere. Lucem enim nimiam sæpe confusam visionem facere ( *n* ).

Sed neque in his finit nos acquiescere, quæ nuper Cl. DAVIEL nos docuit, recte nempe homines cum iride immobili videre, quæ ob cataractam adhærentem fuerat violata ( *n*\* ), aut fissa. Nisi forte optimus amicus noster de visu ad vitæ munera sufficiente dixit, de visu in variabili distantia non sollicitus.

### §. XXVIII. *Animæ de imagine retinæ judicium.*

Hactenus unice imaginem sumus contemplati, quæ corpora nobis circumposita in retina depingit. Verum omnino non ea imago est, quæ animæ repræsentatur, ut facile vel ea imagine considerata, vel per experimenta hominum cognoscimus, quibus subito oculorum usus redditur, postquam cæci nati sunt.

In ea imagine magnitudo nihil ( *o* ) de vera magnitudine objecti exprimit, & acicula ( *p* ), quæ distantem turrem tegit, æque magna est, ac ea turris. Sed nulla etiam in imagine distantiarum ( *q* ) est diversitas, & omnia æque proxima, in eodem incredibilis tenuitatis plano depinguntur. Neque convexitas, aut concavitas, est in imagine, sed lucidæ & umbrosæ sedes in perfecta planitie, & ne planities demum visu dignoscitur, qui nihil nisi colores repræsentat animæ ( *r* ). Denique qui subtiliter hæc sunt rimati, ne figuras ( *s* ) quidem in imagine retinæ ita exprimi credunt, ut cubi a sphaera, hujus a pyramide discrimen per radios

( *l* ) JURIN l. c. p. 134.

( *n* ) p. 145.

( *n*\* ) K. Svensk. vetensk. handling 1759. Trim. I. Journ. de medec. 1762. m. Mars.

( *o* ) Nullum essentiale vinculum est inter magnitudinem visibilem, & tactilem, BERKLEY p. 264. CONDILLAC des sensat. T. I. p. 166.

( *p* ) BERKLEY p. 283.

( *q* ) IDEM p. 247. CONDILLAC ibid.

( *r* ) p. 248. 349

( *s* ) BERKLEY theory of vis. p. 313. 323. 334. & ita CHESelden p. 301. DAVIEL in literis. Negat PORTERFIELD II. p. 416. Sed multo demum rationis usu qualitates utriusque corporis mens distinxerit.



diolos coloratos definiatur ( *t* ), uti quidem certum est, neque totum corpus solidum unquam pingi posse, neque in cubo ex lineis anterioribus ad posteriores illas latentes lineas distinguere, & ad æqualia omnium intervalla ex imagine quidquam concludi. Sed neque motus visibilis tactilem motum exprimit ( *u* ).

Ita cæcus a nativitate ( *x* ), cum deposita cataracta visus ei restitueretur, omnia corpora suos oculos contingere persuadebatur ( *y* ), ut nullam distantie ideam haberet; sed neque corpora visu adgnoscebat, quorum figuras tactu sibi notas reddiderat ( *z* ); neque in picturis solidas eas corpora repræsentare ( *a* ) suspicabatur; & mirabatur, quomodo similitudo hominis in angustam tabulam a pictore potuerit itari ( *b* ): neque intelligebat, ut possit quidquam ea camera majus esse, quam videbat ( *c* ).

Sed neque dubium videtur, cum aliis coloribus humorum nostrorum, alia lentis & corneæ tunicæ curvitate, humoribus diverso modo refringentibus, introductis aliis in oculum figuris cavis, prismaticis, aliis cum radiorum viribus refractilibus & reflexilibus, alia cum tenuitate retinæ, aliis demum modis, aliam & aliam imaginem, & alia mentis de objectis externis judicia nascitura, aliisque animalibus summam lucem esse, quæ aliis profundæ sunt tenebræ.

Ut omnino non penitus nimius fuerit *Georgius BERKLEY*, quando totum visionis negotium pro dialogo arbitrario *DEUM* inter & creaturam habet ( *d* ); quæ nihil de rebus ipsis sentiat, & percipiat, nisi quæ *DEUS* ipsam sentire, & percipere vult, ut per ea signa homo ad sui conservationem quasi manu divina ducatur ( *e* ). Ut nullum in rebus ipsis necessarium principium sit, quare has neque alias de rebus corporeis

( *t* ) Non dignosciturum cæcum, qui subito visui restituitur *BERKLEY* p. 328. 329.

( *u* ) p. 332.

( *x* ) *CHESELDEN* p. 300. seqq. Iridem connatam fuisse *Hist. de la Chirurg.* T. III. p. 115. Sed eodem redit *Add. ACRELL om fosters sjukdom* p. 15.

( *y* ) p. 301. *DAVIEL*. in epistola ad me *Journ. de médec.* 1752. m. Mars. Negat de alio cæco, cui apud *RE'AUMURIUM* cataracta deposita fuerat *LIGNAC lettre d'un Amer.* VII. p. 28. Sed *DAVIEL* utique fides adhibenda, experto homini, & nullam causam habenti, cur mentiretur. Conf. etiam *Miscell. Berol.* T. VI. p. 68.

( *z* ) Ibid. & in *hist. de la Chir.* l. c. *DAVIEL*. l. c. ib. Juin.

( *a* ) p. 302.

( *b* ) p. 303.

( *c* ) Ibidem.

( *d* ) p. 341.

( *e* ) Ibidem.



reis nobis perceptiones fingamus. Ad eam sententiam etiam P. MALBRANCHE & BOERHAAVIUS proniores fuerunt.

Sensim adeo & palpando cæci (*f*) illi didicerunt visu ad adgnosendas corporum proprietates uti, celerius ACRELIANUS ille, lentius CHESLEDENIANUS, qui uno alterove mense elapso demum imposturam picturæ didicit detegere. Tactu ergo utique inter corporum attributa, & inter imaginem in retina pictam harmonia demonstratur.

### §. XXIX. Magnitudo ut judicetur.

In universum magnitudo æstimatur uno oculo, ut simus simpliciores, per angulum, quem duo fines objecti corporis cum retinæ puncto vidente intercipiunt (*g*). Posset etiam æstimari ex magnitudine imaginis, in retina depictæ (*b*), cujus eadem, quæ ejusdem anguli, sunt proportionales. Ergo primo nihil in hoc judicio est veri (*i*), nisi duo objecta, quæ comparantur, æque illustria, ad eandem ab oculo distantiam ponantur, tunc enim ejus anguli æqualitas demonstrat æqualia esse corpora: & major si fuerit, majus objectum esse, atque vicissim minus, quod angulo sub minori adpareat. Non ideo dico, mentem hos angulos metiri, quos ignorat (*k*): id volo, æterna DEI lege ideam magnitudinis cum eo angulo esse conjunctam.

Nunc fallimur, si ex eo solo angulo judicamus, & multis modis fallimur: primum si ea corpora diverso gradu lucida fuerint. Cum enim angulus ille opticus idem sit etiam mensura numeri radiorum, quos utrumque corpus emittit, fit ut ex æqualitate rationis etiam ea corpora majora videantur (*l*), quæ sunt illustriora: facum exemplo & candelarum. Eo magis vero fallimur, quo ea corpora lucida remotiora sunt. Cum enim remota vulgo obscura sint, & parum nos adficient, judicamus valde magna esse, quæ & remota sint, & tamen illustria. Sæpe vidi, dum ambulabam, eo ampliorem mihi cerei flammam videri, quo longius ab eo recedebam, contra diminui, uti accedebam propius. Ita sæpe

(*f*) NOLLET *leçons* T. V. p. 133.

(*g*) p. 504. D'ORLEANS p. 12. 13. PORTERFIELD II. p. 376. S'GRAVE & ANDE n. 3118.

(*b*) STURM *colleg. exper.* p. 156.

(*i*) Qui distantiam non novit, in magnitudine fere fallitur BUFFON T. III. p. 312.

(*k*) BERKELEY p. 256.

(*l*) BAYLE p. 483. BERKELEY p. 259. SCHEINER p. 132. 133.



sæpe memini per incendia remotorum pagorum homines miræ magnitudinis & plane gigantes, mihi visos fuisse.

Altero modo fallimur, quoties corpora, de quorum magnitudine judicamus, non æque distant. Cum enim angulus, ex quo magnitudinem metimur, perpetuo decrescat (*m*), ut objectum ab oculo recedit, ita semper minora videntur, cæteris paribus, quæ remotiora, donec evanescant (*n*). Quare in judicium de magnitudine distantiam recipere oportet (*o*).

Inter æque distantia corpus altum, ut turris, minus adparet, quam idem corpus in planitiem restitutum (*p*).

Remotorum corporum in magnitudine discrimina male judicamus (*q*), quod exiguum sit, quo imagines adeo parvæ differant.

Videtur etiam anima a sensu retinæ majori ad magnitudinem corporis conspecti argumentari: hinc quibus nuper a cataracta deposita visus redditus est, ii majora (*r*) vident. Epilepticus etiam majora videbat (*s*). Ea imaginaria magnitudo cum repetitione sensationum minuitur.

Aliæ causæ, quare de magnitudine anima aliter & aliter judicet, mihi aut per-  
subtiles videntur, aut non veræ. Cum utique magnitudo imaginis in retina pictæ reliquis æqualibus sit, ut angulus opticus, & ut mensura magnitudinis, subtiliter cogitatum est, in minori oculo minora omnia depingi, infantes ergo, & parva animalia minora videre (*t*). Penitus contrario modo Cl. CHEYNE (*u*) magnitudinum conspicuarum sensum credit esse in ratione inversa magnitudinis corporis, ut mus tanto majora videat, quanto est elephante minor.

Ego

(*m*) p. 476.

(*n*) p. 477. seqq.

(*o*) NOLLET *leg. de physique* T. cit. p. 124.

(*p*) BERKELEY p. 274. Lunæ exemplum huc refero. Nam etiam in perfecta planitie major adparet, quando ex horizonte maris surgit. Non ergo ab interpositis arboribus. PORTERFIELD T. I. p. 381. S'GRAVEZANDE n. 3119.

(*q*) Le CAT p. 448.

(*r*) CHESLEDEN p. 304.

(*s*) *Journ. des médec.* 1760. m. Nov.

(*t*) BUFFON *hist. nat.* T. III. p. 330. VANDERMONDE *art de perfectionner l'es-  
pèce humaine* p. 436.

(*u*) *Philos. princip. of religion.* p. 344.



Ego quidem facile crediderim, quemque hominem unitatem suæ magnitudinis a se ipso sumere, & omnia corpora comparare cum suo, ut ea majora videantur, quæ nostrum corpus superant. Satis memini, arbores, domus, urbes, montes mihi majores visas, cum puer essem, minores nuper, cum longo intervallo pueritiæ meæ nidum a diuturno multorum annorum itinere redux primum respicerem.

Diversam esse magnitudinem, quam diversi homines vident, facile dederō (x).

Iterum non credo, magna videri quæ confusa videntur (y); neque a frigore oculum nostrum minora videre (z); neque pupillæ (a) amplitudinem mutatam (b) mutare magnitudinis sensum, cujus quidem phænomeni est facillimum judicium; neque minora videri, quæ cum attentione animi consideramus; neque myopes minora videre (c). Nihil horum unquam expertus reperi. Sed neque angustum, per quod inspicimus foramen (e), mutat judicium de magnitudine.

### §. XXX. *Judicium de loco.*

Locus objecti conspicui, quod unico oculo intuemur, est in linea; quam comprehendunt duæ rectæ linæ a retinæ parte sentiente ad ejus objecti fines (f) ductæ.

Quando duobus oculis intuemur, si intuemur unquam, tunc quidem est in fine axium opticorum, sive in puncto, in quo duæ linæ se secant, quæ ex puncto sentiente retinæ ducuntur in objectum. Quare duplex videbitur objectum, si ea puncta nusquam se secuerint.

Facile est experimentum. Incipio oculo solo sinistro videre, adnoto punctum, in quo objectum conspicitur: tunc clauso sinistro oculo, solo dextro utor, salit ita imago & sinistrorsum fugit. Oportet autem non nimis magnum corpus esse.

Etiam

(x) PORTERFIELD II. p. 345. 346. 374.

(y) Le CAT p. 471. 476.

(z) IDEM p. 470. SAUVAGES *suffus.* p. 22.

(a) Vide PORTERFIELD II. p. 179. 180.

(b) Le CAT p. 471. PALUCCI *hist. de l'oper. de la catar.* p. 27.

(c) Le CAT p. 470.

(e) SCHREINER p. 141.

(f) PORTERFIELD II. p. 393.



Etiam hic per experimenta animam oculi effectum corrigere creditur (g). Hinc si objectum quidem innotum fuerit, retina (h) vero mota, objecta moveri videntur, & retrorsum ire, quando celeriter ea prætervehimus, ut in fluviis (i) fit, quorum litora retrorsum acta fugiunt; & dum ipsi rotamur; objecta contrario ductu videntur in circum agi (k); & contra lunam credimus nobiscum moveri, quia ejus imago in nostris oculis non mutatur (l).

Quæ in oculis ipsis sunt corpora, ea omnia extra oculos credimus nos videre, ut globulos, & lineas pellucas, qui sunt globuli & vascula retinæ (m): Eos in foramine exiguo, per quod lux advenit, accurate poni credas. Inter retinam tunicam & vitreum humorem sedem veram habere S M I T H I U S (n), & eo inclinatur M E I S T E R U S. Sed in retina certas arterias rubras habemus, in vitreo corpore nondum demonstratas, & nascuntur ejusmodi maculæ ex fortissimæ lucis (o) intuitu, is autem retinam, ubi focus est, non vitreum corpus adficit. Dudum tumores eos retinæ depinxit P E C Q U E T U S (p), & nuper Cl. P O R T E R F I E L D (q).

§. XXXI. De distantia.

Distantiæ in imagine ipsa nulla est diversitas, hinc ille C H E S E L D E N I A N I cæci insuperabilis error (r); & infantes remota omnia credunt esse exigua (s). Sed & ipsi utique remota minora videmus (t). Multo demum rerum usu (u) doctior, & semper tamen imperfecte docta mens de distantiarum discrimine discit judicare (x).

U u u 2

CAR-

- (g) M U S S C H E N B R O E C K c. 33. fin. M A R T I N p. 149.  
 (h) S E N A C *ess. de physiq* p. 585. 704.  
 (i) S T U R M *vision. sens.* p. 42.  
 (k) P O R T E R F I E L D II. p. 425.  
 (l) S T U R M *de visione* p. 41.  
 (m) Vide elegantissimam dissertationem Cl. M E I S T E R I in *Hamburg. Magaz. T. XXIII.* p. 269. & conf. P I T C A R N E *theor. morb. ocul.* p. 17. S E N A C *Ess.* 1735. p. 705. 507. B O E H A A V E *morb. ocul.* p. 34. 35. 38. S A U V A G E S *suffus.* p. 13.  
 (n) *Remarks*  
 (o) B U F F O N *Mém. de 1743.* p. 156.  
 (p) Apud M A R I O T T E p. 504. la H I E R *accid.* p. 572.  
 (q) *Edimb. ess.* T. III. p. 263. f. 14.  
 (r) B U F F O N T. III. p. 312.  
 (s) H A R T L E Y p. 201.  
 (t) B U F F O N T. III. p. 313.  
 (u) S T U R M *ocul. Θεωρησις* p. 17. *de vision. ocul.* p. 34.  
 (x) P O R T E R F I E L D I. p. 423. S M I T H *popul. tract.* n. 139. H A R T L E Y p. 201.



CARTESIUS ad modum cæci animam credebat distantiam judicare, ex magnitudine anguli ( $y$ ), quem faciunt coeuntes in objecto axes optici: is angulus semper major est, quo propius objectum, & minor, ut remotius.

Eum angulum neque aves, neque pisces ( $z$ ), neque homines monoculi norunt, neque ii, qui uno oculo vident. Quare utuntur aut angulo linearum a puncto radiante in fines corneæ ( $a$ ) tunicæ ducto, aut angulo, quem fines objecti visibilis cum puncto sentiente retinæ faciunt, uterque enim angulus eo major est, quo propius objectum, & contra.

Vere tamen anima hos angulos ignorat ( $b$ ), & judicium, quod angulis tribuitur, pertinet unice ad sensum magnitudinis, quam idem angulus metitur ( $c$ ). Et in universum ea utimur regula, distantias esse in ratione inversa magnitudinis ( $d$ ) conspicuæ, etsi non accurate ad duplam distantiam duplo minora videmus ( $e$ ). Didicimus enim hominem proximum nobis æqualem, multo minorem videri, quando ad centum pedes remotus est: & iterum minorem, quando distantia est mille pedum. Quare, quando magnitudinem tenemus, ea utimur, tamquam cognita quantitate, qua in æquationem introducta, distantia eruitur. Fallimur adeo, quoties magnitudinem veram non tenemus ( $f$ ). Humilitas aliorum corporum ad distantiam aliquid facit.

Monoculos distantias male æstimare ( $g$ ) non crediderim, cum aves adeo accurate ad destinatam prædam advolantes, pro monoculis ob oculos laterales haberi possint, & venatores uno oculo utantur, quorum interest, distantiam accurate nosse.

Ingrediuntur judicium de distantia etiam aliæ ab experientia sumptæ quantitates. Pallida nempe omnia fieri, & indistincta magis, quo sunt remotiora, experimento constat. Pallor duplex est, a paucitate radio-  
rum

( $y$ ) MUSSCHENBROECK n. 1242. le CAT p. 473. HARTLEY p. 202.

( $z$ ) PORTERFIELD of the eyes T. I. p. 77. 106

( $a$ ) KEPLER. PLEMP. L. IV. probl. 46.

( $b$ ) BERKLEY p. 223.

( $c$ ) p. 521.

( $d$ ) SMITH n. 139. PORTERFIELD II. p. 392. JURIN p. 32. & 38.

( $e$ ) le CAT p. 444.

( $f$ ) p. 520. 521.

( $g$ ) BOYLE final caus. obs. VII. TAYLOR p. 206. DEMOURS ad Edimb. obs. I. p. 365. le CAT p. 474. PORTERFIELD I p. 77.



rum ex objectis remotis (*b*) advenientium alter, perpetuus, & ob eum objecta valde vivide colorata propiora adparent (*i*).

Alter est a colore aeris subcæruleo (*k*) interposito, cujus eo major est effectus, quo profundior columna aeris nos inter & objectum interponitur. Hinc montes cærulei.

Partes etiam corporis remoti minus bene distinguuntur (*l*), tum quod minus clara sit imago, tum quod nimis parvæ adpareant eæ partes, angulumque subtendant (*m*), minorem eo, sub quo distincte videmus. Ideo montes vicini post pluviam, cælo sũdo remoti. Per depuratum enim aerem nitidius arbores, aliaque corpora distinguimus; per sũdum & vaporibus onustum cælum pauciora discernimus.

Possis etiam addere, minorem in oculo sensibilem distantiam corporum, quorum distantiam certo novimus magnam esse, convincere nos, ea objecta remota esse, quæ tamen vere vicina videmus. Ita arborum parallelarum lineas (*n*) longe a nobis recedere intelligimus, quod distantia extremarum duarum, quam scimus magnam esse, parva videatur.

His præsiidiis anima utitur: nam his ipsis adjuti pictores distantias rerum rite exprimunt, parvitate, pallore, cæruleo vapore admisto, lineis debilius circumscriptis & confusis, distantis rerum magnarum diminutis.

Aliquantum etiam utimur multitudine corporum interpositorum: ea enim distantiam (*o*) majorem indicant (*p*). Hinc lacus nimis angusti adparent. Quietem corporum, quæ magna novimus esse, & quiescere videntur: sonorum debilitas, & alia, ab experientia repetita mens experta conjungit.

Reliqua præsidia, ut conatum, quem exerceamus in oculo mutando, lentisve crySTALLINÆ situ aut convexitate (*q*), in contorquendis axibus

U u u 3

opticis

(*b*) De la HIRE p. 533. HARTLEY p. 202. PORTERFIELD II p. 396. BAYLE p. 481. S'GRAVEZANDE n. 3115.

(*i*) *Elém. de psychologie* p. 83.

(*k*) PORTERFIELD II. p. 400. le CAT p. 473. huc lunæ in horizonte positæ apparentem magnitudinem refert p. 433.

(*l*) La HIRE p. 536. le CLERC *system. art.* 21. PORTERFIELD l. c. T. II. p. 404. 405. JURIN. p. 40. le CAT p. 473. HARTLEY p. 202.

(*m*) p. 477. seqq.

(*n*) Conf SENAC l. c. p. 584.

(*o*) NOUET *ibid*

(*p*) La HIRE. HARTLEY p. 202. CONDILLAC II. p. 74. NOUET *leçons* T. V. p. 113.

(*q*) HARTLEY p. 202. S'GRAVEZANDE n. 3111. 3112. BAYLE p. 481. PORTERFIELD II. p. 386. 387.



opticis ( $r$ ), ea quidem hypothefi nituntur, quem recipere non licuit ( $s$ ).

Etsi denique verum est, cis distantiam visionis distinctæ utique confusiora adparere omnia, quo sunt propiora ( $t$ ), non tamen unquam expertus sum, animam inde judicare, objectum propius esse. Neque enim unquam solemus in vita humana in objecta nimis propinqua inspicere: ut quidem nimis remota frequenter intueri cogimur, & usu discimus, quomodo in oculo repræsententur.

#### §. XXXII. *Motus & quies.*

Moveri corpus judicamus, quod id continuo alio & alio in puncto per axin opticum videamus. Multum ergo hic fallaciæ subesse potest. Quiescere videntur ea omnia, quæ in dato tempore per exiguum spatium percurrunt, ita ut intervallum secundi puncti, sub quo ea videmus, a primo, angulo nimis exiguo mensuretur. Ita quiescere videtur horologii sagitta, & sanguis in vivæ ranæ venis, & in semine sui vermiculi. Quando microscopium ( $u$ ) adhibetur, ut distantia, quam ea corpora percurrunt, major adpareat, tunc ea, quæ quiescebant, videmus satis celeriter moveri. Hinc etiam remota corpora ( $x$ ) non videntur moveri, quod ob angulum nimis exiguum, quem subtendit, distantia primi loci & secundi non distinguatur. Accuratus definivit G. PORTERFIELD, si spatium, quod corpus motum in secundo minuto percurrit, fuerit ad distantiam ab oculo, uti 1. ad 1400. ( $x^*$ ).

#### §. XXXIII. *Convexitas & concavitas.*

Valde arbitrarium, & fallax est id judicium. Experientia quidem nos docuit, in universum concavum corpus esse, quod habet umbram in latere respondente manui nostræ dextræ, & convexum, si umbra fuerit in latere, quod e directo est manus sinistræ.

Ipsi

( $r$ ) BAYLE' p. 480. S'GRAVEZANDEN. 3114. la HIRE p. 536. HARTSOEKER p. 85.

( $s$ ) p. 514. 515.

( $t$ ) BERKLEY p. 224. 241.

( $u$ ) HOOKE method. of improving. &c. p. 15. 16.

( $x$ ) SENAC l. c. p. 584.

( $x^*$ ) L. c. T. II. p. 423.



Ipsi nudi oculi non valde fallunt, nisi eos distorqueamus. Tunc enim conatu edito, & oculo contorto, quem nunc etsi sæpe repetii, non possum repetere, (ut accuratius describam), continuo mihi invertuntur convexitates, & fossæ, & in sigillo v. c. eminere videntur, quæcunque depressa sunt.

Microscopium (*y*) etiam hic valde fallit, & in universum quo acrius est, eo magis plana ea facit, quæ sunt convexa (*z*). Ea causa est, quare modice augentes lentes vitreæ globulos sanguinis convexos ostendant, nimis acres planos repræsentent. Sed & alias convexa ostendunt (*a*), quæ sunt concava, ut & diversorum hominum diversum sit judicium, & ejusdem hominis alio in situ positi.

§. XXXIV. *Lux & colores.*

Etsi colores distinguere sit oculi a natura destinatus labor, non ideo tamen uniformiter & constanter eadem eorum est apparentia. Et liceat primo, nam res meretur, vulgare hic, meditati tamen magni momenti futurum, phænomenon adducere, quo percussi (*b*), frictique oculi (*c*), vel convulsi (*d*), inque vertigine (*e*), aque tussi (*f*), vomitu (*g*), a labore in parvis corporibus (*h*) irritati, etiam noctu evigilanti sponte (*i*), per duo etiam secunda durantes, etiam perpetuas (*k*), scintillas veras videant, nihilo minus vividas, quam quæ ex chalybe a crystallo percusso emicant. Ut etiam aliqui mortales ad eas imaginarias scintillas noctu satis ad objecta distinguenda viderent (*l*), si ea pars historiæ vera est.

Eæ

(*y*) Conf. Hooke *micrography* de oculo muscar. & SERAGLI *vigil.* p. 626. 627.

(*z*) Cl. POZZI *epist.* ad Cl. SERAO p. 8.

(*a*) Conf. JOBLEOT. P. I. c. 13. p. 49.

(*b*) Vulgatissimo experimento.

(*c*) LANGGUTH *de luce ex presf. oculi.* MORGAGN. *Adv.* VI. p. 92. POE. TERFIELD *Ess. of Edimb.* T. III. p. 211. MALVICIN *collct.* p. 52. MICHAELI *paralipom.*

(*d*) In morbo convulsivo MORGAGN. *Epist.* XVIII. n. 5. BARTHOLIN. *luc. anim.* p. 109. h. 45. C. III. HAGEDORN *hist.* 15. Cent. I. MARC. DONAT. p. 206. SAUVAGES *suffus.* p. 18. Fulgores ante tetanum HIPP. *Epidem.* V.

(*e*) In vertiginosis PLATNER *de vuln. Supercil.* BARTHOLIN. *de comet.* p. 131. Ante cataractam GALEN. *Hipp. Plat. decr.* L VII. c. 4. ante amaurosin BARTISCH VII. c. 15. Ante apoplexiam LANCIS *subit. morb.* I. c. 20. Ante epilepsiam ARÆCTÆUS. TRONCHIN *colic. pictor.* p. 38.

(*f*) BOYLE *de color.* p. 13.

(*g*) WOODWARD *cases* p. 37.

(*h*) La HIRE p. 579. in sutricibus phrygiis TAYLOR p. 358.

(*i*) SALMUTH n. 58. Cent. II. *Giorn. di Parma* 1687. n. 217. 218.

(*k*) SCALIGER *in Arist.* *de plant.* p. 143.

(*l*) PLUMP L. IV. *probl.* 58. Ez. a CASTRO *ign. lamb.* p. 114. Task apud TEICHMEYER *anthrop.* p. 251.



Ex luces possunt in circulos formari (*m*) tot quot puncta oculi premuntur, eo vividius fulgentes, quo profundius digitus urgetur, eo minores, quo pressio (*n*) minori fit corpore. In circulos quidem coalescunt, quod vividæ sensationes non continuo evanescant. Facile credo fieri a pressa retina (*o*), in qua sola sit sensus lucis colorumve, hinc requiri bonum nervum opticum, neque paralyticum (*o*\*). Sed singulare hoc & utile est testimonium, animam nostram similes sensationes confundere, si minus notæ causæ effectum tribuere magis notæ causæ, quoties in effectibus similitudo obtinet. Hic retinæ pressio a luce externa nata notior est, quam pressio a corpore non lucido durove orta: cum tamen pressio cum pressione genere conveniat, anima a pressa retina lucem se videre persuadetur, etsi ea pressio est alterius corporis.

Uti lux, ita colores in oculo absque causa extra nos posita se repræsentant: alias ab interna causa febreque (*p*), a frictio (*q*) per tenebras oculo, a lipothymia (*r*): iique colores & ipsi in circulum coalescunt (*r*\*). Non oportet hic omittere, pavoninos eos colores ostendere, frictionem fortem eodem modo oculum adficere, quo lux, aut ruber color; inde, ut sensatio ea frictionis decrescit, ita colores debiliores succedere, donec nullus superfit, uti fit ab imagine solari (*s*), & adeo minimam pressionem retinæ ab anima pro violaceo colore haberi, pro luce maximam.

Quare cum tener oculus ab eadem causa magis adficiatur oculo calloso, facile credo, non omnes homines eosdem colores videre (*t*).

LIB.

(*m*) MORGAGN. *Adv.* VI. p. 92. LANGGUTH l. c.

(*n*) LANGGUTH.

(*o*) MORGAGN. l. c. Ab' oscillatione liquidi nervei in PETRI circulo SAVAGES l. c.

(*o*\*) PORTERFIELD T. II. p. 297.

(*p*) Irides in febre pestilentiali BOYLE de color. p. 18.

(*q*) PORTERFIELD II. p. 343. NEWTON *query* 6.

(*r*) CAMER. *memor.* Cent. II. n. 48.

(*r*\*) A frictione.

(*s*) p. 461.

(*t*) PORTERFIELD II. p. 345. 346.



## L I B E R X V I I.

## S E N S U S I N T E R N I.

## S E C T. I.

## I N T E L L E C T U S.

## §. I.

Terum descendendum est in regnum hypothesium & conjecturarum. Mirum autem videri possit, proximum animæ satellitium adeo non notum esse, ut ipsos cæli motus melius, quam propriæ mentis, quæ est *nos ipsi*, in cogitando, in percipiendo, in meminiscendo laborem intelligamus. Videmur ita facti esse, ut sensibus nostris ad mundum cognoscendum utamur: non perinde, ut introrsum conversæ acie animi, nostræ animæ oeconomiam vitamque condiscamus. Exiguum est, quod certo novimus, multa pars latet, & non exigua æternum latebit, si de futuro hominum profectu ex eo judicare licet, quem secula præterita produxerunt. Multam vero lucem sperarem adfulsuram, si opportunitatibus incidendorum hominum fatuorum, obliviosorum, & maniacorum diligenter uteremur: si animalium, quorum mores & ingenia nobis cognita sunt, cerebra cum humano cerebro accurate compareremus: si demum ingeniosior, & ad meditandum aptus homo vellet suæ animæ vitam & gesta longo annorum tempore, aque juvenilibus annis, absque hypothesei meditari, & accurate, & sincere propriæ mentis scribere historiam.

§. II. *Sensatio venit ad cerebrum.*

Omnes illi quinque nobis noti sensus in eo consentiunt (a), ut extremus quidem nervus in suo cujusque sensus organo a tactili & sensili

(a) Omnes sensus sunt tactus species BATHURST *prælect.* p. 22. MONROO *ner.* p. 375. DUVERNEY T. I. p. 314. BUFFON *Histoire natur.* T. III. p. 353. 355.



fili corpore percutiatur: quod potissimum manifesto illo in visione exemplo imaginis in retina depictæ confirmatur. Sed oportet eam in nervo sentiente percussione effectum suum ad cerebrum (*b*) mittere eo modo, ut anima ab eo objecto externo adficiatur. Ostensum est enim cum bono oculo (*c*), mentem cæcam esse, si iter ab oculo in cerebrum impeditum fuerit, aut cerebri sedes male adfecta, ad quam nervus opticus venit.

Non ideo imago in retina depicta venit in cerebrum, non ideo aut sonorum in aure interna excitati tremores, aut sapes, qui linguam adfecerunt. In visione res est manifestissima, imago enim per longam & opacam viam ad cerebrum transmitti non potest, & etiam paulo ultra retinam jam confusissima pingeretur (*d*), etiam si nervus opticus pellucet undique.

Quid ergo ad mentem venit, & quomodo? Quando de sensationibus nobis notis ea detrahimus, quæ habent peculiaria, ut ea sola supersint, quæ habent communia, motus erit in mollem nervum impressus (*e*). Et motum ad cerebrum venire credas, cum a fragore metallorum pulvere pyrio oneratorum (*f*) commotiones in cerebro adeo manifestæ & violentæ succedant: earum similes, quæ ab ictu aliquo capiti ipsi inflicto, sequuntur. Iterum idem confirmatur exemplo simillimæ scintillæ (*g*), & a filicis & chalybis vero conflictu, & alterius imaginariæ scintillæ, tum a frictione oculi natæ, tum absque oculi vitio, in epilepsia, & convulsivis malis. Motus ubique solus est, qui & in cerebro mentem, & in objecti externi sensatione nervum sentientem adficit.

Is motus possit ad cerebrum venire per vibrationes solidarum (*h*) fibrillarum nervi optici: potest etiam per fluidi, iis nervis contenti, motum pernitem, qualem alibi ostendimus: Sed vibratilem naturam a nervis ostendimus alienam esse; sensuum ergo impressiones per elementum  
fluidum

(*b*) L. X. p. 296.

(*c*) p. 297.

(*d*) L. XVI. p. 495.

(*e*) BERGER C. 23. &c.

(*f*) L. XV. p. 287. &c.

(*g*) L. XVI. p. 527

(*h*) L. X. p. 361.



fluidum ( *i* ) adveniunt ad eam sedem, qua menti repræsententur. Ea est in cerebri, & cerebelli medulla ( *k* ).

Ea medulla fibrosa est ( *l* ): & fibræ eæ molles ( *m* ) sunt. Poterit ergo ultimo elementum spirituosum in fibras medullæ encephali urgere, easque incurvare, aut conprimere, neque enim hic quidquam novimus, neque ultra id ipsum quidquam licet vel ex conjectura ( *m*<sup>\*</sup> ) affirmare.

§. III. *Quare animæ non repræsentatur objectum externum.*

Maxime memorabilis hæc est observatio, & profunde totam mentis humanæ cognitionem ingreditur. Res ipsa certa est, & dudum quidem animadversa ( *n* ). Distingui vero debet accurate, & ostendi, neque in cerebro repræsentari imagines rerum, neque in anima. In visu radii colorati, certo gradu modoque refracti, in retinæ fibras incidunt, easque emoveant. In cerebrum nostrum nihil nisi motus pervenit ( *o* ). Fuit vir ingeniosus, qui imaginem quadranguli, in exemplo, per fila continua in cerebrum ita transire diceret, ut conservaretur utrinque in oculo & cerebro par lineolarum inclinatio; ita imaginem in cerebro inscribi ( *o*<sup>\*</sup> ). Verum ponit vir Cl. per solidas fibras motum continuari, quem ostendimus progredi per eas fibras non posse. Ergo is, quem a retina diximus propagari motus, in cerebro natus, non est imago corporis visi ( *p* ), ut ostendimus, neque est radiorum certo gradu refrangibilium in cerebri fibras actio: est autem, quantum videmus, motus in cerebro excitatus a motu, quem in oculo externum corpus visum excitavit.

X x x 2

Idem

( *i* ) L. X. p. 365. Per seriem globulorum, secundum experimentum HUGENII *Mém. avant* 1699. T. I. p. 284. *de la lumière* I. p. 11. 12. PERRAULT, WOLF *Wirkung* n. 124.

( *k* ) L. X. p. 393. 394.

( *l* ) L. X. p. 31.

( *m* ) L. X. p. 361. seqq.

( *m*<sup>\*</sup> ) Vide hypothesein ingeniosam fibrarum, & in oculo & in cerebro pariter a pressione sensoria productarum *Hamb. Magaz.* T. XXV. p. 364.

( *n* ) FRA PAOLO in *vita* GRISELINI p. 51. GALILEUS *suplem. ad Giorn. de letter.* I. HOOKE *method. of improv.* Johannes LOCKE *de l'entendement* L. II. c. 8. NEWTON p. 108. 109. BOERHAAVE *Instit.* n. 510. S'GRAVEZANDE II. n. 2310. 3078. 3079. Olim SOCRATES: color albus non est in corpore albo, neque ullibi *Theætet.*

( *o* ) p. 530.

( *o*<sup>\*</sup> ) *Hamb. Magaz.* T. XII. p. 361.

( *p* ) PLEUCH *Spec. de la natur.* T. V. p. 161. 162. Admiserat imagines CARTESIUS *homin.* p. 133. CRAANEN p. 576. &c.



Idem in cerebri fibrillis excitatus motus nunc alius & alius est, cum iisdem objectis & luce eadem, uti oculus noster magis minusve convexus, magis minusve tener, magis minusve coloratus fuerit, & quæ aliæ sunt organi visorii conditiones (*q*). Relatio ergo est aliqua inter corpora externa, & id quod in cerebro ab eorum impressione fit, non imago aliqua, neque modulus.

Porro in sapore salis marini (*r*) figura cubica est, prismatica in nitri sapore. Non adfirmo quidem ab earum figurarum discrimine discrimen saporum unice sequi (*r*<sup>\*</sup>); sed aliquam tamen in figura partium diversitatem ad discrimen in sapore facere nemo negaverit (*s*). Nunc adeo in lingua, dum sapit, quadrata corpuscula aut rotunda, ad linguæ papillas adplicantur, adficitur nervea pulpa certo motu, quem sola lingua pati apta est; nam ea figuræ quadratæ & triangularis discrimina in particulis saporificis a proxima cute non distinguuntur. Si cutis, si linguæ epithelio nudati nervi sapores non distinguunt (*t*), neque adeo cerebrum poterit eo modo adfici per nervorum continuatum systema, ut quadratas & triangulares figuras percipiat: & iterum mutatis linguæ involucris, & salivæ indole, alii alique sapores ejusdem objecti in cerebro percipientur (*u*).

Multo minus omnino mens nostra objectorum externorum imagines & vestigia percipit, dum sentit. Cerebrum, dum videmus, motum aliquem percipit (*x*), mens nostra ne motum quidem, multo minus distantias, magnitudinem, & alia, quæ vere sunt in corporibus, quæ videmus. Rubrum videt, non laminas rubros radios reflectentes (*y*), absorbentes alios radios, non radios rubros a corpore reperlucos (*z*): multo minus vibrantes (*a*) certa celeritate laminas. Cæruleum videt, non debiles radios (*b*), magis quam rubri refractiles, aut tenues laminas reflectentes & refringentes (*c*); sed aliquid sibi clari, & facile a rubro distinguendi,  
ut

(*q*) p. 519. &c.

(*r*) L. XIII. p. 120.

(*r*<sup>\*</sup>) pag. 123.

(*s*) Ibid.

(*t*) p. 114.

(*u*) p. 123.

(*x*) L. XVII. p. 530.

(*y*) L. XVI. p. 462.

(*z*) Ibid.

(*a*) p. 464.

(*b*) p. 459.

(*c*) p. 461.



ut tamen neque fabricam cærulei corporis, neque radiorum inde redeuntium quidquam sentiat se videre. Videt globum: non videt convexitatem, quam digiti metiuntur, sed umbram certo modo dispositam (*d*).

Ita dum auris nostra musicam audit, cerebrum quidem videtur tremores aliquos pati, ab aere elastico & oscillante impressos (*e*); & ii tremores differunt velocitatibus (*f*), & robore. Anima vero nostra, musices imprimis ignara, tremores dari perfecte ignorat, multo magis ignara eorum tremorum numeros sonorum efficere discrimina, gratas unice ingratasve sonorum successiones percipit.

Et hæc de *secundis qualitatibus* corporum suffecerint, quas omnes fatentur (*g*), *relativo modo* a nobis percipi. Eo nomine denotarunt colores, sonos, sapores, quorum discrimina credas a figura, textu, & motu particularum insensilium corpusculum nasci (*h*).

Neque primas magis rerum qualitates sensus nostri nobis depingunt, aut percipit anima; primas autem vocant metaphysici, quæ vere corporibus sensibilibus inesse creduntur, magnitudinem, duritatem, figuram (*i*). Ostendimus quam diversa sit imaginis in cerebro magnitudo a vera visi corporis magnitudine: & etiam in eo exemplo anima nostra non videt magnitudinem imaginis in oculo depictæ, sed multo majus quid, & toto oculo grandius. Et motus, ut neque a cerebro certo firmoque modo percipitur, ita minus multo ab anima, quæ ne motus quidem ullam ideam percipit, sed effectum unice, corpusque hic, deinde ibi positum.

Ita fit porro, ut sensus inter se passim dissidere videantur, & aliter oculus, aliter auris, aliter digitus ab eodem corpore eodem tempore adficiatur: Solum etiam repetitum experimentum tactiles corporum qualitates cum visibilibus conjungit (*k*). Ita cæcus cum audiret, scarlati colorem eminere vi vivida, per tubæ sonitum id robur describebat (*l*).

X x x 3

Ita

(*d*) p. 296.(*e*) L. XV. p. 271. seqq.(*f*) p. 240.(*g*) CARTESIUS, LOCKE &c.(*h*) L. c. n. 10.(*i*) LOCKE l. c. n. 9.(*k*) BERKLEY *theor. of Vis* p. 252.(*l*) Apud BOYLEUM.



Ita fit demum, ut alias & alias rerum ideas nobis subnascituras fere probabile sit, uti alia sensoria organa nobis natura fecisset. Nulla enim in rebus ipsis est necessitas, ne aliter nisi per hos sensus possint cognosci, minimeque dubito, aut nos ipsos aliis cum sensibus (*m*) magneticum & electricum fluentum, & aetherem æque manifesto percepturos, ut solemus aut aquæ rivos cognoscere, aut ignis micantia spicula: aut certe alias mentes hæc pro nostris sensibus nimis tenera elementa, certis cum sensibus æque facile percepturas. Sic totum regnum lucis & colorum nullum nobis esset, si cæcos omnes nos natura fecisset: nullum nobis sonorum imperium, si surdos. Dudum fuerunt, qui sensus nostris plures (*n*) dari posse senserunt, etsi nobis non est ullo modo datum, de organi fabrica sensusve ejus natura quidquam cogitare. Loci enim sunt, quæ nonnulli de sensu veneris (*o*) peculiari luserunt.

#### §. IV. *Perceptio.*

Diversæ ergo res sunt, 1. objecta externa, cum suis veris adtributis (*p*): 2. eorum in sensuum organa impressiones (*q*): 3. harum impressionum in cerebrum translatarum effectus (*r*) corporeus: 4. hujus effectus in mente repræsentatio (*s*). Et iterum probabile fit, recte Cl. viros sensisse (*t*), arbitrarium omne esse, quod DEUS nobis de mundo permisit percipere, non necessarium. Potuit aliter color ruber in oculo pingi: aliam in cerebro impressionem facere, aliam in animo ideam excitare.

Neque tamen ideo falleremur, etsi *signa* rerum percipimus, non res ipsas: dum ea perceptionis eorum signorum sit constantia, ut ab iisdem causis similes perceptiones semper, & in quoque homine, & in omnibus hominibus generentur: similes, inquam, non eædem: & dum ad hæc  
signa

(*m*) Etiam tactus in variis varius est. Non læduntur bajuli iis, quæ læderent teneros homines PORTERFIELD T. II. p. 348.

(*n*) DEMOCRITUS apud PLUTARCHUM περί των αἰσθητικῶν δ. MONTAGNE, BOHN p. 298.

(*o*) OCTO LAMY, veneris nempe famis & sitis *ame sensitive*. Sensus successivus est memoria HOOKER *postb.* p. 139. seqq.

(*p*) p. 533.

(*q*) p. 529.

(*r*) p. 531.

(*s*) p. 532.

(*t*) BERKLEY *Alciphron*. Etiam BOERHAAVE.



figna rerum regulæ vitæ humanæ, nostræque tutelæ & felicitatis consequendæ leges certæ condi possint. Ita chartulæ, quibus publica fides auri & argenti pretium imprimit, æque veras divitias faciunt, ac quidem aurum, aut merces, quæ cum auro æquivalent.

Nunc *anima* nostra percipit sensationem, nascitur nempe in ea novus status, qui paulo prius non fuerat, inque eo statu, dum is durat, repræsentatur aliquid animæ ejus, quod in universo rerum agitur: non id quod agitur, nam sæpe est id repetendum; sed aliquid ad id, quod agitur analogum ( $u$ ), & constante etsi arbitraria lege revinctum ( $x$ ). Estque id quod agitur in corpore nostro nervi perculsio: extra corpus nostrum est quodcunque phænomenon, quod per aliquem quinque sensuum nostrorum potest in anima mutationem datam excitare.

Incipimus hic animam a corpore distinguere; quod enim in cerebro fit, id motus est fibræ medullaris: quod in anima, id est idea ab eo motu diversissima. Eam anima & habet sibi obversantem, & omnino *appercipit*, nempe conscia est sibi repræsentari; motus interim alicujus, aut in cerebro factæ mutationis, aut in nervo, penitus ignara, ut infans æque bene mecum aut audiat, aut colores videat, cæterum nequidem in aure interna se audire norit, aut in oculo videre, nisi per ratiocinium utrumque didicerit. Mens ergo aliud quid est a corpore. Corpus si foret, & tamen apperciperet, apperciperet ( $y$ ) utique motum in medulla cerebri, qui solus est in corpore: nunc non eum, sed colorem percipit, qui in cerebrum non imprimitur.

Non omnes ideæ videntur *appercipi* ( $z$ ), sed eæ solæ, quæ paulo fortiores sunt, aut minus per consuetudinem nobiscum familiares. Non videmur, in ordinario vitæ humanæ casu, appercipere respirationis motum, etsi a voluntate nascitur, & facile appercipitur, quamprimum volumus appercipere. Non appercipimus levia illa incommoda, a luce fortiori, aut aliunde nata, quæ cogunt palpebras claudere, non sonos perdebiles, non contactus vestium in cutem, quæ omnia appercipimus, quamprimum libet: quæ adeo animæ repræsentantur, sed ita, ut  
ejus

( $u$ ) p. 534.

( $x$ ) Ibid.

( $y$ ) Cerebrum se ipsum non sentit, neque cognoscit, neque nervi se cognoscunt *Letures d'un Americain* T. VI. p. 160. 162.

( $z$ ) Sensus non perficitur in homine non adtento. NOLLET l. c. T. I. p. 173.



eius statum non eo gradu mutant, quo mutari oportet, ut ejus mutationis simus conscii.

Videor hactenus nimium STAHLIANIS concedere, qui animæ nostræ in organorum vitalium fabrica ignorantiam defectui, vel debilitati hujus apperceptionis tribuunt, sensumque (b) vitalem vocant, perceptionem proprii corporis, cujus statum mens per divisos undique nervulos ita percipit, ut ejus non sit conscia. Verum in eo tamen a Cl. viris differo, quod nostras obscuras sensationes anima nostra appercipere possit, quoties ipsi videtur; cordis contra, hepatis, intestinorum statum, quando sana sunt omnia, & maxime volens, non appercipiat. Videtur in nostro casu debilis esse apperceptio, & absque vestigio, nulla in STAHLIANO.

§. V. Ordo idearum.

Ostendimus sensuum impressiones non continuo evanescere, & aliquamdiu animæ manere præsentem, etiam quando causa corporea earum impressionum ablata est, argumento circuli lucidi, qui ex scintillis rotati baculi & in extremo fine candentis coalescit (c). Adjuvatur certe eam per constantiam anima, ut majori tempusculo repræsentationem rerum corporearum præsentem habeat. Sed anima potest ex arbitrio suo (d) ultra id tempus repræsentationem, aut certe ejus signa conservare, sibi-que præsentia retinere. Eritque *adtentio*, quando anima toto eo tempore, quo repræsentatio durat, ad eam repræsentationem solam se applicat, omni alia repræsentatione interim exclusa (e), id enim anima potest. Hujus *adtentio* nunc ope signa repræsentationis aliqua ita confirmantur (f), ut diu in homine integra supersint, signa, inquam, ple-  
rorumque enim tactiles & refractiles & saporificæ impressiones (g) non manent, quales recepimus; auditoriæ hactenus, ut certe sciant, etiam aves, cantilenam *adtentem* exauditam repetere (h), tamen ipsum sonum  
diffici-

(b) GOHE von dem an Vorurtheilen kranken Verstande p. 31. GODART de l'ame p. 62. &c.

(c) HARTLEY prop. 3.

(d) WOLF psychol. Empir. p. 167.

(e) LOCKE de l'entendement L. II. c. 10.

(f) Augetur intensitas impressionis BONNET Anal. de l'ame p. 107.

(g) HARTLEY p. 57.

(h) Luscinæ a parentibus discunt, neque bene canunt ab iis non educatæ Aedologia p. 10. Conf. de canibus BONNET p. 179.



difficilius nobis volendo repræsentemus; sed signa utique, quæ & ipsa per visum didicimus. Omnium vero distinctissimæ & constantissimæ supersunt sensationes, quæ per visum nobis adveniunt (*i*). Insomnia (*k*) sunt sonorum quidem etiam, maxime tamen objectorum, quæ per visum repræsentantur, repetitæ imagines. Imaginatio est fere unice rerum visibilium. Potest, qui ea facultate pollet, absentem amicum, domum, arbo-rem sibi depingere, ut in anima videat, quasi præsentem, & ad eam ideam penicillo depingere (*k*<sup>\*</sup>), non absque expressa similitudine, & verbis describere ut adgnoscas. Absque ea facultate non licet esse Poetis. CARDANUS vigilans videbat, quæcunque cuperet, ut tamen imagines adscenderent ante oculos, & descenderent (*l*). Simile exemplum habet singularis vir & præstantissimus, Cl. BONNETUS (*m*). Videtur autem visus privilegium esse in distinctissima & minima imagine (*n*), exigua ergo particula nervi, quam visæ imagines percellunt, partiumque ejus imaginis certo ordine, qui in plerisque sensus nullus est, organumque late diffusum. Auditivæ sensationes creduntur esse confusiores, quod multi soni in unum coalescant (*o*).

§. VI. *Memoria.*

Retinentur adeo in homine, quæ cum adtentione receptæ fuerunt: deinde quæ vehementer hominem (*p*) perculerunt, incendia, dolores maximi, animalia insolentia (*q*), strepitus gravissimi. Etiam in scholis (*r*)  
adnota-

(*i*) Conf. HARTLEY p. 210. 57. 58. WOLF *psychol. Empir.* p. 60. Mobiliores esse abras eo pertinentes, quia sæpius moventur BONNET p. 425.

(*k*) BONNET ibid.

(*k*<sup>\*</sup>) MORELLUS civis noster omnium Cæsarum vultus calamo ita delineabat, ut adgnosceres.

(*l*) *Subtil.* p. 314.

(*m*) p. 427.

(*n*) p. 477. 478.

(*o*) BERKELEY p. 339.

(*p*) Spinosæ homo brasiliæ BOERHAAVE *de morb. nerv.* T. II. p. 412. Torsionis perpetuam præsentiam habet WOODWARD *cases* p. 260. 261. Octavo anno post morsum canis rabidi odor canum & dolor in vulnere imaginarius superstes ALBINUS *de Tarantism.* Ut retineantur imagines, debent grandes esse, rerumque fædarum, vel ridicularum SCHE-  
KEL *art. memor. detect.* p. 86.

(*q*) BONNET p. 205.

(*r*) CHARDIN *de Persis voyag.* L. V. p. 20.



adnotatum est melius discere pueros, qui clara voce lectionem pronuntiarent. Et in arte memoriæ imagines, ut retineantur, jubent motas esse (s). Credas profundius inprimi, quæ sint validiora.

In homine, inquam, nam disputatur, num in cerebro, num in mente potius (t). Vix tamen neges in cerebro hæc perceptionum quæcunque vestigia habitare, si cogitaveris, quid in ea vestigia sola fabricæ corporeæ mutatio possit.

Editur in lucem homo cum genere nervoso valde mobili, ut sensuum impressiones sint maximæ, & protinus in lacrimas, aut convulsiones erumpant. Sed ea ætate cerebrum est mobilissimum, aque fluida (u) pulte parum omnino distat: videtur in labili elemento nihil potuisse inscribi: & omnino adeo vehementium sensationum vestigia continuo evanescunt.

Confirmatur idem per ætatem cerebrum & hætenus indurefcit. Ita & sensationum minus velox, minus fortis est effectus, & contra manent vestigia rerum, & perfecta nunc est animæ facultas, quæ *memoria* dicitur, ab anno fere octavo, & nonnunquam citius.

Demum circa quinquagesimum annum cerebrum magis induruit magisque, ut nonnunquam etiam digitis & demissis ponderibus, & cultro eam firmitatem demonstres. Tunc, ut in duram materiem (x) novarum sensationum vestigia difficulter imprimuntur, & parum hærent. Vetusiarum autem rerum memoria, tamquam cum cerebro induruiſſet, constantior nunc superest. Sic cum memoria ab adliso occipite sublata esset, recuperata valetudine, rediit longe præteritorum recordatio, non eorum, quæ proxima præcesserant (y).

Donec labascente nunc & perinde puto, ut totum corpus, ob humorum acrimoniam, & excretionum pigritiam, vergente ad putredinem cerebro (z), ea ætas obrepât, in qua neque novæ sensationes, neque vetustæ, cum aliqua nunc constantia menti repræsentantur, sed pariter senex &

(s) SCHENKEL *art. Mem. detect.* p. 84.

(t) BUFFON l. c. T. IV. p. 60. CRUSIUS *homo non machina* n. 30. & Add. PLUCHE L. V. p. 162.

(u) BONNET p. 77.

(x) In homine, qui ad infantiam redierat, cerebrum siccum, flavum, friabile, nervorum origines siccæ & graciliores H. de HERBS *obs.* p. 45.

(y) TULP. L. IV. c. 15.

(z) Consumi & minui HARTLEY p. 392.



& ad minima mobilis fleat inultus ut puer, & fletus (a) causam paulo post obliviscatur: De fene legimus, qui absque memoria, absque sensatione vixit, ut (b) ne cibum quidem quæreret, neque cuperet quidquam. Videtur adeo memoria sequi naturam corpoream cerebri, & pariter crescere, sibi constare, & minui.

Deinde huc pertinent adducta a nobis hominum exempla, qui per morbos, & capitis læsiones, memoriam, aut insigniter labefactatam habuerunt, aut omnino amiserunt. Qui memoria excellenti fuerat, ad annum 30. vino abstemius, multum amisit de suo privilegio, cum ad vini usum rediret (b†). Per febrem catarrhalem etiam elegantiora ingenia memoriam perdiderunt (b\*). In peste attica multis literarum rerumque memoria periit (b\*\*). Post morbum acutum memoria deleta (c), & valde debilitata, ut declinare *mensam* iterato necesse foret discere, in viro Cl. HANOVIO (d). Post cephalalgiam alius tamen convaluit, cum patriæ & adgnatorum fuisset oblitus (e). Ex morbo acuto, cum ossicula essent inter falcis laminas, deleta memoria (f). A suspensione (g), & post apoplexiam memoria fere abolita, ut legere non posset literarum oblitus (h), & vulgo ab apoplexia memoria debilitatur, aut deletur (i). A philtro amissa omnium memoria (k); & a semine Canis (l); & a masturbatione (m). Ab æstu nimio (n). A pinta aquæ inter meninges homo obliviosus (o): & ab hydatidibus in cerebro (p). Literarum memoria,

Y y y 2

ria,

(a) De MAREBOROUGHIO ROBINSON *spleen* p. 83. Frequentia inter suos Marchiæ incolæ exempla BECMANNUS habet.

(b) FISCHER *de senio* p. 67. III.

(b†) SCHULZE *de granis Kerm.* p. 28.

(b\*) *Mém. de l'Acad.* 1754. p. 514.

(b\*\*) THUCYDIDES.

(c) JUCH *de singulari memor. læsione* HARDEE *apier.* p. 122.

(d) STRODTMANN *in vita viri.*

(e) SALMUTH II n. 41.

(f) *Histoire de l'Acad. des sciences* 1711. p. 27.

(g) ARVIEUX *Mém.* I. p. 402. omnium oblitus, quæ sibi acciderant.

(h) EBERHART *Vorles.* p. 902. 903. WEPFER *apopl.* p. 245-246.

(i) WEPFER *apopl.* p. 248. *de morb. capit. obs.* 67. 101. 103. 167. 98. 99. 100.

102. 109.

(k) UNZER p. 107. HEERS p. 131.

(l) LERUWENHOEK *Phil. transf.* n. 305.

(m) *Onanisme* v. 32.

(n) *Hist. de l'Acad.* 1705. p. 58.

(o) *Phil. transf.* n. 185.

(p) WEPFER *de morb. capit. obs.* 96.



ria, & matris & adfinium lapsu destructa (q). Calculus grandis in glandula pineali, cum memoria nulla (r) fuisset.

Quare etiam sublato eo vitio corporeo memoria rediit. Obliviosi pedum (s) tumore levati, (desidente eo humore qui cerebrum inundaverat), & alius a fluxu ventris (t) memoriam recuperavit. De tecto lapsus cum contusione, convaleuit & memoria læsa restituta est (u). Apoplexia & oblivio post sex menses sanata cucurbitulis cum igne (x) admotis. Et mitigato cæli æstu (y), memoria rediit, tum iis qui a morbo maligno amiserant (z), & renovato vulnere, quod clausum fuerat (a).

Et videntur, quæ profundius impressa fuerunt, retineri dum reliqua destruuntur. Homo, qui vocum ex morbo memoriam amiserat, & linguarum, musices tamen peritiam tenuit (b). Primum, quod amittitur, *substantiva* sunt (c), rerumque nomina; in majori malo etiam artes, quas homines didicerunt, & proprii labores de memoria pereunt. De poeta legimus, qui eo relapsus est, ut eo vivo poemata (d) ejus ab alio ederentur, neque ipse animadverteret. HERMOGENES, ARTEMIDORUS (e), MESSALA, CORVINUS, ORBILIUS, Georgius TRAPEZUNTIUS (f), Julius LIBRIUS (g) sodalis LICETII CURIO pater (h) literati viri amiserunt omnem literarum facultatem. Johannes CALCULATOR eo rediit fenex, ut propria inventa non intelligeret (i). Alii artes suas (k), & legendi omnino facultatem amittunt

(q) PLIN. L. VII. c. 24.

(r) CONTULI lap. pod. p. 42.

(s) G. V. SWIETEN T. III. p. 373.

(t) BENIVEN. abd. morb. caus. hist.

(u) CORNAR. hist. var. c. 15.

(x) Hist. de l'Acad. des sciences 1719. Add. HEERS obs. 21.

(y) Histoir. de l'Acad. des scien. 1705. l. c.

(z) JUCH. l. c.

(a) Giorn. de Lett. T. XVIII. p. 64.

(b) HAMBURGER physiol. p. 572.

(c) LINN K. Svensk. vetensk. handl. 1745. p. 116. 117. Add. BORZHAAY. nerv. p. 697. Manente judicio CONSTANT. med. beto. obs. ult.

(d) MONTAGNE Essays L. II. c. 13.

(e) CÆLIUS AUR. Chron. I. c. 5.

(f) BASSIANUS p. 60.

(g) Spontaneor. ort. p. 39.

(h) BASSIANUS ibid.

(i) CARDAN. subtil. L. XVI.

(k) Bresl. Saml. 1725. m. Aug.



unt (l), demumque etiam proprium nomen obliviscuntur (n); alii periodos non finiverunt (o), quod initium sermonis prius evanisset, quam finem possent addere. Alius familiarissima nomina oblitus erat, ut manubrium pro parte cava cochlearis haberet, chartam pro strophio (p). Fuit, qui & sonorum formationem, & loquendi facultatem dedidit (q). Denique, qui famem, sitimque omnino non senserunt (r).

Quare cum ex corporis diversis conditionibus memoria crescat, minuatur, pereat, restitatur, neque animam tegulæ ictum sentire probabile sit, aut vim effusi sanguinis; erit adeo in corporeo cerebro (s) sedes vestigiorum, quæ a sensationibus superfuerunt, & inprimis signorum, quæ mens nostra cum sensationibus didicit conjungere. Quod primum documentum est, mutuo in animam agentis corporis in perceptione, mentisque in corpus regnantis, quæ signa, nunquam, absque mente nascitura, cerebro imprimunt.

#### §. VII. Memoria. Imaginatio.

Cerebro inhærere memoriam, credo ostensum esse, sed multa sunt in ea re miracula, quæ possis partim demonstrare vera esse, modum omnino nemo explicare queat.

Primo quid sint rerum vestigia, non puto posse inveniri. Non sunt imagines (u), quæ vox ab unico sensu sumitur, & ad vestigia sonorum non potest absque errore transferri. Non sunt motus aliqui, etsi & ex motu oriuntur, & vibratiunculæ (x) nuper vocatæ sunt. In molli cerebro, post quinquagesimum annum, vibrationem superesse posse a mo-

Y y y 3

tu

(l) EBERHART l.c. WEPFER morb. cap. obs. 103. apoplex. p. 245. 246. Scribere oblitus MOTTE obs. 163. HERRS obs. 131.

(n) BRINIUS spirit. anim. p. 217. TULPIUS L. IV. obs. 15. Id solum norat scribere, ab apoplexia obliviosus alius le CAMUS l. p. 98. 100.

(o) WEPFER cicut. de morb. cerebr. n. 100. EBERHART l.c.

(p) WEPFER obs. 98. apoplex. p. 245. 246.

(q) La MOTTE obs. 163. & Hist. de l'Acad. 1711. p. 27. HERRS.

(r) FISCHER l.c. BONNETUS in sepulchr.

(s) BONNET analyse p. 39. le CAMUS p. 98. 100. MURATORI fantasia p. 32. HELVETIUS esprit l. p. 11. 12. HOOKE posth. p. 140. HARTLEY p. 374.

(u) p. 511 &c

(x) HARTLEY p. 59. &c.



tu semel in infante orto, neque eum motum unquam conquievisse, non potest ullo modo mente concipi. Sint ergo vestigia sensationum, quocunque demum modo in cerebro hæreant.

Earum natura est ejusmodi, ut anima volendo ea vestigia revocare possit, quamdiu sunt integra, & valida. Signum Asiæ est in iis quinque literis. Desidero nomen maximæ partis telluris nostræ; obsequiosum accurrit Asiæ nomen. Volo ejus partes, limites, maria, regna, imperia nosse: possum imperfectam, sed sic satis tamen similem chartam geographicam Asiæ mihi repræsentare, & facere, ut coram anima, mihi explicata videatur. Ita in nomine signum, in mappa ista imaginaria sensationem revocavi volendo. Estque anima in eo opere plerumque conscia, se ex memoria sua has ideas revocasse, easque olim per sensus accepisse (y); plerumque, inquam, nam debilissima per ætatem vestigia redeunt, absque recordatione, eas in memoria dudum fuisse reconditas.

Sponte se etiam sæpe rerum vestigia (z) obtrudunt, ut nimis frequens sit, fortes ideas, certe aliquo tempore, importunas nos persequi, nostræque mentis sibi adtentionem poscere. Amatæ conjugis dilecta idea (a) diu cum miti & humano marito habitat, eumque omnibus horis interpellat. Sic jactura quæcunque, ut memoria incendii, & indignatio repulsæ cum mente quasi consenescit. Sed ejusmodi ideas, quæ invito etiam redduntur, oportet esse ex fortissimis.

Sive sponte, sive ex animæ voluntate vestigia in memoria animæ repræsentantur, dicitur *memoria*, quando signa revocantur, & *imaginatio*, quando ipsæ sensationes renovantur. Separatæ sunt hæ facultates: nam alii homines signorum memoria pollent, miramque possident nominum repetendorum facultatem: alii imaginatione vivida excellunt, ut sensationes vetustas pene æque valentes sibi repræsentent, ac quidem fuerunt, cum primum sensorio organo se offerrent. Illud eruditos viros facit, hoc poetas (b). Est autem signorum repræsentatio debilior, & minoris efficacix, quam imaginum (c). Et repræsentatio, quæ fit a memoria, debilior est in sano homine, quam sensatio, quæ nunc a corpore sensus nostros feriente excitatur (d).

Potest

(y) BOWNE p. 60. 63.

(z) IREM p. 261.

(a) Idææ triduo hæsit invito G. V. SWIFTEN T. II. p. 334.

(b) Utraque qui valebat rusticus *Gentlem. Magaz.* 1751. m. Febr.

(c) CONDILLAC *des sensat* I. p. 55.

(d) BONNET p. 57. 504.



Potest autem imaginatio ita vivide sensationem repræsentare, ut a præsentis corporis impressione distinguere nequeas. In sonis exemplum est, in quibus campanarum diu auditum sonum, vix possis excludere auribus, neque facile distinguere, num veras audias campanas; num vero vestigia in cerebro eum sonum æmulentur.

Si validissimum in universum fuerit sensationis vestigium, poterit novam sensationem æquare (*e*) robore (*f*), & perinde pro vera haberi externi objecti impressione, ac quidem ejusmodi impressio per sensus adlata pro vera habetur. Huc visiones pertinent. Huc flammæ in febriente animo obversantes; huc vertigines quasi ruituri; huc melancholicorum fallaces ideæ (*g*), quibus, etiam conscii sui erroris, nequeunt resistere. Huc imagines, quæ per insomnia nobis obversantur, & quibus plerumque adsensum negare non possumus.

Fit vero ejusmodi robur imprimis a repetitione (*h*). Pueri (*i*) memoriter lectiones discunt recitare, dum sæpe easdem relegunt. Adgnosci- mus homines frequenter repetita vultus visione. Videtur sensatio quæque quasi aliquantò profundius vestigium prius imprimere, quibus vocibus non verum sulcum, & sculptionem aliquam, sed ignotam operationem in cerebro factam intelligimus, qua sensationis robur & constantia augetur. Idem vero est, siue sensatio ab anima revocetur, aut ab aliqua corporei mundi extra nos particula.

### §. VIII. *Ordo vestigiorum.*

*Ideam* vocamus eam in anima mutationem, quæ vel ex præsentis sensatione, vel ex renovato sensationis vestigio, vel ex combinatione a mente facta nascitur. Perceptio vero est animæ actio, qua hanc ideam recipit. Ejusmodi Idea est vel simplex, in qua nihil est sui dissimile, ut albi, rubrive coloris idea, aut soni tubæ: vel composita, quam ideam multæ  
sui

(*e*) Debili WOLF *Psycholog. Empir.* p. 58. Sed neque fortî cedit.

(*f*) NICOLAI *Einbild. &c.* p. 27. HARTLEY *prop.* 14.

(*g*) *Zod. Med. Gall. ann.* IV. m. Mart. MEAD. *de venen.* p. 33. 34. BORRHAAVE (qui vocat imaginationem alteram) *Prælect.* T. IV. p. 470. n. 533. ROBINSON *of the spleen* p. 186. 187.

(*h*) NICOLAÏC. HARTLEY p. 397. *Elém. de psychologie* p. 19. Add. LALLEMANT *mécan des pass.* p. 142.

(*i*) Conf. HOOKE p. 145.



fui diffimiles partes ingrediuntur, qualis hominis est, in quo sit vultus, & pectus, & pedes, & manus.

Nunc id summa admiratione dignum memoria habet, quod vestigia, nullo animæ labore, suas in classes segregantur, inque suos quasi vicos per cerebrum disponantur, quæ cognatæ sunt. Novæ sensationes, earumve signa continuo, nullo nostro conatu, ad eas se adgregant, quæ sunt ejusdem generis. Id ita se habere certum est, quod anima, dum eas revocat, plerumque vel classem ipsam quasi interroget, vel certe per aliquam ideam ei classi analogam quasi filo ad eam, quam quærit, ducatur. Ita dum quærimus quercus nomen, offertur animæ arboris nomen, quod est classis, deinde si subito quercus non repræsentatur, fagus, castanea, abies, arbores aliæ, donec quæsitæ quercus se repræsentet, quam anima statim adgnoscat eam esse, quam indagine quæsit. Hanc adgnitionem *reminiscentiam* vocat BONNETUS (*k*).

Occasione colorum colores redeunt coram mentem, sonique sonos revocant, neque saporum mentio reducit signa colorum. Est ergo cerebrum, per experientiam, ingens bibliotheca (*l*), in qua signa & imagines, tamquam libri, per classes suas & adfinitates disponuntur. Sed plus in cerebro est, quam in bibliotheca; nam hujus libri nullo vinculo connectuntur, vestigia vero, & signorum & imaginum, connexa sunt, vix intelligibili modo, sed connexa tamen, ut unum excitatum alterum revocet.

Sunt autem connexa eodem ordine, quo in sensorium commune advenierunt. Quæritur puero nomen arboris non valde notæ, ut Castaneæ, vix præceptor literam Ca. nominavit, quin reliquæ literæ succedant.

Sunt etiam connexæ per definitiones suas. Justum Principem, piumque desideras, recurrit T. ANTONINUS, M. AURELIUS; recurrit divum nomen GEORGI III. De bellicosis regibus quæritur, sponte se suggeret ALEXANDRI idea, & CÆSARIS, & FRIDERICI. Sitis quam percipimus speciem scaturiginis & blandum frigentium aquarum murmur revocat (*m*).

Sunt etiam connexæ per tempora, ut quæ eodem tempore natæ sunt ideæ eadem se mutuo revocent. Ita tactus, qui rotundum corpus certo modo percipit

(*k*) p. 60.

(*l*) Mechanismum proponit Cl. BONNET, ut fibræ impulsæ alias ad motum impetrent p. 337.

(*m*) IDEM p. 133.



percipit, cum conveniat cum visu certas umbrarum sedes detegente, fit ut cum iis umbris idea rotunditatis ( *n* ) tactilis jungatur. Veris idea revocabit viridia folia, novos arborum flores, lætitiæ naturæ. A latrone, in exemplo B O E R H A A V I A N O, ad annosam quercum homo spoliatus fuit. Nunquam, quinquagesimo post anno, eam videbit quercum, quin ejus menti latro, & periculum suum, & tota tragica historia vivide recurrat. Equitem vidisti, non redibit pedes, sed equus virum, virum eques sequetur.

Eo nunc modo signa nata sunt, nempe prima quæ soni, arborem, hominemque definientes, una cum arboris hominisve imagine pronuntiata: & secunda signa literæ nimirum scriptæ, quæ cum pronuntiatione nominum coaluerunt, ex quibus arbores hominesque agnoscimus. Et ea signa secunda prima trahunt, ut figuræ sonos revocent, soni imaginem.

Denique cum idæ pleræque complexæ sint, maximo fit cum generis humani commodo, ut totum systema notionum peculiarium ( *o* ) unam ideam totalem componentium, se teneat innato vinculo, & una revocet omnes ( *p* ). Londinum nomino, revocatur continuo idea ædis D. Pauli, Palatii Whitehall, pontis utriusque, Turris, Tamesis, eorum omnium, quæ de Londino meminimus. Nomina circuli, recurrit definitio, & proprietates, & æquatio, quæ circuli character est, & diameter, & radius, & quæ alia circuli naturam ingrediuntur, & ab eo pendent. Sponte vere hæc fiunt, & absque animæ labore, & vestigia a sensu, absque voluntate ( *q* ) animæ, etiam efficacius renovantur.

Neque ab animalibus hæc penitus absunt ( *r* ). Signa, certas nempe voces, & baculi cum dolore suo nexum facile percipiunt.

Adeo denique & involuntarie, & fortiter vestigia a similibus signis revocantur, ut in motus erumpant. Nam medicamentorum odiosorum nomen, vel odor, aut vehiculum, in quo sumta sunt, nauseam & pene vomitum movent ( *s* ), & denique omnino vomere cogunt ( *t* ), aut  
alvum

( *n* ) n. 580.

( *o* ) Palatium, ut per singula conclavia imaginetur, ædificat M U R A T O R I p. 25.

( *p* ) B O N N E T p. 156.

( *q* ) p. 360.

( *r* ) Etiam B U F F O N *Hist. natur.* II. p. 440.

( *s* ) S C H O C K *aversat. cas.* p. 268.

( *t* ) H A R D E R *apiar.* p. 183. S T A H L *de autocratia natur.* p. 296. Ed. germ.



alvum citant (u); & nausea ad eum locum redit, ubi primum ex fædo spectaculo nata est (u\*); aut convulsio a titillatione nata, ipsa titillatione nominata recurrit (x), etsi hæc nonnunquam nimis ornantur. (y).

Est etiam in anima facultas uniendorum, quorum nulla est naturalis unio. Fere hac nititur observatione. Cum nominibus hominum, quæ oportebat retinere, conjunguntur ab anima certæ ædes, partesque ædium (z), & fenestræ, & columnæ. Ita, cum grandes sint earum ædium partes, & bene se cerebro imprimant, & retinentur facilius, & connexa secum nomina hominum una restituunt. Hæc fuit nonnullorum ars memoriæ.

Nunc quidem anatomie nihil ostendit, quo hæc societas similium vestigiorum explicetur. Ostendimus, ne id quidem ex anatomie satis firmiter demonstrari, regiones certas (a) esse, in quibus ideæ per certos nervos receptæ habitent, cum nervi ejusdem sensus partitis radicibus diversissimis locis nascantur, olfactorii exemplo, & in homine (b), & in pisce, ubi ex tribus omnino tuberculis provenit, superiori, inferiori, & glandula pituitariæ simili. Sed idem etiam tuberculum ad diversos nervos medullam edit, ut in homine quinti paris gustatorii rami (c) & olfactorii (d) sunt, & mere tactiles. Neque adeo in nervo aliquo peculiaris est (e) indoles, quare unico generi sensationum aptus sit. Nam insecta nonnulla ex nervo ipso optico, in aliis simplicissimo, ramos habent, qui alias capitis partes adunt (f), neque vident; alia vident absque oculis, iisdem, quibus tangunt organis (g). Pars ergo ejusdem nervi ad motum, & alia ad sensus etiam diversos apta est.

Deinde

(u) SCHURIG *chylolog.* p. 136. BARTHOLIN. L. V. *hist.* 64. Alex. BENEDICTUS *de pestil.* ALBERTI *von der Seele* p. 167. WERFFER *cicut.* p. 105. M. DON. p. 630. *Act. Hafn.* P. V. n. 49. PECHLIN *obs.* L. III. *obs.* 13. V. SWIETEN III. p. 415.

(u\*) G. V. SWIETEN T. II. p. 222.

(x) G. V. SWIETEN *Comm.* III. p. 402. Ex terrore nata eplepsia redeuns ex admoto ad os poculo DUBINSKI *remm. vital.* p. 41.

(y) Ut historia NICOLAI *Einbild.* n. 21.

(z) Petrus RAVENNAS *de memoria.* ПАЕР. in eadem arte. GUARINONI *cas.* 299.

(a) L. X. p. 397. Fibras dari oleri, sono, colori aptiores BONNET p. 52.

(b) p. 205.

(c) p. 213.

(d) p. 218.

(e) Ut videtur velle BOERHAAVIUS n. 571. & HARTLEY. p. 41.

(f) LYONNET p. 561. SWAMMERDAM *de nervo optico cochleæ* *bibl.* p. 165.

(g) Polypi lucem sequuntur. etiam eorum segmenta SCHAEFFER *Armpolyp.* p. 30. 55.



Deinde cum fibræ medullares & nerveæ, quantum microscopium valet, a summo ad imum distinctæ sint (*b*), solisque cellulosis vinculis nexæ; neque absque ea fabrica ratio intelligi possit, qua accurata sensationum in minimis particulis v. c. oculi factarum discrimina absque confusione menti repræsententur; neque adeo fibras nerveas, aut medullares usquam revinciri recte doceremus.

Quare de expositione mechanica despero, in phænomenorum veritate securus (*i*). Si placet hypotheses audire non absque ingenio natas, lege HOOKIANAM (*k*), & aliam HARTLEYANAM (*l*), & elegantissimam Cl. BONNETI (*m*).

Regionem aliquam memoriæ esse, aliam imaginationis, aut judicii, penitus repugnat (*n*), cum imaginatio a memoria (*o*) non differat.

§. IX. Oblivio.

Nunc quidem & ditissima hæc penus vestigiorum est, & inmensa. Calculum qui inire voluerunt, vix numeros invenerunt, qui sufficerent. Ideam intra 1" (*p*) formari posse sumit R. HOOK. Sed potest intra 40. & 30. & 20. (*q*), demum tertias formari. Ita homo, sumtis pro ideæ generatione 20''' intra 100. annos congereret vestigia 9,467,280,000. quod quidem nimium est propter somnum, posset autem ad tertiam partem reduci, ut essent vestigia 3,155,760,000. (*r*).

Quando etiam vulgaris meæ memoriæ ambitum mente metior, nomina & imagines plantarum, earumque partium: anatomicarum particularum in variis animalibus, & in homine: geographiam locorum, fluviorum, urbium: historiam nominum & rerum gestarum: vocum in diversis linguis interpretationem; commentarios vitæ propriæ, etsi ut

Z Z Z 2

repeto

(*b*) L. X. p. 188.

(*i*) Conf. WOLF l. c. p. 64. 65. JURIN ad SMITH not. 171.

(*k*) *Postb.* p. 140. &c.

(*l*) *Prop.* 10. p. 689.

(*m*) p. 378. &c.

(*n*) Recte adnotavit CASALPINUS *quæst. peripat.* p. 116. tum CLAUDINUS proprio libello.

(*o*) Cellula memoriæ lapsu destructa THEODORIC. *Chir.* p. 195. Conf. L. X. p. 397.

(*p*) *Postb.* p. 143.

(*q*) CHLADEN. *disp. propr. de veloc. cogit.* p. XVI.

(*r*) Idem numerus, quem HOOKIUS, sumta lentiori generatione idearum.



repeto, minime memoria excello, tamen numerum invenio signorum, & imaginum, qui ad cerebrum comparatus, magnus dici potest. Ex HOOKIANO calculo, facto cerebro 4. l. detracta libra pro vasis & sanguine, altera pro cortice, erunt in medullæ particula, quæ grani pondere fit, vestigia 205452. (s).

Fuerunt autem homines immensum meliori, ditiori, & constantiori memoria.

Et primum celerem multorum & nullo modo cohærentium memoriam SCHENKELII (t) discipulus specimen edidit, sententiarum 240. vocum 300. eodem, quo prolatae fuerant, ordine repetitarum. Prodigiosa apprimis fuit Petri RAVENNATIS memoria. Qui totum longum sermonem reddant, non valde rari sunt (u). Fuit Parisiis homo, qui integræ cohortis (x) pronunciata nomina retinebat, & triginta arithmeticas figuras coram habebat in ordine, ut operationes in iis solitas susciperet, quales nos in figuris depictis exsequimur. Johannes etiam WALLIS (y) in tenebris radicem quadratam 53. numerorum post unitatem extraxit. Exstitit qui nomina barbara varia, numerosissima, eodem repetebat ordine, quo erant pronuntiata (z). HEIDEGGERUS ille, qui diu in Anglia magister quidem fuit voluptatis publicæ, dicitur semel perambulati vicini minimum semileucam longi, signa omnia, adeo non cohærentia, deposito pignore recitasse. Bis mille nomina J. PICUS MIRANDULANUS sibi prælecta repetiit (a). Paginas 25. 30. memoriter retinet Cl. BONNETUS, & 45. sui libri paragraphos (b). Jos. SCALIGERUM (c) 21. diebus HOMERUM memoriter didicisse, & quatuor mensibus omnes poetas græcos sibi impressisse legimus.

Nunc

(s) Mirus thesaurus idearum in homine, qui magnâ itinera suscepit MURATORI p. 24. seqq.

(t) *Art. Memor. detect.*

(u) MORTON *natur. hist. of Northamptonshire* p. 462.

(x) *Journal des sçavans* n. 33.

(y) *Phil. transf.* n. 178. Exemplum pene simile rustici est in *Gentleman's Magaz.* 1751. m. Febr.

(z) Apud BAYERUM *de memoria*, & SCHENKELIUM *art. detect.* p. 153

(a) BASSIANUS p. 62. 63.

(b) p. 517. 518.

(c) BRANCACCI *de arte memor.*



Nunc ad divitias memoriæ. Non sex aut septem linguarum (*d*), sed 20. & ultra tenacem virum nomine M U L L E R nunc maxime ajunt Lipsiæ vivere.

Immensa omnium fere artium cognitio olim S A R P I I (*e*) fuit, deinde L E I B N I Z I I, & in alio genere M A G L I A B E C C H I I (*f*), tanta cum firmitate, ut integros libros amissos dictare nosset.

Ad constantiam memoriæ pertinent eorum hominum exempla, qui dicuntur nihil unquam eorum obliti esse, quæ scivissent, ut S A R P I I (*g*), *Laurentii* B O N I N C O N T R I I (*h*), & *Blasii* P A S C A L, quæ ita sumo, ut de rebus memoria dignis sermo sit.

Certum est equidem, artem (*i*) aliquam & ordinem hic multum posse: neque eam volo, quam P. R A V E N N A S, aut P A E P I U S, aut alii, nimis adfectatam nos docuerunt; sed signorum ope, & exercitio (*k*), & repetitione. Meum artificium a prima juventute fuit, res memoria dignas, dum legebam, inscribere chartulis, has subinde in ordinem, classes, speciesque distribuere: deinde cum vellem iis uti, minutissime ad quamque particulam laboris mei ordinare. Ita non quidem feci, ut excellerem memoria, sed tamen ut minus multa mihi perirent eorum, quæ didicissem.

Qui signis non utuntur, vix memoriam habent. Puer 10. annorum inter urfos educatus, erat absque memoria (*l*). Puella in Galliæ solitudine reperta, & puer polonicus (*m*), non potuerunt, postquam in societatem felici casu redierunt, patriæ suæ, parentum, aut itineris ullam historiam tradere. Hinc minor animalium memoria, quorum pauca signa sunt.

Verum & in his felicissimæ memoriæ hominibus, & in vulgo hominum etiam celerius, tamen vestigia (*m*<sup>\*</sup>) pereunt de cerebro; ut

Z z z 3

primo

[ (*d*) *Journ. des Savans* l. c.

(*e*) *Vita* p. 38. Idem & visu, & tactu erat subtilissimo p. 37.

(*f*) In ejus *vita*.

(*g*) L. c.

(*h*) C A R D A N *subtil.* L. XII.

(*i*) Artem memoriæ S I M O N I D E S medicus, & M E T H O D O R U S S C E P S I U S scripsit apud P L I N I U M L. VII. c. 24.

(*k*) P E L S H O V E R apud W O L F l. c. p. 134.

(*l*) C O N D I L L A C *des sensat.* H. p. 225.

(*m*) C O N N O R *hisor. Polon.* T. I. p. 342.

(*m*<sup>\*</sup>) Pleraque minuo. *Mechanice* explicat, dum fibra ab imagine producta nunc brevior sit H U B E R *Hamb. Magaz.* T. XXV. p. 196,



primo debiliora sint: tunc ægrius & per connexa demum alia vestigia revocari possint; denique integre intereant, et æque nunc nobis nulla sint, ac quidem essent, si nunquam exstitisent. Nisi dum aliqua supersunt, nova sensatio, novave in anima orta signi repræsentatio, vestigia quasi recentat.

Est etiam quidam quasi vestigiorum somnus, qui a morbo (*n*) inprimis, tamen etiam in sano homine supervenit, ut aliquando ab effuso in cerebro sanguine vel ichore, vel obscuriori a causa, in cerebro vestigia, aut omnia, aut aliqua, multo tempore lateant, neque ab ullo animæ labore revocari possint; quæ tamen eadem sublata mali in corpore nostro habitante causa, reviviscunt omnia, & sponte se menti offerunt. Hominem lego, cui memoria alternis quasi, etsi incertis paroxysmis, & peribat, & redibat vicissim (*n*\*), & coram virginem habeo, cui id est vitium menstruis fere periodis.

Videntur porro aliquando solo numero vestigia sibi nocere, & se excludere vicissim, & in homine nimis multa legente, & in animale (*o*) nimis varia discente. Et tamen parvi homines cerebro minori, & pueri, sæpe optima sunt memoria. Etiam nani ingeniosi (*p*), maligni, ut Æsopi exemplo. Videtur non ipse adeo numerus hic sibi nocere, ac quidem a leni illo circulantis sanguinis motu, & reparata pro medullæ particula, quæ sensationem recepit, alia aliaque per nutritionem de cibis materie, paulatim vestigia quasi exæquari; celeriter vero destrui, quando pressio augeatur, ut ab æstuoso cælo, a morbo maligno, a sanguine per apoplexiam effuso (*p*\*). Prima vero evanescunt vestigia, quæ absque attentione, absque animi adfectu, quæ vulgaria, quæ debilia, quæ non connexa cum aliis ideis; sed denique omnia nullum non mortalem defererent, si senium satis longe protraheretur (*p*\*\*).

§. X.

(*n*) BEHRENS *consider. anim. medica* p. 55.

(*n*\*) *Journ. de Trévoux* 1711. Juin.

(*o*) Serinus si nimis multas cantilenas didicerit, & vel a duabus vel tribus una propositis, confunditur HÆRVIEUX p. 361.

(*p*) *Journ. de Médec.* T. XII. p. 167. seqq.

(*p*\*) p. 539.

(*p*\*\*) p. 538. 539.



§. X. *Anima.*

Hæc nunc vestigiorum penus est, in qua *anima* facultates suas exercet. Nomen id imponimus enti, quod cum nostro corpore conjungitur, quod cogitat, judicat, vult, quod sui conscium est, suarumque idearum, easque, quas olim tenuit, quando renovantur, agnoscit suas fuisse, uti suæ sunt, quæ noviter e sensationibus, aut ex cogitationibus nascuntur.

Nunc id ens non esse de natura corporis, multa declarant, quæ breviter tangimus. Et primo ostensum est, corpus omne sua directione ( *q* ) immutata ferri, quoad ab alia vi de itinere deturbetur. Contra anima mutat pro lubitu suarum cogitationum filum, & ad alias aliasque transilit, neque est in his cogitationibus causa, quare novam illam advocet ulla.

Deinde anima nostra non unam ideam, sed infinitas perspicit, suasque vocat, & in se ipsa unit. Nunc ( *r* ) si memoriæ penus animam non haberet, ad quam vestigia referuntur, videtur fore, ut inter species rerum, quæ sunt in ea penù, quæque solitaria, existeret, essetque memoria nostra integra quasi mappa geographica, cujus nullus pagus ad alterum pertineret. Neque intelligitur, quomodo corpus & unum sit, suæ simplicitatis & personæ conscium, & tamen tot diversas rerum species sibi sumat, suasque faciat. Nunc anima neque una est sensatio, neque omnes, sed ens, quod eas omnes ad se refert.

Sed etiam judicium ( *s* ) non videtur corporis esse posse. Cæruleus color ad rubrum adjacet, & diversus est, diversæ sunt in cerebro species utriusque; sed neuter eorum colorum potest pronunciare, atqui ego ruber color a cæruleo differo. Oportet adeo ens aliquod in nobis esse, & a rubro & a cæruleo colore diversum, quod comparet, quod distinguat utrumque.

Est etiam in nonnullis nostris desideriis aliquid, quod frustra hujus ævi olores religionis voluerunt ad voluptates ( *t* ) corporeas referre. Desiderium v. c. gloriæ, etiam ejus quæ nobis superest, ejus quæ dolore, quæ morte

( *q* ) H. DITTON MÜSCHENBRÖCK *de anima se ipsam ignorante* p. 20.

( *r* ) Olim BAYLE. Conf. *Mém. de l'Acad. de Berlin* T. XIII. p. 186.

( *s* ) Male corporeum facit HELVETIUS l. c. p. 13. 14. Superfluum facit facultatem judicandi IDRM p. 18.

( *t* ) Ab HELVETIO.



morte redimitur, quæ ad nullas voluptates corporeas ducit; uti neque ingenii in erudito homine cupido, neque constantia in bono viro, neque in REGULO mortem provocatura audacia, aut in CURTIO funestus saltus, ullas possunt corporeas delicias parare.

Denique etsi multa pars functionum animæ a corporis morbis patitur, certum est tamen, persæpe in summa debilitate corporis, quæ mortem non eminus præcedat, animam mire vivide (*u*) cogitare, sentire, & loqui. Eorum omnium multa vidi testimonia. Hæc ita breviter: facile enim video multis medicis perinde fere fore, cujusnam naturæ sit anima, quæ sibi semper ignota sit, dum ejus functiones cognitæ habeant. Aliqua ex iis addi possunt, quæ nuper monuimus (*u*<sup>\*</sup>).

#### §. XI. *Facultates animæ. Cogitatio.*

A cogitatione (*x*) animæ essentiam CARTESIUS definivit. Alii negarunt, perpetim animam cogitare, etsi plerumque (*y*) cogitare fatentur. Adduxerunt autem deliquia animi, somnumque profundum, & apoplexias, qualis sex mensium statum (*z*) inertem reliquit, post quem anima, quasi nihil interim secum actum fuisset, neque intervallum aliquod intercessisset temporis, denique evigilavit: tum catalepticæ feminæ exemplum, quæ sermonem per morbi paroxysmum interceptum eodem loco continuabat, quo interceptus fuerat (*a*). In se ipso MARQUETUS, cum 21. dies in delirio transegisset, & nunc convalesceret, vix 24. horarum morbum fuisse persuadebatur, reliqua enim vestigia morbus destruxerat (*b*).

Verum in somno animam non cogitare vix est probabile. Plerumque & in homine & in animalibus jactat se in insomniis, & quoties ea abesse creduntur, possunt mitiora esse, & leviora, ut vestigium non relinquant. Certe ostendemus, in somnum nos per delirii crepuscula transire, qui status non est *inertis* animæ. Sed neque in deliquiis animi (*c*) feminæ sunt absque cogitationibus, & a me interrogatæ, se audivisse sæpe nararunt, tamquam eminus colloquentes amicos, & similia fiunt in moribundis

(*u*) TRALLEES *hom. mach.* p. 218.

(*u*<sup>\*</sup>) p. 535.

(*x*) Capax est anima cogitandi BONNET p. 74.

(*y*) SAUVAGES *physiol.* p. 145.

(*z*) *Histoire de l'Acad.* 1719.

(*a*) Ibidem ann. 1705. p. 50.

(*b*) *Observ.* p. 193.

(*c*) TRALLEES *hom. Machin.* p. 218.



bundis (*c\**). Denique obliterari rerum omnino ex voluntate gestarum memoriam certum est, cum tamen eo tempore, quo eas imperabat anima, conscia fuisset suæ actionis: Id adparet noctambulatorum exemplo, qui eorum, quæ interim gesserunt, nullam memoriam retinuerunt (*d*).

Cogitare in nobis adultis est plerumque ad seriem signorum, alias & ad sensationum seriem adtendere, & auscultare quasi scenam, quam species rerum, aut per sensus advenientes, aut ex memoria repræsentatæ repleat, cujus scenæ anima sit quasi auditor. Apperceptionem autem accedere necesse est, ut eas imagines nostras esse certi fiamus, quod vocamus *conscium esse sui*, suæque cogitationis.

*Adtentio* est, quando ex animæ voluntate earum specierum aliqua vel sola animæ contemplationem occupat, vel certe clarius (*e*), & efficacius animæ repræsentatur, quam reliquæ. Libertas, si ulla, in eo est, ut anima adtentionem suam vel præbere possit huic vel alteri ideæ, vel negare vicissim (*f*). Causa hujus electionis est plerumque, quod deinde explicabitur, ejus ideæ ad nostram felicitatem propior nexus, ut eam magis e re nostra sit præsentem habere, quam ullam aliam. Studium, inquit SANCTORIUS, absque adfectu, vix horam perseverat, cum eo plures horas; cum mutatione adfectuum dies noctesque (*g*).

Nunc adtentio omnis scientiæ mater est (*g\**) Anima nostra finitum ens, & oculi fere ad modum, plura quidem confuse, distincte unicum objectum (*h*) cognoscere potest. Qui dixerunt, plura (*i*) nos cognoscere, neque alias fore voluntatem (*k*) ullam, neque reminiscentiam (*l*), neque propriæ personæ sensum (*m*), neque judicium (*n*), neque comparatio-

(*c\**) *Nouv. de la Républ. des lettres* 1704. m. Juillet.

(*d*) PIGATTI in propria historia ejusmodi hominis p. 42. NICOLAI *Einbildungskraft* p. 96.

(*e*) WOLF l. c. p. 168.

(*f*) Non ergo est corporea QUESNAY *Essai* T. III. p. 324. n. 442.

(*g*) *Med. stat. Sect. VII.* n. 45.

(*g\**) BOERHAAVE passim. HELVETIUS *de l'esprit* I. p. 354. 361.

(*h*) PARSONS *physiogn.* p. 23. FRANK *Abbildung.* p. 44. ego ad *Prælect.* T. IV. p. 472.

(*i*) Duo BONNET p. 139. 140.

(*k*) p. 143.

(*l*) BONNET *ibid.*

(*m*) IDEM *ibid.*

(*n*) p. 141.



parationem (o), ii quidem Cl. viri partim celeritatem summam, quæ anima ab idea ad ideam tranfilit, non videntur considerasse, partim, ut in oculo, confusiolem perceptionem a clarissima non distinxerunt. Triangulum una possum imaginari, sed ut plena idea oriatur, vel cathetum solum contemlor, vel hypotenusam, neque unquam totius trianguli distinctam ideam unico tempusculo mihi fingo, certe non ego, qui sentio latus ad latus celeriter, ex ordine tamen in mea imaginatione addi. Porro anima per vocabula cogitat, quæ pronuntiat, impossibile vero est totam vocem una cogitare, & oportet literam post literam in illo monologo cogitantis animæ pronuntiari. Quæ de iudicio & voluntate obijciunt, nisi fallor, ea sunt hujusmodi. Idea in cerebro nata, perinde ut oculo (p) obversans imago, aliquamdiu, brevi quidem tempusculo, durat, sensumque sui debiliorem relinquit, quando nova successit, quæ nunc vivida animam occupat. Ex hac debiliore imagine priori, & præfente fortiori, anima comparando iudicat: Denique sensus ideæ olim nostræ, neque noviter natæ, a qua personæ propriæ sensus pendet (q), non videtur aliquid distinctum esse ab idea (r) ipsa, quæ renovatur; sed alium omnino sensum esse ideæ renovatæ, alium novæ, eoque discrimine animadverso animam, ut in aliis iudiciis, sentire, dudum se illam novisse, hanc nuper. In demonstrationibus mathematicis omnia prius ostensa contrahimus in unum, quod pro axioma recipimus, & redeunt eadem ad exemplum duarum idearum, quas comparamus. Etiam inter contactum & perceptionem: inter voluntatem & motum in corpore natum Cl. EBERHARD successionem invenit (s). Et sensatio major minorem obprimit (t); non oppressura, si utrique esset locus.

Qui plurimum animæ tribuit, non excedit (u) idearum numerum 5. vel 6. quæ una animæ repræsententur. Verum si se ipsos experientur, invenient, puto, aliquam earum reliquarum dominam esse, & superare robore.

Nunc

(o) p. 141. 142.

(p) L. XVI. p. 280. 281.

(q) BONNET p. 147. 170.

(r) *Histoire de l'ame* p. 117.

(s) *Physiolog.* p. 269.

(t) WOLF l. c. p. 47.

(u) BONNET p. 333.



Nunc si ea animæ est angustia, ut unicam speciem rerum distincte & clare possit percipere; facile sequitur, si plures una velit contemplari, nullam plene, nullam vivide animæ iri repræsentatum. Quare adtentio necessaria est, ut idea aliquamdiu præsens, & sola, vividam imaginem sui menti repræsentet. Eritque eo magis necessaria adtentio, si fuerit complexa notio, cujus multæ sint partes. Tunc enim nunquam plene ea notio percipitur, nisi omnes eæ partes, & singulæ quidem clare menti innotescant: Adtentione ergo, sive remotione alienarum idearum opus est. Hinc in tenebris ea miracula calculorum WALLISIUS ( $x$ ); in oculorum quiete memoriæ prodigia BONNETUS ( $y$ ) edidit. Hinc quibus sensus aliquis aboletur, reliqui sensus vividiores fiunt. Cæci frequenter satis discunt canere ( $z$ ), chelyn agitare, scalpere, ut etiam imagines ad similitudinem tactu perceptam fingant ( $z^*$ ): alii fuerunt qui pingerent ( $z^{**}$ ), alii officiis omnibus vita humanæ cum laude defuncti sunt ( $a^*$ ), literas denique ( $a$ ) ipfas attigerunt. SAUNDERSONIUS cæcus mathemata docuit. Sunt enim in tenebris, neque ab ideis visoriis alienis interrumpuntur. Surdus & mutus natus, tamen calculos aliquos didicit ponere ( $b$ ).

Sed ea adtentio difficilis est, & ægre quasi nos defendimus a vestigiis rerum, quæ ignotas per causas agitatae, injussæ & exosæ se nobis obtrudunt. Quare aurora musarum amica, & nemora poetæ quærunt, solitudinem nempe, & objectorum alienorum absentiam. Et resistunt, qui calculos difficiles obvolvunt, & vix respirare audent, ne peregrina sensatio necessariam ideæ constantiam interrumpat. Triduo neque edit, neque bibit, neque audivit, neque vidit VIETA, dum arcanas notas interpretabatur ( $c$ ).

A a a a 2

Hinc

( $x$ ) p. 548.( $y$ ) Ibid.( $z$ ) Cæcus musicus PECHLIN ibid.( $z^*$ ) SERVIUS *unguent. armar.* p. 60. 61. GANNIBASIUS apud KIRCHER *cit. in Nouv. de la Républ. des Lettres* 1685. p. 1156.( $z^{**}$ ) ALBERTI *jurisprud. Med. Leg.* T. VI. p. 657.( $a$ ) De SCHOENBERGERO cæco T. BARTHOELINUS *Hist.* 45. *Cent.* III. add. HILDANUS *de anat.* p. 85. Orationes sacras totas ediscebat cæcus PECHLINI *Hist.* III. *obs.* 8. Cæci melius audiunt KAAUW n. 1098. *seqq.*( $a^*$ ) NARDI *noct. genial.* I. p. 32. NICASIUS de VOERDE tertio anno excæcatus ad superiores in ecclesia gradus se suo ingenio sustulit.( $b$ ) K. *Svensk. vetensk. handling.* 1759. p. 265. De homine idiota LOCKE *Phil. trans.* n. 272.( $c$ ) POPEBLOUNT. p. 604. ex THUVANO.



Hinc melancholici, quibus adtentio major est, poetæ sunt, & inventores. Eo TASSUS, non semel pene maniacus, HUGENIUS (d), SWAMMERDAMIUS.

Catalepsis videtur exemplum esse tyrannicæ ideæ, quæ sola dominatur, omnemque alium sensum (e), aut voluntatis (e\*) in edendo motu actionem impediat, ut æger in statuum quasi transformatus, situm omnem, in quem composueris (e\*\*), retineat, una sensus omnes quiescant & cessent (e\*\*\*). Origo fere est in amore (e†), etiam in alio studio (e††), & in devotione (e†††), quæ fere est superstitio.

## §. XII. Judicium.

Duarum idearum comparatio (f) ostendit vel easdem esse, vel diversas. Quare quoties ideæ complexæ sunt, oportet eas per singulas suas notiones simplices comparare, & potest subtilis omnino esse operatio, quando vel multas notiones peculiare examinare oportet, vel notiones probabiles librare. Probabiles autem vocamus eas, quæ aliquas notas veri possident, ut alias tamen desideres, de quibus non liquet.

Cum autem error plerumque sit in eo, quod duas ideas recipiamus pro iisdem, quæ vere sunt diversæ, adparet lentam & difficilem & magnæ adtentionis, multæque per singula cognitionis esse, quod vocamus, *judicium*. Ejusque perfectionem esse in accurata comparatione notionum peculiarium, quæ integram notionem ingrediuntur. Quare lenti potius quam velocis ingenii ea laus est (f\*), quorum illud per singulas particulas utramque ideam investiget.

Ratiocinium est series judiciorum.

## §. XIII.

(d) ZIMMERMANN *de bile atra* p. 8. LISTER *Journy to Paris* p. 110.

(e) DEIDIER *Cons.* I. p. 332. *Recueil d'obs. de Méd.* 1756. m. Jul. Inde asitia SCHLEGEL apud SCHURIG I. c.

(e\*) G. V. SWIFTEN T. III. p. 312. *Journ de médec.* ibid.

(e\*\*) DE HEERS p. 29 de HAEN IV. p. 186. 187. *Recueil d'obs. de médec.* ibid. TRIOEN p. 1. DEIDIER I. c. *Journ. de méd.* 1759 m. Oct. PERZOLD *obs.* 12. GUIARD sub fin. LA METTRIE *nouv. prat. obs.* 35. & *déscr. d'une catal. hysteriq.* Rennes 1737. 12.

(e\*\*\*) FEHR *absinth.* p. 59. de HAEN I. c. *Recueil d'obs. de méd.* ibid.

(e†) SCHILLING *ag. catalept.* TULP I. *obs.* 22.

(e††) SCHURIG *chylol.* p. 325.

(e†††) FONTAN *anal.* c. 13.

(f) BONNET p. 87.

(f\*) Sapientes ob contemplationem stupidi habentur ARRETAEUS II. *diut.* c. 6.



§. XIII. *Ingenium.*

In distinguendis ideis *judicium*, in uniendis *ingenium* ponitur. Nempe hæc animæ facultas invenit in comparatis ideis similitudines, quæ eo majus ingenium requirunt, quo sunt magis reconditæ, & in natura utriusque ideæ profundius latet. Quando LEIBNIZIUS de frustraneis ad insuper habendum calculum infinitorum moliminibus versu utitur VIRGILIANO:

Quando arma ad vulcania ventum est,

Futilis ut glacies mortalis dissilit ensis

ingeniosissime similitudinem invenit, quæ est inter calculos vulgares, qui possunt expediri vulgari algorithmo, & inter illas computationes subtiliores, & magis reconditas, quæ eo solo infinitorum calculo solvi possunt: quorum istas cum divino gladio omnia penetraturo, illum cum debili & inutili instrumento vir summus comparat. Quando NEWTONUS ex pomi de arbore lapsu ad gravitationem, tamquam ad præcipuam legem universi mundi conclusit, similitudinem valde reconditam ejus mens detegebat (*g*).

Adparet quare ingenium velox sit; unica enim in notione aliqua particulari similitudine eget: & quare sæpe ab ingeniosis hominibus absit *judicium*. In similitudine enim aliqua inventa adquiescunt, neque lento examine notiones omnes peculiare expendunt, ut earum discrimina inveniant.

Et cum memoria in corpore habitet, *judicium* & *ingenium* animæ sint operationes, fieri potest, ut hæ tres dotes separentur, & rarius conjungantur omnes. Conjungi tamen non repugno (*b*).

Video qui reponant nobis, ingenium perinde a corpore pendere. Certas regiones, inter 30. & 45. gradum sitas, ab omni tempore ingeniosis hominibus abundare. Atheniensem (*i*) & olim felix ingenium celebre fuisse, & nunc: esse vini certum gradum, quo aliqua & non nimia excitetur humorum in cerebro celeritas; ejusmodi dosin vini ingenium acuere, versusque dictare: etiam febrem modicam similia facere, idearum fecunditatem & eloquium (*k*) dare, quod ipse plus semel me

A a a a 3

expertum

(*g*) BONNET p. 313.

(*b*) DU HAMEL de corp. anim. L. I. c. 4.

(*i*) DE LA GUILLETIERRE *Athenes*. WHEELER *Voyage* T. II. p. 106. & de Cilentinis MOSCA II. p. 157.

(*k*) KLOEKHOF *morb. anim.* p. 153.



expertum memini, ut facillime versus (l) funderem. PAULUS II. in calore febrili miram & constantem eloquentiam adquisivit (m); a morbo MABILLONIUM (n) ingenium adquisivisse lego: & hominem nullius, quando bene valebat ingenii, per ictum in cranium acceptum ingeniosum factum (o) esse: similia ex mutatione in nervosa quasi fibra facta in hysterico morbo (p). Et in universum cum valetudine debili (q) bonum ingenium sæpe habitare (r), exemplo POPPII, VIRGILII, PASCALII, BARATTERII.

Porro homines illos ex morbo vinove ingeniosos in priorem mediocritatem relabi (s), quando vini morbive vis deferbuit; & ex corporei pharmaci, opium (t) potissimum atque cannabis indicæ semen recipientis, usu homines paulatim in statum infantie proximum regredi, deposita omni cura, & vix præsentium cupidos (t†). Post vividam lætitiā a vino campaniensi altero die mors attonita (t\*).

Infantes etiam absque ingenio nasci omnes, idem cum mediocri quadam in cerebri constantia confirmari, aque 10. ad 40. annum perfectius esse; sensim vero fertilem venam siccare, & demum in summo senio, ut de memoria dictum est, ita ingenium quasi evanescere, & illum mirabilem reconditarum similitudinum inventorem SWIFTIUM in fatuum, & insipidum senem degenerasse.

Esse ergo, ut memoriæ, sic ingenii perfectionem a corpore.

Ad

(l) CRIFLET *peruv. pouv.* p. 20.

(m) Poetæ ex morbo FRANK *de vaticiniis*. In causo vates ARETÆUS *acut.* L. II. c. 4. Canebat in delirio canendi inexpertus *Phil. transf.* n. 484. SCHURIG *chylolog.* p. 205. Linguis ignotis locutes fuisse alios legas apud CARDANUM *variet.* p. 321. *Gal. Minerv.* VI. p. 82. Astronomia, philosophia, musice ex morbo valuisse, quosdam ARETÆUS *acut.* L. I. c. 6.

(n) *Histoir. de l'Ame* p. 110.

(o) ROBINSON *of the spleen.* p. 70. 71.

(p) Le CAMUS II. p. 20.

(q) CHRYNE *engl. malad.* p. 104.

(r) Le CAMUS p. 17.

(s) ROBINSON l.c. CARDAN. *Gal. di Minerv.* CHARDIN T. IV. p. 204.

(t) BERNIER *Mémoires* T. I. p. 47. Is infusum facit esse papaveris. Succum inspissatum BONTIUS ad C. ab ORTA L. IV. c. IV. p. 42. Admisceri cannabis semen CHARDIN IV. p. 207. 208. Sed etiam ejusdem plantæ semen, cortex, folia infusa, absque papavere, similia faciunt, *Gingri* indis dicta, Persis BANGUE RUMPF L. VIII. c. 34. Semen Cansje cannabi simile dicunt LEEUWENHOECK *Phil. transf.* n. 305. sed est vera cannabis RUMPF.

(t†) Vid. ARVIEUX *Mém.* T. III. p. 21. 22.

(t\*) BOERHAAVE *prax. med.* I. p. 244.



Ad hæc videtur solide responderi posse. Et primum ingenium requirit quamdam in ideis coram anima adparentibus majorem celeritatem (*u*). Ita enim intra idem tempus plures notiones peculiare cum animæ obversentur, potuit ea similitudines (*x*) detegere, ad quas alii multo lentius perveniunt, quod rota imaginum lentius ipsis versetur. Summum ingenium CÆSARIS (*y*) fuit, qui quatuor amanuensibus epistolas dictaret, & etiam septenis, quoties ab alio labore vacabat. Id autem omne est celeritatis, neque enim una septem expediebat negotia, sed ab uno ad alterum celeriter transliebat.

Deinde ad ingenium requiritur sensilitas major, quam in mediocri homine, ut ea similitudo vehementer nos percellat, vivideque adficiat, quæ stupidum hominem non emoveret.

Utrumque autem fit ab iis causis, quas ingenium augere diximus. In febribus, & in cerebri inflammatione (*z*) intolerantia summa est sensationum (*a*), tremor (*b*) ad sonum vulgaris vocis, & oculorum ad lucem dolor (*c*), & sensus etiam ad odores & gustus acutior, etiam convalescentibus. Ita maniaci dantur, qui, dum melius habent, colorem flavum & rubrum, & sonos majores non absque concussione ferunt (*c\**). Sic in hydrophobis intolerabilis lux (*d*), colorve vividus, & sonus (*d\**), & aura (*d\*\**), & titillatio (*e*) a contactu quocunque. Proxime adeo a delirio & furore hæc sensilitas distat (*f*). In hypochondriaco sensus adeo accuratus, ut æger auræ quasi frigida sensum perpetuum pateretur (*g*). Huc acriter sentiens ante pluviam, & nebuloso cælo melancholicus (*h*).  
Sic

(*u*) BONNET p. 340. Ideam claram in dimidio secundo nasci CHLADENIUS de celerit. cogit. & veterem in tribus tertiis representari. IDEM.

(*x*) Conf. etiam CHLADENIUM.

(*y*) PLINIUS L. VII. c. 25.

(*z*) HOME facts p. 181.

(*a*) L. X. p. 293. KLOEKHOF p. 112.

(*b*) Phil. transf. Vol. XLIX. P. I. n. 12. BOURDELOT in conferenc. de Denis p. 129.  
HOME facts p. 184. in se ipso.

(*c*) HOME l. c. in se ipso p. 184.

(*c\**) FISCHER de miro sens. augment.

(*d*) DESAULT de la verol. p. 289. Journ. de Médec. T. III. n. 3. MEAD of poisons p. 135. JAMES canine madness. p. 91.

(*d\**) STREPITUS MORGAGN. sed. & caus. morb. I. p. 63.

(*d\*\**) MORGAGNUS ibid. JAMES ibid.

(*e*) HUNAULD de la rage p. 49.

(*f*) KLOEKHOF p. 153.

(*g*) Comm. Nor. 1722. hebdom. 49.

(*h*) WOODWARD cases p. 38. Ad. KRUGER n. 357. &c.



Sic in regionibus fervidis, ut insulis Bourbon (*b\**), & Barbados (*i*), ex minimo vulnere nervorum distentiones per universum corpus oriuntur.

Nunc in regionibus adeo calidis, a vino, & a febribus, & celerius ideæ repræsentantur, & efficacius, & hætenus a corpore ingenium pendet. Anima tamen semper est, quæ ideas comparat.

§. XIV. *Abstractio & notiones generales. Signa.*

*Signa* quidem ex sola adfociatione idearum nascuntur, & per repetitionem memoriæ imprimuntur. Loquela primum nata est, pene cum animalibus communis, omnibusque hominibus in societate viventibus pariter propria: nam homines extra societatem educati (*k*) non loquuntur. Ergo puero pronuntiatur matris nomen, dum una oculis, digitis, ore, in matre hæret. Ita repetendo discit & imitari matrem, quæ *mama* pronunciat (*l*): & eum sonum cum cognita sibi tot per beneficia, tot per sensus matre conjungere, sæpe repetita delineatione, ut denique vinculum fiat inseparabile. Adeo vero innatum est homini sermone uti, ut inter paucos pueros una educatos peculiaris lingua enata sit.

Hic gentes non moratæ, nomadicæ, urbium ignaræ, venatrices, & piscatrices fere substiterunt. Gentes vero agrum colentes & urbes, pleræque ultra sunt progressæ; nempe ad signa secunda, quæ sonos primorum signorum figuris visibilibus & fixis exprimunt. Eorum signorum antiquissima (*l\**) similitudinem exprimebant rerum, quibus designandis destinabuntur. Solis imaginem didicerunt circulo imitari. Ita natum est signum secundum, quod & archetypum, nempe solem revocaret animo, & cum signo primo, nomine solis recepto, paulatim per consuetudinem coalesceret.

Neque

(*b\**) *Journ. de Médec.* 1757. Decembr.

(*i*) HILLARY *barbad.* p. 221.

(*k*) Balabat puer TULPIANUS L. IV. c. 10. Clamabat, sed non loquebatur, & canebat inarticulate, ut aves, puella in Gallia reperta *Algern. Magaz.* T. VII. Ursina vox erat pueri, qui in Polonia inter urfos educatus fuerat CONNOR *nat. hist. of Poland.* T. I. p. 342. 349. & nullam fuisse ait RASCYNSKI p. 355. & HARTKNOCH.

(*l*) Etiam in Peru. Qui mutus & surdus esset cum 12. anno recuperaret auditum, pronunciavit vocem *Mama* MONCONIS *Voyages* T. I. p. 16.

(*l\**) In Aegypto, Mexico.



Neque ibi substitit industria; Cum enim pictura difficultatem haberet, invenerunt gentes, inter eas quæ sociali vita usæ sunt, antiquissimæ *hieroglyphæ*, characteres nempe arbitrarie fictos, qui integram notionem exprimunt (*l\*\**). Verum cum etiam ii summam haberent difficultatem, & notionum numerus una cum artibus nimium incresceret, admirabile certe inventum exstitit Phœnicum, qui characteres *mobiles* invenerunt, paucos & faciles, ex quorum compositione infinita *nomina* possent componi, rerum quidem minime similes, sed quos usus tamen & repetita adsociatio cum rebus conjungeret. Ita literis *𐤀* *𐤁* & *𐤂* & solem ipsum expresserunt, & sonum vocis *schemesch*. Id summum certe artificium in Europam transiit, cumque ejus incolis hæsit.

His præfidiis mirifice animæ vires dilatantur. Signa quidem priora per auditum recepta, sive rerum nomina, multo facilius in memoria retinentur, quam imagines, simpliciora cum sint, neque laborem illum pictorium requirant, qui in revocanda amici imagine summus foret. Puer ille polonus, & puella gallica, cum signorum usu destituerentur, nullam potuerunt vitæ ante actæ historiam narrare (*l†*). Et ita adsuevit anima signis uti, ut mera per signa cogitet, & sonorum vestigia sola omnium rerum repræsentationes animæ offerant, rarioribus exemplis exceptis, quando adfectus aliquis animi imaginem ipsam revocat. Sed possunt signa plurimas rerum adfectiones exprimere, quas imago nulla potest, ut rerum communia, & successionem, deinde notiones intellectuales. Verum signa secunda etiam eam habent utilitatem, ut persistant: ut ideæ, quas exprimunt, quantum lubet repeti, comparari, dividi, inque minores notiones resolvi possint, ut denique ad plures homines, etiam absentes & post natos, nostræ ideæ pervenire queant.

Signorum potissimum ergo ope anima didicit *abstrahere*. Id vocamus, ex multis ideis detrahere id quod habent commune: ut ex cane, equo, & bove abstrahas, animal vivum, aut quadrupes; ex rubro, albo & cæruleo colorem. Id certa operatione animæ fit, nam etsi rubrum, album & cæruleum per radios repræsentantur, sola tamen voluntas suscipit attendere ad similitudinem trium colorum, & ad discrimen, id rejicere,

(*l\*\**) In Aegypto, China.

(*l†*) CONNOR. p. 342. WALDSCHMID *de miraculis*. *Algem. Magaz.* T. VII.



jicere, & solam retinere similitudinem. Adjuvatur autem anima a signis, quod longe facilius sit ad præsentia & persistentia adtentionem adhibere, quam quidem numerosas ideas & retinere renovatas atque animæ repræsentare, & ad eas undique adtente circumspicere.

Potest etiam de idea composita detrahi pars maxima, ut exigua portio maneat: ut de homine nihil supersit, nisi color niger, qui facit æthiopem.

Eodem modo relationes abstrahimus, ut causæ & effectus, patris & filii, & quæ innumera sunt alia, quæ ab hominibus parum excultis raro, ab iis, qui extra societatem vivunt, forte nunquam, nec ab infantibus, neque ab animalibus abstrahuntur, & sunt humanæ mentis exercitatæ privilegia.

Ideæ ex abstractionibus natæ *notiones* (*m*) dicuntur. A sensationibus hætenus nascuntur omnes, & ipsæ per signa animæ nostræ repræsentantur, sunt tamen animæ opus; neque cum brutis communes (*n*). Est etiam in anima, & quidem ex abstractionibus & notionibus nata potestas ordinis, quæ ab animalibus abest (*o*).

#### §. XV. Veritas. Error.

Liceat brevibus verbis hæc perstringere, quæ partim ad medicos, partim ad universos homines pertinent.

Verum dicimus nos tenere, quando ideæ nostræ cum rebus ipsis conveniunt, quarum ex perceptione natæ sunt. Erramus, quando aliæ sunt ideæ nostræ a rebus ipsis.

Errores sensuum hic non tangimus, quos in visu fuscè enarraverimus. Facile damus etiam tactum (*p*) fallere posse, & certe ab arbitraria craftitæ velamentorum insensilium pendere.

Verum hic in universum de mentis nostræ erroribus dicimus. In ideis simplicibus rarius erramus: longe plerumque, quod notionum complexarum partes non ex ordine omnes percipiamus, & tamen argu-  
mente-

(*m*) BONNET p. 165. Lego equidem canem, qui iussus pileum adferre non inveniebat, ejus loco aliud capitis tegmen attulisse, ut crederes id animal species ad genera retulisse SCHELLHAMMER *physiol.* p. CXLV. sed ea unica historia est.

(*n*) p. 180.

(*o*) BONNET p. 197.

(*p*) Ut unum globulum pro duobus habeamus STURM *Sensus unus geminus* p. 8. Negat tactum visu tutiorem esse PORTERFIELD II. p. 501.



mentemur ex paucis, quæ nobis innotuerunt, ad omnes. Hæc hypothesis est fallacia, quoties in complexa notione aliqua cum re ipsa conveniunt, indeque sumimus gratis, & reliqua convenire. Voluntarius, ut adparet, est error, natus hinc a pigritia, quæ laborem recusat sustinere, qui est in repræsentandis sibi omnibus ideis peculiaribus complexam notionem ingredientibus; inde a vanitate, quæ vult definire, & docere, etsi non didicit.

In rebus nostris physiologicis error fere est in adsumta aliqua parte fabricæ, tamquam nota & certa, quæ neque nota est, neque certa: hinc legibus mechanicis, hydraulicis aliisque adplicatis in explicando phænomeno, veris & certis, si phænomenon ita se haberet. Exempla dedimus de motu cordis, de musculorum motu.

Inmensa vis errorum hinc etiam in medicinam & physiologiam incubuit, quod phænomena semel visa, habita sunt pro perpetuis. Ita negatus est motus intestinorum peristalticus, ita motus cerebri a respiratione crescens refutatur; a viris nunquam vel minimum moturis dubium, si placuisset ipsis sæpe & iterato utrumque phænomenon contemplari.

Alter fons errorum perinde voluntarius est auctoritatis gratia, minus longe, quam olim late dominans, neque tamen tota obsoleta. BOERHAAVIUS, quem amas, hæc dicit: ergo vera sunt. Recte facis quod amas, nullus unquam magister magis meruit suis discipulis carus esse: Sed homo fuit, neque aureum ejus os est audiendum: verum solum ad sensum nostrum poscit. Odisti STAHLIUM, acrem virum, neque dictione sua amabilem, neque perpetuo contemptu fere omnium, quos citat, & quibus se unum opponit. Et tamen STAHLIUS non raro verum dixit, & sæpe utiliter.

Ita ex prioribus pravæ sectæ nascuntur, & ex istis perennant.

#### §. XVI. *Delirium.*

Sani fere fallimur, quia falli volumus. Sed in alia corporis conditione, utique inevitabile est in errores incidere maximos: merentur vero breviter exponi.



Simplicior causa est incitatus sanguinis in cerebrum motus (*q*), five id fiat ab alcohole vini (*r*), quod est quidem frequentissimum, aut a gas illo *sylvestri* fontium spad anorum (*s*); five a calidis medicamentis (*t*); ab opio puro, aut nonnullis aromatibus con temperato; a plantis venenatis, belladonna (*t*\*), hyoscyamo (*t*\*\*), datura (*t*\*\*\*), fungis (*†*): five a febre: five ab adfectu animi, ut a metu (*u*): five a frigore nimio (*x*); a suppressis hæmorrhoidibus (*y*); five a cæli ardore (*z*); a dolore (*z*\*), a vermibus (*a*): a cerebri variis malis (*b*). Sic etiam per abstinentiam a somno (*b*\*) in delirium præcipitabantur miseri illi Galliæ incolæ, religionis minus potentis adseclæ; sic Falcones (*c*) eodem artificio reduntur pene maniacy, ut in ardeam se præcipitent ignari periculi. Magno exemplo hic esset historia ægri, qui alterne desipiebat, & redibat ad sanitatem, ut supinus magis jaceret, aut rectus (*c*\*).

Ea nimis in encephalo vivida actio per multos gradus a poetico (*d*) ingenio ad periculosum (*e*) denique mania genus ducit, quale aliquoties vidi, ut ab eo omnis quidem error abesset: cæterum idearum nimius vigor voluntatem ad feroces & crudeles actiones incitaret, qualem nunc in carceribus præ vindictæ cupidine furem teneo.

EQ

- (*q*) HALLER *hemast.* p. 137.  
(*r*) CARTHEUSER *mat. med. Sect. XI.* BARON ad LEMERY *chem.* p. 689.  
(*s*) GERONSTER HEERS p. 14. SAUVENEX le PRESSEUX p. 2. *Altmaffer primit. Polon. II.* p. 235.  
(*t*) VALISNERI T. II. p. 272.  
(*t*\*) *Journ. de Médec.* 1759. m. Aug. FABRI *strychnomam.* &c.  
(*t*\*\*) BARRERE *obs. anat.* ed. II. p. 48. seqq. Inde furor SPRAT *hist. of the roy. societ.* p. 162. (Non est ad manus).  
(*t*\*\*\*) KAAUW *impet.* n. 349.  
(*†*) Inde delirium & cantus & risus L. JOUBERT *du ris* p. 272.  
(*u*) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 4 obs.* 29. BLANCARD *Jaarreg. C. V. obs.* 17. GOEKEL *Cent. I. conf.* 7 BOLZ *histor. Salzburger.* L. I. p. 142. Semi stultus fuit, qui post 8. dies vivus fuerat effossus PORTIUS *ap. L. II.* p. 273.  
(*x*) BARTHOLIN C. VI. *hist.* 88.  
(*y*) SENAC *trait. du cœur* II. p. 494.  
(*z*) In Apulia frequens BAGLIV *Tarant. c.* 2.  
(*z*\*) Ex colica pictonum *Journ. de Médec.* 1762. m. Maj. In cane furor a ligatis nervis octavo & intercostali SWIETEN I. p. 255.  
(*a*) LA METIRIE *obs.* 75.  
(*b*) Ex vulnere fragmento globi pulvere nitrato feti inflictio *Chir. Anweis. II.* p. 742.  
(*b*\*) Ab inanitione, vigiliis, inedia, mania TRALLER P. IV. p. 74.  
(*c*) *Hamburg. Magaz. T. V.* p. 196.  
(*c*\*) BOND *of the nightmare* p. 5. Sed ejusmodi historias oporteret plures proponi.  
(*d*) p. 558. 559.  
(*e*) MONRO *on madness.* p. 7.



Est tamen, & in hac classe, ubi omnino etiam necessarius idearum nexus abrumpitur, quod in miserrimis illis vivorum hominum sepulchretis videas, quibus homines mente capti includuntur. Eos invenias ab idea ad alienissimam (*f*) aliam delabi, cujus cum priori nullum sit vinculum, nulla comparatio, nullum ergo neque judicium, neque ratiocinium, neque futuri cum præsentem conjunctio.

Aliud demum genus est maniacorum, qui falsum principium ponunt, & ex eo omnino conclusiones deducunt, legitime inde secuturas, sed una cum suo fundamento caducas. Et hoc genus frequens est, quos devotio in superstitionem degener: aut alterius vitæ nimium & meticulosum studium (*f*<sup>\*</sup>): aut infelix amor: vel male respondens ambitioni fortuna: aut vindictæ frustranea cupido: aut meditatio improba ad unicam aliquam ideam (*g*) fere adligavit, quæ perpetua reproductione ita est impressa animo, ut perinde persuasionem & adfensum (*h*) menti extorqueat, uti quidem fieret, si ea idea per sensus a mundo corporeo adveniret. Sunt autem hi homines adeo ad unicam ideam retinendam apti, ut funambulæ in linea carbone notata alius egerit (*i*); alius, cujus bene memini, multos annos impenderit, ut in asserculum de pariete modice eminentem de suo ergastulo saliret, indeque se continuo in caput præcipientem daret.

Vidi, qui principes (*k*) se esse persuasi (*l*) omnes, etiam sibi præfectos, haberent pro subditis. Paulo major gradus ejusdem insanix fuit, ut nonnulli se Deos esse crederent (*m*). Cælum se gestare ille a TRALLIANO (*n*) dictus, & a GALENO (*n*<sup>\*</sup>). Deum audiebat alius (*o*).

B b b b 3

Læta

(*f*) Videtur hoc sentire MURATORI l. c. p. 93.

[*f*<sup>\*</sup>) Ex lectis medicorum libris, metu injecto melancholia & furor TULP L. IV. c. 54.

(*g*) Melancholia est *αδυνάμει επί μιν φαντασίαν* ARETÆUS diut. l. c. 5. add. CHEYNE sanit. infirm. p. 185. LALLEMANT *mécan. des pass.* p. 142 TRALLES *vir. opii* IV. p. 49. Conf. CORNACCHINI *della Pazzia* p. 27. QUESNAI *des fievres* p. 184.

(*h*) p. 543. NICOLAI *phantas.* p. 105.

(*i*) Hamb. *Magaz.* T. V. p. 164.

(*k*) Ex fastu maniaci *Eph. Nat. Cur.* Vol. III. obs. 57.

(*l*) Qui de industria cum finxisset sibi, se principem esse, sensim eo pervenit, ut esse se crederet KRUGER *patholog.* p. 28. SCAMBATUS se putabat esse cardinalem MURATORI p. 99.

(*m*) GALEN. *loc. aff.* L. III. c. 7.

(*n*) L. I. p. 109.

(*n*<sup>\*</sup>) GALEN. *ibid.*

(*o*) ZIMMERMANN *bilis atra* p. 30.



Læta etiam deliria fuerunt eorum, qui musicos concentus (p) se audire; naves, quæ in Piræum adventarent, omnes suas esse (q) cum multa voluptate persuasi vivebant.

Tristes alii, cum metuerent præsentis seque ad supplicium ducturos (r) lictores, nunquam ausi sunt de cubiculo egredi (s), aut a veneno periculum metuerunt (t). Alii divites cum essent, miseram paupertatem timuerunt (u).

Neque quidquam fere est adeo infani & ridiculi, quod non in mentem alicujus venerit eorum miserorum.

Vitrum se credidit (x) homo, non ausus progredi, ne frangeretur.

Straminea crura (y) se habere persuasus a BOERHAAVIO refertur; & qui flexilia ossa (z), aut furas se non habere (a) crederet: aut paralytica certe crura (b), aut caput amputatum (c), aut demum se nullo igne calefieri posse (d). Alius mentem rationalem sibi ademtam esse, aut se mortuum (e) pertinaciter pugnavit. Alius in ligneum equum se conversum (f), defendit, aut in fictile (g), & in anserem (h), avem (i), spiritusve animales suos in avium, musc arumve formas mutari (k). Alius cæcum (l) se esse, & impoten-

(p) SALMUTH II. n. 79. PISONI *spicil. curat. obs.* 3. ROBINSON p. 58. MARC. DONAT. p. 900. MORGAGN. *Sed. & caus. morb.* I. p. 53. Abutuntur, puto, tianita aurium.

(q) ÆLIAN. *var. Lect.* L. IV. c. 25.

(r) WEPFER *obs.* 89.

(s) Etiam ob alios metus PECHLIN L. III. *obs.* 16.

(t) *Epb. Nat. Cur. Dec. I. ann. 9. 10. obs.* 46.

(u) WEPFER *morb. cap. obs.* 91.

(x) LOCKE L. II. c. 11. Vitreas nates BARTHOE. *hist.* 79. Cent. I. LEVINUS LEMNIUS.

(y) Stipulam se esse CÆLIUS *tard.* I. c. 5.

(z) TULPIUS L. I. *obs.* 18.

(a) CÆLIUS l. c.

(b) COLLOT *art de tailler.* Crus sinistrum & manum a serpente sibi corruptam fuisse ARTEMIDORUS.

(c) TRALLIAN L. I. p. 110.

(d) ZACUT *prax. med. mir. obs.* 48.

(e) *Act. Hafn. Ann.* 5. *obs.* 60.

(f) ROBINSON *of the spleen* p. 191.

(g) TRALLIAN L. p. 109. CÆL. *tardar.* I. c. 5.

(h) SALMUTH C. III. *hist.* 92. Gallum, passerem CÆLIUS.

(i) ZACCHIAS *ipocb.* p. 385.

(k) HARRINGTONUS auctor *OCEANÆ Act. Erud.* 1701. p. 45.

(l) HIPPOCR. *epid.* V.



impotentem (*m*): alius ulcus in latere se habere (*n*), aut abscessum in hepate (*o*), aut molam (*p*), aut putrefactum cerebrum (*q*). Alius ob intestina sibi perrupta (*r*) noluit cibum capere, aut bibere, quod lutum se crederet (*s*), aut clavum devorasse (*t*), aut in tubo se inclusum esse (*u*).

Multi vermes (*x*), scarabæos (*y*), ranas (*z*), mures (*a*), cuniculos (*b*), muscas (*c*), fetum (*d*), nasum prælongum (*e*) sibi esse, aut spectrum se videre, qualem & ipse vidi (*f*), aut dæmonem suum adstipulatorem (*g*), aut maleficium a forte sibi in pactum (*h*).

Mirificum sensum extensi immensi, tenuissimi, mollissimi, & plumulæ in infinitum crescentis in se ipso ante convulsionem percepit BOERHAAVIUS (*i*).

Hominibus, qui in una idea aberrant, frequens est in eo uno insanire, ceterum sapientes esse (*k*), & suorum artificiorum peritos, ut de architecto suo ARETÆUS (*l*), tum SGAMBATI jesuitæ exemplo, alteriusque evangeliorum repetitoris (*m*) adparet.

Porro

(*m*) CONSTANT. AFRIC. p. 318. SALMUTH II. n. 78. HIPPOCR. Epid. V. FRITSCH *selekt. Händ.* p. 218.

(*n*) AMAT. Cent. V. cur. 42.

(*o*) VOLTER Hebamm. Schule p. 203.

(*p*) TULP I. obs. 19.

(*q*) PIGRAI *præcep.* p. 335.

(*r*) COMM. NOR. 1733. hebdom. 44.

(*s*) ARETÆUS diut. I. ibid.

(*t*) BARTHOL. Cent. I. hist. 79.

(*u*) ZEVIANI l. c.

(*x*) DEIDIER tumor. obs. 7.

(*y*) IDEM ibid.

(*z*) FERDIN. EPIPHAN. hist. 68. GATINARIA p. 325.

(*a*) ZEVIANI *fiato ipoch.* p. 56.

(*b*) SAUVAGES *class. morb.* p. 297.

(*c*) Princeps Vasiorum a SPOLETO fanatus VALISNËR T. II. p. 358. Paulo aliter de Numan Pascha CANTIMIR *hist. ottom.* L. IV. p. 465.

(*d*) MEAD. *medic. sacr.* p. 72. PORTII *opusc. & fragm.* p. 185.

(*e*) BARTH. Cent. I. hist. 79. QUERCETAN l. c. DÖRING *medic.* p. 202.

(*f*) WEPFER obs. 87.

(*g*) Ipse T. TASSUS. MURATOR *fantas.* p. 308. Habet & exemplum PENA apud QUERCET *diaret* p. 68. 69. LAMZWEERDE p. 227. BARTHOLIN. Cent. I. hist. 85.

(*h*) EPIPHAN. l. c.

(*i*) De morb. nerv. II. p. 401. 402.

(*k*) ARETÆUS diut. I. c. 6. CHEYNE *sanit. infirm.* p. 185.

(*l*) L. c.

(*m*) Hamburg. Magaz. T. V. p. 160.



Porro ad omnia alia, etiam naturales stimulos famis, sitisque furidi, & frigoris (*n*), alvo nulla (*o*) adeo dura, ut novem (*p*), & duodecim (*q*) grana mercurii vitæ feminæ maniacæ impune porrigerentur; somni denique expertes (*r*) sæpe reperiuntur. Denique vires humanis fere majores exercent (*s*). Qui cancellos ferreos in phrenitide fregit, alias a nobis dictus est (*s*<sup>\*</sup>).

Maniaci illi vagi, & furiosi fere sanantur iis, quæ vires frangunt nimias (*s*<sup>\*\*</sup>), venæ sectione (*s*<sup>\*\*\*</sup>) arteriotome (*t*); maxima aquæ copia, in qua purgantia (*u*) medicamenta dissoluta essent, quod quidem medelæ genus mihi aliquoties successit, & a natura ipsa aliquando adhibetur (*u*<sup>\*</sup>); subactis viribus & terrore incusso per verbera (*x*), quæ vulgaris (*y*) sanandorum maniacorum est ratio, demum immersione in aquam (*z*), quo remedio etiam ebrietas subito tollitur (*a*). Alii duro, & quotidiano labore (*b*) valetudinem recuperaverunt animi. Ante mortem non rarum est, convalescere miseros, & memoriam recuperare, sanamque mentem (*c*), forte ex ea debilitate, quæ in universa machina invalescit. Ipsi Falcones, quando plumas mutant, debilitati, furorem deponunt, neque nunc ardeas persequuntur (*d*).

Qui ob unicam aliquam falsam ideam pro vera recepta delirant, non quidem unquam ratiocinio sanantur. Nunquam enim sensatio potest per signa superari, ut neque idea, quæ sensationis vires habet. Memini me  
ex

(*n*) HELMONT *demens idea*.

(*o*) G. V. SWIETEN T. III. p. 264.

(*p*) BOERHAAVE *morb. nerv.* p. 537. 538.

(*q*) G. V. SWIETEN T. III. p. 524.

(*r*) INGRAM *cases* p. 101.

(*s*) PANAROLUS *Pentec.* IV. *obs.* 49.

(*s*<sup>\*</sup>) L. XI. p. 484.

(*s*<sup>\*\*</sup>) VALSALVA maniacos sanabat refrigerantibus, MORGAGN. *sed. & caus. morb.* I. p. 55. Alii thermis *Journ. des sav.* 1717. m. April.

(*s*<sup>\*\*\*</sup>) Libra integra sanguinis amissa. Addit equidem in capite cataplasmata MORGAGNUS l. c. p. 56.

(*t*) RAULIN *obs. de medec.* p. 234. 236.

(*u*) TULP. I. *obs.* 18.

(*u*<sup>\*</sup>) Diarrhœa biliosa sublata infania MORGAGNUS *ibid.* I. p. 57.

(*x*) RICHTER *medic. plagos.* n. 5. LOEBER *diatet.* II. p. 79. SANCASSANI *idib.* I. p. 150.

(*y*) Londini, Delphis, Hamburgi PECHLIN L. III.

(*z*) HELMONT *hom. & morb.* p. 33. *parad. discurs.* p. 77. GAUBII *sermo* p. 107.

(*a*) Eph. Nat. Cur. Dec. I. *ann.* 2. *obs.* 217.

(*b*) SANCASSANI l. c.

(*c*) BEHRENS *consider. anim.* p. 55. FONTAN. *anal.* p. 17.

(*d*) Hamburg. *Magaz.* T. V. p. 156.



ex febre pessima miliari, cum calidum decoctum mihi propinaretur, in delirium incidisse, in quo, nam rectissime recordor, plena die tenebras esse, & in iis tenebris me versari persuadebar. Luctabar contra errorem aliqua parte superstitis rationis, & candelas jubebam accendi, nunquam tamen potui hanc tenebrarum ideam mihi eripere, cætera satis mente sanus. Omnino ut anima tinnitum aurium a vero campanæ tonitu sæpe non distinguit.

Maniaci, & in una re deliri, sanantur sæpe subito, quando per sensationem evidentem aut vere de errore convincuntur, aut certe idea nova æque fortis introducitur, quæ erroneam illam destruat. Plurimum est ejusmodi historiarum. Qui furas se habere negabat, sanatus est iis percussis (e); qui non calefiebat, incenso spiritu vini, quo vestes erant oblinitæ (f); qui caput credebatur sibi amputatum fuisse, imposito pileo plumbeo (g); qui avem se volebat esse, cum ad fugam alas desideraret (h).

Fraude sanati sunt alii admistis inter fæces ranis (i), scarabæis (k), clavo (l), serpente (m); muscis de aure extractis (n); vel inciso leviter abdomine (p), aut naso (q); evulsa de oesophago spongia (r); imagine cerea in exedram demersa, cui maleficium imputabatur (s); remedio superstitioso, quo ægri fiducia unice obtinebatur (t).

## §. XVII.

(e) TULP. I. c. 50.

(f) ZACUT. l. c.

(g) PHILODOTUS Medicus apud TRALLIANUM L. I. p. 110.

(h) ZACCHIAS l. c.

(i) GATENARIA p. 32.

(k) DEIDIER l. c.

(l) DÖRING l. c. BARTHOLIN. Cent. I. hist. 79.

(m) TRALLIANUS l. c.

(n) SPOLETUS l. c. DANIEL *racolt.* p. 173. paulo aliter apud VALISNER II. p. 368. & aliter apud CANTIMIRIUM.

(p) VÖLTER. AMATUS.

(q) QUERCETAN l. c.

(r) CABROL. *obs.* 12.

(s) EPIPHAN.

(t) CONSTANTIN. AFRIC. Adde hujusmodi historias ex RIVINO *de imag. vir. med.* CARDAN *subtil.* p. 530. TULP. I. c. 18. LAMZWEERDE, PENA apud QUERCET. &c.



§. XVII. *Fatuitas.*

Nimis incitatus in mania motus est per cerebrum, nimisque sensilis medulla. In hoc statu contraria sunt priorum ( *t\** ), & nimis debilis est humorum circuitus, minusque sensilia organa sensus.

Plurimi ejusmodi fatui in vicina mihi Valesia vivunt, quibus nomen *Cretin* inponitur, & in planitie, & inter montes, pro portione sanorum civium pene innumeri, & ex sanis nati. Facies ipsis vix humana, os amplum & saliva defluens, strumæ frequentes; vox absurda, & ingenium ad omnia vitæ officia inutile. Alii, æque numerosi, totam vitam suam in lecto degunt, ad omnem motum corporis inidonei ( *u* ). Diu cæterum vigitant ( *x* ), non multo meliores brutis animalibus, & in vita paranda potius minus habentes proprii luminis. Adeo autem sensus sunt obtusi, ut nuper perierit aliquis ex congesta fæce, cujus nullum stimulum sensit, quoad sesqui pedis in recto intestino diameter fieret.

Horum proximi sunt *hydrocephalici* homines, certe plerique. Sunt & passim alii, simili mentis debilitate afflicti, ab apoplexia ( *y* ) prægressa, ab insultibus epilepticis ( *z* ), a morbo convulsivo ( *a* ), qui secalis corniculati usui supervenit. Ex alio morbo, exque causa morali, alias hoc vitium nascitur. Et maniaci quidem ( *b* ) verberibus, metu, sanguine abunde misso ( *c* ), sæpe in fatuos mutantur: tum feminae, quæ in puerperio ( *d* ) plurimum sanguinem amiserunt; denique eruditi viri ( *e* ), qui nimio labore se ipsos enervaverunt, & quibus insuperabilis cerebri ad retinendas ideas inutilitas supervenit.

( *t\** ) Infania est nimia sensatio, stultitia nimis parva. Recte BATTIE n. 52.

( *u* ) Puer mutus, surdus, lingua, manu, pede immobilis, pene vegetabilis FISCHER von der Natur. n. 795.

( *x* ) Senescere fatuos VERULAM *hist. vit. & mor.* p. 155. BATTIE *on madness.* p. 61. SWIFTIUS ille macilentissimus, dum ingenio valebat, pinguis factus est, cum fatuus esset BAKER *adfect anim.* p. 10.

( *y* ) In HOFMANNO fletus inde involuntarius BAYER *biograph.* p. 47.

( *z* ) Exemplum habet RUMLER *obs.* 53. G. V. SWIETEN T. III. p. 397. BATTIE *on madness.* p. 61. *Phil. trans* Vol. L. P. 2. p. 841.

( *a* ) FORST *de sensib. intern.* p. 56.

( *b* ) Fatuus ex mania HELMONT l. c.

( *c* ) Quare dissuadet curationem debilitantem ROBINSON l. c. p. 406.

( *d* ) SWENKE p. 94. TITSINGH *Diana* p. 583.

( *e* ) BOERHAAVE *de morb. nerv.* p. 657. G. V. SWIETEN II. p. 265. Exemplum est notissimum.



venit. A quiete nimia ( *f* ) per 12. annos adfectata simile exemplum stupidi ingenii lego, ut denique ad canis morem ederet; & de nimio etiam temere adfectato somno habet BOERHAAVIUS ( *g* ). Denique senium hunc morbum adfert ( *h* ). Magnus ille ex victoriis suis MARLBOROUGHIIUS ante mortem flebat, ut inultus puer ( *i* ).

Esse autem a languido nimis systematis sentientis sensu, vel inde constat, quod sanetur fere iis, quæ irritant, vino ( *k* ), gaudio ( *l* ), denique, ex Cl. MUZELII plane ( *m* ) memorabili invento, ipsa inoculatione acris materiei, quæ scabiem facit. Quod vero interim, oppresso quasi animali systemate, vitale pergat operari, possis ad irritabilitatem majorem eorum organorum referre ( *n* ).

Cum demum persuaderer, ex cognitis corporeis in cerebro causis utriusve vitiis, multa ad partium cerebri fines & utilitates cognoscendas utiliter sequi, conatus sum colligere, quæ de causis manix & fatuitatis reperirem. Non multum profeci, historiæ paucæ sunt, præter nuperrimas, quas ILL. MORGAGNO debemus, & mihi ipsi nulla fuit ad inquirendum opportunitas.

In delirio febrili vasa piæ meningis sanguine plena ( *n\** ), gelatina crescens sub meninge ( *n\*\** ), cerebrum durum ( *n\*\*\** ), erysipelas in cerebrum & meningem translatum, cortex ruber & inflammatus ( *n\*\*\*\** ), squamæ ossæ in cerebrum depressæ ( *n†* ). In ebrietate, quæ species est delirii, vasa sanguinea nervi optici, & retinæ nudo oculo conspicua fuerunt ( *n††* ). In hydrophobia, adfini morbo, cerebrum ficius ( *n†††* ), sanguis potius concretus; meningum vasa sanguine plena ( *n††††* ).

C c c c 2

Phreni-

( *f* ) *Gentlem. Magaz.* Jun. 1752.( *g* ) Ad n. 590.( *h* ) FISCHER *de senio* p. 67.( *i* ) Jam p. 539. ex ROBINSON *of the spleen* p. 83.( *k* ) Le CAMUS II. p. 122. 123.( *l* ) Amata puella possessa ARETÆUS *diut.* II c. 5. Spe libertatis facta in nostalgia GALSTALDUS. Sola spe mutui amoris excitata in catotocho TULP. I. *obs.* 22. Societate perpetua amicorum restitutus NEWTONUS SCARDONA p. 120. Cantu suspensum delirium & sanatum *Hist. de l'Acad.* 1707. p. 7. 8.( *m* ) TOGGENBURGER *casus stupor. scabiei inoculat. sanati.* Inde pulsus lentus invaluit.( *n* ) L. XI. p. 534.( *n\** ) MORGAGNUS *Sed. & caus. morb.* I. p. 53. 54. 49.( *n\*\** ) IDEM p. 49.( *n\*\*\** ) MORGAGN. p. 80. 59. cum cerebellum mollius esset.( *n\*\*\*\** ) STORK *ann.* I. p. 101.( *n†* ) M NNE *ohff* p. 122.( *n††* ) COWPER ad f 28. *append.*( *n†††* ) MORGAGN. *ibid.* p. 61. 63.( *n††††* ) IDEM p. 62. 63.



Phrenitis frequenter ab inflammatione piæ membranæ ( *o* ), cerebri ( *p* ), cerebelli ( *q* ), ab aqua in eo effusa ( *r* ), a sanguine in encephalon & meninges congesto ( *s* ), ab abscessu cerebri ( *t* ) oriri visa est.

In mania cerebrum ficcum ( *x* ), durius ( *x\** ) friabile, sanguis in cerebri meningibus, aut in cerebro congestus ( *y* ): cerebri pars consumpta, reliquum molle & maceratum ( *z* ): glandulæ in plexu choroideo ( *z\** ): carotides ossæ ( *a* ); vermes in cerebro ( *b* ) reperti sunt.

In hypochondriacis cerebrum durius ( *c* ), ficius: sanguinis in sinu falciformi coagula: sanguis in pia meninge piceus ( *d* ); & vasa cerebri turgida ( *e* ); aqua in ventriculis cerebri ( *f* ). In nostalgia, melancholiæ genere, vasa cerebri & cerebelli mire tumentia ( *f\** ).

Porro accusæ in amentibus repertam in cadavere corruptam. Figuram capitis alienam ( *g* ), ut a cranio compresso ( *h* ); duram matrem lividam, putidam, inflammata ( *i* ); cerebrum ficcissimum; cerebrum male figuratum ( *l* ); sanguinem in cerebro congestum ( *m* ); cerebrum molle

( *o* ) BONNET *obs.* 4. 5. 9. 17. 18. 19. 30. Sanguine plenæ meninges MORGAGN. I. p. 51. 52.

( *p* ) BONNET *obs.* 7. 11. 12. 17. 21. 24. 25. 32. 33. 36. MEAD *of pois.* p. 139. in hydrophobo G. V. SWIETEN. Conf. L. X. p. 218.

( *q* ) BONNET *obs.* 5.

( *r* ) ID. *obs.* 16. 27. 28. RICHA *Const. Epid.* III p. 114. 34. &c. WILLIS *anim. brut.* p. 307. Gelatinosa concrementa secundum vasa piæ membranæ MORG. I. p. 49. 51.

( *s* ) BONNET conf. L. X. l. c.

( *t* ) L. X. l. c.

( *x* ) BONNET *obs.* I.

( *x\** ) MORGAGN l. p. 55. 56. non cerebelli.

( *y* ) ID. *obs.* 26 MEKEL l. c. In meninges BARRERE *obs.* p. 52. seqq.

( *z* ) INGRAM *cases* p. 101.

( *z\** ) MORGAGN. l. p. 54.

( *a* ) HARMES *cas.* mania.

( *b* ) BONNET *obs.* 7.

( *c* ) SCHMIEDEL *de pericard* &c.

( *d* ) G. V. SWIETEN III. p. 264.

( *e* ) BARRERE in *nostalgia* ed. II. *obs.* 5. p. 20. *obs.* 6. p. 24. LOTICH C. IV. L. III. *obs.* 3.

( *f* ) BARRERE *ibid.*

( *f\** ) ID. l. c. *obs.* 6. p. 24.

( *g* ) Addit ad *obs.* 4.

( *h* ) HILD. *Cent.* III. *obs.* 21.

( *i* ) LIEUTAUD *précis.* p. 209. FANTON *obs.* 25. BONNET *obs.* 8. 17. Compactum. LAN-  
CIS. *de sede cogitan* p. 158. 159.

( *l* ) POZZI p. 88.

( *m* ) BONNET *obs.* 11. FORST, l. c. BARRERE *ed. nov.* ex hyoscyami radice. p. 54. seqq.



le (*n*), aut durum vicissim (*n*<sup>\*</sup>); tumorem scirrhosum super corpus callosum (*o*), vel alibi positum, & perinde cerebrum comprimentem (*p*); vesicas in corpore calloso (*q*); scirrhos in plexu choroideo (*r*); cerebrum justo minus (*s*): cerebrum inflammatum, erosum (*t*); aquæ in cerebro copiam (*u*); hydrocephalum (*u*<sup>\*</sup>); calculum in cerebri ventriculo (*x*), falce (*y*); calculos in glandula pineali (*z*), & scirrhum (*a*) in ea glandula, & osseam (*b*) naturam: varia cerebri mala, tumores glandularum (*c*) &c.

Omitto aliqua, ut nervorum paria non parallela (*d*), aequæ in sanissimis frequentia.

Pauca ista, quorum pleraque MORGAGNO debemus. Neque multa inde auctim definire, cum præterea non rarissime nullum vitium (*e*) in maniacorum corporibus reperiatur, & in non sentientibus (*f*); & cum nihil certi vinculi inter aliquod mentis vitium definitæque in encephalo particulæ vitium depræhendatur; & cum demum communia sint contrariorum morborum in cadaveribus vestigia, fatuitatis & phrenitidis: quam quidem

C c c c 3

novissi-

(*n*) BONNET *obs.* 2. §. 16. L. X. p. 318. *Histoir. de l'Acad.* 1705. *obs.* 17. 1704. *obs.* 12. Cum glandula pituitaria magna, memoria deleta & iudicium destructum VIEUSSENS *nov. system. vas. fin.*

(*n*<sup>\*</sup>) MORGAGN. I. p. 55.

(*o*) BONNET *obs.* 4. PLATER *obs.* 51. WEPFER *de apoplex.* p. 277. BAUMIN *theatr.* p. 305.

(*p*) DUVERNEY *de l'ouïe* p. 100. FLAMERDING *de apoplex.*

(*q*) *Obs.* 12 aut in cerebro *Opusc. scientif.* III. p. 162.

(*r*) BOEHMER l. c.

(*s*) BONNET *obs.* 9. 10. Ad tertiam partem consumtum cum aqua inter meninges, KING *Phil. coll.* 1686.

(*t*) RUMLER l. c. COITER p. 111.

(*u*) SANTORIN p. 54. BOEHMER *præf. fascic.* I. p. XVI. XVII. BONNET *obs.* 1. 4. 7. 12. 14. 15. 20. CHIFFLET *obs.* Huc historia surdi & muti, qui auditum recuperavit, cum aqua de aure effluxisset *Histoire de l'Academie des sciences* 1703. p. 18.

(*u*<sup>\*</sup>) L. X. p. 319.

(*x*) BONNET *obs.* 5. MEKEL *ibid.* p. 94.

(*y*) VATER *propr.* ad disp. ZIEGENHORN.

(*z*) MEKEL *Mém. de Berlin.* T. X. p. 91. KING. l. c. GUNZ *lap. gland. pinealis*, in quinque hominibus. In ventriculo cerebri MEKEL p. 94.

(*a*) L. X. p. 319.

(*b*) DUVERNEY *ibid.*

(*c*) IDEM *Mém. avant* 1699. II. p. 25. FANTON ad PACCH. p. 112. *Opusc.* III. p. 182.

(*d*) POZZI *Comm. Ep.* p. 88.

(*e*) FRÄNK. *Anmerk.* T. V. p. 288. WILLIS *de cerebro* p. 188. ed. 8. MEKEL l. c.

(*f*) HOME *med. facts* p. 53.



novissimam objectionem possis excusare, ex phænomenis ebrietatis, & phrenitidis, in quibus ex eadem causa primo delirium, deinde, morbo ultra profecto sopor & insensibilis stupor oritur. Id utique adparet, plerumque in mentis vitiis encephalum pati: & si aliquando rariori exemplo non visum est pati, potuit vitium in minoribus elementis latuisse, aut incifori patientia defuisse. Addit ILL. MORGAGNUS (*f\**), peculiarem legem, in omnibus infans cerebrum, aut certe medullam, durior fecisse.

## S E C T I O I I.

## V O L U N T A S.

§. I. *Dolor.*

**C**Um luce intellectum, cum igne voluntatem compares. Blande ille, hæc vehementissime operatur. Sensu, & voluntate natura animalis propria continetur (*g*). *Voluntas* est actio animæ, qua aliquam suam conditionem præfert alteri conditioni (*h*). *Bonum* est, quod esse nobiscum præferamus, *malum* quod a nobis abesse.

In corporeis rebus *dolor* verum & maximum, quod fugimus, malum est; sunt tamen etiam alia molesta. Est autem dolor sensatio quæcunque ita fortis (*i*), ut anima eam malit abesse. Dicas in circulum me circumire, sed alium terminum non habemus.

In dolorem abit lux nimia, & acre sapidum, & frictio cutis fortior. Dolet nudata epidermide cutis, si mollissimo panno tetigeris. Lux, aura & colores vividi hydrophobis dolorem faciunt, quod nervi magis sentiant (*i\**).

Multi definiunt eum statum esse in dolore, in quo nervi aut rumpan-  
tur (*k*), aut sint ruptioni (*l*) suæ proximi. Hæc definitio videtur ex  
tortura

(*f\**) *Sed. & caus. morb.* I. p. 59.

(*g*) BASTER *uytspanning.* T. I. p. 64.

(*h*) BONNET p. 115.

(*i*) HARTLEY p. 35. GORTER *Chirurg.* p. 189.

(*i\**) *Lond. mag.* 1735. p. 291. *Journ. de méd.* T. III. n. 3. add. p. nostr. 559.

(*k*) CARTESIUS *de homine* p. 63.

(*l*) HARTLEY p. 36.



tortura nata, in qua extensi (*m*) artus, & una nervi, acerrime dolent, & paulo post rumpuntur. Verum capitis nervi P O R T I O quinquaginta annis pene quotidie hemicraniam passi, neque rupti sunt, neque ultima die acrius aut mitius doluerunt, quam prima: acrius dolituri si magis nunc tensæ fibræ fuissent, mitius si ruptæ (*n*).

Magnus utique dolor, & perpetuus, corpus consumit (*o*), & si maximus fuerit, vires subito tollit (*p*), & celeriter ciet alvum (*q*) & urinam, ut video in miseris, quorum torturæ officium meum me cogit præfidere; denique necant, ut (*r*) in flexione validissima tibiæ accidit. Canes, quibus nervos ligabam, unico excepto, interierunt omnes, etsi nervi fere cutanei fuerunt, & animalia suam salubrem salivam poterant adhibere.

Dolorem DEUS homini fidelem custodem (*s*) dedit, qui de causa corporis destructrice moneat. Leve videtur, & est magni. Nisi dolor moneret in morbo, ut corpus converteremus, neque in eandem particulam perpetuo pondus totius corporis dimitteremus, tunc utique in quovis morbo gangrænæ orirentur, ab intercepto per eam compressam cutem sanguinis succique nervei motu, quæ mala nunc rara sunt. Totum corpus summe sensibili velamento ambitur, ut undique caveamus ab adhesionem in corpora dura, a vulneranti acie, a congelaturo frigore, ab exusturo igne. Interiora, ut minus exposita externis læsionibus minus dolent, viscerum exemplo.

Ad dolorem, etsi non ita veri dolores sint, revoces tamen famem, in verum dolorem abituram, sitim, anxietatem (*s\**), quæ est a sanguine per pulmonem transire impotem, lassitudinem, a motu musculari, pruriginem, & titillationem, illam nudi nervi, ut videtur leniorem irritationem, hanc graviolem, & abituram in convulsionem: demum ingratos

(*m*) Dolent fibræ, quando paucæ tensionem ferunt, quam multæ ferebant BOERHAAVE *virt. medicam.* p. 162.

(*n*) Contra etiam dixit LOBB *on painfull diseases* p. 16. GORTER.

(*o*) In sceleti speciem BLANCAARD *Juurreg I Cent II. n. 94.*

(*p*) BOERHAAVE *morb. nerv.* II p. 428 exemplo tauri, cui canes testes convellunt, & qui viribus fractis procumbit, quod exemplum jam in vetere poemate *der Reinken* reperitur.

(*q*) LABAT *Voyag. d'Italie T. VII. p. 6.*

(*r*) PETIT *Malad. des os II. p. 232.*

(*s*) RAI *wisdom of God &c.* p. 244.

(*s\**) In suspensio G. V. SWIETEN II. p. 198.



gratos odores, sapores, sonosque. Eas enim omnes corporis conditiones a nobis volumus abesse.

§. II. *Voluptas.*

Is est in corpore status, quem malis esse. Non est facile dictum, quid sit in nervis, quod voluptatem faciat. Motum esse, leniorem quam in dolore, fortiolem quam in statu sensus experte, videmus equidem. Sed cur colores iridis nobis pulchri videantur, cur sonorum certæ successiones gratæ sint, cur rosæ potius quam urticæ odor, cur vini magis sapor placeat, quam ficeræ, de eo quidem non definias. Sed neque exiguam voluptatem recte esse dicemus, in qua motus nervi sentientis sit lenior, maximam, in qua fortis; neque enim auræ lenis per æstum adspiratio, neque potus sitienti homini oblatus, est ex vehementius afficientibus. Scabere prurienti summe deliciosum est, & tamen paulo acrius qui scabet, dolebit (*t*). Sed etiam hic dicere non est, cur venerea lubido, in qua toti artus contremiscunt, & convelluntur, cum voluptate jungatur; omnis alius tremor, omnis alia convulsio nihil grati habeat (*u*).

Exigua voluptas corpus nostrum sustentat, magna destruit. Omnia fere insecta mascula paulo post venerem intereunt, & aliqui homines interierunt, & plerique inertes fiunt aliquamdiu, neque ferrent ullo modo, si diutius continuarent. In eo voluptas cum aliis convulsionibus parem effectum habet.

Dolorem leniorem diximus perpetuum esse, voluptatem rariorem; tamen quam molestus dolor frequentior. Num in sensu existentiae nostræ (*x*) sit aliqua voluptas, non dicero. Sed est in edendo, in bibendo; neque abest, quoties desiderio alicui naturæ satisfit, ut in aura quam frigidam captamus, in quiete hominis labore fracti; minimum adeo horæ unius in diem, in omni mortali, in aliis multo longior.

In

(*s\**) Etiam ii, qui cæci nascuntur, reddito visu, scarlatinum colorem præferunt *Histoir. de la Chir* III. p. 115. *Journ. de Méd.* Juin 1762.

(*t*) Insecta esse, quæ pruritum faciant, (quæ eadem in farina habitant LINN *mirac. insect.* p. 20.) ex *Hyacinthi* CESTONI inventis constat, *Giorn. di Letter d'Ital* T. IX. p. 35. VALISNERI T. III. p. 431.

(*u*) Voluptas fit a vibrationibus ita acceleratis, ut tamen non sint nimis BONNET p. 91.

(*x*) MULLER *Entwurf. &c.* T. II. n. 88.



In omni tamen sensu ( $\gamma$ ) aut voluptatem, aut dolorem esse, non invenio. Triangulum inspectum neutrum apud me excitat ( $\alpha$ ).

Sapientiæ divinæ mihi in dolore & voluptate vestigium est evidentissimum. Ille nos monet, ut morbos avertamus, neque nos exponamus vulneribus. Ista ex paterno CREATORIS animo missa nobis est conciliatrix ad ea officia, quæ vel nos ipsos sustentant, ut in edendo sit & bibendo; vel genus humanum conservant, ut in venere. Et istam fecit fortio-rem, atque indomabile fere ejus desiderium in maribus, ut feminas ad patiendum persuadeant, cogantve. Tantum, cum animalia pleraque in conjugio non durent, & cum educatio filiorum brevi tempore absolvatur, brutis animalibus fere ad eam cupidinem certa in anno tempora præscripsit, nullum homini, qui ad conjugium sit destinatus, & qui ultra omnia animalia diutissime infans, & alienæ opis sit indigus. Quare nulla, quantum in legendis itineribus profeci, nulla, inquam, natio est absque conjugio: cujus perpetuum vinculum perpetua pariter voluptas sit. Nunc quidem non videtur certius esse sapientiæ signum, quam sint stimuli, id nobis acceptissimum reddituri, quod facere nobis necesse est.

Dolori multa fere cum voluptate communia sunt, fortior nempe sensus; fortior etiam sanguinis confluxus ad eam partem, quæ vel voluptate emovetur, vel dolore: exempla sunt in venereis organis, in ipsis oculis acrius tuentibus, in fricta cute.

### §. III. *Aliæ cupidines.*

Circa istos fere stimulos animalium vita versatur. Destinata sunt, ut aliquamdiu, præscriptis annis, partem suam pabuli consumant, sive id ex herbis fuerit, sive ex animali materie: utque speciem suam conservent. Ad ea officia dolore, fame, siti, voluptate ducuntur.

Homini & hæc communia sunt, & alia destinatio est, alii adeo stimuli. Primarium quidem, quo invenio differre, spes est, & consideratio remoti futurique eventus. Si formicas mihi apesque excitaveris: & thesaurorum conditores fibros, mures montanos, mures buccis inflatis [*Hamster*], vides eam omnem penum tamen ad alendam vitam, adque speciem

( $\gamma$ ) BATTIE *on madness*. p. 27. HARTLEY p. 41. BONNET p. 409.

( $\alpha$ ) A sensu distinguitur utraque *Mém. de Berlin* T. XIII. p. 389.



speciem propagandam spectare, si omnino spes est, & si in remotum hæc animalia prospiciunt, dum laborant.

Verum homo ratiocinio suo ex præsentē causa effectus futuros colligit, in eos ita extendit spes suas, ut præsentibus præterat. Omnes, olim HORATIO monente, laboramus, non ut nunc bene sit, sed ut olim, ut etiam nostris filiis, posteris, civibus, patriæ sit bene, cujus admirabilem amorem DEUS quibusdam gentibus impertiit. Hæc ipsa spes omnis religionis est fundamentum, jubetque præsentēs voluptates coercere, ne futuras in miseris ducant. Facile vero adparet, oportere hanc spem alere adtentione, & sæpe repetitis & meditatīs notionibus, quibus nititur. Id ni fiat, relabimur in dominationem voluptatis præsentis, quæ spem futurorum reddit inertem. Hoc est illud: video meliora, proboque, deteriora sequor.

Alter instinctus, cujus exigua apud animalia vestigia sunt, & in cane aliqua, est curiositas, sive nova discendi cupido, quæ & ipsa hominem extra se rapit, ut patriæ oblitus per invia maria, milleque pericula alimenta sui furoris inveniat. Magnum hoc iterum sapientiæ divinæ est monumentum. Nam cum animalia intra paucas plantas, aut intra alia certe animalia devoranda sua desideria includant, cumque spectaculum Naturæ non debuerit esse absque spectatore, solus homo ad perspicienda universi corporei miracula superest. Eum ut eo officio fungatur, DEUS hoc instinctu armavit, quem tamen Europæi præ aliis gentibus validiorem experiuntur. Originem quidem in tædio status præsentis, & fibræ ab eadem flexione continuata fatigatione ponas (a). Inde tamen potius inquietudo aliqua sequitur, quam curiositas; sed homines inquietos abunde videas, non ideo vera curiositate præditos.

Tertius gloriæ est instinctus, homini iterum proprius, neque in corporea voluptate habens alimenti quidquam. Excellere ergo inter sodales, inter Europæos, inter posteros, cupido est, qua & ipsa DEUS, ad vitæ civilis ardua subeunda munia homines incitat. Cumque varia sint omnino privilegia, quibus excellas, idem instinctus homines ad literas colendas, ad tuendam in bello patriam, ad artium omne genus, ad omnes in universum vitæ civilis virtutes animat.

Omnes

(a) Conf. BONNET p. 103.



Omnes hi stimuli in unico demum uniuntur, felicitatis nempe nostræ desiderio, sive amore proprio, qui omnium sensationum finis, & actionum fons est (b).

§. IV. *Affectus animi.*

Sunt ergo bona, in corpore voluptas (c), sanitatis enim bonum non percipitur, nisi a passio morbos; in anima spes futuri boni, gloria, & idearum novarum adquisitio; Mala sunt eorum contraria: desperatio de bonis cupitis, pudor ex male actis, & maximum malorum, quod soli Germani recte nominant, *temporis longitudo*, quæ est idearum animæ placentium absentia. In illis quærendis, in istis vitandis voluntas occupatur. Desiderium bonorum est averfatio malorum. Non ideo unice hæc aut bona, aut mala in sensatione fundantur, ut nuper passim docetur; sed ex notionibus pariter abstractis oriuntur, qualis est spes vitæ æternæ, DE I amor, aut metus. Neque enim gloria quidquam habet cum illo sensu commune, utcunque conatus sit id persuadere HELVETIUS. Nam Romani illi neque veneris, neque cibi spe tentabantur, neque ullam corporis voluptatem quærebant, qui se reddebant Carthaginensium tormentis, aut desiliebant in specum, de qua mephitis spirabat, ut CURTIUS. Sed neque anachoretæ Christiani, voluptatis amore ducebantur, ut in miserrimo victu, exsortes veneris, inque doloribus, & ardentis solis radiis vitam agerent. Causæ necessitas nuper Philosophos reddidit subtiles, & est ex eorum re, nihil in nobis esse, nisi corporis adtributa.

Aequilibratio sensationum cum notionibus facit eam pugnam duarum (c\*) voluntatum, præsentis stimuli, & prævisi mali futuri, sensumque mali moralis eadem creat. Hinc illæ hydrophoborum contrariæ voluntates mordendi, ex præsentis furore, & abstinendi ex notionibus veri & æqui dudum animo receptis; ut moneant amicos ne ad se accedant cominus, morsuros invitos (d). Multum certe obstinata potest voluntas, quæ notioni-

D d d d 2

bus

(b) BONNET p. 253.

(c) IDEM p. 301.

(c\*) BONNET p. 301.

(d) CODRONCHI p. 100. FABER ad HERNAND. p. 492. P. SALIUS *de affect. particul.* c. 19. GOKEL *Hundsbiß* p. 25. 26. MEAD. *of poisons* p. 133. *Lond. Magaz.* 1735. p. 391. *Journ. de Méd.* T. III. n. 3. RHODIUS C. I. *obs.* 46. BAGLIV. p. 634. HUMAULD *sur la rage* p. 28. RIDLEY *obs.* p. 110. SAVIARD *obs.* 99. *Journ. des Savans* 1757. m. Dec. *Art de faire les Rapports* p. 221. *Mercur de France* 1765. n. 1. BROGIANI *de venen. animal.* SAUVAGES *physiol.* p. 153. *Histoire de l'Acad.* 1749. p. 108. &c.



bus stimulat. Nævum, ut animo ex sanguine conspecto linqueretur, medicus superavit volendo (e). Ipsas pollutiones vicit alius deliberato consilio evigilandi, uti imaginatio inciperet furere (f).

Ideæ ergo bonorum, quorum acquisitionem & conservationem; deinde malorum, quorum aversionem, & amolitionem concupimus, excitant eos in anima motus, quos *adfectus* vocant: qui omnes sunt vehementiores quasi concitatae mentis fluctus, quibus ad obtinendos fines acius incitatur.

Primumque *adfectus* a possessione boni natus, est lætitia, quæ in gaudium vertitur, quando & magnum bonum est, & inopinatum nobis contingit.

Boni futuri expectatio spes est, quam alibi diximus, plerumque adeo tenuis, ut non possit inter *adfectus* numerari, cum notionum non sit eadem in percellendis nervis, quæ sensationum potestas.

Boni acquirendi desiderium in universum *amor* est, etsi magis peculiariter ea voce utuntur in exprimendo desiderio mutuo duorum sexuum, quo in venerem feruntur. Hoc desiderium est ex validissimis *adfectibus*, nosque reddit adeo impatientes præsentis status, ut mortem appetamus, ne is status fruitionis expers supersit, idemque est robur, si fuerit gloriæ desiderium.

Mali mediocris & longi præsentia *tristitiam* facit: mali vehementis, & subito ingruentis idea *terrorem*, & ipsum validissimum *adfectum*. Mali expectatio cum impotentia id avertendi, *metum* incutit: mali aversatio cum ejus avertendi conatu *iram* ciet: *pudor* sensus est admittæ culpæ: *commiseratio* sensus ex miseria aliena tristis. Denique *desperatio* est & maximi mali sensus, & cujus nullum sit remedium, quo *adfectu* non alius sævior, ad destruendum hominem pronior digniorque est, quem cum igne æterno S. S. comparaverit.

#### §. V. *Effectus adfectuum animi.*

Hæc potissimum speculatio ad medicos pertinet. Nempe ab *adfectibus* animi sequuntur in corpore motus memorabiles, & violenti. Eos quidem dimittimus, quibus voluntas ad consequendum suum finem utitur, neque pugnas hic describimus, aut blandimenta, quibus destinato amore potiri

(e) Apud FRITSCH *seltsame Händel* p. 22.

(f) TISSOT *de l'onanisme* p. 208.



potiri studemus. Sed alii sunt motus, quos hoc loco oportet contemplari, & qui ex animi adfectu in corde, sanguinis motu, nervis, musculis, universo corpore vehementissimi oboriuntur, nullo nostro ex arbitrio, neque nobis consciis.

Ergo lætitiæ saluberrimus est adfectus eo magis, quando modica est, & una purior. Ea enim omnes vitales motus incitat, perspirationem auget (*g*), inque morbis convalescentiam (*h*) adjuvat, novis quasi cordi viribus additis. A lætitia vita longa potissimum sustinetur, eoque refero Academicorum Parisinorum in sinu honestæ voluptatis viventium summum senium (*i*): & inter eos eminentem longævitatē FONTENELLII, nihil volentis vehementius, quem nec iræ morderent, neque cupido de mentis tranquillitate exjiceret.

Gaudii violentior est adfectus. Modicum tamen cordis palpitationem (*k*) facit, ruborem faciei, calorem (*l*), perspirationem (*m*) auctam, lacrimas cum sensu mirifico tenerrimi adjuncti & exoptati doloris, febrem (*n*) acutam, si maximum & subitissimum fuerit, & deliquia animi, subitasque demum mortes (*o*): ut a restituta libertate (*p*): a reddita sibi amata puella (*q*), aut filio, filiaque, quæ credebatur mortua (*r*), ab hereditate insperata (*s*). Qui id fiat, non satis novimus. A perspiratione aucta (*t*): a sanguine ad extrema pulso, neque ad cor (*u*) redeunte, video exponi. Sed desunt experimenta. Apoplexiam fieri su-

D d d d 3

spiceris,

(*g*) SANCTOR. *de perspir.* Sect. VII. n. 1. II. 24. 25. & imprimis 6. 19.

(*h*) *Laurentii* a MEDICIS. *PEIRESC. vit.* p. 261. (aphonia sublata) SCHERHANMER *adfect. anim.* p. 219. Sanata melancholia TRALLIAN L. I. Cataleptis SCHELLING *ager catalept.*

(*i*) CREBILLONII. DUVERNEY, WINSELOWI &c.

(*k*) KEMPER *de valv.* p. 25.

(*l*) WOODWARD *cases* p. 96.

(*m*) ROBINSON *on food and discharg.* p. 77. conf. L. XII. p. 71.

(*n*) RHOD *obs.* 5. L. I.

(*o*) Conf. STIEF *de somno* p. 30. PECHLIN L. III. c. 3. LOTICH L. III. c. 4. *obs.* I. BOERHAAVE *de morb. nerv.* p. 553. SANCTOR *sect.* VII. n. 1. GALEN. *valv. evend.* p. 440.

(*p*) FOUQUETI, reddita libertate. BEHBENS *diatet.* p. 436.

(*q*) THORESBY *natur. hist. of Leeds* p. 625.

(*r*) L. JOUBERT *du ris* p. 79. ROBINSON *of the spleen* p. 91. De matre romana post pugnam L. Thrasymerii Veteres.

(*s*) NICHOLLS *anim. med.* p. 16. Neptis LEIBNIZII *Hist. de l'Acad.* 1716. Add. PECHLIN L. III. *obs.* 3.

(*t*) SANCTOR. *Sect.* VII. n. 26. 28. CHEYNE *sanit. infirm.* p. 189.

(*u*) PARSONS *physiognom.* p. 81.



spiceris, incitato in cerebrum ictu sanguinis. Ita rubor, calor, deliquium suadent.

Amor & ipse sanguinem incitat, pulsusque accelerat, cum inæqualitate, quam admisto metui tribuas. Ita certe STRUTHIUS ( $x$ ), olimque ANTIOCHI amor ex pulsu detectus fuisse legitur. Vehementior amor, & propior possessioni, summum calorem, palpitationem, ruborem, robur, pene cum tremore, & sensum quasi ignis per vasa ipsorum artuum fluentis facit: ut de genitalibus interim differamus. Menses inde ante diem excitatos novi ( $y$ ).

*Studium* aliqua habet amoris similia, & circuitum sanguinis incitat; sudorem movet, etiam febrem sanavit ( $z$ ) intensius; paralytin, minuit ( $a$ ), superatve ( $b$ ). Mortem ipsam expectatio distulit ( $c$ ). Ad studium possis referre *Philippi NERII* aneurysma aortæ, cum costis fractis, cum palpitatione huic viro a contemplationibus sacris potissimum superveniret ( $d$ ). Nimium, in debili cerebro, nimios motus facit, etiam epilepsiam ( $d^*$ ).

*Pudor* etiam in animalibus aliquis videtur. In homine peculiarem facit in facie ruborem, non genarum, sed ut vidi in puella, totius etiam faciei & pectoris, & forte universi corporis; nam menses ex pudore suppressi ( $e$ ) fuisse leguntur. Credas esse ex impedito reditu sanguinis venosi ( $f$ ), cum venæ inde ruptæ fuisse legantur ( $g$ ).

*Misericordia* possit pro tristitia haberi, differt tamen. Multo magis & quasi profundius animum emovet, & viscera solvit, atque lacrumas ciet, etiam eorum, qui ex propriis malis nunquam eo possint urgeri, ut flerent. Admiscet se ad tristitiam amor. Hæc adfectio homini pene propria est. Video tamen animalia aliqua, quando de sua gente aliquod patitur,

( $x$ ) *Spbygmol.* p. 218.

( $y$ ) Habet BIERLING *advers.* n. 39.

( $z$ ) Q. FABIO MAXIMO, in quartana, PLINIUS L. VII. c. 50.

( $a$ ) Paralyticos curiositas fecit incedere, cum Maroccanus legatus nosodochium inviseret ANDRY *orthoped.* p. 98.

( $b$ ) HILDAN. *epist. med.* ut pugmare posset in vallo obsessæ urbis conscendendo.

( $c$ ) PECHLIN L. III. *obsf.* 3. & studium ludi LOUIS *signes de la mort* p. 129.

( $d$ ) ANGELUS VICTORINUS in proprio libello p. 30.

( $d^*$ ) HOFMANN *Med. Conf.* C. IV. D. II. c. 6. Convulsiones PECHLIN *Cens.* III. *obsf.* 6.

( $e$ ) SCHELHAMMER p. 180. ex BALLONIO.

( $f$ ) VIEUSSENS p. 182.

( $g$ ) In temporibus CORNAX *Enchirid.* p. 26. SCHENK p. 141. Sal. ALBERTI *de sudore cruento.*



patitur, concurrente & querula voce simile quid testari, etsi nihil adjuvant.

*Mæror* vel *tristitia* frangit motum cordis, ut suspiriis necesse sit transitum per pulmonem expedire: frangit appetitum (*b*), viresque, & perspirationem minuit (*i*), mensesque (*k*); aperit poros ad recipiendum pestis venenum (*k*<sup>\*</sup>); pallorem inducit & oedema; scirrhus, cancrus facit ingravescere (*l*); scorbuti causa est, & morborum in urbibus obsessis malignorum (*m*). Major palpitationem ciēt (*n*), pulsus in inæquales etiam in utroque brachio dissimiles (*n*<sup>\*</sup>); gangrænas in vulneribus (*o*); amaurosin (*p*); occidit denique aut brevi, aut nonnunquam subito (*q*). Adeo vehemens animo insidet, ut ab opio nequeat superari (*r*).

Nostalgia genus est moeroris (*s*) subditis Reipublicæ meæ familiaris, etiam civibus, a desiderio nati suorum. Is sensim consumit ægros, & destruit (*t*), nonnunquam in rigorem (*t*<sup>\*</sup>), & maniam abit, alias in febres lentas. Eum spes sanat (*x*). Etiam animalia consueta societate privata nonnunquam depereunt, & ex pullis amissis etiam lutræ maris Kamtschadalensis. Sic ex amore frustrato lenta & insanabilis consumptio sequitur, quod angli *cor ruptum* vocant (*y*).

*Metus* multa similia facit moeroris (*z*): debilitat cordis vires, pulmonemque

(*b*) SCHELHAMMER p. 176.

(*i*) ROBINSON *food and discharges* p. 77. SANCTOR. *de perspir.* VII. n. 15. Hinc diarrhoea ex moerore BAGLIV.

(*k*) SCHELHAMMER. SCHURIG *parthenol.* p. 156. MERCURIALIS *morb. mul.* L. IV.

(*k*<sup>\*</sup>) Intra duas horas ex peste exstinctus post insignem moerorem *Recueil sur la Peste* p. 244.

(*l*) PECHLIN L. III. *obs.* 21.

(*m*) BAGLIV. *prax.* p. 150.

(*n*) WOODWARD p. 98.

(*n*<sup>\*</sup>) MORGAGN. *Sed. & caus. morb.* I. p. 254.

(*o*) DIONIS p. 472.

(*p*) SCHNEIDER *de catarrh.* p. 428.

(*q*) CARDAN. *subtil.* p. 375. ROBINSON *of spleen* p. 91. NICHOLLS *de vi animæ medica* p. 16.

(*r*) YOUNG *opium* p. 28.

(*s*) SULZER ad SCHEUCHZER *Naturgesch.* p. 87. 88. AUENBRUKKER p. 44.

(*t*) BARRERE *nov. ed. obs.* V VI. &c.

(*t*<sup>\*</sup>) IDEM *obs.* 5. p. 20. Etiam urina suppressa *ibid.*

(*x*) AUENBRUKKER.

(*y*) *Nov. Comment. Acad. Petrop.* T. II. p. 395. MARCELL. DONAT. p. 282.

(*z*) B. ROBINSON *on food and discharges.*



sumque reddit incertum (a), & pallorem (b) facit, & horripilationem, ut a frigore (c), & animi deliquium (d), & canitiem subitam in nonnullis exemplis (e): Sanguinis motum ita moratur, ut nihil de vena fluat; hæmorrhagias supprimit (f), & menses (g), & lac (h), & perspirationem (i); viresque ad venerem necessarias frangit (k): cutis poros, aut certe pulmonis aperit ad recipiendum venenum pestis, alteriusve morbi (l); sudorem ciet (m), alvumque laxat, & icterum (n), scirrhumve inducit etiam (o) subitum, puto a retento & coacto lacte; gangrænam demum (p); & vulnera reddit lethalia (q), morbosque funestos (r). Etiam ventriculi & intestinorum vires debilitat, facit flatus, ructus (s). Semen ex metu emissum (t) lego, sed id puto esse terroris. Denique musculorum motum delet, ut præ tremore neque fugere possint, neque se tueri. Inde tremor (u), etiam per viginti annos non recessurus (u\*), paraly-

(a) PECHLIN L. III. obs. 17. TULP L. IV. obs. 49. BINNINGER V. obs. 66. Ex sole tactu medicæ manus BORDRU poulx p. 95.

(b) Journ. d'un voyage aux indes T. III. p. 214.

(c) TABOR p. 244. Journ. cit.

(d) FRITSCH p. 22.

(e) BOERHAAVE morb. nerv. p. 543. 544. GARMANN mirac. mort. p. 30.

(f) PANAROL Pentec. V. obs. 17. MORHOF stentor. βαλονλας p. 232. 233. WALDE SCHMIDT de imagin. HUNAULD vapeurs p. 366.

(g) Ex terræ motu BAGLIVUS p. 537. SPINDLER obs. 70.

(h) MORTON p. 460. la MOTTE obs. 38. RIVIN. de peste p. 843.

(i) ROBINSONS food and discharg. p. 77. SANCTORINUS I. n. 8. Hinc tumor universalis Eph. Nat. Cur. Vol. VII. n. 43.

(k) FRITSCH seltsame Händel p. 218. KUNDMANN. p. 1311. Hinc timore correcto potius est cupita venere FRITSCH.

(l) Variolæ PECHLIN 23. Pestis KUNDMANN Seltenheiten p. 1147. 1148. Dec. VII. p. 47. FRITSCH VI. p. 540. SPINDLER obs. 35. HOECHSTETTER, SCHREIBER p. 19. Morbi maligni ex imaginario pestilenti contagio, quod nullum erat KUNDMANN Zustand p. 224. 225. Inde dysenteria BEHRENS diat. p. 433.

(m) PECHLIN l. c. obs. 18.

(n) BIANCHI T. II. MORGAGN. sed. & caus. morb. T. II. p. 73. Succedit delirium, convulsio, mors.

(o) G. v. SWIETEN T. I. p. 190. HEISTER Chirurg. p. 783. Dolor mammæ singularis Verb. of de Hollandz. Maatsch T. III. p. 32.

(p) SCHELHAMMER p. 182.

(q) FERRARA sylva p. 26.

(r) In peste RIVIN. de peste p. 830. SPINDLER, HOECHSTETTER, SCHREIBER de peste obs. 17. De aliis BAGLIV prax. p. 150.

(s) PECHLIN.

(t) BOERHAAVE de morb. nerv. T. II. p. 481.

(u) LYSER obs. 8.

(u\*) V. SWIETEN T. II. p. 182.



paralyfis (x); amaurosis (y), aphonia (z), melancholia durabilis (a), amentia diuturna (c), epilepsia (d).

Denique magnus metus nonnunquam mortem intulit. Mortuus est, eodem die, quo mors ei fuerat prælagita, ut metus esset pro morbo (e). Mortuus est, cui iudicium fatale erat pronuntiatum (f), & cui in sepulchro pes esset retentus (g), & qui intuebatur tendines sibi dissectos (h), & qui notas variolarum in se ipso conspexerat (i), & alii ex aliis causis (i\*). Etiam in cane ex fragore tormenti (k) mors.

Reperitur in ejusmodi casibus sanguis ad cor congestus (l), & polypi (m), & ad cerebrum collectus cruor (n).

Idem alios sensus tristes supprimit, dolorem, maniam (o). Dentarii medici, quando expediunt instrumentum, sæpe ægrum dolore levatum inveniunt (o\*).

## §. VI.

- (x) BOYLE *exp. post l. de caus. fin.*  
 (y) PERRY in l. de passione hysterica præfat. SCHAARSCHMIDT *Berliner Nachrichten* 1740. p. 22.  
 (z) SPINDLER *obs.* 96. *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. IV. c. 27.*  
 (a) BOERHAAVE l. c. p. 411. TULP. l. IV. c. 54.  
 (c) *Eph. Nat. Cur. l. c.*  
 (d) BOERHAAVE *morb. nerv.* p. 801. BARTHOLIN. *Cent. III. hist. 41.* HAGEDORN C. I. *hist.* 19. G. v. SWIETEN III. p. 393. BINNINGER l. n. 1. *Journ. de médec.* 1683. n. 1. SALMUTH II. n. 73. Etiam infans WEDEL *morb. inf.* 37. TRALLES l. c.  
 (e) KERKRING *obs.* 41.  
 (f) LUSSAN in historia CAROLI VI. ad annum 1403. ROCHEFORT *Antilles* p. 544. WARLIZ *morb. bibl.* p. 339. & RAMI MEHEMET *vasirorum princeps* apud CANTIMIR *hist. des Ottomans* IV. p. 385.  
 (g) CARDAN *contradiet.* l. II. tr. 2. p. 51.  
 (h) MENIOT *oper.* T. I. *obs.* 1.  
 (i) Cum amici morbum celassent KIRKPATRIK *analys.* p. 21. Ed. II. p. 26.  
 (i\*) BARTHOLIN *Cent. III.* p. 76. LANCIS. C. LIT. NOR. 1737. n. 31. *Bresl. Saml.* 1727. m. April. BEVERWCEK *schat der ongez.* p. 39. THORESBY p. 625. 626. &c. *Anecdotes de Médec.* p. 31. 32.  
 (k) *Phil. transf.* n. 235.  
 (l) SENAC II. p. 464. MALPIGH. p. 45.  
 (m) BARTHOLIN. l. c.  
 (n) LANCIS. *mors subit.* l. c. XI.  
 (o) p. 568. FICHET DE FLECHY *obs.* p. 342.  
 (o\*) BUNON *Essay sur l'art du dentiste* p. 176.



## §. VI. Porro de iisdem.

Terrorem ego a metu separo (*p*). In eo enim vires naturæ augentur, non minus, quam ab ira. Inde enim fortissimi motus in universo corpore & in ipso corde (*q*) excitantur, ut muti loquendi usum recuperent (*r*); moribundi convalescant (*s*); paralyticis artubus motus reddatur (*t*), arteriæ cum hæmorrhagia magna aperiantur (*u*); & menses suppressi redierint (*x*); & podagra subito supprimatur (*y*), & ischiadicum malum (*z*), & febris intermittens (*a*), & delirium (*b*), & diarrhoea (*b\*\**). Et contra epilepsiæ ex terrore nascuntur (*b\*\**).

Iræ fere quæ terroris sunt symptomata: pulsus citatior (*c*), rubor, calor, trepidatio etiam & balbuties, vires maximæ (*d*), sanguinis in  
vias

(*p*) Distinguit etiam MORGAN. *princip.* I. p. 378. seqq. Tertianæ a metu nata, sanata per terrorem PETZOLD. *obs.* 20. Alio modo HARTSOEKER passim p. 104. facit *crainte* absentis mali formidinem, & *peur* præsentis.

(*q*) Vires fieri ad vires solitas, ut  $13^2$ .  $8^2$ . Pulsus ad 25. novos accedere in minuto primo conf. SAUVAG. *infl.* p. 234.

(*r*) Filius CRÆSI. BATTUS ex Leone viso L. X. p. 581. PAUSANIAS. CAMER. *Epist. taurin.* p. 79. A lingua resecta TULP. I. c. 41.

(*s*) Bresl. Saml. 1723. m. Jul.

(*t*) HOFMANN *de thorac.* p. 71. BECKER *cultrivov.* Post paralyfin 30 annorum DIERMERBROECK p. 500.

(*u*) HILDAN. *Cent.* I. *obs.* 18.

(*u*) SCHELHAMMER *oper.* T. III. p. CCCII. Copiosissimi inde menses SALMUTH C. III. *obs.* 49. hæmorrhagiæ uteri TRALLES *Vorsorge der Mütter* p. 311. BUDEUS III. *cas.* 23. Abortus TRALLES *ibid.*

(*y*) BOYLE *util. phil. exp.* p. 282. Bresl. Saml. 1718. m. Febr. SEIDEL *morb. incur.* p. 101. HILDAN. *Epist.* 47. LEHMANN *Chron.* p. 912. Accenso lecto RÖPER *Nacht-wandl.* Ex incendio viso PECHLIN L. III. *obs.* 24. Crucifixione TACHEN *podagr.* p. 81.

(*z*) BOYLEI *obs.* & *exp.* PECHLIN III. n. 24.

(*a*) LEHMANN. JUCH *de utilib.* & *futilib.* *antifebrilib.* n. 16. CHIFFLET *puls. febris. orbis Americ.* p. 20. 21. G. V. SWIETEN T. II. p. 327. PECHLIN L. III. 22. 24. PETZOLD *obs.* 20.

(*b*) *Hist. de l'Acad.* 1752. n. 2.

(*b\**) LOESECKE *Arzneymittel* p. 115.

(*b\*\**) HAEN *rat. med.* V. p. 122. Epilepsiæ ex visis epilepticis HILD. III. *obs.* 8. DUBNSKY *reminz. vit.* p. 41.

(*c*) Viribus in moribundo auctis SCHWENKE *hamatol.* p. 20. KAAUW *impet.* p. 429. Ad usque 104. FLOYER *pulsuath* n. 91.

(*d*) In Phreniticis L. XI. p. 484.



vias alienas transitus, hæmorrhagiæ (e); apoplexiæ (f); cordis mirum incrementum (g); cicatrices ruptæ (h); inflammationes (i); perspirationis incrementa (k); bilis subiti motus (l); hinc vomitus (m), & alvi fluxus (n).

Quare ira, ut terrore, mutitas sublata (o) est, & arthritidis (p), & paralyfis (q), & podagra (r), & mors retardata (s) per septem integros dies; ab eadem causa epilepsia (t), & volvulus funestus (u), & febris maxima (x), & mors subita (y) supervenit.

Ad incitatum etiam sanguinis motum pertinent sanguinis subtiliores effusiones, maculæ sanguineæ (z); macula subito fusca in pede nata, hinc (a) gangræna (b). Maculæ & vibices lethales, & nigredo a pede ad genu (c). Cum isto effectū comparo rubedinem in gallorum calecuticorum collo ex ira natum, ipsa denique chamæleontis phænomena. Ea enim, demtis nimis miraculis eo redeunt, ut cutis color ex

E e e e 2

nigro

(e) *Comm.* BOERHAAV. T. II. p. 451. 452. HILDAN. *Epist.* I. PECHLIN III. 25. *Menses inde subito nati* LALLAMANT *mécan. des pass.* p. 168. *Hæmorrhagia uteri* R. DOLPHI. *Narium in ATTILA.* Sudor sanguinis RASCZYNSKI T. II. p. 456. Sanguis in puero per os, oculos, nares, aures, anum, pudendum incitatus a nutricis vehemente ira ALBIN *pravit. sang.* p. 32. *IDEM s. miss.* n. XI.

(f) BECKER *cultivator.* WENCESLAUS IMP. &c. *Wier de ira* p. 795. WOLF L. II. n. 5. *Asphyxia MALPIGH. posth.* p. 45. *Paralyfis lateris alterius* &c.

(g) HARVEI *diff.* III. p. 154.

(h) HILDAN. *Epist.* I.

(i) *IDEM Cent.* I. *obs.* 17.

(k) SANCTOR S. VII. n. I. ROBINSON *food* &c. p. 77.

(l) PECHLIN III. n. 25. *Icterus ALBIN. pravit. sang.* p. 50.

(m) YOUNG *opium* p. 113.

(n) HILDAN. *Cent.* I. n. 18. *Post obstructionem* SCHURIG *chylol.* p. 628. *Salubris est* BEHRENS *dietet.* p. 429. BAGLIV. p. 150. *cum alioquin febris succederet.*

(o) *Act. Hafn.* I. n. 71. *Hist. de l'Acad.* 1738. *hist.* 5.

(p) SALMUTH I. c. 48. BARTHOLIN. H. 28. *Cent.* VI.

(q) WOLF L. II. c. 5. MARCELL. DONAT p. 640.

(r) BARTHOLIN *ibid.* PECHLIN L. III. *obs.* 26. KRUYSSINGH *de odontalg. tact. secund.* HEISTER ad HILDANUM.

(s) ALBERTI *kleine Schrift.* p. 549.

(t) G. V. SWIETEN T. III. p. 393.

(u) TULP. II. c. 41.

(x) FALCONET *princip.* p. 19. *Ea zoma hora funesta fuit.*

(y) ZACUT. *prax. med.* H. I. *obs.* 147. TURNER *force of imagin. farther considered* p. 43.

(z) PRIZOLD *obs.* 20.

(a) ALBERT *med. leg.* T. III. c. 134.

(b) *IDEM. ibid.* QUESNAY *de la gangrene* p. 330.

(c) Gal. *di Minerva.* VI. p. 132.



murino, qui sani est (*c\**), in pallidum, in flavum (*d*) transeat cum flacciditate collapsi corporis. Id fit dum modo retento aere pulmonem turgefacit (*e*), ut per appendices suas distincti, forte etiam inmisso sub cutem aere, & expandant id velamentum, & ejus plicas reticulatas (*f*) deleant, idque nunc glabrum aliter lucem reflectat; modo vicissim remissis pulmonibus aer exit collapsio pulmone, complicatæ cutis pallidam partem animal ostendit (*g*).

Odium & averfatio, maxime ciborum vomitum facit (*h*), & diarrhoeam (*i*), aliquando etiam syncopen, spumam de ore fluentem (*k*), magnaue mala (*l*).

### §. VII. Mechanismus horum adfectuum.

Res ipsæ vulgo notæ sunt, quas enarravimus; sed quomodo, & per quæ omnino organa ad occasionem nati in anima adfectus ii motus in cerebro nascantur, quos diximus, de eo possit utique a nobis quæri. Continuo respondet STAHLIANA secta (*m*), animæ id fieri imperio, quæ a malo se vindicet, ad bonum properet. Id nullo modo cum phænomenis consentit. In metu, ad fugiendum imminens malum, si propriam conservationem finem eorum motuum facias, quid absurdius tremore genuum, debilitate suborta. In ira, quid in emota bile, & diarrhoea boni, ad ulciscendum hostem, quid in epilepsia?

Omnino phænomena metus, cum animalibus communia, quæ fato suo plerumque non resistunt, quando cum fortiori inimico rem habent, persuadent mihi, non ad propriam conservationem metuentis individui, sed ad faciliorem destructionem, eas virium diminutiones cum metu conjunctas a CREATORE destinari. Oportet ad æquilibrium conservandum animalia fecundiora destrui a bestiis infecundis; oportet adeo defensionem

(*c\**) HASSELQUIST. le BRUYN *klein Asien* p. 162.

(*d*) HASSELQUIST *palaestin.* p. 300. Consentit etiam HOUSTOUN.

(*e*) VALISN. II. p. 416. & olim ARISTOTELES.

(*f*) VALISNER. II. p. 394. 414. GREW *rar.* p. 40.

(*g*) HASSELQUIST. VALISN. T. II. p. 396. Etiam in morte pallent SPON.

(*h*) A beta rubra visa RIVIN. *imag. vir. med.*

(*i*) Ex talpa poculo injecta, funesto eventu VALENT. *pand. Med. Leg.* P. I. S. 6. c. ult.

(*k*) ZACUT *prax. admirab.* L. III. obs. 107. ex caseo.

(*l*) *Phil. trans.* n. 29. Ex fele comesta, cum disceret fuisse felem, quam esset pransus L. SAV *cruent. cadav.* p. 269.

(*m*) Conf. L. XI. p. 519.



nem non nimis facilem esse eorum, quæ prædæ destinantur. Ad faciliorē ergo victoriam carnivorarum specierum metus confert earum, quas oportet prædæ cedere. Contra ira, amor, etiam terror ad individui conservationem pertinent.

Sed nihil hæc ad mechanismum. Eum WILLISIUS (n) olim, & VIEUSSENIUS (o) in laqueis nerveis quæsierunt, qui arterias (p), venasve amplectuntur, & qui possint aut adstricti sanguinem per venas in parte aliqua retinere, pudoris (q) exemplo, & erectionis venereæ, aut adstricta vicissim arteria sanguinem a parte aliqua avertere (r), exemplo mictionis in cane impeditæ (s); & denique eum sanguinem, argumento palloris in nonnullis adfectibus suborti, ad cor repellere (t); aut vicissim laxati viam facere urinæ, & liquori intestinali; aut vehementer absque alterna remissione adstricti sanguinem per arterias in partes aliquas uberius colligere (u).

Sed contra eos laqueos varia a Cl. viris (x) edita fuerunt, & ipse totam hypothesein olim antiquavi.

Res adeo non facilis est. Per nervos ea potentia utique exercetur, qui soli animæ inserviant; & eo exemplo ostenditur, esse eorum in vitalia organa aliquam potestatem: ut in cor, intestina, ventriculum, sphincteres minimos cutis, villorum intestinalium: esse etiam in singulas particulas (y) reliquis parum mutatis, ut in erectione venerea, in vomitu ex visa re turpi: esse adeo in adfectibus animi nervis potestatem aliquam, quæ in voluntate nulla est. Potissimum tamen adfectus in corde (z) operantur, pulsumque mutant, & fere ad duas classes possunt reduci,

E e e e 3

quorum

(n) *De cerebro* p. 170. ed. 8. tum VALISNERI *de chamaleonte* p. 394. STAHL *de obstruct. vas. sang.* n. 35. iste per plexus fibrosos.

(o) p. 182.

(p) VIEUSSENIUS p. 193.

(q) IDEM *neurolog.* p. 182.

(r) Add. *Id.* p. 193.

(s) IDEM *neurolog.* p. 200. Ex terrore SCHAAERSCHMIDT *Berlin. relat.* T. V. p. 262. 263.

(t) SCHREIBER *de fetu* n. 51.

(u) VIEUSSENS *l. c.* p. 193.

(x) De pudore WHYTT *vital. mot.* p. 102. In universum BAKER *anim. adfect.* p. 18. 19.

(y) NUGENT *hydrophob.* p. 61.

(z) CHEYNE *sanit. tuend.* p. 178.



quorum alii motum sanguinis debilitant, alii intendunt. Ad illos moeror, & fere metus: ad istos ira, gaudium, amor, & terror pertinent.

Aliquid autem in minimis vasis esse, quod laqueorum nerveorum similitudinem certe in effectu habeat, adparet ex suppresso sanguinis venosi motu in pene, analogo effectui vinculorum, & ex tuberculis cutaneis, quæ perinde a terrore, ut ex frigore nascuntur.

In ventriculo & intestinis, inque corde vim nervosam, quæ musculos regit, incitari posse, aut minui, intelligimus. Non ideo a ventriculo (a) affectus animi prodeunt.

### §. VIII. *Lingua affectuum.*

DEUS, societatis omnis auctor, voluit, ut affectus animi in ipsa voce, in gestu, in vultu potissimum se efferrent, adeoque homo homini lingua infallibili, & ab omnibus intellecta, amorem suum, & iram, & reliquos animi affectus proderet. Sed neque brutis animalibus ejusmodi lingua negata est, qua amorem venereum, amicitiam socialem, pietatem maternam, iras, gaudium, dolorem, metum, præcipuos omnino affectus exprimerent. Hæc lingua (b) omnibus quadrupedibus, & avibus communis est, ut omnino & se invicem intelligant, & hominem, & ab homine intelligantur. Iras enim hominis canis adprime ex facie legit, exque voce colligit: iras tauri homo ex mugitu adgnoscat, leonis rugitum omnia quadrupeda horrent,

De sonis quidem brevis ero, quos tamen certum est in omni affectu singulares edi. Sed in vultu potissimum characteres affectuum fedent, adeo faciles lectu, ut pictores omnes animi motus solo vultu, & a latere spectato, adprime exprimant. Elegans est speculatio, cujus primas lineas describemus.

Amor, admiratio, adgnoscentur fronte sursum ducta, exporrecta, oculis elevatis, unaque palpebris. Occipitalis & rectus superior oculi agit, & palpebræ levator (c). Curiositas, admiratio dicentis oratoris, os una aperit, ut aer sonorus ad tubam posset venire (c\*).

Lætitia

(a) WOODWARD *cases* p. 31. 33. 34. 35. 242. 288.

(b) Conf. CORDEMOI *de loquel.* p. 16 NICOLAI &c.

(c) Add. PARSONS *on physiognom.* p. 53.

(c\*) IDEM p. 54.



Lætitia & risus (d) oculos habent pene clausos, angulum oris sursum ductum, cutem narium corrugatam, os distractum per buccinatorios & risorios musculos. In multis hominibus fovea tunc in gena nascitur, & gratiam addit, inter, puto, tumentes fasciculos zygomaticos.

In fletu (e), & tristi adfectu, labium inferius detrahitur, ut facies longior videatur; anguli labiorum distrahuntur a triangularibus; oculus clauditur, & pupilla se sub palpebram superiorem recipit.

In ira & odio labium inferius super superius elevatur; frons descendit adtracta, & rugis caperatur.

Contentus inæqualem habet vultum, ut alter oculus pene claudatur, alter despiciat (e\*).

In terrore muscoli validissime os & oculos aperiunt, manusque elevantur (f).

### §. IX. *Hinc nascitur physionomia.*

Recte perspectum est non dudum, plerosque quidem dominantes adfectus in vultu inspecto legi, ut lætum hominem & jocosum: tristem & severum: superbum: mitem & benignum: invidum: innocentem & pudicum, humilem, uno verbo fere omnes etiam compositos adfectus, aut suborta vitia, indeque natas virtutes manifestis in vultu & universo corpore signis se prodentes distinguas. Id fit, quia muscoli (g), qui sunt adfectus alicujus characteristici, in eo homine, in quo is adfectus dominatur, frequentius agunt, ut necesse est frequentius contrahi iræ musculos in homine irato. Ita fit denique repetito usu, ut ii muscoli invalescant, & reliquis in eo temperamento otiantibus potentius se efferant, ideoque etiam, postquam adfectus animi se remisit, tamen aliqua pars characteris regnantis adfectus in facie supersit.

Eo fere referas, quæ LANCISIUS pro *chiromantia* dixit, ut plicæ magnæ in manu robur, bonamque valetudinem fetus, hominisque, parvæ, aut nullæ, debilitatem indicarent.

Non

(d) PARSONS *ibid.* p. 72.

(e) *Idem* p. 77.

(e\*) *Conf. Idem* p. 64.

(f) *Idem* p. 60.

(g) ZAMBECCARI apud CORTE p. 222. *Letres sur les physionomies* p. 188. ANDRÉ *orthoped.* T. II. p. 30.



Non ergo necesse est ad structricem animam recurrere (*b*), quæ dum corpus suum format, faciat utcumque sui simile, brutam faciem fictura, si stolidam.

§. X. *Adfectuum excitatio.*

Est in homine nata non dubie ex idearum adfociatione ad imitationes facilitas. Unius oscitatio, uti notissimum est, ciet ad eundem motum totam sociorum catervam. Homines, potissimum juniores & teneriores, plorantes dum vident, plorant & ipsi (*i*). Ex sola recensitione horridi objecti convulsio (*k*), & deliquium animi, mortemque vidit SENACUS (*l*). Etiam magis ex visis ipsis convulsionibus simile malum (*l*\*), & ex epilepsia (*l*\*\*).

Hoc fundamentum est excitandorum adfectuum per lectionem, per musicam, per ipsos gestus; nam QUINTILIANUS vidit histriones, cum tristes historias agerent, plorantes de scena decessisse. Tragicus actor in scena expiravit (*m*).

Ita fit, ut musicæ in excitandis & moderandis adfectibus magna sit potestas. Eos revocat, quorum characterem voce aut instrumento repræsentat (*n*).

S E C T I O III.

S O M N U S.

§. I.

**H**Actenus vigilias descripsimus, eum certe hominis statum, in quo mutationes in sensoriis organis per corpora nobis circumposita factæ, menti nostræ repræsentantur, aque ea apprehenduntur. Sed is quidem

(*b*) STAHL *de animi morb.*

(*i*) BOERHAAVE *morb. nerv.* T. II. p. 512.

(*k*) KLOEKHOF *morb. anim.* p. 55. ex imaginatione.

(*l*) T. II. p. 464. Sanguis in vasa cordis congestus.

(*l*\*) RIVIN. *imagin. vir. med.*

(*l*\*\*) HILD. L. III. *obs.* 8.

(*m*) KLOEKHOF *morb. anim.* p. 55. KAUW *impet. fac.* n. 406.

(*n*) L. XV. p. 304. 305.



dem status non multum supra dimidiam partem vitæ humanæ tenet; altera portio somni est. Dormit, ut videtur, fetus (o): dormit in ovo pullus (p): pueri præmaturo partu editi dormiunt pene perpetuo. Plurimum dormiunt infantes; plurimum senes decrepiti. ILL. Mathematicus A. le MOIVRE (q) eo rediit, ut ex 24. horis quatuor solas horas vigiles transigeret. Media ætate tertia, & plus tertia parte, diei dormitur. Bruta animalia pleraque, quæ noctu prædam non quærunt, tantumdem dormiunt, quantum vigilant: tenebras nempe totas dant somno, vigiliæ id tempus, quo sol supra horizontem est. Aliqua animalia etiam supra eam portionem in hibernaculis suis dormiunt. Dormit per brumam mus montanus, & ægre excitatus continuo obdormiscit (r); dormit zibelinum animal (s), & forex (t), musque carpathicus (u), & glis (x), & vespertilio (y), & erinaceus (y\*), & melis (z). Ursi 40. fere diebus latent (z\*), & in Suecia a medio Novembri ad medium Aprillem (a). In Grönlandia cum sole 3. Nov. evanuerunt, & redierunt cum sole (a\*). Sed etiam insecta (b) plurimum dormiunt, si

ex

(o) SUPPRIAN p. 26.

(p) Hamb. Magaz. T. VI. p. 3.

(q) Hist. de l'Acad. 1754. natus annos 83. Celebris ille 150. annorum senex Thomas PARRE plurimam suæ vitæ partem dormivit L. Magaz. 1753. p. 601.

(r) Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 4. obs. 122. Journ. helv. 1743. p. 553. HARDEE apiar. obs. 22. CITOIS absur. consolentan. p. 75. GESNER Quadr. p. 842. add. BUFFON T. VIII. p. 224.

(s) STRAHLEMBERG in Sibiria descriptione.

(t) AGRICOLA anim. subterr. p. 34.

(u) BRL. in hist. Ungar.

(x) BORRICH diff. VII. p. 309. MERSENN. in genes. p. 625. NOLLET leçons de phys. T. I. p. 92. FANTON. diff. anat. ed. nov. p. 41. RE'AUMUR Mém. pour servir à l'histoire des insect. T. II. p. 29. Glis verus BUFFON T. VIII. p. 159. 161. 162. Glis minor IDEM ibid p. 182.

(y) BRUKMANN Cent. Ep. II. p. 161. LEEUWENHOECK epist. 67. BUFF. T. VIII. p. 117.

(y\*) BUFFON T. VIII. p. 31.

(z) IDEM Hist. natur. T. VII. p. 106. non tamen per totam hiemem.

(z\*) AGRICOLA anim. subterr. p. 411. LEHMANN Bergm. Chron. p. 540.

(a) FIELSTROEM lapperues blörnfsange. De anim. latent. L. III. c. 14. 15. 17. Tota hieme PONTOPPIDAN natur. hist. T. II. p. 32. etsi alii aliter narrant, dicuntque contra invadentes pugnare: add. BUFFON T. IV. p. 254.

(a\*) Trois voy. au Nord. p. 127. LINSCHOTEN Voy. II. p. 23. In Barenfii tamen historia pene tota hieme, & certe 22. Jan. præsto fuerunt.

(b) Insecta varia hieme immota degunt SWAMMERDAM bibl. p. 600. 864. Astaci Bresl. Saml. 1722. m. Sept. Etiam in æstuosa illa Æthiopia concha Kamboul hiemem sopita degit, & operculo se obducit ADAMSON Senegal p. 18. Quo ostenditur, tamen etiam absque frigoris vi nonnullis animalibus somnum deberi.



ex sensus motusque voluntarii suspensione colligas dormire. Dormiunt erucæ, aliquoties (c) antequam cutem mutant: & chrysalidis (d) vita somnus est. Pisces etiam dormire creduntur (e), nuperis etiam experimentis (f), aliqui etiam profunde (g), ut subito territi fugiant (h). Aliquando tamen septem diebus continuis piscis velocem navem persecutus est (i). Ranae in frigore sopiuntur, vivuntque absque cibo & motu (k), non ita in calore (l). Tinea se in lutum demergunt (m). De hirundinibus idem dictum est (n). Denique si placet accurate calculum inire, dormiit per longissima forte tempora germen humanum, quoad fecundatum expurgiscat.

Communes ergo omnibus animalibus vices esse videntur, ut partem vitæ suæ inertia, per soporem transigant. Iniqua tamen portione ea necessitas distribuitur. Nam equus vix tribus quatuorve horis dormit, & dantur (o), qui nunquam decumbunt (p).

## §. II. Somnolentia.

Maxime naturalis est somnus, qui homini post toleratos diurnos labores, & coenam frugalem blandissimus obrepit. Non est adeo facile observare ejus atria, cum observator ipse una sopiatur, sæpe tamen animum in me ipsum adtendi. Et primum vesperi multo motu, per causas accessorias nato, sanguis vehementius incitatus, febriculam quasi ciēt (q), muscoli vero lassi dolent, & potissimum longi quicunque languent.

(c) Ter MALPIGHI *de bombyce* p. 3. §. 1.

(d) RE'AUMUR *Histoire des insectes* T. II. Mém. I.

(e) ARISTOTELES *Hist. anim.* L. IV. c. 10. OPPIAN L. IV. HALLE *von Thieren* p. 176. De thynnīs & delphinīs PLINIUS L. X. c. 75. BELLON *obs.* p. 159.

(f) RICHTER p. 308.

(g) Acipenser.

(h) HALLE l. c.

(i) OVERTON *voy. to Surat* I. p. 45.

(k) Oecon. *Nachrichten*. T. VI. p. 335.

(l) *Hist. nat. des anim.* II. p. 2. 137. Sic neque marmota RE'AUMUR l. c. T. II. Mém. 2. p. 29. Et in universum animalia eo magis sopiuntur, quo polo propiora sunt, eo minus, quo calidior est regio BERGEN *de anim. hiem. sopit.* p. 18.

(m) PECHLIN *aer. & alim. defect.* p. 54. BORRICH p. 320.

(n) L. IV. p. 417. L. VIII. p. 266.

(o) HALLE *Geschichte der Thiere* p. 232. BUFFON *Hist. natur.* T. IV. p. 253.

(p) BUFFON *ibid.* Stantes dormiunt BATHURIST *praedict.* p. 165.

(q) p. 598.



guent. Deinde stupor est aliquis, satis ingratus, circa genua. Oscitationum subinde necessitas intercedit, pulsusque tardior fit (*r*), & debiliior, & in pueris intermittit (*s*). Deinde capitis functiones labascunt, curiositas interit, & cura, & ad somnes cogitationes aptitudo, & quietis in animo & corpore amor obrepit. Omnium sensuum externorum impressiones elanguescunt, neque oculi bene vident leguntve, neque sensationes a memoria cum aliquo aut robore, aut ordine repræsentantur. Percipitur vero blanda quædam ad somnum necessitas, cum ardore aliquo in palpebrarum conjunctiva, non longe ab angulo majori, & una difficilior oculi aperti tenentur (*t*), & clauduntur injussi, ut pupilla sursum ducta lateat (*u*). Una caput antrorsum labascit, & subinde nutat, atque maxilla hiat, & universum corpus laberetur, si staret pertinax. Diu tamen excubat vigil auditus (*x*), & voces vicinorum hominum exaudiuntur, & intelliguntur, fracta jam oculorum vi. Et nunc ideæ dissolvuntur, speciesque obversatur animo delirii, in quo sensationes internæ, a memoria redditæ, fortiores fiunt, ut denique ipsæ in cerebro adservatæ imagines ante oculos versentur, quo signo soleo agnoscere, me proxime dormitutum; ultra enim observare non datur.

### §. III. Somnus.

Ut pleni somni phænomena discamus, alios oportet observare homines. In eo statu corpus quidem eo minus movetur, quo perfectior somnus (*y*) est; stimuli sensuum, soni, titillationes, non (*z*) percipiuntur (*a*), nisi validiores fuerint (*b*); etiam interni stimuli debilitantur, ut sitis (*b\**),

F f f f 2

ut

(*r*) TRALLES *de opio* p. 250. STRUTHIUS *ars spbygmie* p. 200. STENZEL *περί ύπνου*. Conf. GORTER *Exerc. de somn. vigil. tot.* PUSCHER *de perisigil.*

(*s*) BAGLIV. *prax.* L. I. p. 73.

(*t*) Primi quiescunt musculi minimi SUPPRIAN p. 41. ut levator palpebræ.

(*u*) PARSONS p. 16.

(*x*) Eum statum a somno distinguit nomine *Schlummer* Cl. MEYER *Nachtwandler*.

(*y*) Est status absque sensationibus SUPPRIAN p. 39.

(*z*) YOUNG *opium* p. 25.

(*a*) Noctu a decubitu non dolemus RAI *wisdom* &c. p. 236.

(*b*) Mus montanus excitatur aqua ebulliente *Journ. helv.* l. c. Glis non rediit ad se, quoad eum incisor nunc dissecaret MERSENN. l. c. Ursus ne vulnere quidem excitatur PLINIUS L. VIII. c. 36. In homine similia difficillimæ excitationis exempla sunt ap. SCHURIG *chylol.* c. 4. FICHET. *Obs. of a societ. at Lond.* n. 22. Neque spiritu falis ammoniaci, neque helleboro discussus somnus *Phil. trans.* n. 304.

(*b\**) Sæpe expertus sum sitim dormiendo superari. Sitis ab aqua marina sedatur, si superdormias LEWIS *mat. med.* p. 77.



ut tussis, quarum utramque somnus placat, ni fuerit nimia: & lotii res-  
tenti sensus minor est, & ipse motus peristalticus ventriculi atque inte-  
stinorum debilitatur, ut omnino longissimo tempore (c) fames non per-  
cipiatur, quamdiu somnus superest, totisque hiemibus; & in homine  
æque (d) facile 15. horæ a coena ad prandium tolerantur, ac 7. horæ  
a prandio ad coenam. Sed etiam fæces alvi promoventur absque sensu,  
& colliguntur, in sano homine intra primam horam ab evigilatione in-  
tolerabiles futuræ, etiam si matutinus lectum reliquerit. Hinc pilulæ pur-  
gantes altero die demum operantur (e). Semel intra 42. dies minxit,  
nunquam egeffit homo, qui ad 70. dies dormiebat (f).

De cordis motu omnino quæritur, cum Cl. viri abierint in oppositas  
sententias. Olim HIPPOCRATES (g) scripserat, interiora in somno  
calidiora esse. Deinde SANCTORIUS (h), somno animales vires lan-  
guescere, vigilia vitales & animales. Addunt nuperi, pulsum in dormiente  
frequentiorum esse, & a 70. & 80. ad 80. & 96. (i), & a 70. 86. ad  
80. 96. in eodem tempore (k) increbescere; pulsum etiam majorem  
esse, & respirationem manifesto fortiorum (l), ut eo signo dormientem  
hominem adgnoscas. Etiam ciborum digestionem (m) in somno melio-  
rem esse; & perspirationem ad duplum (n) augeri; & sudorem (o),  
& vulnera calidiora (p) esse, & tumere, & manifesto pueros blande  
dormi-

(c) Ursi diu absque cibo vivunt dum latent BUFF. T. IV. p. 254. quatuordecim diebus *de anim.*  
*latent.* sex septemve mensibus HILLERSTROEM *Jämtlands diursfa'ng* p. 15. CHARLEVOIX *Histoire*  
*de la nouv. France* III. p. 117. Pilis resinæ & foliorum abjetis autumnis devoratis, absque  
cibo durant, pilulasque vere demum rejiciunt FIELLSTROEM *lappernas diursfa'ng*. Sic glires nihil  
edunt FANTON l. c. p. 41. neque ranæ OECON. NACHR. l. c. neque vespertilio, melis,  
talpa, erinaceus LINN *faun.* p. 8. Vix quidquam edebat in somno 27. septimanarum BA-  
CKERUS ille *Stolwyck slaapsiekte.* Journ. des savans 1707. m April.

(d) GORTER Exerc. II. p. 23. Tr. des maladies de l'estomac. p. 196.

(e) Ess. of a societ. phys. and liter. at Edimb. T. I. p. 440.

(f) Phil. transact. n. 304.

(g) Epidem. VI. n. 4. 5. & MARTINE *anim. simil.* p. 257.

(h) Sect. IV. n. 47. 48. & AVICENNA l. c. MAJOW oper. p. 335.

(i) MORGAN. *princip.* p. 193. 399.

(k) BROWN & LANGRISH *med. pract.* p. 273.

(l) SENAC du cœur II. p. 219. STRUTHIUS l. c. TRALLES p. 250. de somno  
profundo.

(m) HARTLEY p. 55. seqq. C. HOFFMANN *instit.* L. V. c. 28.

(n) Sect. IV. n. 2 & ad 40. Sect. III. n. 1. ut quinquaginta uncia in nocte diffarentur,  
S. IV. n. 1. 42. 56. III. n. 69. denique ad libram unam in unica hora, Conf. Sect. IV. n. 7.  
29. 31. 37. 54. V. n. 21. VI. n. 6. Augeri etiam quarta parte DODARTUS p. 235.

(o) AVICENNA L. I. *Fen.* II. d. 2. c. 13.

(p) YOUNG *opium* p. 142.



dormientes rosarum ad modum genis rubere, & de blande madida cute uberrime exhalare. In febribus etiam, quod ipse sæpe vidi, somno incallescere ægros, & expergiscentes deterius habere.

Contra alii, & olim GALENUS (q), & potissimum Vir ILL. *Johannes* de GORTER (r) in somno cordis vires minores esse, pulsum lentiores (s) & infrequentiores, perspirationem minorem (t), etiam in ratione 2. ad 3. aut 2. ad 4. (u), respirationem rariorem (x), reditum sanguinis venosi difficiliorem (y), & hominem dormientem frigere, quoties non magis, quam in vigilia, tegitur, quod ipse sum expertus (z).

Sed etiam sanguinem de vena dormienti ægre fluere (a), vulnera & ulcera non dolere (b), & pus fundere melius (c), nempe crassius. Hinc humores tenuiores per somnum fere stagnare (d), secretionem fieri parcas (e), & pinguedinem colligi, atque ipsa animalia somno saginari (f). Esseque id tempus resorptionis, ut diarrhoea ex tenui crassescat (g): & noxia paludum (h) effluvia plus habeant periculi.

F f f f 3

Ut

(q) Pulsus in somno parvi, languidi, rari *caus. puls.* III. c. 9. 10.

(r) *Exerc. II. de somno & vigil. tot. de perspir.* Ed. II. n. 354. 355. 356. PUSCHEL de pervigil. LUDWIG in thesib. *Ess. phys. and litt. of a societ. at Edimb.* p. 436. seqq.

(s) SCHWENKE *hamatol.* p. 56. GORTER *Exerc. II.* n. 14. BOERHAAVE *prælect.* T. IV. p. 505. STENZEL p. 65. & pulsus 60. & 50. in morbo *Stolwicensi Journ des Sav.* 1707. *Avr. Journ. de Trév.* 1707. Avril. Nullus in somno grav. *Ess. of a Societ. at Lond.* l. n. 8. In somno pulsus minui B. de MOOR *institut. med.* p. 355.

(t) KEIL p. 174. 175. GORTER de perspir. n. 307. ut hieme 16. uncias non superet, æstate 14. In *Stolwicensi morbo cutis sicca Journ. des Sav.* l. c.

(u) Uncias in hora vigil tres, & cum motu corporis quatuor transpirat; dormiens duas GORTER n. 312. 313. *Exerc. II* p. 28.

(x) IDEM *Exerc. II.* p. 28. 30.

(y) Hinc intumescunt crura sub vinculis RAVESTEYN p. 189. Inde plethora YOUNG l. c.

(z) GORTER de perspir. n. 356. Hinc pluribus vestibis per somnum egemus SANTA NELLI *Galer. di minerv.* P. I. p. 196.

(a) Non fluere ARISTOTELES *hist. anim.* L. III. c. 19.

(b) RAI *Wisdom &c.* p. 237.

(c) BERENGAR. *CARP. fract. cran.* c. XIX.

(d) YOUNG l. c. p. 25

(e) LUDWIG *physiol.* n. 540. MORGAN. *principi.* 189. 190. LAMURE *Secrets* p. 41. Nullas BORDEU *Recherch. sur les gland.* p. 355. Id nimium.

(f) PECHLIN *aer. & alim. defect.* c. 5. Ursus HILBERSTROEM l. c. PLINIUS l. c. ÆLIAN L. VI. c. 3. Si diu tamen absque cibo fuerint, emoriuntur marmotæ BUFFON T. VIII. p. 224.

(g) MORGAN. p. 191.

(h) LANCIS. *palud. nox.* L. I. P. I. c. 20. TARGIONI TOZZETTI in itineribus



Ut his me expedirem dubiis, undique circumspexi. Videtur omnino in vigiliis plurimum esse causarum, sanguinis motum accelerantium, quæ absunt a somno. In somno solum cor est; in vigiliis (i) idem cor, & muscoli, & sensus, qui certe nos emonent, & nonnunquam efficaciter, & studium, & animi affectus. Non ergo videtur ullo modo fieri posse, ut cum minoribus causis cordis motus in somno major sit. Quare pulsus vespertino tempore frequentior (k) per somnum paulatim minuitur, ut matutinis horis omnium sit rarissimus (l). Vivitur sub eo cælo, in quo mercurius thermometri ad 120. & ultra gradus Fahrenheitianos infra eum descendit, ad quem aqua congelatur, ut in celebri illa per sævissimam brumam civitate Jeniseisk. Contra peribit, & certissime peribit, qui dormiet in aere 20. gradibus frigidior, quam frigus est, a quo aquam congelavit. Quare constat somnum in frigus tendere, & hominem, qui aerem frigidum (m) facile fert exercitatus, perire si in eodem aere dormiverit, coacto sanguine & congelato (n), quem motus vigiliarum retinuisset fluidum. Hinc animalia in hibernaculis dormientia pulsu esse vix ullo (o), & perfecte frigescere (p). Sed cum cordis motu respirationem fere pari ambulare passu. Ipsum motum intestinorum in vigiliis suscitari cibo, potu, motu musculorum abdominis, labore animæ (p\*): in somno nihil esse causæ, quæ excitet. Certa hinc esse signa lentioris motus peristaltici. Et comparato cane somnoloso dominæ, cum ejus fratre venatore, pinguitudinem a somno natam esse manifestam. Diuturnum etiam somnum adeo sanguinis motum non incitare, ut perspiratio minuatur (r), totum corpus frigeat (s), humores stagnantes inspissentur (t), & nova somni causa nascatur ex somno, etiam

(i) BELLINUS *miss. sang. prop.* 46.

(k) L. VI. p. 263.

(l) Ibidem.

(m) L. VI. p. 295. Dormientem frigus magis lædit SANCTOR. *Seç.* IV. n. 52.

(n) L. V. p. 17. *Comm. Lit. Nor.* 1736. *bebd.* 22. Cogitur 25. gradu MARTINE *essays* p. 351.

(o) *Berigt van de stotwyke slaapzickte.* Nullo cordis motu HARVEI gener. p. 150.

(p) NOLLER *Legons* T. I. p. 32. de gliribus. Hinc ajunt frigido esse sanguine erinaceum BUFFON T. VIII. p. 31. *Glirem le loir* IDEM *ibid.* p. 559.

(p\*) Omnes sensationes augent cerebri actionem *Idée de l'homme physique* p. 222. *Sudatur* in difficili problemate, aut versu.

(r) SANCTOR. *Seç.* V. de exerc. & quiete n. XI. *Seç.* IV. n. 50. *Stotwyke slaapzickte.*

(s) *De somno & vigil.* n. 50.

(t) V. de GORTER de perspir. n. 357.



etiam sano in homine, quæ in lethargum fere abit (*u*), & in catalepsi (*x*), & in fatuitatem (*y*): omnemque fere sensum destruit (*z*). Hæc omnia faciunt, ut a somno omnes in machina animali motus minores fieri persuadeat.

Quem adeo majorem calorem, pulsum, anhelitum in somno subinde videas (*a*), eum tribuo potissimum stragulis, & atmosphæræ circa cutem collectæ, quæ laxet vasa cutis, & in ea sanguinem invitet, maxime sub finem somni (*b*); partim coenæ nonnunquam uberiori, difficili, quæ magna mihi æstus & sudoris causa esse solet, & quæ eadem illas nimis abundantes perspirationis mensuras SANCTORIANAS fecit (*c*). Sed etiam decubitus ad respirationem incommodus est, quod æque alta viscera abdominis diaphragmati magis resistant. Insomnia (*d*) denique, quæ sunt cum animi adfectu, possunt in vehementem æstum nos ciere, inque sudorem, eo magis, quod insomniorum in mutando corpore majores, quam in vigiliis ipsarum sensationum vires sint, quod alias ostendetur.

§. IV. *Somni causa.*

Ex naturæ lege labor vigiliarum somnum invocat & producit, estque somni necessitas fere in ratione laboris diurni. Hinc fugit desidum magnatum palatia, & agricolarum mapalia habitat rerum dulcissimus. Hinc pueris perpetuo agilibus blandus & facilis. Hinc adeo insuperabilis est somni necessitas, ut hæc inter principes causas fuerit, quare castellum S. Philippi somno carens fortissimus Anglorum miles non potuerit ultra tueri (*d\**), cum vix arma sustinerent, & milites inter tormentorum (*e*) militarium

(*u*) GRÖBEN *Oriental Reisebeschreib.* p. 48. in se ipso.

(*x*) *Histoire de l'Acad.* 1713.

(*y*) BOERHAAVE *Prælect.* T. IV. p. 513. FICHET p. 200.

(*z*) Vesicatoriis non excitabatur FICHET ibid. neque a spiritu salis, neque ab helioleboro *Phil. transf.* n. 204. Neque ab ullo dolore, & a laceratione *Obs of a Societ. at Lond.* n. 22. Ita FRITSCH *selts Händ.* T. II. p. 597. SCHURIG *chylog.* c. 4.

(*a*) AVICENNA pulsum facit in somni principio debilem, parvum, tardum; uti digestio viget fortiolem; diutius protracto somno debilem, non certe imperite l. c. c. 12.

(*b*) Ultimis horis plus perspiratur GORTER *Exerc.* II. p. 32.

(*c*) IDEM *de perspirat.* n. 338. Jejunus vix 18. uncias perspirat SANCTOR. S. III. n. 420. Primis quinque horis a coena vix selibra, tribus sequentibus libræ duæ cum dimidia perspirant S. IV. n. 29. Quatuor horis a cibo dormientibus uberior perspiratio DODART p. 235.

(*d*) In iis plus perspirat GORTER *de perspirat. aphor.* 333. *Exercic.* II. p. 9.

(*d\**) *Lond. Magaz.* 1757. p. 441.

(*e*) BOERHAAVE *morb. nerv.* p. 644.



rium fragores discant dormire, & miseri, quos a somno sui magistri arce-  
bant (f), post longum somni desiderium media inter verbera obdormi-  
scent. Post triduanas choreas somnus quatuor dierum (g). Puella  
amissa, & septimo die inventa, toto eo tempore dormierat, puto ex  
delassatione (h). A vigiliis lethargus (i). Ad summam virium exhau-  
stionem forte pertinet somnus a tortura (k), fere funestus (l).

Altera causa, minus aliquantum potens, sed per omnia tamen anima-  
lium (m) *Secula* perpetua est: & ipse polypus bene pastus languet,  
quoad ventriculus prædam subegerit, & pelliculam inanem de ore  
ejecerit (n).

Nuperi Cl. viri hanc a coena necessitatem tribuerunt pressæ a distento  
ventriculo aortæ (o), aut certe ejus arturiæ ramis (o\*), a qua sanguis ab  
inferioribus averfus caput petat, & aucta pressione somnum faciat, inque  
incubum res ingravescat, quando cibi coctu duriores ventriculum præ-  
gravant.

Dudum mihi hæc interpretatio (p) suspecta fuit. Nam parum vi-  
debatur cum sapientia NATURÆ consentire, si tunc, quando secre-  
tiones in abdomine majores requiruntur, sanguis ab abdomine averteretur.  
Eget certe coquens cibos ventriculus, egent intestina uberiori secretionem  
liquidi gastrici, intestinalis, pancreatici & bilis.

Deinde in multis animalibus somnus fit a pastu, in quibus non est ea  
natura fabricæ, ut aorta vel comprimatur valde, vel etiam ut ejus com-  
pressio somnum faciat. Serpentes (q) a pastu dormiunt, quibus ventri-  
culus cutem facillime distendit, & in eam protuberat. Polypo nulla est  
aorta, neque insectis plurimis.

Sed

(f) FRIKE *Ostind. Reisebes.* p. 99.

(g) SCHNEIDER *de catarrh.* III. p. 475. SALEMUTH III. n. 66.

(h) *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 8. obs. 68.

(i) AMAT *Cent. I. Cur.* 9.

(k) LABAT *Voy. d'Ital.* T. VII. p. 5. SCLANOVIVS ad HORST. *Ep.* p. 415.

(l) LABAT l. c.

(m) LISTER *humor.* p. 145.

(n) BAKER *polyp.* p. 107. 108.

(o) MORGANUS *principl.* I. p. 159. BOND. *nigibmare* p. 51. 53. cum in vivo  
omnia plena sint. *Journ. de Trév.* 1729. p. 1821. Add. GODART *de l'ame* p. 319.

(o\*) MORGAGNI *sed. & caus. morb.* T. I. p. 251.

(p) *Comment. in Pralect.* T. IV. p. 515.

(q) Caudifonus serpens devorato sciuro dormit KAL'M *Reise* T. II. p. 228. Sic serpens  
maximus conganus LABAT *Ethiop. occid.* p. 200. FIGAFETTA *relaz. di Congo.*



Sed denique in homine quidem stante, aut sedente exigua est, quam possit in aortam exercere ventriculi pressio. Nam in homine ventriculus manifesto situm mutat, & arcu suo majori versus peritonæum eminet, ut a spina dorsi longissime recedat, & aortam ( *r* ) solis suis duobus ostiis contineat, in quibus cibus non retinetur. Ita certe recte, ut nunc video jam *Philippus* HECQUET ( *s* ), & A. STUART ( *t* ).

Morbofus etiam somnus foret, quem eo gradu pressa aorta faceret, quo sopiat. Nunc suavis est, qui coenæ salubri supervenit ( *u* ). Quare neque diaphragmatis ( *x* ) utique aliquantum impeditum motum huc revocaverim, qui & ipse potius anxietatem fecerit, quæ post impedimenta, itineri sanguinis per pulmones libero obsistentia, indivisa sequitur.

Sed neque in naturali somno particulas cibi sanguinis motui adversas ( *y* ) accusaverim, quæ soporem facere possint, absint autem a coena frugali.

An voluptatem, & stimuli quietem ( *z* ) accuses; an cerebri libertatem a sanguine in abdomen decumbente, qualis est a pediluviiis. Cum nempe a pastu plus sanguinis in abdomine sit, & ad secretionem uberiores ( *a* ) eo tendat, avertitur adeo a cerebro sanguis.

Tertiam causam naturalem somni STAHLIANA schola nobis suppeditat, nempe voluntatem ( *b* ). Animam nempe laborum, & sensationum frigidiorum impatiente & pertæsa, sponte sua sensus remittere, etiam utili consilio, ut vires recuperet, quas per labores amisimus.

Possis huc revocare summam in somno voluptatem, quam sentias, quoties eo indiges: somni necessitatem, quæ a malis carminibus, & a longis

( *r* ) Vide interim *Prim. lin. Physiolog.* n. 610.

( *s* ) Réponse à M. SYLVA p. 311.

( *t* ) *Phil. transact.* n. 427.

( *u* ) Ejus laudes vide apud HOFMANN *Instit.* p. 715. SANCTOR. *de somno* n. 28. GORTER *aphor.* 334. *Exerc.* I. p. 47.

( *x* ) BOND p. 51. 53. Conf. NICOLAI II. *Stück.* n. 57. qui inde ruborem deducit.

( *y* ) B. de MOOR *inst. med.* p. 86. STUART *Phil. transact.* n. 414.

( *z* ) MEAD *of poisons* p. 250.

( *a* ) GORTER *Exercit.* I. p. 42.

( *b* ) MORGAN *princip.* p. 345. QUESSNAY *Essay sur l'Occon. anim.* T. III. p. 271. JUNKER *Physiol. Conspect.* p. 487. TABOR p. 104. NENTZ *physiol.* p. 315. SAUVAGES *de somno.* NICHOLLS *anim. med.* p. 26.



longis narrationibus nobis obrepit; animalium & hominis ad somnum quærendum secessum in lectos, in lustra: Evigilationem ad certas & ad destinatas horas.

Et tamen hanc voluptatem, qui sæpe adtentus, a prandio per æstivos calores auscultavi, semper sensi, non esse arbitrii mei, & peregrinam, atque victricem mihi supervenire; nihilque homini potissimum senescenti est frequentius, quam somno velle resistere, & volendo eum arcere, quod experimentum tota æstate feci, cum inciperet mihi a prandio somnus imminere, neque ego vellem tantam partem diei inertiae dare. Superavi denique omnem eam necessitatem, ut post multos nunc annos eam non sentiam; & adeo non voluntarius somnus nobis advenit, ut voluntati contrarius nos opprimat: voluntas autem eam velit abesse, neque semper possit.

#### §. V. *Somni causæ adjuvantes aut minus perpetuæ.*

Multum ad somnum faciunt ea omnia, quæ sanguinis, & spirituum motum moderantur. Et in sensibili quidem systemate absentia omnis irritationis, soni fortioris, lucis, curarum & sollicitudinum, soni lenes aquarum labentium, blanda voluptas a modico per æstatem frigore, per hiemem calore, lectio rerum nullum in anima motum cientium.

In systemate motorio quies, decubitus, in quo paucissimi muscoli laborant, pediluvium, quod sanguinem in pedes eorumque dilatabiles apprime venas invitat, & a capite revellit. Perinde juvant seminum oleorum insipidorum emulsionem, quæ omnem in sanguine motum temperant: papaveris lac recens, nondum amarum; denique, quæ debilitant, ut purgatio (c) vehemens, prægressa febris, quæ vires exhaustit; sanguinis ex vulnere, vel ex vena incisa jactura (d).

Hæ causæ omnes, & imprimis etiam virium a febribus acutis exhaustio, atque sanguinis uberius amissio, blandissimum & exoptatissimum absque somniis somnum cient.

#### §. VI.

(c) A purgante in maniaco somnus SENAC *ess. de physique* p. 685. quod experimentum in juvene summo loco nato salubri eventu olim feci.

(d) A duabus libris sanguinis amissis mors per somnum BENIVEN. *abd. morb. caus.* Is erat exitus Romanorum, qui venas sibi secabant perituri.



§. VI. *A causis sanguinem in cerebrum congerentibus.*

Id in somni theoria difficultatem facit summam, quod a contrariis adeo causis idem invitatur. Ostendimus ut concilietur ab iis, quæ motum sanguinis & spirituum diminuunt, nunc aliæ contrariæ sequuntur.

Ambigit inter utrasque frigus, quæ princeps ( $d†$ ) causa est, cur animalia hieme sopiantur ( $d^*$ ), cum pleraque certe per hiemem pari in tempore si manserint, necessitatem somni non sentiant ( $d^{**}$ ). Id in universum utique motum sanguinis minuit, atque supprimit, quoties per plenam congelationem occidit. Potest autem frigus etiam insuperabilem somnum facere, alio modo. Manifesto humores omnes de cute ( $e$ ), & de extremis partibus repellit ad intimas, ut digiti insensiles, immobiles, imperspirabiles, denique albi fiant, & gangrænosi. Ita dum sanguis introrsum refugit, congeritur in cerebrum, cujus arteriæ sanguinem maximo impetu impulsam accipiant, venæ constrictæ minus bene revehant, & quo loco calor sit perpetuus, ut per ossa tegmina ab injuriis aeris tecto. Ingruit ergo suavissima ad somnum invitatio, cui si locum dederis, plenus somnus succedit, in quo, cum vires vitæ eo in statu minores sint, certo pereundum est ( $f$ ); coacto demum sanguine, quod nostrarum alpicolarum non infrequens fatum est, quando per avios calles immensa nive obrutos errant. Servari poterant, si excusso sopore, motu musculari calorem reparassent.

Ejusdem generis sopor est, qui fit a fune venæ jugulari circumjecto. Qui de laqueo fuerat servatus, is narravit se fuisse sopitum ( $g$ ), stupuisse ( $g^*$ ), & quæ ejusmodi voces sunt.

Idem etiam fatum est hominum nimis obesorum. Iis enim redivus sanguinis de capite difficilis est, ob venas ( $b$ ) a sanguine compressas. Somnolenti adeo fiunt, ut in Professore vidi, cui ea causa diu ante mor-

G g g g 2

tem

( $d†$ ) Conf. p. 593. not. b.

( $d^*$ ) Glis (*le loir*) BUFFON T. VIII. p. 559. Marmotta p. 224. vespertilio p. 117. erinaceus p. 31.

( $d^{**}$ ) Glis apud BUFFON T. VIII. p. 162. Marmotta p. 224. Rana Hist. natur. des animaux.

( $e$ ) Cutis venas constringit STAHL de motu tonico p. 28.

( $f$ ) WEPFER cicut. aquat. p. 44 apoplex. p. 391. BOYLE on frost append. p. 28. KLOEKHOFF frigus nervi inimicum p. 35. BORRHAVE Praelect. T. III. p. 523. 524.

( $g$ ) WEPFER apoplex. p. 174. Animo inde linqui ARISTOTELES somn. vigil.

( $g^*$ ) CÆSALP. quæst. med. p. 229. b. Add. SWIETEN II. p. 198.

( $b$ ) RÆDUS oper. vol. VII. p. 61.



tem perpetuos fecit sopores, & in alio haftenus sustuli, cum sapone dato & propinatis medicamentis purgantibus, obesitatem (i) imminuisssem. DIONYSIUS ille Heracleæ tyrannus, adeo somnolentus erat, ut acubus per adipem penetrantibus necesse foret eum excitare (k).

### §. VII. Phlogiston.

Varia sub specie hoc phlogiston (l) per aerem, perque omnia pene corpora nobis nota oberrat. Undecunque proveniet, certa ejus copia admissa soporem facit, sed gravem magis, & stupidum. Facit vapor ex carbonibus (m) exspirans; facit fluitans in aquis mineralibus (n) halitus. Vapor hepatis, sulfuris, dum calcinatur, inebriat (o).

In animalibus nonnullis simile est Venenum. Sopor a serpentis de viperæ classe morfu funestus (p) ingruit; & is effectus erat aspidis, quo CLEOPATRA ad effugiendum triumphum usa est. Ex aranei perfici *Enkurek* humore super cutem effuso sopor lethifer (q).

In vegetabilibus frequentius est id somnificum, & pleraque odora-menta, quando menaciora respirantur, eo inclinant. Etiam ex cistis caryophyllorum & maceris apertis (r) somnus bajulos invasit. Tres nautæ ab odore aromatum in nave belgica extincti (s) fuerunt. Eadem de croco fama est (t), & lego etiam vittis in crocum missis, quibus caput obnubitur, somnum accersi (u).

Idem odor vapor, quando de fermentante vino uberior exhalat, pariter inebriat, sopit, stupefacit, occidit; estque idem eventus, quando vinum nunc perfectum, eo ut vocant, alcohole fetum bibitur, aut ipsum

(i) Habet BOERHAAVE *Pralect.* T. IV. p. 527.

(k) ATHENÆUS L. XI. p. 272.

(l) HOFMANN *von Holz- und Steinkohlen.* CARTHUSER *mat. med. Sect. XI.* Eandem vult esse in mephitide, in opio vim &c.

(m) Ex fumo fornacis HILDAN. IV. *obs.* XI. Ex vapore foeni humidi & calentis *Cent. VI. obs.* 85.

(n) Pouchon *PRESSEUX* p. 13. Conf. BERGER p. 446.

(o) CARTHUSER.

(p) *Philos. transact.* n. 245. Aspis HASSELQUIST *resa* p. 546.

(q) OLEARIUS *ibid.* ex *ed.* WIQUEFORT p. 477.

(r) TRALLER *de vi & usu opii* p. 113.

(s) MERKLEIN *Ofind. Reise* p. 471. De aromatibus STRABO L. XVI.

(t) GEOPROI *mat. med.* T. II. p. 286.

(u) NEUMANN *oper. edit.* ZIMMERM. p. 250.



ipsum a vino separatum alcohol. Summa inde somnolentia ( $x$ ), & lethargus.

### §. VIII. *Narcotica.*

Hæc odora placent, quæ diximus. Fætida sunt, quæ sequuntur, & eadem minori dosi sumta, soporem faciunt. Omnibus etiam commune est, naturam sentientem minuere, dum somnum cient. Amara sunt pleraque, aliqua fatua. Eo ergo pertinet lactuca sylvestris opii odore ( $y$ ), cannabis ( $z$ ) anthelmintia ( $z^*$ ), & imprimis genus solanaceum: solanum ipsum ( $a$ ), belladonna, mandragora ( $b$ ) regionum calidiorum, etsi in frigidis minus noxia est, stramonium, & potentissimus hyoscyamus ( $c$ ).

Horum omnium sopor cum delirio & nimio motu spirituum miscetur.

Verum omiſſis reliquis liceat caput familiæ *opium* contemplari. Succus est papaveris hortensis albi nigrive, qui ex inciso capite, de cortice potissimum ( $c^*$ ), lacteus & dulcis fluit ( $d$ ), a sole vero coactus fuscus & gummi similis, vel extracti, amarus, calidus habetur. Æque ( $d^*$ ) perfectum opium mihi experimentum tentanti papaver in Germania dedit, ac quidem solet in Asia ( $e$ ), aut China.

G g g g 3

Extus

( $x$ ) WEPFER *de cicut.* p. 50. WEDDEL *opiol.* p. 37. FABER ad HERNANDEZ p. 254.

( $y$ ) LOBEL. *Advers.* p. 89. Dare æque bonum opium ac papaver *Ess. of a Societ. at Edimb.* T. V. p. 124.

( $z$ ) FLACOURT *madagasc.* p. 146. CHARDIN *Itin.* T. IV. p. 207. 208. HOOKER *exper.* p. 210. RUMPF *herbar. Aenboin* L. VIII. c. 34. *Bangue* ARVIEUX T. III. p. 21. 22. RUSSEL *alepo* p. 83.

( $z^*$ ) BROWNE *Jamaic.* p. 157.

( $a$ ) Vide *Enum. plant. helvet.* p. 508.

( $b$ ) In Judæa MYLLER *iter in Palest.* p. 214. Tigris a mandragora domita THOMASIIUS *de Mandragora.* Adfirmat in se ipso vim sopientem expertus LEVINUS LEMNIUS *plant. bibl.* Innocua fuit J. TERENCE & J. FABRO, qui poma integra absque malo devorant, ad HERNANDEZ *plant. mexic.* L. VIII. c. 28. p. 279.

( $c$ ) *Enum plant. helv.* p. 512.

( $c^*$ ) LEWIS *mat. med.* p. 419.

( $d$ ) In Persia CHARDIN *Voy.* T. IV. p. 31. Sed ibi papaver ad quadraginta pedum altitudinem excrescit. Multum Schirassi colitur THEVENOT T. IV. L. 3. c. 2. etiam in apulia AGRIC AMMON. p. 181. Eodem eventu etiam decoctio capitem sopit, quæ coquenar Persis dicitur CHARDIN l. c. p. 106.

( $d^*$ ) Etiam melius in anglia LEWIS. Fecit etiam experimentum TRALLER p. 6.

( $e$ ) Credit in Persia fortius esse CHARDIN.



Extus equidem nervis circumfusum nihil operatur (*f*): sed ore sum-  
tum, per clysterem (*g*) impulsum, cuti admotum (*h*), in nares intru-  
sum (*i*), in cellulofam telam injectum (*k*), vel in abdomen (*l*) perinde  
fopit; & sanguini denique infusum (*m*), & ipse haustus ore vapor (*n*). In  
ventriculum (*o*) receptum operatur vix diminuto suo pondere, ut in te-  
nero adeo elemento (*p*) vis fopiens habitet. Fumo etiam solo, ad  
nicotianæ morem similia facit illud *Bangue* (*p*<sup>\*</sup>).

Huic *succorum* principi duplex narcotica vis potentissima inest. Sen-  
tiens ergo principium potenter debilitat, fopit (*q*). Ita per experimenta  
mea & SPRÖGELII nostri didici. Opium facit, ut iris, amissa vi contra-  
ctili, radiantis candelæ proximum fulgorem immota ferat (*r*). Facit  
idem cæcitatem (*s*), colicam sanat (*s*<sup>\*</sup>). Etiam partibus de corde re-  
motis stuporem incutit.

Deinde

(*f*) FONTANA per novem experimenta *Mémoire sur les part. sens. & irritabl.* T. III. n. 30. CALDANI *refless.* XXXV. contra WHYTTIUM. Non bene adeo dentium do-  
lorem ait sopire PFAFF p. 98 nisi forte nervum amburit. Monet Cl. LORRY id falsum  
esse *Journ. de Médec.* 1756. & l. c. p. 72. In cancro dolorem auxit MURALT *Chir.*  
*Gesch.* p. 264. Agit acrimonia sua & dolorem facit TRALLES IV. p. 196. In ventri-  
culo foramen omnino fecit adsumtum FRITSCH T. IV.

(*g*) LORRY *Journ. de médec.* 1756. p. 77. 78. ad gr. 30. SMELLIE *cases* p. 298.  
WHYTT p. 297. 298. Periculi plenum esse ejusmodi clysterem TRALLES IV. p. 208.

(*h*) LORRY l. c. p. 74.

(*i*) TIMÆUS L. II. *cas.* 9.

(*k*) LORRY *Journ. Méd.* 1756. p. 78. 79. Si nempe 30. grana in cellulofam den-  
tur, fopiant.

(*l*) WHYTT *ess. of a Societ. at Edimb.* T. II. p. 299. 307. addit, potentius operari,  
quam in venas infusum.

(*m*) WHYTT l. c. p. 303. BERGER *de vi opii raref.* ALSTON *Ess. of a So-  
ciet. at Edimb.* ed. nov. II. p. 301. LOESKE *Arzneymitt.* ed. II. p. 569. BORRICH  
*de sanguine* p. 85. SPRÖGEL *de venen.* p. 70. Negat, puto ob minorem dosin, LORRY  
p. 78: Occidit GARMANN *ep.* 30.

(*n*) NEUMANN T. I. P. 2. p. 426.

(*o*) In ipsum guttur detrusum animal enecuit. *Ad. Edimb.* T. V. p. 154.

(*p*) KAAUW *impet. fac.* n. 47.

(*p*<sup>\*</sup>) RUSSEL l. c.

(*q*) TRALLES p. 184. WHYTT p. 281. 297. 298. 299. 302. 303. SPRÖGEL  
p. 26. 27. 29. 35. 37.

(*r*) *Exp. nostr.* in *Opusc. min.* 213. 214.

(*s*) WILLIS *anim. brut.* p. 231.

(*s*<sup>\*</sup>) In equis BIRCH II. p. 268.



Deinde irritabilem vim minuit, & nonnunquam delet, in musculis variis ( *t* ), in ventriculo ( *u* ), in intestinis ( *x* ), in vesica urinaria ( *y* ), fellea ( *z* ). Quare in ventriculo ab opio sumto sequuntur distentio a flatu summa ( *a* ), fæces absque concoctione acescentes ( *b* ), aut putrescentes, & etiam in equo ( *c* ), atque homine ( *d* ) appetitus diminuitur. Dicitur etiam in partibus animalium de corpore revulsis similiter irritabilem naturam ( *e* ) demisse. Quare utile fere est, quoties oportet convulsiones conpescere, nimiamque irritabilitatem frenare. In spasmo cynico magna ejus copia absque malo effectu data est ( *f* ). Idem profuit & convulsa maxilla, & ore clauso ( *f*\* ). Sed hæc omnia non penitus perpetua sunt ( *g* ).

Num etiam cordis irritabilitatem destruat, multum est quæsitum. Olim ( *b* ) scriptum est, pulsum ex opii usu frequenti minui ( *i* ), & sanguinis universam celeritatem ( *l* ), teste etiam microscopio in ranis adhibito ( *m* ). Febres sanavit ( *m*\* ).

Idem

( *t* ) WHYTT l. c. p. 281. 291. 297. 298. 302. 303. 311.

( *u* ) HOFMANN *de curat. imprud.* ANDRÆ *de irrit.* p. 39. SPRÖGEL p. 26. 28. *Exper. nostr.* n. 325. 326.

( *x* ) VIVIENTI in epistola ad me data, HOFMANN. ANDRÆ. KAAUW n. 435. SPRÖGEL p. 26. 28. 30. 37. *Exp. nostr.* n. 397. 399. 405. 406. 411.

( *y* ) Vesica lotio distenta KAAUW n. 434. Triduo ab opii usu nulla urina reddita BARON. ad LEMERY *Chymie* p. 759.

( *z* ) KAAUW *ibid.* Vesicula bile turgida SPRÖGEL p. 27.

( *a* ) KAAUW n. 434.

( *b* ) IDEM n. 435. SPRÖGEL p. 35. 70. WILLIS *pharm.* p. 57.

( *c* ) Etiam in india equis appetitum demit CAMBRIDGE *Hist. of the East. ind.*

( *d* ) Appetitum delet P. ALPIN. *hist. natur. Egypt.* I. p. 133. CHEYNE *sanit. infirm.* p. 238. 239. TRALLERS p. 142. 143. De Banguæ ARVIEUX l. c. Sic etiam ventrem obstipat TRALLERS p. 132.

( *e* ) ANDRÆ p. 50.

( *f* ) *Obs. of a societ. ad Lond.* vol. I. n. 1.

( *f*\* ) *Obs. of a societ. at Lond.* II. p. 137. Epilepsiæ paroxysmos suspendit de HAEN V. p. 127.

( *g* ) Diaphragma irritabile mansit SPRÖGEL p. 37. & intercostales musculi WHYTT p. 300. & intestina SPRÖGEL p. 27. *Exp. nostr.* n. 398. 400. 409. & ventriculus *exper. nostr.* n. 322. 329.

( *h* ) Calidum esse opium SANCTOR. I. *Fen.* p. 125.

( *i* ) 20. pulsibus in minuto FLOYER *puls. watch.* p. 118. *Act. Edimb.* V. p. 154. ANDRÆ p. 39. KAAUW *Impet. fac.* n. 434. 435.

( *l* ) PECHLIN *de apoplexia* n. 22.

( *m* ) *Eff. of a societ. at Edimb.* T. V. p. 154.

( *m*\* ) BARTHOL. *Cent. I. hist.* 84.



Idem experimentum multis modis repetiit *Robertus WHYTT*. Invenit fecisse opium, ut arteriæ micationes in cane a 150. pulsibus ad 76. & a 165. ad 70. (n) redirent, & in alio exemplo ad 74. (o). In ranis, a destructa medulla spinali, in opii solutionemmersis cor lente pulsabat (p), & pulsus ad 30. 26. 20. & 18. 16. (r), & 21. 14. (s), & ad 8. 15. 14. 13. (t) rediit, summam nempe tarditatem; & cor parvo tempore elapso immobile fuit (u); evulsam vero idem inque solutione opii datum intra 6. & 10'. (x) quievit. Aperto abdomine & pectore animal, in solutionem opiimersum, addit IDEM pulsus habuisse 9. & 7. (y), & 6. 9. & 2. (z), & 9. 6. (a), & 10. 11. (b); & in ventriculum injecto opio, pulsus fuisse 17. pro 60. & 70. (c). Ut omnino persuadeatur, irritabilitatem cordis ab opii vi destrui (d), citius etiam quam a destructione medullæ spinalis, & capitis detruncatione (e); & celerius demum occidere opium, motumque cordis destruere, quando cerebrum integrum est, lentius, quando destructum (f).

Sed etiam respirationem inde rarefcere, ut unica esset in minuto primo (g). Et destructo corde, cum opium nunc in sanguinem agere non possit, tamen irritabilitatem destruere (h). Opium adeo in nervos operari, & ideo somnum facere, quod ad stimulum animal insensibile faciat (i). Delere vero & nervosam vim, & musculosam (k), & perinde contactu externo (l) efficax esse.

Hæc

(n) WHYTT *Edimb. Ess.* II p. 299. 300.

(o) p. 282.

(p) p. 292.

(r) p. 287.

(s) p. 292. 293.

(t) p. 289.

(u) p. 292.

(x) p. 295. 296. Intra 10' ANDRIE p. 40.

(y) *Edim. Ess.* T. II. p. 288.

(z) p. 286.

(a) p. 290.

(b) p. 291.

(c) p. 281.

(d) p. 302. *Vital. mot.* p. 371. 372. *physiolog. ess.* p. 205.

(e) *Edimb. Ess.* II. p. 303. 304.

(f) p. 305.

(g) *Vital motion* p. 194. cum suspirio, ad mortem usque.

(h) Ibid. p. 376. *Edimb. ess.* T. II. p. 281. 309.

(i) T. II. p. 309. 314.

(k) lb. p. 310.

(l) lb. p. 301. 302.



Hæc quidem experimenta non videntur esse ejusmodi, ut aliquid certi demonstrent. Animal, quod morti est proximum, utique pulsus habet (*m*) raros, intermittentes, & ejusmodi fuerunt ranæ illæ, quibus WHYTTIUS capite amputato, & medulla spinali incisa satis dederat rationis, ut absque opio perirent. Et tamen aperto abdomine datum in opium miserum animal duabus integris horis, & duabus cum triginta minutis & uno (*n*), & quinque horis (*o*) vixit (*o*<sup>\*</sup>), & destructo, ablatoque capite canis plus 50' superfuit (*p*); in rana vero 12. horis (*q*), resecta medulla spinali sex horis (*r*), & evulsum cor minutis 35. (*s*) micavit. Præterea Cl. FONTANA ostendit, extus adplicatum, ut in plerisque experimentis WHYTTII, opium nihil potuisse mutare (*t*). In altero etiam experimento ANDREÆ cor canis ab opio dato fortius pulsavit (*u*).

Sed porro mihi nunquam ullum animal ab usu opii periit, neque adeo in his exemplis & cum ea dosi, cordis irritabilitas est destructa.

Et ab eo effectu adeo longe abest, ut consensu fere omnium scriptorum (*x*) sanguinem rarefaciat (*y*), pulsum expandat (*z*), & acceleret (*a*), cordisque motum incitet, calefaciat (*b*), sudorem (*c*), & venarum moveat (*d*), sanguinem in caput congerat (*e*), ejus vasa dilata-

let

(*m*) Pulsus debilior ab opio sumto, mortis signum WAELDSCHMIDT invent. circa opium.

(*n*) Edimb. Eff. T. II. p. 288.

(*o*) p. 286.

(*o*<sup>\*</sup>) p. 290.

(*p*) p. 283.

(*q*) p. 285.

(*r*) p. 289.

(*s*) p. 296.

(*t*) p. 608.

(*u*) p. 39. de irrit.

(*x*) Primus calidum esse ostendit WEPFER cicut. c. 4.

(*y*) PECHLIN circ. sang. p. 128. TRALLEs p. 192. BACON. ad LEMERY p. 799. CARTHEUSER. MBRAD of poisons p. 259. WHYTTII p. 311. Neque rubicundior, neque fluidior in cane ab opio enecto Journ. de Médec. l.c.

(*z*) BORDEU pouls p. 428.

(*a*) TRALLEs I. p. 56.

(*b*) IDEM p. 67.

(*c*) IDEM p. 132. WEDEL &c.

(*d*) CARTHEUSER. TRALLEs, p. 129. Pollutiones facit IDEM p. 131.

(*e*) TRALLEs p. 89.



tet (f). Et in cane, cui ALSTONUS opium in venas inpulerat, pulsus frequens supervenit (g). In phthifico ex opii usu lethalis hæmorrhagia successit (h), in mania furor inde increvit (i), & in febribus calidis, & in hæmorrhagia (k) nocet idem, dum sanguinis motum auget. Vasa visum est rupisse (l). Ab opii scrupulo in cane inflammatio oculi, & palati, sanguis (m) ruber, pulcher, fluidissimus (n), vix coagulabilis (o). Ab eodem veneno sanguinis in vasis cerebri copia (p), & tres quartæ sanguinis ex sinibus effusi (q), & in basin ceretri cruor egestus (r). In cane sinus sanguine atro pleni (s).

Uno verbo, eadem ratione, qua vinum, ea & opium agit (t). Hinc qui opio adfecti, eo destituti languent (u), perituri, si caruerint diutius, solo vino refocillantur, quod opii vires supplet (x).

Neque alios effectus expectes ab opio acri, amaro, feto vapore summe penetrabili, fætidissimo (y). Destillatum ex uncis sex, dedit spiritus volatilis, qualis ex cornu cervi prodit, uncias duas (z), olei fætidæ drachmas quinque grana 36. carbonis non falsi uncias duas, drachmas duas, grana 24. (a). In alio experimento opii uncia sedecim destillando dederunt phlegmatis subacidi drachmas decem, spiritus uncias quatuor, drachmas duas, olei fætidæ uncias duas, salis volatilis alcalini grana quatuor, fæcum

(f) TRAELLES p. 243. CATHERWOOD *apoplex.*

(g) *Eff. of a Societ. lit. and. phys. at Edimb.* II. p. 3013.

(h) BINNINGER *Cent.* IV. obs. 47.

(i) *Journ. de médec.* 1756. I. p. 71.

(k) HORMANN *de opii mechanica rat. agendi.*

(l) BORELLUS *Hist.* 57. *Cent.* IV.

(m) *Act. Budissin.* p. 68.

(n) ELLER *Mém. de Berlin* T. VII. p. 17. add. BERGER *de vi opii raref.* p. 10. *Budissin. Act.* p. 68. Cogere sanguinem *Act. Edimb.* T. V. p. 160. sed plus tribuo ELLERO, & sanguinem diluere ostendit experimentum *Edimb.* V. p. 156. Nihil mutasse MILITIA p. 32. MEAD. *of poisons.*

(o) *Act. Budissin.* l. c.

(p) CATHERWOOD p. 40. COLLINS p. 1128. BERGER *de vi opii raref.* Etiam in retina, & opticis nervis IDEM.

(q) CATHERWOOD.

(r) COLLINS.

(s) KAAUW n. 434.

(t) *Eff. of a Societ. at Edimb.* T. V. p. 169.

(u) CHRISTORAL & COSTA p. 12. 13. ed. Clus. Perit ille apud HASSEQUIST *refa* p. 183.

(x) CHARDIN *Voy.* T. IV. p. 205. & COSTA *ibid.*

(y) BORRICH *de somnif.* n. 14.

(z) Unciæ quinque de libra una PITCAIRN. Habet & WEDDEL *in opioleg.*

(a) MEAD. *venen.* p. 254.



ſæcum uncias ſex, in quibus terræ grana 105. & ſal non fixus (*b*). Cum ea autem copia acris olei ſalisque volatilis, qui poſſit niſi ſtimulare, calefacere, cordis motum augere? Refina vero multo quam extractum violentior eſt, & ad pauca grana mortem intulit (*b\**). Extractum aquoſum fere iners eſt (*b\*\**). Hæc eadem, non inutiliter addo, eſt ratio, quare ILL. STORKIUS extracta hyoſcyami & ſtramonii abſque periculo exhibuerit. Princeps enim viſ exhalando diſperit (*b\*\*\**). Opium poſt coctionem ſiccatum abſque viribus eſt (*b†*).

Tertius opii effectus eſt, qui in cerebro locum habet. Exigua nempe copia, ut vini, ita opii, facit indolentiam, tranquillitatem (*c*), excitatiorem animum (*d*), lætitiā, temulentiam (*e*), celeritatem cogitationum, cum voluptate ſingulari (*f*), & gratis quaſi ſomniis & viſionibus (*g*), appetitum demum veneris (*h*).

Major copia plerumque ſomnum fortem facit (*i*), turbulentum (*k*), pollutiones (*l*), etiam prælongum (*m*) ſoporem, qualem in virgine memini fuiſſe.

Aut conjungitur cum ſopore, aut abſque eo ſupervenit, aut poſt ſoporem ſupereſt ab opio, temulentia (*n*), vertigo, triſtitia (*o*), debili-

H h h h 2

tas

(*b*) Edimb. Eff. T. V. p. 148. 149. 150.

(*b\**) Medit. de virib. hypnot p. 167.

(*b\*\**) Ibid. p. 180.

(*b\*\*\**) Ibid.

(*b†*) SCHWARTZ de opio p. 17.

(*c*) TRALLEES hiſt. Choler. p. 119. conf. PETIT nepenthes p. 100.

(*d*) Phil. tranſact. n. 221.

(*e*) In cane SPRÖGELIUS p. 70. BIRCH II. p. 267.

(*f*) Banguæ apud ARVIEUX T. III HOOKE exper. p. 210. Conf. CHARDIN T. IV. p. 207. 208.

(*g*) G. V. SWIETEN T. I. p. 818. MORGAN. principi. p. 353. JONES myſter. of opium reveald. Phil. tranſ n. 221. MEAD. of pois. p. 256. THEVENOT Voy. II. p. 392. VENETTE p. 132. SPOLETTUS apud MORGAGN. cauſ. & ſed. morb. T. I. p. 55. ARVIEUX l. c. ex Banguæ, tum RUSSEL nat. hiſt. of Alepo p. 83.

(*h*) TRALLEES p. 129.

(*i*) SPRÖGEL p. 30. BARTHOL. hiſt. 84. Cent. I. A ſcrupulo Aſt. Mogunt. II.

(*k*) Ideas feroces TRALLEES choler. p. 131. de opio p. 115.

(*l*) IDEM p. 131.

(*m*) THEVENOT. Bidui ſomnus, ex tuurunda in nares data TIMÆUS L. II. caſ. 9. triidui TRALLEES opium p. 285.

(*n*) TRALLEES p. 101. BRUNNER paucr. p. 9.

(*o*) LORRY Journ. de Médec. 1756. p. 71. CHARDIN T. II. p. 704. P. ALPIN hiſt. natur. Aeg. p. 133.



tas nervorum, stupor ( *p* ), defectus appetitus, icterus ( *q* ), macilentia ( *r* ), ineptitudo ad venerem ( *s* ), memoriæ decrementum ( *t* ), sopitæ quasi vires animæ ( *t*\* ), stultitia ( *u* ), paralytis ( *x* ), postque vitam brevem mors ipsa sequitur ( *y* ).

Nimia copia sumtum omnino stuporem, & delirium ( *y*\* ) facit, insensibilitatem ( *z* ), convulsiones ( *a* ), paralytin ( *b* ), & demum occidit ( *c* ). Dosis funesta non satis nota est. Perierunt aliqui a granis quatuor ( *d* ), septem ( *e* ), a granis tincturæ 60. ( *f* ), cum meraca esset. Ab opii granis duodecim ( *g* ), viginti ( *h* ), & viginti duobus ( *i* ) mors supervenit, & a drachma ( *k* ). Qui minime sunt adsueti, tulerunt minimum.

Reperiuntur vero, qui scrupulum ( *k*\* ), grana 24. ( *k*\*\* ), dimidiam ( *l* ) drachmam, & integram ( *m* ), & grana 34. ( *n* ), & duas, & ultra ( *o* ), tres

- ( *p* ) CHARDIN T. IV. p. 204. P. ALP. p. 133.  
 ( *q* ) *Phil. transact.* n. 221. BERGER de vi opii rarefac. p. 16. Hamburg. Magaz. l. c.  
 ( certe faciem flavam ) ARVIEUX ex usu Banguæ.  
 ( *r* ) Hamb. Magaz. &c.  
 ( *s* ) A 30. granis STALPAAERT Cent. II. obs. 47.  
 ( *t* ) WILLEIS anim. brut. p. 232. add. CHARDIN Voyag. T. IV. p. 205.  
 ( *t*\* ) In Emir sive principe arabum ARVIEUX l. c. Vulgo in turcis vix vita aut anima superest BIRCH II. p. 8.  
 ( *u* ) TRALLER p. 127.  
 ( *x* ) VALISNERI oper. T. III. p. 586. Edimb. eff. T. V. p. 158. 162. KAAUW B. 438. TILING apud STENZEL somn. p. 153. 154.  
 ( *y* ) CHARDIN. BRADLEY.  
 ( *y* ) Nat. hist. verv. Linn. T. I. P. II. p. 132.  
 ( *z* ) In omnibus canibus nostris.  
 ( *a* ) LORRY p. 71. 74.  
 ( *b* ) WHYTTE l. c. p. 312. WILLEIS anim. brut. p. 231. Pharmac. p. 144. CHARDIN IV. p. 205. 206. Fränk. Anmerk. III. p. 88.  
 ( *c* ) TANARON princip. de Chir. I. p. 263. HELWIG obs. p. 328.  
 ( *d* ) BIRCH T. II. p. 459.  
 ( *e* ) CATHERWOOD p. 39.  
 ( *f* ) GHERLI obs. C. II. obs. 97.  
 ( *g* ) COLLINS p. 1128.  
 ( *h* ) Eff. of a societ. at Edimb. T. IV. n. 6.  
 ( *i* ) WEPFER apoplex. p. 235.  
 ( *k* ) Edimb. Eff. T. V. p. 162. AGRIC. AMMON l. c. A duabus FALLOPIUS nat. hist. l. c.  
 ( *k*\* ) Act. Mogunt. II. HEUERMAN III. p. 211.  
 ( *k*\*\* ) Extracti quidem DUECINI p. 57.  
 ( *l* ) PATIN valet. med. p. 398. HOFMANN acid. & visc. p. 51. 52. RAYMANN prejud. opin. SINAP. remed. dol.  
 ( *m* ) CHEYNE sanit. infirm. p. 38 39. FALLOP. de lue Gall. VALISNERI III. p. 427. TRALLER p. 285. RICHTER progr. propr. SINAP. SPOLETTUS l. c. LAMBERGEN exulc. cancr. curat.  
 ( *n* ) *Phil. trans.* n. 275. Laudani gr. 102. in triduo.  
 ( *o* ) HOISTETTER.



tres [p], quatuor [q], quinque [r], octo [s], sedecim [t], viginti quatuor [u] drachmas tulerunt. Ad 32. drachmas fumendas homo se obtulit [x].

Canes multum ferunt opii [y]. Mihi nullus eorum periit, quos adegeram, ut fumerent. A drachmis tamen duabus [z] occisus canis MEADIANUS. In venas infusæ quinque drachmæ soluti opii occiderunt [a], & opium in cellulofam telam effusum [b]. A resina etiam canes facile pereunt, & a paucis granis [b\*]. Ranæ facile pereunt, & ab intruso in gulam opio ad grana decem [c], & inmersis in opium dissolutum animalculis [d].

### §. IX. *Causa proxima somni.*

Denique, ut somni causam proximam indagaremus, ex cadaveribus collegimus eas in fabrica encephali mutationes, quæ in lethargo & in nimio somno conspicuæ fuerunt, & quas possis, probabili usus ratiocinio, pro eo statu cerebri habere, ex quo somnus sequitur.

Et primo presso utcunque cerebro, somnus fit cum stertore. Id sæpiissime in canibus vidi, & videtur etiam Anna Carolus LORRY [e] vidisse, etsi ad cerebellum solum eum eventum refert.

H h h h 3

Etiam

[p] Hamb. Magaz. t. 16. Phil. transf. n. 221.

[q] Quotidie JUNKER casus rariss. matron. opii largiss. usu per plures annos tractat. Ad RONCALL p. 119. BRADLEY morb. med. p. 87. Add. Phil. transf. n. 275.

[r] Apud Turcas hæc summa dosis est. BIRCH T. II. p. 267.

[s] JOSSELYN voyage p. 60.

[t] NEUMANN oper. p. 947. ed. ZIMMERMANN.

[u] JONES.

[x] GARCIN de opio.

[y] MORGAN philos. principl. p. 267. Drachmam, Medit. l. c.

[z] Of pois. p. 266. Toleravit eam dosim canis Cl. COURTEN Phil. transf. n. 335. Non pereunt, quia revomunt ROBINSON sudden death p. 39. Sed etiam alias robustum est animal. Periit tamen canis SPRÖGEL p. 72. & a drachma LORSEKE p. 569. Sed hi ab injectio opio.

[a] Edimb. Eff. T. V. p. 156. A multo minori dosi GARMANN.

[b] LORRY l. c. p. 79.

[b\*] Medit. l. c.

[c] SPRÖGEL p. 27. 28.

[d] Edimb. Eff. T. V. p. 152. 153.

[e] Mém. des savans étrang. T. III.



Etiam in homine, cui a carie cerebrum nudatum erat, somnus a pressione sequebatur [f].

Eodem modo somnus, etiam funestus, sequitur a varia compressione cerebri [g]; a sanguine super duram membranam [h] cerebri per vulnus effuso; a tumore cerebrum comprimente [i], aut a scirrhis [k]; a fragmentis cranii in cerebrum nitentibus [l].

Ita a meningibus inflammatis, & cruore plenis [m] sopor: & post febres malignas [n], ut pestem massiliensem [o], phrenitidem; & ex febre male sanata [p] sopor ingruit. Sanguine infecta vasa cerebri, & maculae in membranis cerebri rubrae, in ejusmodi cadaveribus vulgo adparent. Inter mauros, aestuosissimae regionis incolas, frequens reperitur lethargus [q].

Huc revoco oleum olivarum in venas canis injectum, quod somnum funestum fecit [r].

Sic a pure in ventriculum cerebri effuso [s], ab abscessu in cerebro [t], aut in cerebello [u], a cerebri gangraena [u\*], & a cerebro utcumque destructo [x] ferreus somnus supervenit.

Frequentior tamen causa est cerebrum utcumque aqua plenum [y];

in

[f] BORETIUS *epileps. a depress. cran.* A cranio nimis pleno, ut cerebrum comprimatur, infantum uberiores somnum Cl. David HARTLEY deduxit p. 47.

[g] BONNET *ibid. obs.* 17. 18. 19. 30. Addit *obs.* 2. 7.

[h] COLLINS p. 1132.

[i] FANTON ad MANGET *Epist.* 9. A ligato fungo, qui cerebri processus erat FANTON *obs.* 26.

[k] BONNET *obs.* 21. 29. WEPFER *apopl.* p. 277. BAUHIN *theat.* p. 305. WILLIS *anim. brut.* p. 207.

[l] *Aët. Chir.* T. I. P. 2. p. 152.

[m] WILLIS *anim. brut.* p. 313.

[n] In Cephalea illa Pannonica RHUMEL *cent.* p. 68.

[o] SENAC *recueil de la peste* p. 201.

[p] WILLIS *anim. brut.* p. 207.

[q] ATKINS *navy surgeon* p. 364.

[r] *Phil. transf.* n. 335.

[s] SCHAARSCHMIDT *relat.* 1740. n. 26. WEPFER *hist.* 17.

[t] BARTHOLIN *hist.* 34. *Cent.* II. LA PEYRONIE *Mém. de l'Acad.* 1741. p. 214. *Zod. Med. Gal.* I. *obs.* 182. *Acad. de Chirurg.* T. I. P. 2. p. 130. BONNET L. I. *Seç.* 3. *obs.* 32. 33. 34. 37. 38. 44. HIPPOCR. *epid.* IV. & VII.

[u] Des Hais *hemipleg.* p. 14.

[u\*] Post vulnus sclopetarium PLANQUE *bibl. de Méd.* T. III. p. 77.

[x] FANTON *obs.* 26.

[y] LOWER *de corde* p. 254. BONNET L. I. *Seç.* 3. *obs.* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 24. 25. 43. 45. 46. Addit *obs.* 1. 6. &c. CHESelden p. 224. pro perpetuo WILLIS p. 217. 306. la MOTTE *chirurg. complet.* *obs.* 126. HILDAN *Cent.* I. *obs.* 10. WEPFER *de morb. cap.* *obs.* 96.



in anfractibus [z]; in ventriculis [a], inter meninges [b], in hydatidibus [c]. Et in universum cum hydrocephalia stupor conjungitur, & somnolentia [d].

§. X. *Causa vigiliarum.*

Ut per contraria propius ad causam somni accedamus, etiam ea contemplari oporteat, quæ somnum impediunt.

Minus ergo diu dormiunt, & minus facile, minusque suaviter, qui corpus non exercent. Senes mane evigilant [d\*].

Omnino non dormiunt, qui cibo destituuntur [e], ut in multis exemplis collectis legi [e\*].

Neque dormiunt, quibus quæcunque est causa motus alicujus perpetui. Ita non dormiunt, qui male cibos coquunt. Ipse cum ann. 1749. & 1750. frequentissime noctes totas insomnes transigerem, nihil aliud in me percepi, nisi motum peristalticum perpetuum, cum exiguis, sed tamen tumultuantibus, non quidem dolorificis, flatibus. Id vitium sustuli sublato usu carniū, adipis, inmensa vi acoris chemici in corpus recepta, vini calidi usu modico, demum abstinencia a nimio studio.

Non dormiunt, quibus pars aliqua friget, dum interim caput calet. Iniquus inde sanguinis motus fit, & congestio ad cerebrum, & quies impeditur.

Neque dormiunt certe longo tempore, quibus strepitus majores, aliave molesta sunt, quæ sensus valide adficient. Inter tormenta in Gallia anno 1685. adhibita, tympana fuerunt, quibus miseri vel ad voluntatem regiam sequendam compellebantur, vel sanorum sensuum usum amittebant.

Non dormiunt, quibus contentio aliqua major animum occupat, ut de *Francisco VIETA* legimus. Non dormire sinunt curæ quæcunque acriores.

[z] Gelatina WEPFER *apopl.* p. 344. Aqua WILLIS *anim. brut.* p. 217. Circa cerebrum MORGAGN. *Sed. & caus. morb.* I. p. 46. 47. Add. WILLIS l. c.

[a] WEPFER, SCHAARSCHMIDT l. c. 1738. n. 6. du HAMEL *Hist. de l'Acad.* p. 214. *Trois demisetiers* DUVERNEY II. p. 539. quæ immensa est copia.

[b] PACCHIONI.

[c] BONNET l. c. *obs.* 47.

[d] HILDAN. *Cent.* I. *obs.* 10. WEPFER *apoplexia* p. 64.

[d\*] *Senium salomon.* p. 267.

(e) STUART *phil. trans.* n. 414. 417.

[e\*] Conf. L. XIX. *Seç.* III.



acriores. Vix dormiverunt miseræ, quæ angusto in cubiculo multa nive sepultæ [f] vivebant, totis 37. diebus. In gravida insomnium 45. dierum [g]. Melancholica sex septimanis insomnis [h]. Maniaci sæpe insomnes, & eorum aliqui nunquam dormiunt [i]. Hysterica per tres menses insomnis fuit, neque contra morbum valuit opium [k]. Quæ nunquam dormiit [l]; sed id ægre credibile.

Ex inflammatione, ut credit, cerebri cum sensu omnium corporum nimio, etiam lucis, insomnis fuit Cl. HOME [m]. Opii omnem vim tristicii nuntius superavit [n]. Miser ille GARDELLE, cum hospitam occidisset, totis 14. noctibus non dormiit, cum 40. grana opii sumisset [o].

Doloris corporei eadem est vis, quale pervigilium BOERHAAVIUS ab arthritide passus est, & octo mensium integrorum aliud PECHLINUS narrat. Ob febriculam MÆCENAS [p] tribus annis dormire nequit. Sic a latente fomite veneni canis rabidi [p\*]. Febres etiam aciores [q] somnum fere auferunt, quoad vires factæ fuerint, & vel in mortem res declinet, vel spes convalescentiæ restituatur. Non dormiunt animalia hibernum somnum, quando ab ipsis frigus externum arcetur; cum calore enim humores nunc moveri possunt [r].

Arcent somnum potus calidi, subinde ad sanguinem adfusi, quæ theæ [s] inveniendæ causa fuisse dicitur [t]. Eadem, & potentior, virtus est coffeæ [u], vulgo nota. Sex diebus somnum abercuit Alexander de RHODES [x].

Post

[f] SOMIS *raggionam* p. 74.[g] BARTHOLIN *Cent.* IV. *hist.* 70.

[h] G. v. SWIETEN T. III. p. 264.

[i] *Phil. trans.* n. 317. INGRAM *cases* p. 100.[k] MILITIA *morb. graviss.* p. 27. Confer alia exempla PLUMP *valet tegat.* p. 281.[l] MOUSIN *hort.* p. 289.[m] *Faëls* p. 184.[n] YOUNG *opium* p. 28.[o] *Gentl. Magazin* 1761. April.

[p] PLINIUS L. VII. c. 51.

[p\*] JAMES *madness.* p. 48.[q] Animam ob periculum vigilem esse CARL *diact.* p. 142.

[r] p. 360. &amp; adde semper not. 593. pag. b.

[s] OVERTON *tea* p. 32.[t] KÆMPFER *amæn. exot.* p. 609. 610.[u] WILLIS *pharmac. ration.* p. 163.[x] Apud du FOUR *de thea &c.* p. 229. 230.



Post diuturnas vigilias cerebrum etiam adfectum reperitur, molle, aqua plenum, maceratum, & pars consumpta [y]. Hinc ex pervigilia mania [z].

§. XI. *In quo convenient causæ somni.*

His omnibus comparatis poterit aliquanto propius ad causam somni accedi.

Ea est vel a motu sanguinis in cerebrum valde diminuto [a]; vel ab eodem vehementer aucto (b), ut præterea minus facile circumeat, exemplo vigiliarum, quæ fiunt a liquore calido fluidiori, ad sanguinem admisto [c].

Fit etiam somnus a subpresso omni motu externo [d], internove [e], ut ipse motus peristalticus vehementior fileat [f], quæ est inter causas, cur opium sopiat.

Quæsi, quid hæ causæ, quæ contrariæ sibi videntur, habeant commune. Videtur esse minus expeditus spirituum nerveorum in cerebro motus [g]; sive is sequatur eorum spirituum defectum, ut ex labore [h]; sive diminutam celeritatem [i]; sive cerebrum utcumque compressum; maxime vero a lenta causa [k], & paulatim congesta somnus fit, cum subitæ compressiones occidant.

Contra vigilie redeunt reparato spirituum motu, per irritationem quamcunque [l]; per restitutam materiem spirituum [m]; per libertatem cerebri ab omni præter naturam pressione liberi.

Est

[y] INGRAM.

[z] BARTHOLIN. *Cent. IV. bist. 701*

[a] p. 602.

[b] p. 603. seqq.

[c] p. 616.

[d] p. 602.

[e] ibid.

[f] p. 615.

[g] GORTER *Erere. V. p. 27. 30*

[h] L. XI. p. 562.

[i] p. 602.

[k] p. 613. 614.

[l] p. 615. 616.

[m] A cibo: ab aromate.



Est autem in hac re quædam mediocritas (*n*), ut celeritas sanguinis in cerebrum euntis minima somnum, mediocris vigilas, major delirium, maxima soporem faciat, quod ex ebrietate valde manifestum est. Spirituum vero motus & celer & expeditus vigilas; lentior somnum, magnus, sed cum renixu & difficultate somnum turbulentum, plenum imaginum facit.

Quare complicatio fistularum spirituosarum (*o*) in somno, laxitas fibrarum sensorii (*p*), cerebri (*q*), aut ventriculorum collapsus (*r*), minor copia spirituum (*s*), aut diminuta secretio (*t*), tubulorum spirituosorum obstructio (*u*), quæ singulæ a variis auctoribus pro causa datæ sunt somni, partim non plenam enumerationem tradunt causarum somni, partim omnino conjecturam meram.

## §. XII. Somni effectus.

Somnus adeo moderatur eam destructionem machinæ humanæ, quæ fit ab animæ & corporis motu, & quorum uterque vel minuitur a somno, vel tollitur. Solum enim nunc cor superest, quod sanguinem incitat, cum in vigilia & muscoli sint & nervi. Vitam adeo producit, adeo certo, ut frigore solo possis chrysalidis (*x*) evolutionem pene pro luitu retardare, erucæ adeo vitam per aliquos menses producere (*y*), qui ei animalculo plus sunt, quam iustia nobis. Cossus scarabæi per annos sub terra manet, vitalis emerfurus certo alicujus anni favore (*z*).

Reducit adeo somnus motum sanguinis a vespertina febre ad leniorem illam moderationem, cum qua mane expergiscimus (*a*).

Quare

(*n*) Inde respondetur ad objectiones D. de la CAZE *idée de l'homme métaphysique* p. 248. seqq.

(*o*) Ad DESCARTES *de hom.* p. 22. Nervi laxi p. 180. Intervalla nervorum in vigilia latiora sexangula, in somno arctantur, & triangularia fiunt CRAANEN p. 426.

(*p*) GODART *de l'ame* p. 306.

(*q*) CHIRAC *de incubo* p. 47.

(*r*) HARTLEY p. 48. quasi unquam ventriculo distenti forent c. 50. VERHEYEN L. II. p. 245. de MOOR p. 84. Ob eos ventriculos somnus ISAG ANAT.

(*s*) BAYLE p. 520.

(*t*) ZENKER *de opio* p. 19. STUART *Phil. transf.* n. 417.

(*u*) VIEUSSENS *histoire de l'Académie des sciences* 1709. p. 12.

(*x*) RE'AUMUR T. II. *Mém.* l. p. 19.

(*y*) Ad tertium annum IDEM.

(*z*) LISTER *humor.* p. 42.

(*a*) p. 598.



Quare, qui somno carent, nam nimis sum expertus, febriculosi sunt, & impatientes frigoris (b), & in malo diutius protracto facile in delirium transeunt, inque maniam (c), convulsionem, mortem (d). Falcones (e) longis vigiliis dementantur, ita apti redduntur, ut ignari periculi in ardeas se præcipitent.

Dum motus in sanguine minor est, & lentius moti humores, tunc eorum qui sunt tenuiores partim stagnant, ut de adipe notum est, partim adhærent ad solidas partes corporis, quæ est nutritio (f). Ideo infantes & multum dormiunt, & potenter nutriuntur, & crescunt celeriter.

Motu peristaltico diminuto (g) cibi longiori tempore retinentur, & locum dant resorptioni.

Omnia etiam aliorum succorum resumtio fit major, per quietem, quæ eos suarum venularum haustis non subripit. Inde inspissatur mucus pulmonum, & colligitur.

In musculis dolens ille a perpetua adtractione & remissione sensus per somnum & quietem levatur.

In systemate nervoso reparatur tantum elementi spirituosum (h), quantum est necesse, ut musculi voluntarii, atque sensus suis muniis fungi possint. Una alacritas redit, adque omnes corporis animique labores rediviva aptitudo.

Quare etiam expergiscere somni videtur effectus. Dubitat equidem BOERHAAVIUS, si nulla forinsecus irritatio accesserit, num unquam sponte somnus finem esset facturus. Nititur experimentis, in quibus somnus præter modum diuturnus, ad somnolentiam tamen, novamque somni necessitatem duxit. Reperiuntur etiam exempla non rarissima hominum, qui ex incerta aliqua causa diuturnos somnos dormiverunt. Exemplum exstat hominis, qui a 29. Junii ad 13. Julii dormivit, deinde

I i i i 2

iterum

(b) GORTER *Exercit.* II. p. 7.

(c) In nave *Schifbruch des Schiffs* SCHELLING p. 8. & *L. Magaz.* 1753. p. 145. Add. BARTHOL. *Cent.* IV. *hist.* 70. MORGAN p. 128. Ab insomnio quatuor mensium mania ZACUT *princ. med. hist.* L. I. *obs.* 13. Puer per 18. menses insomnis, inde fatuus PANAROLUS *Pentecost.* V. *obs.* 4.

(d) AMATUS *Cent.* I. *cur.* 9.

(e) *Hamburg. Magaz.* T. V. p. 147.

(f) GORTER *Exerc.* II. p. 4.

(g) p. 598.

(h) SUPPRIAN n. 21. &c.



iterum sex mensibus, & post brevem evigilationem a 12. Jan. ad 22. Febr. & ultra dormiit (*i*). Homo dormitor septuaginta dies somno transegit, ut tamen subinde cibum caperet. Decima & septima septimana excitatus, sanus superfuit (*k*). Somnus quatuor & ultra mensium parum interruptus, in sanitatem terminatus est (*l*). Somnus quatuor annorum paucis cum intermissionibus (*m*). Omitto breviores somnos, quatuor (*n*), septem (*o*), & octo (*p*); & tredecim (*q*), & quatuordecim (*r*) dierum.

Ex stimulo ergo aiebat PRÆCEPTOR (*s*) optimus nos expergiscere, sive esset a facibus alvi & urinæ, sive a fame, sono, luce, aut a contactu aliquo.

Cum ejusmodi stimuli nunquam a nobis absint, experimenta non possunt capi, quibus confirmes, solam spirituosæ elementæ refectionem sufficere. Crederem tamen ex analogia eorum, qui ob compressum cerebrum (*t*) stupent vel dormiunt. Hi enim, liberato cerebro, nullo addito stimulo, continuo expergiscunt, ut credas vigiliarum statum reddi, quam primum elementum spirituosum libere, & debita copia per nervos circumit.

### §. XIII. Phænomena expergiscientium.

Oculos fere solent aperire, digitisque detergere. Deinde artus omnes extendere, non sine *crampi* periculo, si nimis subita fuerit extensio. Brachiis & cruribus aliquot motus alternos porro edunt, flexionis & extensionis: oscitant aliquoties, sternutant multi, & tussunt, seque liberant muco. Urinam reddunt, alvumque evacuant. Ita in paucissimis horæ minutis plenus usus rationis & musculorum voluntati obsequentium redit.

Nunc

- (*i*) *Act. Erudit.* 1707. p. 278. seqq. *Journ. des sçavans* 1707. apr. Non sunt ad manus.  
 (*k*) *Phil. transact.* n. 304.  
 (*l*) BURETTE *Journal de médec.* T. I. P. IV.  
 (*m*) FICHET p. 200.  
 (*n*) RHUMEL *centur.* p. 68.  
 (*o*) *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 8. obs. 68.  
 (*p*) SCHURIG *chylolog.* c. IV.  
 (*q*) *Histoire de l'Académie* 1729. n. 2.  
 (*r*) PLOT *Natur. hist. of Staffordshire* p. 285. adde somnum periodicum Cl. MISSÆ *Journ. Méd.* T. II.  
 (*s*) PRÆLECT. T. IV. p. 512. A diuturno in eandem cutis particulam decubitu.  
 (*t*) L. X. p. 303. 304.



Nunc quidem & homines, & animalia extendunt artus, quod iis fere conflexis dormiant, & ex eo perpetuo situ in musculis sensus incommodus oriatur, quem extensione tollunt.

Oscitant (*u*), ut sanguini per somni naturam paulo lentius per pulmonem circumeunti, iter expediant.

Sternutant & reliquas fæces ejiciunt, quæ omnes nocte tota collectæ, molestæ sint, copia, densitate, aliquæ etiam acrimonia.

#### §. XIV. *Somnia.*

Hactenus perfectum somnum descripsimus, in quo anima vel ab omni sensatione abstinet (*x*), vel certe earum sensationum non meminit, quas dicas esse expertam (*x*\*). Ejusmodi somnus esse possit in blandissima quiete (*y*) corporis & animi, qualis magnis virium decrementis supervenit. Est etiam forte is status in prioribus horis (*z*) somni, forte inquam, nam difficile est experimentum, & habemus manifesta exempla etiam brutis animalibus (*a*) somnia coram animo versari.

Sive ergo perpetuum est somniorum jus, sive frequens, certum est mentem sæpe per somnum minime otiosi, sed perinde, uti in vigiliis, spectaculum succedentium sibi sensationum & notionum contemplari, ita etiam in somno (*b*) seriei imaginum auscultare, quæ ex vestigiis priorum sensationum cerebro impressis nascuntur. In earum imaginum sensu anima & sui conscia est, & judicat, & ratiocinatur (*c*), & voluntate utitur, & affectus animi patitur omnes, multo, quam in vigiliis graves, anxietatem summam, terrorem maximum, gaudia effusa.

Quæ in somniis expertus sum, ea breviter narrabo: A juventute enim mea sæpe me somniantem sum meditatus, & fallaciam phantasmatum deprehendi, quæ vellent me persuadere, se esse extra me. Alias tamen cum amicos mortuos viderem, non potui me de errore convincere,

I i i i 3

neque

(*u*) GORTER *perspir.* n. 338. 339. 340. EBERHARD *physiol.* p. 1003.

(*x*) Quare somnia refert ad suum imperfectum soporem MRYERUS *Nachtwandler*.

(*x*\*) DEPIEU p. 161.

(*y*) In summa abundantia spirituum, & in summo defectu, nulla fieri FORMEY. Fuisse, qui nunquam somniarunt LOCKE T. II. c. 1. GASSENDUS &c.

(*z*) FORMEY *Mém. de l'Acad. de Berlin* 1746. p. 326. & *Hamb. Magaz.* T. XVI.

(*a*) Quadrupeda vivipara somniant ARISTOTELES *hist. anim.* L. IV. c. 10.

(*b*) BONNET p. 421.

(*c*) *Letres d'un Américain* T. VI. p. 229.



neque tamen non offendebar insperato visu ( *d* ). Ita ille, quem diximus, ad vitandas pollutiones voluntatem firmam adtulisse, expergiscebat ad sensum lubricæ imaginis ( *e* ).

Somnia nonnunquam ex præsentē sensatione ( *f* ) oriuntur, frequentius ex præterita. Ex præsentē sensatione anxietatis & sanguinis ægre circumducti notissimus incubus ( *g* ) nascitur, ex situ nempe supino, in quo sanguis rapidius ad cerebrum venit, & difficilius a cerebro redit ( *h* ), mihi ignotus: ejus vero locum anxia tenent somnia, domuum per mille cubiculorum mæandros, exitum negantium; itineris subterranei, cujus fornix continuo humilior desidet. Sed & præsentē sensationes somnia faciunt. Ita ex abundantia copiosi, & congesti feminis, venerea somnia oriuntur, & feminis profusiones, etiam in pueris veneris ignaris, ut vestigia nihil hic addant sui. Ejusmodi sensationes possunt maxime diversæ cogitari: tumultus intestinorum ( *i* ), a coena longiori; ventriculi a flatu distentio ( *k* ); calor febrilis; calor lecti nimius: duritas strati, aut tantum minor adfuetudo ( *l* ); decubitus supinus: pars aliqua minus bene tecta; dolor quicunque, aut incommodum; sensus etiam lætus propriæ valetudinis.

Leges somniorum ex sensatione nascentium sunt ejusmodi: Somnium, quam sensatio fortius est ( *m* ), & vehementius animam percellit. Id tribuas solitudini, quieti, attentioni ad unicum objectum. Certe vix unquam sanus homo ex quacunque libidine semen profuderit. In somniis id fit, certa quidem ætate, neque fere in senio, perfacile in pueris: & musculi eam excretionem efficientes potentius ( *n* ) agunt, quam in vigiliis. Hoc robur somniorum facit persuasionem.

Sed

( *d* ) Non offendi MURATORI p. 60.

( *e* ) Onanisme p. 208.

( *f* ) FORMEY p. 328. MEYER *Nachwandler*. Sed internas etiam sensationes eodem nomine comprehendit WOLF *Empir.* p. 78. 79.

( *g* ) NICOLAI p. 334. Hinc ab eo apoplexia BOND p. 64. 65. Subtilius tamen A. BOND collectionem eam in venam cavam, auriculam ventriculum dextrum restringit. Hinc utile esse decumbere in dextram, ut cor habeat mediastinum pro sustentaculo p. 81.

( *h* ) L. X. p. 169. BOND p. 10. Conf. *obs. of a Societ. at Lond.* I. n. 5.

( *i* ) Ciborum corruptela facit somnia SANCTOR. *Sec. IV.* n. 40.

( *k* ) A lentibus somnia teterrima PETIT *æperith.* p. 109. 110. A palumbum esu olim CATO MAJOR.

( *l* ) SANCTOR. *de somno.* n. 26.

( *m* ) Pusilli magis in somnio magni ARISTOTELES *de divinat. per somn.*

( *n* ) *Histoir. de l'Ame* p. 117. 281.



Sed neque sensatio, quæ somnii causa est, aut, sola aut pura, menti repræsentatur. Ex lege adfociationis ( *o* ) idearum ad simplicem stimulum nascitur idea feminæ pulchræ, amatæ, quam ambias, quæ cedat facilis: adcedit lectulus, & omne satellitium arcani amoris. Et magis & magis post primos sermones adpropinquat cominus sperata voluptas ( *p* ), ut vicissim perinde anxietatis hieroglyphæ continuo graviora menti incumbunt. Ita in febre, cum supra modum calerem, ignis regnum videbam & flammæ de toto horizonte micantes. Et fitis ( *q* ) fontes salientes, nemusque impendens vividissime repræsentat.

Perfecta valetudo mihi sub imagine volatus pro somnia depingitur, ut mirer me pedibus suspensis super terram me elevare, & ea intacta in distans per æra ferri.

Ordo est ejusmodi, qualem adfociatio facit idearum, neque mutationes eæ sunt absque ratione sufficiente, quæ fiunt in his phantasmatis ( *r* ).

Sæpe longe cohærent, ut idææ, quæ a memoria animæ redduntur. Libros ( *s* ), etiam poëmata inpressa sæpe lego, itinerum historias, & alia ejusmodi, etiam plantas video regionum remotissimarum, iis regionibus convenientes.

Alii problemata se in somnio solvere ( *t* ), scribunt, & versus fecerunt ( *u* ), quod & mihi contigit, & lectiones didicerunt ( *x* ), quæ certe omnia ordinem ponunt servatum.

Si somniorum imagines vulgo confuse miscentur, fieri id potest, quod in systema idearum ex prima sensatione natum aliæ idææ noviter se admisceant, quæ sunt de systemate alterius sensationis. Ita potest primum

( *o* ) Conf. BONNET p. 412. 413. NEEDHAM *obs.* p. 449. NICOLAI *Einbild.* p. 32. FORMEY p. 321.

( *p* ) Ita intelligo Cl. FORMEY, qui inefficacem in principio somni sensationem sensim invalescere monet p. 328.

( *q* ) BONNET p. 133.

( *r* ) WOLF p. 82.

( *s* ) Aliquid ejusmodi, sed nimis ornatum habet KUNDMANNUS *Zustand* p. 120. tum CARDANUS: librum nempe per quietem se ait elaborasse, qualem postea ediderit *subtil.* n. 18.

( *t* ) LIGNAC l. c. KRUGER *physiol.* p. 241.

( *u* ) MAFFEI *fulmini* p. 181.

( *x* ) KAAUW *impet.* p. 321.



mun somnium a calore nasci, & aliud dejecto interiori stragulo, a frigore se immiscere ( *y* ).

§. XV. *De iisdem.*

Frequentiora dixi somnia a vestigiis ( *z* ) in cerebrum receptis nasci. Pleraque mea somnia versantur circa curas quascunque, quæ noctu fortiores redeunt. Ita amissum amicum, amissam suppellectilem per somnia revideas; ita inimici exosa imago per somnia nos persequitur: & plantarum amor me ducit per avia. Id est cur somnia imagines visibiles ( *a* ), & loquelam fere nobis solas revocent, raro cibum, potum, egestionem necessariam facum, neque nisi ex præsentè sensatione. Nam etiam vigili imaginatio visas fere imagines sonosque reddit.

Vestigia rerum per imaginationem renata, perinde secundum adassociationem idearum, totum satellitium idearum concomitantium revocant; amici vestes, demum dies nobiscum actos, imo factos ludos, ipsas chartas lusorias, prata, prædia, forum senatumque, quem una frequentaveris.

Nunc si mechanicam causam requisiveris somniorum, solent respondere, mistum ( *b* ) esse statum ex somno & vigiliis, & requirere cum sensorio cætera quieto tantum unius tribus spiritus reparatos ( *c* ), partemque cerebri perviam, dum in reliquo ( *d* ) cerebro quies regnat, neque spiritus itinera sua urgent.

Facile intelligitur somnia fieri, quoties stimulus aliquis præsens: aut vestigium præteritæ sensationis, adeo magnas vires acquirit, ut superare animæ quietem, suamque ei repræsentationem obtrudere valeat. Diximus enim alias ( *e* ), animam in somno minores stimulos non percipere. Est autem hic mediocritas roboris aliqua, nam magis robusta sensatio hominem cogit expergiscere. Ita anxietas, quando per multos labyrinthos

( *y* ) BOHN p. 416.

( *z* ) BONNET p. 137.

( *a* ) BUFFON T. IV. p. 63. non bene vero parum audire addunt. Nam somnia sunt loquacia.

( *b* ) SUPPURIAN p. 48. 49.

( *c* ) FORMEY l. c. p. 326. add. BAYLE p. 526.

( *d* ) DESCARTES de hom. p. 122. BOERHAAVE Proleg. T. IV. p. 564. WILLIS animi brut. p. 171. Prim. lin. n. 565.

( *e* ) p. 595.



thos somniorum animam persecuta est, denique, quando nunc summa est, abruptit somnum, & vigiliam reddit. Idem frequenter venerea facit libido, quando nunc tendit ad acmen.

§. XVI. *Motus in somno superstites.*

Sensationes & cogitationes in somniis aliquæ supersunt: sed etiam in somno vero non tanta est quies, quin magna pars corporis humani porro in motu pergat obeundo.

Et primum cordis motus per somnum pergit ( *f* ), de quo alias diximus: pergit respiratio ( *g* ): pergit motus peristalticus certe sæpe: motusque sanguinis, chyli, humorum tenuiorum, etsi lentior ( *b* ), non cessat tamen. Verum pergunt etiam nonnulli motus voluntarii, gestusque adfecti animi indices & homines edunt, & animalia, alii homines quidem potius vehementius. Equi nonnulli stantes dormiunt ( *b\** ), & in somno nobis maxilla sustinetur ( *b\*\** ). Dormientes homines laceffiti sæpe manum adhibent, qua parte sentiunt ( *i* ). Infantes per somnia, dum obversatur ipsis urinæ instrumentum, parent ( *k* ) necessitati, quam sentiunt, & propriis musculis usi lotium expellunt. In amico homo pugionem defixit, cum crederet se hostem occidere ( *l* ). Frequens est audire per somnia triste suspirantes flentesque. Sed etiam loquentes minime rari sunt, qui arcana sua quæque per somnum revelant.

Ab istorum hominum statu gradu aliquo distant *noctambuli*, frequens ( *m* ) morbi genus. Ii pro portione somniorum, animæ nunc maxime obversantium, eos exsequuntur motus voluntarios, quos vestigia mentem

( *f* ) L. IV. p. 473.

( *g* ) L. VIII. p. 264.

( *b* ) p. 598.

( *b\** ) BATHURST l. c. p. 165.

( *b\*\** ) Id. p. 166.

( *i* ) SWAMMERDAM *biol.* p. 846.

( *k* ) LUCRETIVS.

( *l* ) HERVEY *medit.* II. p. 43.

( *m* ) ARISTOTELES *gener. anim.* L. V. TITHOREUS PERICLIS servus apud LAERTIVM L. IX. HORST *hist. med.* p. 171. seqq. MURATORI p. 65. NICOLAI *Einbildungskraft* n. 95. ROEPER. *Opusc. scientif. filolog.* X. p. 23. *Bresl. Saml.* 1722. Febr.



tem occupantia requirunt. Historiarum nullus finis est; in eo conveniunt omnes, ut surgant de lecto clausis oculis, & profunde dormientes, per sua tamen cubicula, suasque ædes oberrent, neque facile (*n*) in via fallantur, aut adlidant, etiam per periculosas fenestras (*o*), & tecta equitantes. Sed etiam alia difficiliora gerunt. Vestes induunt, de domo exeunt (*p*), incendunt ignem (*q*), balneum subeunt exutis vestibus (*q*<sup>\*</sup>), verberant (*r*), equum frenant, iter sulciunt (*s*), scribunt, versus (*t*) faciunt (*u*), & variis omnino vitæ humanæ officiis (*x*) rite defunguntur, acute etiam & subtiliter (*y*).

Interim profunde dormiunt, vel clausis oculis, vel tamen non videntibus, & iride (*y*<sup>\*</sup>) non irritabili, pulsu (*z*), ut in somno, debiliori, sensibus omnibus cessantibus (*a*). Neque facile excitantur, etiam nicotiana, neque pluma in nares data, neque plagis (*b*).

Excitati, quod mirum, non solent meminisse gestorum (*c*), cum somniorum tamen soleamus adeo tenaces esse, ut olim EPICTEtus, inter sua prudentiæ consilia, etiam vetuerit sua narrare somnia.

Nihil hic est valde incredibile, & unice plures, quam vulgo solent, motus voluntarii in somnio supersunt; tum quod ejusmodi homines fortiores eos adfectus in universum ex suo temperamento patiantur, tum

- (*n*) ROEPER *Gesch. eines Nachtwandl.* HILD. Cent. II. obs. 84. 85.  
 (*o*) P. SALIUS *adfect. partic.* c. 18. MUSITANUS. In arborem picarum nidum lecturus HORST. Perit tamen alius apud HOESTETTER *disp.*  
 (*p*) KRUGER p. 79. TOZZI *med. theoret.* p. 131. JUNKER *physiol.* p. 127. WILLIS *anim. brut.* p. 171. Oculis immobilibus DEBIEU p. 176.  
 (*q*) FRITSCH II. p. 597.  
 (*q*<sup>\*</sup>) *Gazette salut.* 1762. n. 15.  
 (*r*) WILLIS.  
 (*s*) MURATORI *fantas.* p. 68. seqq. Equitabat DEBIEU p. 176.  
 (*t*) BOHN *de somnambul.*  
 (*u*) HERRS *obs.* p. 33.  
 (*x*) ESCHENBACH *obs. rar.* 19. HELMONT *orig. form.* n. 57. FIGATTI p. 40. 42. & de eodem homine MAFFEI *de fulmini* p. 144. 145. *Opusc. scientif. e filol. &c.*  
 (*y*) FIGATTI p. 45.  
 (*y*<sup>\*</sup>) G. V. SWIETEN T. III. p. 456.  
 (*z*) FIGATTI p. 46.  
 (*a*) Gustu IDEM p. 19. 20. 33. odore p. 26. Insensiles esse DEBIEU p. 176.  
 (*b*) FIGATTI p. 40. 41.  
 (*c*) IDEM p. 42. 45. NICOLAI *Einbildungsk.* n. 96.



tum quod eo ipso tempore is affectus sit potentior, & tamen simul causa somni adeo vehemens, ut ad excitandum hominem is affectus non sufficiat. Uno verbo in sensorii communis parte aliqua validum motum superesse oportet, in reliqua tota quietem. Ita sequentur ex fortiter agente voluntate motus ei potentiae subiecti, & tamen somnus manebit. Itinera cæterum sua tactu gubernant, ad topographiam adsuetorum cubiculorum menti impressam, omnino ut vigilantes per tenebras ambulare solemus.

Ob fortissimum autem affectum, & in parte sensorii communis violentum motum, hic morbus multa cum delirio communia habet, & facile in maniam transit (*d*), & perinde verberibus supprimitur, metu nempe forti excitato, qui eum peculiarem affectum animi subjuget (*e*).

(*d*) *Sat. files. T. VII. n. 7.*

(*e*) *MEIBOM de potest. flagr. p. 103.*





# I N D E X

## ELEMENTORUM PHYSIOLOGIÆ

### T O M I Q U I N T I

#### L I B E R X I I . T A C T U S .

#### S E C T I O I.

#### FABRICA ORGANI TACTUS.

<b>T</b> Actus in universum	pag. 1	9. An vascula habeat	pag. 14
2. Peculiariter sumta vox tactus	2	Ut credatur ex vasculis nasci	15
Cutis introrsum continuatur	ibid.	10. Laminæ	ibid.
Ejus fabrica cellulosa	3	Crassities varia	15. 16
Tendines eam non subeunt	3. 4	facile renascitur	16
3. Arteriæ subcutaneæ magnæ	4	abit in callos crassissimos	ibid.
Cutaneæ parvæ	ibid.	11. Laminæ epidermidis æthiopum	17
Venæ	ibid.	Reticulum nigrum	18
Vasa minorum generum	5	non perforatum	ibid.
4. Nervi numerosi	ibid.	colores varii	ibid.
Unde cutis valde sensibilis	6	12. Æthiopum color est in reticulo	19
5. An musculosi quid in cute sit	ibid.	Epidermis ex indurato reticulo con-	19. 20
Panniculus carnosus	6. 7	sistit	20
paucis locis reperitur	7	13. Causa nigri coloris æthiopum	20. 21
neque cutis musculosa est	8	an ex æstuosa regione	21
6. Papillæ	ibid.	sudore fusco copioso	21
Omnino aliquæ	ibid.	sanguine atro	22
sub ungue	9	14. An detur omnino seminalis proprietas	23
in glande penis, breves	ibid.	quæ propagetur in filios	23
alibi	9. seq.	Varietas generis humani	24
7. Papillarum fabrica	9	Ex morbis nigri	24. 25
Recipiunt nervos	ibid.	Causa coloris æthiopum	25
Arterias	10	15. Ungues	26
colligatas celluloso textu	ibid.	Radix finitium	ibid.
8. Epidermis	11	Pars sulcata	27
Exterior	ibid.	Reticulum	ibid.
Interior	11. 12	epidermis	28
fabrica	12	papillæ	ibid.
Sulci	ibid.	16. Ungues renascuntur	29
nexus cum cute	13	Utilitas	30
squamas habere dicitur	ibid.	17. Pili	31
sed plana est	ibid.	homo pilosum est animal	ibid.
		Pili in adipe radican- tuntur	32
		18. Fabrica pilorum	33
		Bulbus	33. 34.
		In eo sanguis	34
		Pilus ad epidermidem usque	ibid.
		Vagina	



Vagina epidermidis	pag. 35
Cortex	ibid.
medulla	ibid.
19. Color in variis regionibus	35. 36
crassities	36
robur	ibid.
Canities	37
Rectitudo, crispitas	37
incrementum	38
analysis chemica	39
20. Folliculi cutanei	39
ductus muciferi piscium	ibid.
cochlearum	40
succu viscosi cutis humanæ	ibid.
Fontes, Cryptæ	ibid.
sebaceæ glandulæ	41. 42
21. Glandulæ sudoriferæ	42
num dentur	43
22. Pinguedo cutem obungens	43. 44
per poros effluit	44
& secundum pilos	ibid.
23. Vasa sudorifera	45
arteriosa	ibid.
Sudor per glandulas	46

## S E C T I O II.

### SUDOR. EXHALATIO. IN- HALATIO.

1. Sudor in universum	46
Causa sudoris	47
Calor	ibid.
2. Materies sudoris	48
Color	ibid.
Odor	ibid.
a cibis	49
a morbis	ibid.
admixtus adips	ibid.
sanguis	50
alia	ibid.
3. Sudor non est a natura	50. 51
qui juvet	ibid.
& noceat	ibid.
copia sudoris	ibid.
4. Perspiratio insensibilis in universum	52
5. Ejus elementa	ibid.
ut conspicua reddatur	52. 53
Aqua exhalans	ibid.
6. Materies electrica	54
sponte adparens	54
post electricum torrentem excitatum	54. 55

7. Partes volatiles fætidae	pag. 55. 56
Sagiuntur a canibus	56
8. Particulæ potus, aquæ	57
cibi	ibid.
9. Ut a sudore materies perspirans differat	57
ut cutis perspiret	ibid.
imitatur injecto liquore	ibid.
fit per arterias	59
10. Mensuræ perspirationis	ibid.
SANCTORII experimenta	ibid.
DODARTI	60
KEILII	ibid.
RYE	ibid.
C. LININGS	ibid.
FRANCISCI HOME	ibid.
modus, ut experimenta facere oporteat	ibid.
11. Quid oporteat cavere	61
mensura ut certa instituat	ibid.
12. Perspiratio in regione boreali. Scotia	62
Hibernia	ibid.
Hæc fusa per totum annum	62. 63. 64
Corollaria experimentorum	64
KEILII experimenta	65
ROBINSONI	ibid.
HARTMANNI.	65. 66
DODARTI	66
13. In regione calida	ibid.
experimenta SANCTORII	ibid.
Cl. LININGS	68
Omnium corollaria	ibid.
14. Quæ perspirationem augeant	69
1. motus musculorum auctus	70
hinc hiemalis perspiratio major	70. 71
Torrens electricus	71
Ira, aer calidus	71. 72
15. 2. Aucta portio materiei perspirabilis	ibid.
a sumtis cibis	73
& digestis	73. 74
facileque subactis	74
16. 3. Cutis laxa	ibid.
a lecto	ibid.
hinc perspiratio per somnum major	74. 75
& a balneo	76
17. Quæ perspirationem minuant	77
Aer humidus	ibid.
frigidus	77. 78
Ciborum defectus	ibid.
mala coctio	ibid.
alia secretio uberior	79
Cutis dura	80
18. Utilitas perspirationis	ibid.
K k k k 3	ad



ad cutem solam	pag. 80
ad universum corpus	ibid.
morbi ex retento perspirabili	81. 82
19. Alii hæc credunt nimia esse	ibid.
Perspirationis diminutiones absque morbo	82. 83
& augmenta cum incommodo	83. 84
Ex pondere perspirationis decrementum non colligitur	84
Debilitas est a materie febrili vires frangente	84
20. Inhalatio	85
Cutis humana pervia est	85
per poros in venas ducentes	ibid.
exemplo hydrargyri	ibid.
Arsenici	86
Olei	ibid.
Veneni vegetabilis	87
Veneni venerei	88
Vaporum salubrium	ibid.
Vaporis aquei	ibid.
Inhalatio in aere humido	89
Argumentum repetitum a lotio potum multum superante	89. 90
Inhalatio sub cuticula	91
21. Augmenta inhalationis	ibid.

## SECT. III. TACTUS IPSE.

1. Tactus proprie dictus quid sit	91. 92
Pulpa nervea adfricatur ad corpora, quæ volumus cognoscere	92
Digitorum prærogativa	ibid.
num papillæ erigantur	93
2. Quæ corporum qualitates per tactum innotescant. Figura	93. 94
Asperitas	93
Duritas	94
Calor	ibid.
Distantia	ibid.
3. Num minus, quam reliqui sensus, tactus fallat	95
Tantum de corporibus extraneis indicat, quantum per velamenta cutis licet	ibid.
nimis subtilis	ibid.
nimis acer	96
Consuetudo	ibid.
4. Adfectiones corporis humani ex tactu natae	96. seqq.
Voluptas	96. 97
dolor	97. 98
5. Epidermidis necessitas	98
muci malpighiani	ibid.
pilorum	ibid.

## LIB. XIII. G U S T U S.

## SECTIO I.

## ORGANUM EJUS SENSUS.

1. Est lingua	99
Et ad sapores acres aliæ partes oris	99. 100
2. In lingua sunt papillæ	100
Earum Classis 1. truncata	100. 101
3. 2. Obtusæ	102
fungiformes	ibid.
3. Conicæ	ibid.
4. Minimæ	ibid.
Rugæ	103
4. Fabrica papillarum	ibid.
sunt conglomeratæ	ibid.
ex tela cellulosa	ibid.
vasis	104
nervis	ibid.

5. Involucrum linguæ mucosum s. Epidermis	104
Inventores hujus involucri	105
6. Fabrica quadrupedum	106
papillæ longæ	ibid.
vaginæ ab epidermide	ibid.
corpus reticulare perforatum	ibid.
7. Glandulæ linguæ simplices	107
foramen cæcum linguæ	108. 109
8. Arteria lingualis	109
sublingualis	ibid.
ranina	110
arteriæ linguæ aliæ	ibid.
9. Venæ linguæ	ibid.
submentalis	ibid.
superficialis linguæ	ibid.
Ranina	ibid.
Vena profunda	111
dorsales venæ	ibid.
Ductus	



Ductus COSCHWIZIANUS venis fit p.	111
Vasa lymphatica linguæ	ibid.
10. Nervi linguæ	112
Uter gustet quintus an nonus	ibid.
Rationes utriusque sententiæ	ibid.
Potius quintus	ibid.
Aut uterque	113
11. Papillæ buccarum	ibid.
& labiorum	ibid.

## S E C T I O I I.

## G U S T U S I P S E.

1. Tactus in lingua exercetur	114
2. & gustus	ibid.
Oportet fluida esse quæ sapiunt	115
& penetrare per involucrum linguæ	ibid.
humor oris saporem imprimit salivæ	ibid.
Oportet inesse salem	116
3. Saporum classes	116. 117
& gratia saporum	ibid.

4. Corpora sapida	pag. 118
Acida vegetabilia	ibid.
Animalia	ibid.
fossilia	ibid.
Dulcia sunt acida	ibid.
Amara quæ	118. 119
Salsa	ibid.
mineralia pauca saporem habent	120
5. Figura crystallorum salium	ibid.
An cuius sal propria figura	121
an ea a salis specifico acore	ibid.
an ab ea figura certus suusque sapor	ibid.
nam ejusdem salis modo hæc crystallorum	
figura est	122
& modo alia	ibid.
& diversorum salium eadem figura	123
Unde ergo sapores	ibid.
6. Utilitas gustus	ibid.
ad dignoscendos utiles cibos	124
Tamen bestiarum in iis dignoscendis sal-	
luntur	ibid.

## L I B. X I V. O L F A C T U S.

## S E C T I O I.

## EJUS SENSUS ORGANUM.

1. Nasus	125
Officula nasi	ibid.
maxillæ superioris processus nasalis	ibid.
2. Cartilagines nasi	126
Superiores	ibid.
mediæ	ibid.
inferiores	126. 127
Septum narium	127
3. Musculi nasi	127. seqq.
Levator alæ nasi	ibid.
Procerus	ibid.
Compressor nasi	128
Depressor alæ nasi	ibid.
Fasciculus anomalus	ibid.
Nasalis labii superioris	128. 129
4. Cavæ nares	129. seqq.
Universa cavea	ibid.
5. Meatus peculiare	130
imus	ibid.
medius	ibid.
supremus	131
6. Os cribrosum	131. seq.

Ejus lamina descendens	pag. 131
pars media cribrosa	ibid.
Ejus processus eminens	131. 132
lamina media	132
7. Partes laterales	132. seq.
cellulæ Ethmoideæ	132. 133
Os plenum	133
corniculum sphenoides	134
Os spongiosum superius, vel medium	134. 135
Ejus lamina descendens	135
8. Os spongiosum infimum	135. 136
Ejus laminæ foliaceæ	136
9. Septum narium	137
Pars ossea	ibid.
Pars cartilaginea	ibid.
sæpe curvum est	138
10. Sinus pituitarii	138. seq.
— frontales	ibid.
Ostium eorum	139
Alia historica	ibid.
11. Sinus sphenoides	140
Situs varius	ibid.
Ostium	140. 141
12. Sinus maxillaris	141. seqq.
Ostia	



Ostia. Conspicuum & vulgo notum	pag. 141. 142	4. Summarum sunt virium	pag. 159
Appendix ejus sinus	142. 143	& vires medicas	ibid.
Cellulae orbitariae	143	aut venenatas continent	ibid.
13. Membrana pituitaria narium	143. 144	faciunt subitos magnosque effectus	
14. Glandulae ejus membranae	144. 145	etiam tenues sed averfati odo-	
de iis dubitatur	145	res	160. 161
confirmantur	ibid.	maxime putres	161. 162
Vasa mucosa in animalibus	146	etiam narcotici	162
15. Villi membranae pituitariae	ibid.	aromatici & acres	ibid.
dubiae naturae	ibid.	& alentes	ibid.
16. Arteriae narium	147. seqq.	5. Classes odorum	ibid.
a maxillari interna	ibid.	Possunt tamen odores diverforum	
ramus superior	ibid.	corporum in commune genus col-	
inferior	ibid.	ligi	ibid.
ab arteria ethmoidea anteriori	148	Odorum classes. Ambrosiaci	163
posteriori	ibid.	animalium	ibid.
ab ophtalmica, ad sinum frontalem	ibid.	plantarum	ibid.
ad nares	ibid.	minerarum	164
a carotide interna	ibid.	Odores alii grati varii plantarum	164. 165
ab infraorbitali	149	etiam animalium	165
a dentali superiori posteriori	ibid.	minerarum	ibid.
a palatina	ibid.	6. Odores medii varii	165. 166
hae arteriae sanguinem facile sudant	150	7. Faetores	ibid.
17. Venae narium	ibid.	Odor cadaveris	ibid.
18. Nervi narium	151	stercoris	ibid.
a pari primo	ibid.	olei corrupti	167
19. Ab ophthalmico quinti paris ramo	152	casei	ibid.
a secundo ramo quinti	ibid.	vires aphrodisiacorum	ibid.
Postiores narium nervi	153	allium	ibid.
ab infraorbitalibus	ibid.	odor hyftericus	ibid.
a palatinis	ibid.	alii faetores	ibid.
ab alveolaribus	ibid.	8. Causae odorum	167. 168

## S E C T I O I I.

## C O R P U S C U L A O D O R A.

1. Eorum historia fere desideratur	154	acutam	ibid.
2. Effluvia odora de plerisque corpori-		& naturam volatilem	ibid.
bus exeunt	ibid.	aliae causae odorum	ibid.
etiam metallis	155	Commistio	ibid.
lapidibus	ibid.	aliae	170
Animalibus	ibid.	9. Causa gratiae	ibid.
Vegetabilibus	ibid.	aliquae sunt arbitrariae	ibid.
Effluvia inodora	156	aliae in natura radican- tur	ibid.
an odor a phlogisto	ibid.	Gratia videtur esse in mediocritate	
nondum certum est	ibid.	odoris	ibid.
3. Corpuscula odora sunt tenuissima	157	ut possit alteri placere odor, qui al-	
calculis positis id ostenditur	157. 158	teri displiceat	171
alia exempla	158	10. Num eadem causa odoris quae sapo-	
tamen per vitrum non transeunt	ibid.	ris	ibid.
		Qui adfirmant	ibid.



Est tamen discrimen pag. 171  
Ad odorem pertinet natura volatilis,  
non ad saporem 172

## S E C T I O I I I.

## S E N S U S I P S E O L F A C T U S.

1. Modus quo olfacimus 172. 173  
per vires inspirationis 173
2. Num particulæ odoræ ad cerebrum ve-  
niant ibid.  
non videtur 174
3. Organum olfactus est in naribus ibid.  
quæ in earum parte ibid.  
signa ejus partis 175  
reperiuntur in ossibus spongiosis 176  
non excluduntur aliæ narium partes 177  
Aliis locis tamen acrior odor, aliis de-  
bilior est ibid.
4. Quis sit nervus proprie olfactorius 177. 178  
Et primus est 177

- & quintus pag. 178  
Cur hi nervi in naribus odores per-  
cipiant ibid.  
sunt nudiores quam alibi ibid.  
Aliis hominibus magis, minus aliis 179
5. Muci necessitas 180  
Temperare violentiam odorum ibid.  
ut mucus de naribus exeat 180. 181  
resorbio quæ in naribus fit ibid.
  6. Mucus non est a cerebro 181. 182
  7. Olfactus utilitas 182  
Ad dignoscendos cibos salubres ibid.  
Fatida minus salubria sunt 182. 183  
non credas grate odora insalubria  
esse 183  
vires medicatas olfactus detegit ibid.  
Animalibus reliquis magis necessarius  
est 184  
nulli negatur ibid.  
utilitates secundæ: ad refocillationem  
hominis exanimis 185  
ad vocis robur & gratiam ibid.

## L I B E R X V. A U D I T U S.

## S E C T I O I.

## F A B R I C A O R G A N I.

1. Divisio 186
2. Auricula ibid.  
in quibus sit animalibus ibid.  
ejus natura 187  
ligamenta. Cellulosa tela 188  
Ligamentum posterius ibid.  
——— anterius ibid.
3. Particulæ auriculæ 189  
Helix ibid.  
Anthelix ibid.  
Scapha ibid.  
innominata cavitas ibid.  
concha ibid.  
Tragus 190  
Antitragus ibid.  
lobus ibid.
4. Musculi auriculæ 190

- Eæ nonnullis hominibus mobiles ibid.  
Veros habent musculos 191
5. Musculi majores. Retractor 191. 192  
Levator 192  
Anterior 192. 193  
Fibræ a musculo occipitali 193  
a latissimo colli ibid.  
aliæ ibid.
  6. Musculi minores, qui in cartilaginea  
auricula manent 193. seqq.  
Antitragicus 194  
Tragicus ibid.  
Musculus helcis major ibid.  
& minor 195  
Transversus auriculæ ibid.
  7. Meatus auditorii pars ossea 195  
pars membranæa ibid.  
pars cartilaginea 196  
anuli tres ibid.  
Incisuræ duæ ibid.

Musculus



- |   |           |                                       |            |
|---|-----------|---------------------------------------|------------|
| Musculus incisuræ majoris               | pag. 196  | in stapedis musculo                   | pag. 215   |
| 8. Meatus auditorius osseus             | 196. 197  | sub crure incudis breviori            | ibid.      |
| Membranæ ejus                           | ibid.     | 19. Ligamenta mallei posterius.       | ibid.      |
| Cutis sentiens                          | ibid.     | Anterius                              | ibid.      |
| epidermis                               | ibid.     | Incudis. ligamenta                    | 216        |
| 9. Glandulæ ceruminosæ                  | 198. 199  | & stapedis                            | ibid.      |
| Cerumen                                 | ibid.     | Varietates                            | ibid.      |
| 10. Anulus, qui membranam tympani       |           | 20. Musculi mallei                    | 216. seqq. |
| continet                                | 199. 200  | Internus EUSTACHII                    | ibid.      |
| 11. Membrana tympani                    | 200       | ejus situs                            | ibid.      |
| ejus figura                             | ibid.     | insertio ejus tendinis                | 217        |
| duplex impressio                        | 201       | Verus musculus est                    | ibid.      |
| laminæ quatuor                          | ibid.     | tendit membranam tympani              | ibid.      |
| in plerisque animalibus reperitur       | ibid.     | 21. Musculus mallei externus Folia-   |            |
| Inventores                              | 202       | nus                                   | 218        |
| 12. In ea membrana foramen esse dicitur | ibid.     | Parum habet naturæ musculosæ          | ibid.      |
| Ejus rei vetusta vestigia               | ibid.     | Musculus externus CASSERIANUS         | 219        |
| etiam practica                          | 203       | & ipse exigui momenti                 | ibid.      |
| & physica                               | 203. 204  | 22. Stapideus                         | 220        |
| Accuratius descripsit RIVINUS           | ibid.     | Ejus officium                         | ibid.      |
| 13. Qui aliter senserint                | 204. 205  | 23. Cellulæ mastoideæ                 | 221        |
| Experimentis non confirmatur            | 205       | Prima sive antrum                     | ibid.      |
| aliter exponuntur phænomena             | ibid.     | Cellulæ supra processum mammilla-     |            |
| 14. Tympanum                            | 206       | rem                                   | ibid.      |
| Ejus situs & partes                     | ibid.     | in eo processu                        | 221. 222.  |
| periosteum                              | 207       | 24. Tuba EUSTACHIANA                  | 222        |
| 15. Officula in tympano                 | ibid.     | ejus origo in tympano                 | 223        |
| Malleus                                 | ibid.     | pars extra cranium                    | 224        |
| in animalibus frigidis                  | 207. 208  | Inventores & historia                 | 224. 225   |
| quadrupedibus                           | ibid.     | 25. Ut in tympanum pateat             | 225        |
| inventio                                | ibid.     | ut subeat aer                         | ibid.      |
| figura                                  | 209       | semper aperta est                     | ibid.      |
| caput                                   | ibid.     | an dilatetur a musculo suo            | 226        |
| processus brevis                        | ibid.     | ut comprimatur                        | ibid.      |
| processus longissimus                   | 209. 210  | 26. Fenestræ. Ovalis                  | 227        |
| Ejus inventores                         | 210       | rotunda                               | ibid.      |
| manubrium                               | ibid.     | 27. Foramina minora vasculosa         | 227. 228   |
| 16. Incus                               | 210. seq. | 28. Vestibulum                        | 228        |
| Ejus sedes                              | 211       | Ejus recessus                         | 228. 229   |
| Caput                                   | ibid.     | Pulpa                                 | ibid.      |
| cuius breve                             | ibid.     | Foramina eo patentia                  | ibid.      |
| crus longius                            | ibid.     | 29. Canales semicirculares in univer- |            |
| 17. Stapes                              | 212       | sum                                   | 230. 231   |
| Inventores                              | ibid.     | 30. Sigillatim                        | 231. seqq. |
| situs                                   | ibid.     | Superior                              | 231        |
| cruscula                                | ibid.     | Inferior                              | 232        |
| basis                                   | 213       | Exterior                              | ibid.      |
| membranula                              | ibid.     | 31. Cochlea                           | 233        |
| fabrica avium                           | ibid.     | in fetu                               | ibid.      |
| 18. Officuli subrotundi historia        | 214       | situs                                 | ibid.      |
| alia officula, inter malleum & in-      | ibid.     | 32. Ejus partes. Modiolus             | 234        |
| cudem                                   | ibid.     | Infundibulum                          | ibid.      |
| in musculo mallei interno               | 214. 215  | 33. Cochleæ canalis integer           | 235        |
|   |           | Septum                                |            |



Septum osseum	pag. 235	3. Ut sonus fiat, oportet minima elementa	
Septum membranaceum	236	contremiscere	pag. 251. 252
Finis septi & communicatio	scala-	hinc franguntur facile corpora sonora	252
rum	ibid.	Vitra ab humanæ vocis vi dissiliunt	ibid.
34. Scalæ cochleæ.	237	4. Sonus transmittitur per corpora so-	
Scala vestibuli-	ibid.	lida	253. 254
Scala tympani	ibid.	Huc phænomena fornicum resonan-	
35. Antrum nervi septimi	238	tium	255
Recessus superior	ibid.	5. Sonus etiam per aquam transmitti-	
Inferior	239	tur	255. 256
ejus finis cæcus anterior	ibid.	Neque pertinet ad aerem, qui aqua	
posterior	ibid.	contineatur	256
36. Nervi acustici	ibid.	6. Sed imprimis per aerem sonus pro-	
Duo, tres, ad quinque	240	pagatur	257
37. Nervi in vestibulo	ibid.	quare augetur in aere compresso	ibid.
Nervi vestibuli sigillatim	241	diminuitur in rarefacto	257. 258
Eminentia pulpofa	ibid.	& exstinguitur demum	258
Membrana suspensa	ibid.	redditoque aere restituitur	259
Nervi canalium semicircularium	241. 242	7. Ut aer sonum concipiat & propa-	
38. Nervi cochleæ	242. 243	get	259. 260
Quæ minus manifesta sint	ibid.	Undæ sonoræ	260
39. Nervi auriculæ externi	243. seq.	8. Soni propagatio	ibid.
a pare quinto	ibid.	& diminutio, ut propagatur lon-	
a cervicali secundo & tertio poste-		gius	260. 261
rior	243. 244	Sonorum gravium robur	261
Anterior	244	quam longe sonus propagetur	ibid.
40. Arteriolæ organi auditus	ibid.	9. Ut soni robore crescant	262
ab auriculari posteriori	244. 445	Non videntur undæ sonoræ flecti	ibid.
a temporali	ibid.	Vis elliptici fornicis	ibid.
ab occipitali	ibid.	Vis speculi parabolici	263
a maxillari interna	ibid.	& tubæ parabolicæ	ibid.
a stylomastoidea	ibid.	& ellipseos cum parabola conjunctæ	ibid.
a meningea	245. 246	conservatur sonus in cylindris cavis	ibid.
a carotide interna	246	robore augetur in tubis conicis	ibid.
a pharyngea	ibid.	& spirilibus	263. 264
a vertebrali trunco s. arteria au-		10. Ut augeatur	264
ditiva	ibid.	a sono renato ex tremore corporum	
41. Venæ organi auditus	247. 248	ambeuntium	ibid.
42. Vasa lymphatica	248	Corpora dura resonant	265
Nodosa quidem nulla	ibid.	non, mollia	ibid.
Aquæductus Cl. COTUNNI	248. seq.	11. Sonus reflexus & redux ad suum	
Aquæductus vestibuli	249	fontem s. Echo	265. seq.
— cochleæ	ibid.	distantia necessaria	266
		Ut fiat Echo sæpius repetens	266. 267
		12. Soni celeritas	267
		ut mensuretur	267. 268
		mensuræ variæ	268
		discrimina	268. 269
		Soni fortes non propagantur celerius	ibid.
		Neque sonus fatigatur eunde	ibid.
		13. Numerus oscillationum corporis sonori	270
		major in sono acuto	ibid.
		minor in gravi	ibid.
		L 1 1 1 2	Vibra-

## S E C T I O I I.

## S O N I T H E O R I A P H Y S I C A.

1. Collectitia traditur	250
2. Sonus est tremor	ibid.
& oscillatio corporis sonori alterne	
amplioris	ibid.
Resonant sola corpora dura	251



Vibrationum numerus cifris expres-	pag. 271
fus	ibid.
14. Causæ discriminis tonorum	ibid.
Tensio chordarum, corporumve sonan-	272
tium durities varia	ibid.
Longitudo chordarum	273
crassities	ibid.
& numeri ex istis compositi	273. sq.
15. Proportiones numeri vibrationum	274
Octavæ &c.	275
16. Tremores sympathici	276
per solida corpora propagati	ibid.
per aerem	277
An dentur particulæ diversimode ten-	ibid.
sæ in singulis corporibus	277
Ab iis tremoribus fracti scyphi	ibid.

## S E C T I O I I I.

## A U D I T U S I P S E.

1. Radii sonori colliguntur in meatum	278	& cochleam	pag. 289
auditorium	279	& contremiscunt earum partium	290
Utilitas auriculæ	280	nervi	ibid.
2. Percellitur membrana tympani	ibid.	Aer ea sede nullus	ibid.
id soni iter demonstratur	281	7. Quæ sit vera sedes sensus audi-	290. seq.
Obsurdescit a perforata membrana	282	tus	291
3. An possit pro arbitrio tendi	283	est in intimis	ibid.
aut ad unisonum cum aliis tonis ac-	ibid.	inque nervo auditorio	ibid.
commodari	284	non tamen in solo vestibulo	ibid.
a voluntate	ibid.	An in canalibus semicircularibus	292
vel mechanica necessitate	285	Num pisces audiant	ibid.
4. Officula tremores recipiunt	285	In cochlea omnino	293
& deferunt	286	Objectio solvitur	ibid.
Auditus perit officulis destructis	287	tamen etiam in canalibus semicircula-	294
Acrior est animalibus quæ osficula	ibid.	ribus	295
habent	ibid.	8. Omnino in toto nervo molli	295
5. Tubæ officium	286	ab ossibus partibus percusso	295. 296
Sonos admittit	287	9. Quid ad auditum faciat nervus durus	297
ab obstructa surditas	286. 287	ut adficiatur a sonis acutis	ibid.
non agit inter inspirandum	287	10. An nervus aliquis de interna aure ad	298
Creditur per eam aerem cedere	ibid.	cerebrum redeat	ibid.
& renovari	ibid.	non videtur	ibid.
& temperari	288	11. Cur unicus sonus audiatur	298. seq.
& ad respirationem accommodari	ibid.	Quomodo in unum consentiant soni	299
6. Fenestræ rotundæ officium	ibid.	primigenii, cum accessoriis	ibid.
Tremores in vestibulum veniunt	289	Cur duabus auribus unicus sonus ex-	300
inque canales semicirculares	ibid.	audiatur	301
		Aures virium inæqualium	ibid.
		12. Diversi homines diverso modo au-	302
		diunt	ibid.
		Auditus nimis acutus	303
		Nimis gravis	ibid.
		13. Soni non gratiosi. Nimis acuti	304
		Nimis graves	ibid.
		Cur placeant certi modi & successio-	305
		nes tonorum propriæ	ibid.
		Num a facilitate numerandorum nume-	306
		rorum	ibid.
		non videtur	ibid.
		Causa ignoratur.	ibid.
		14. Effectus musices ad adfectus animi	307
		perducendos	ibid.
		tristitiam	ibid.
		lætitiam	ibid.
		Videntur ista ex lege adfociationis idea-	ibid.
		rum fieri.	308
		Ut morbi musicis sonis sanentur	ibid.
		Tarantula fabulosa	ibid.
		Num homo auditu excelleat.	ibid.



## LIBER XVI. VISUS.

## SECTIO I.

## OCULI TUTAMINA.

1. Introductio	pag. 306	in homine	pag. 323
2. Oculi in universum	ibid.	MONROI jun.	324
Quænam animalia oculis prædita	ibid.	& HUNTERI inventa	ibid.
sint	ibid.	14. Lacrumæ pars exhalabilis	ibid.
iisve careant	307	15. Natura lacrumæ	325
Pleraque tamen vident	ibid.	regeneratio	ibid.
Oculorum numerus	ibid.	utilitas	ibid.
Par unum	ibid.	16. Causa cur fluant lacrumæ	ibid.
duo	ibid.	acre oculis inimicum	325. 326
tria	ibid.	Sanguis congestus	ibid.
quatuor	ibid.	Adfectus tristis	326
quinque	ibid.	Etiam bestię flent	ibid.
sex	308	17. Quo ferantur lacrumæ	326. 327
septem	ibid.	Pars resorbetur	327
octo	ibid.	Pars ad nares venit	ibid.
monoculi	ibid.	18. Caruncula lacrumalis	327. 328
Pentophthalma animalia	ibid.	19. Palpebra tertia	328
3. Supercilia	309	Ejus in animalibus varietates	329
4. Membrana epicrania	309. seq.	20. Puncta lacrumalia	330
Pericranium	ibid.	Inventores	ibid.
Tela splendens cranio imposita.	Epi.	Varietates	331
crania	310	21. Ductus lacrumales	ibid.
5. Musculi occipitales	311	superior	ibid.
Frontales	ibid.	inferior	ibid.
Fines eorum qui Proceri	312	insertio in faccum	332
Officium	312. 313	historia	ibid.
6. Corrugatores supercilii	313	22. Saccus lacrumalis	333. 334
eorum actio	314	An aliunde lacrumas habeat	334
7. Palpebræ in universum	314. 315	23. Ductus nasalis	335
Summa necessitas	315	Ejus ostium	335. 336
8. Palpebræ majores	315. seq.	Aliæ lacrumæ viæ	336
Ut ex cute nascantur	316	24. Musculus orbicularis palpebrarum	ibid.
Epidermis earum	317	Ligamentum	317
Sensus acer	ibid.	stratum extra orbitam circumductum	ibid.
9. Tarsus	318	stratum palpebris inpositum	ibid.
Cilia	ibid.	Officium musculi	338
10. Glandulæ sebaceæ palpebrarum	318. 319	25. Lacrumæ iter ad nares	339
inventarum historia	319. 320	Adtrahi videtur	ibid.
Earum sebum	320	omnino nares subit	340
11. Intervallum palpebrarum	ibid.	neque ex sacco per puncta prodit	ibid.
Ligamentum tarforum	ibid.	26. Musculi palpebrarum diductores	341
12. Glandula lacrumalis vera	321	Levator	ibid.
in quibus sit animalibus	322	Musculi palpebræ inferioris	342
13. Ejus ductus excretorii	ibid.	Motus palpebrarum voluntarius est	343
in animalibus a STENONIO detecti	ibid.	27. Orbita	ibid.
		Pars ejus frontalis	344
		nasalis	ibid.
		temporalis	ibid.



## S E C T I O II.

## O C U L U S I P S E. 345

1. Globus oculi	pag. 345
figura	346
magnitudo	ibid.
2. Nervus opticus	ibid.
Omnino visum facit	347
Unio utriusque nervi optici	347. 348
Constans in quadrupedibus	348
Avibus	ibid.
piscibus	ibid.
num decussentur nervi optici	349
num contra, quisque sui lateris oculum adeat	349. 350
num utriusque medulla misceatur	350
Pro ea sententia	ibid.
Ad eam respondetur non tamen repudiatur	351
3. Iter nervi optici per orbitam adaptatio ad oculum	352
4. Fabrica ejusdem	353
Septa cellulosa	ibid.
medulla	354
Arteriola	ibid.
Porus	355
Anatome comparata	ibid.
5. Sclerotica tunica	356
num continuetur cum dura membrana cerebri	ibid.
Rationes adfirmantium non videtur continuari	357
6. Lamina nigra tunicae scleroticæ	358
7. Cornea tunica	ibid.
figura convexa	359
conjunctio cum sclerotica obliqua	ibid.
Ejus involucria peculiariora	360
8. Corneæ tunicae color	360. 361
laminæ	361
humor	ibid.
pori	362
vasa	ibid.
nervi & sensus	363
regeneratio	ibid.
9. Chorioidea tunica	ibid.
Nervi optici ingressus in oculum	ibid.
lamina cribrosa	364
ab ejus foraminis ambitu nascitur chorioidea	ibid.
ut se habeat in avibus	ibid.
in piscibus	ibid.
ibi duæ aut tres membranæ pro chorioidea	ibid.

& musculus circularis	pag. 365
non oritur a sclerotica	ibid.
fabrica ejus & color	ibid.
facies interna	365
tapetum	366
lamina RUYSCHIANA	ibid.
orbiculus ciliaris	367
Chorioideæ perpetuitas	ibid.
10. Iris	367
num oriatur a chorioidea	ibid.
anulus est ovalis	368
convexus	ibid.
perforatus. Pupilla	ibid.
Uvea	368. 369
flocculi iridis	369
& striæ	ibid.
& arcus	ibid.
mutabilis figura	ibid.
color	370
Uveæ facies posterior	ibid.
striæ uveæ radiatæ	371
nullæ striæ anulares	ibid.
neque radiatæ certo musculosæ sunt	ibid.
neque iridis sensus est de accuratioribus	372
11. Membrana pupillaris	ibid.
quando evanescat	373
de inventoribus	ibid.
12. Pupillæ motus	374
Arctatur in luce	ibid.
Laxatur in tenebris	ibid.
Limites	375
Laxatur etiam ad remotiora	ibid.
Arctatur ad proxima accurate videnda	ibid.
ut is motus debilitetur & pereat	ibid.
a morbis	376
Laxatur in ipsa morte	ibid.
Constringitur in valida irritatione	ibid.
Causa hujus motus non est in iride	ibid.
quare in oculo minus sensibili motus pupillæ pereat	377
Ut per ætatem mutetur	ibid.
num a voluntate pendeat	ibid.
non videtur	378
num muscularis motus sit	ibid.
num detur sphincter pupillæ	ibid.
non videtur	ibid.
Causa est irritatio nervea	ibid.
inflammationis genus	379
Aliæ hypotheses	ibid.
experimentum paradoxon	ibid.
13. Corpus ciliare	379. seq.
ejus origo	380
striæ	381
Piscibus nullum est	ibid.
	Neque



Neque striæ lenti crystallinæ infiguntur	pag. 381	19. Lens crystallina	pag. 397
sed mucî ope adherent	382	magnitudo varia	ibid.
quare adhæsiô putredine solvitur	ibid.	color	ibid.
fabrica ejus corporis membranacea	ibid.	flavescit in homine	ibid.
14. Niger oculi mucus	382. 383	& opaca fit	ibid.
Anulus mucosus	383	ut a venenis se habeat	398
Unde oriatur	384	Figura varia	ibid.
Glandulæ nucleæ in oculo	ibid.	in diversis animalibus	399. 400
15. Retina tunica	384. seqq.	in homine	400
nomen	384	Diametri	ibid.
ut oriatur retina ex medulla cerebri	385	mensuræ	401
ut ex origine pergat	ibid.	densitas, quam aquæ major	ibid.
ut oriatur in avibus	386	non ea refractione quæ vitri	402
in piscibus	ibid.	quanta sit	ibid.
ut antèrius finiatur	ibid.	Indurescit per ætatem	ibid.
lamina avium peculiaris	ibid.	Vallecula vitrei humoris	403
num etiam in homine reperiatur	387	20. Capsula lentis crystallinæ	ibid.
negatur	ibid.	firma, pene cornea	ibid.
Videtur tamen reperiri	388	pellucida	404
Retina acute sentit	ibid.	tamen opaca redditur	ibid.
habet vasa numerosa	ibid.	a capsula libera	405
& in piscibus fibras	389	aquula distincta	ibid.
etiam in avibus	ibid.	quæ videtur exhalans esse vapor	406
& nonnullis quadrupedibus	ibid.	21. Ejus lentis fabrica	ibid.
duplicemque laminam	ibid.	nucleus	ibid.
Fabrica insectorum	390	Diffusio in radios	407
16. Pecten avium	390. 391	in laminas	ibid.
Est sustentaculum lentis crystallinæ	391	in fibras	408
non est bursula	ibid.	Tela cellulosa	ibid.
neque musculus	ibid.	non est humor	409
Sustentaculum ejusdem lentis in piscibus	ibid.	neque renascitur	ibid.
Arteria circularis vitrei corporis	391. 392	Analysis chemica	ibid.
Arteria centralis ejusdem corporis	392	22. Humor aqueus	ibid.
17. Membrana vitrea	ibid.	ejus antiquitates	ibid.
Inventor	ibid.	Piscibus parvus	ibid.
vere adest in humano corpore	ibid.	Abundat avibus	410
finis anterior	393	etiam homini	ibid.
laminæ duæ	ibid.	nonnunquam turbatur	ibid.
anterior	ibid.	Ejus copia	ibid.
posterior	ibid.	non cogitur ab acidis liquoribus	ibid.
Interceptus canalis striatus	393. 394	Brevi reparatur amissus	411
18. humor vitreus	394	vel in vulneribus hominis	ibid.
magna ejus copia	ibid.	vel in experimentis bestiarum	ibid.
aquea natura	ibid.	vel ab exempta lente crystallina	412
densitas major	395	Oritur ex arteriis	ibid.
visciditas	ibid.	Num ex NUCKIANIS fontibus	413
membranulæ internæ & cellulæ.	395. 396	Si sunt arteriæ ciliares longæ	ibid.
Ut ad venena se habeat	396	Resorbetur idem	414
dicitur renasci	ibid.	23. Camerae oculi quid	ibid.
		Anterior	ibid.
		Posterior	ibid.
		Mensuræ	415
			Posterior



- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Posterior minor est<br>experimenta in oculo congelato<br>Tamen aliqua posterior est<br>Lens uveæ proxima  | pag. 415<br>ibid.<br>416<br>ibid.  | 32. Arteriæ ciliares. Posticæ<br>inter eas minores posteriores<br>earum finis<br>An dent ramos ad lentem crySTALLI.   | pag. 431<br>432<br>ibid.   |
| 24. Musculi oculi<br>In animalibus<br>non ab ossibus oriuntur<br>Recti in universum<br>Superior<br>Internus<br>Externus<br>Inferior<br>motus eorum singuli<br>& conjuncti | ibid.<br>ibid.<br>417<br>417. 418<br>ibid.<br>ibid.<br>418. 419<br>419<br>ibid.<br>ibid. | ad vitreum humorem<br>33. Arteriæ ciliares longæ<br>Arteriæ ciliares anteriores<br>circulus uveam amplexus<br>Inventores<br>Inde rami in uveam<br>Circulus uveæ interior<br>Vascula recta | 433<br>ibid.<br>ibid.<br>434<br>ibid.<br>ibid.<br>435<br>ibid.<br>ibid.<br>ibid. |
| 25. Musculus obliquus superior<br>secundus trochlearis<br>Obliquus minor<br>Musculus bulbosus<br>Membrana in nominata nulla   | 419. 420<br>421<br>ibid.<br>ibid.<br>ibid.   | 34. Arteria retinæ centralis<br>Origo<br>rami in retinam<br>rete<br>Circulus anterior retinæ<br>Arteria posterior lentis crySTALLINÆ<br>Inventores<br>Rami ad membranam pupillarem        | 435. 436<br>436<br>ibid.<br>437<br>ibid.<br>ibid.<br>438<br>ibid.                |
| 26. Nervi oculi in universum<br>Eorum per receptaculum ad latus<br>fellæ equinæ iter<br>Par tertium<br>Quartum<br>Quinti ramus ophthalmicus<br>Sextus                     | 422<br>ibid.<br>ibid.<br>423<br>ibid.<br>ibid.<br>ibid.                                  | 35. Arteriæ oculi accessoriæ<br>ab infraorbitali<br>a temporali<br>36. Venæ oculi<br>Vena princeps<br>finis posterior<br>Rami anteriores. Superior<br>inferior                            | ibid.<br>ibid.<br>ibid.<br>ibid.<br>ibid.<br>440<br>ibid.<br>ibid.               |
| 27. Rami ad oculum<br>Quinti<br>Sexti<br>Qui non sint a sexto   | ibid.<br>ibid.<br>424<br>ibid.   | 37. Venæ ciliares<br>Vasa vorticosa<br>Venæ ciliares longæ<br>& anteriores  | ibid.<br>441<br>ibid.<br>ibid.   |
| 28. Nervus ophthalmicus a quinto<br>Ramus ad ganglion<br>alii rami<br>Lacrumalis<br>Ramus ophthalmicus exterior<br>interior   | ibid.<br>425<br>ibid.<br>426<br>ibid.  | 38. Vena centralis retinæ<br>39. Num dentur vasa lymphatica in<br>oculo<br>Dubitatur  | 442<br>ibid.<br>ibid.  |
| 29. Nervus tertii paris<br>furculus superior<br>Truncus inferior<br>Ganglion ophthalmicum<br>Rami ciliares<br>Rami capillacei   | 427<br>ibid.<br>ibid.<br>ibid.<br>428<br>ibid.   |   |  |
| 30. Nervi interiores oculi<br>ad uveam<br>Accessorii  | 429<br>ibid.<br>ibid.  |   |  |
| 31. Arteriæ oculi<br>Truncus ophthalmicæ<br>Rami. Lacrumalis<br>Ethmoidea anterior<br>palpebralis<br>frontalis<br>nasalis   | ibid.<br>430<br>ibid.<br>431<br>ibid.<br>ibid.   |   |  |

## S E C T I O I I I.

## L U X E T C O L O R E S.

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 1. In universum               | 443       |
| 2. Lux                        | ibid.     |
| num penetrabilis              | ibid.     |
| est tamen corporea            | 444       |
| 3. An eadem cum igne          | 444. seq. |
| Discrimina utriusque elementi | 445       |
| Quæ similia habeant           | ibid.     |
| ut convenient                 | 446       |
| ut differant                  | 447       |
| 4. Radii lucis                | 448       |
|                               | ut        |



ut lucis intensitas minuatur	pag. 448
Etiam qui propius adveniunt	449
& pro rectis habentur, qui curvi sint	ibid.
5. Motus lucis	ibid.
tempus	ibid.
tamen est celerrimus	450
An lux sit torrens	ibid.
Num pulsatio	ibid.
Videtur posterius locum habere	451
6. Natura lucis est solidissima	ibid.
ex vi urente foci	ibid.
Angulum reflexum incidenti æqua- lem	452
7. Leges reflexionis	ibid.
Maxime reflexibiles maxime refrin- guntur	ibid.
8. Refractio	453
est in ratione densitatis	ibid.
& naturæ inflammabilis	ibid.
exceptiones	ibid.
ut leges refractionis ex adtractione sequantur	454
In eodem medio sunt constantes	455
ut se habeant inter media diversarum virium	ibid.
9. Ut in superficiebus curvilineis	ibid.
in sphaeris	456
in lentibus	ibid.
10. Refractio vitrorum concavorum	457
11. Qui radii reflectantur a superficie refringente.	ibid.
12. Ut radii lucis dividantur	458
Colorum elementa	ibid.
Immutabilia	459
Diversa refractione radiorum diverso mo- do refractorum	ibid.
Conjuncti faciunt album	460
Hinc lucis robur	ibid.
Objectiones	ibid.
Colorum discrimen esse a diversa ve- locitate vibrationum	460. 461
14. Quid sit in colorato corpore ut hoc, non alio colore oculum adficiat	461
Laminarum diversa crassities	461. 462
Compositi colores	ibid.
Corpora reflectentia	463
pellucida	ibid.

opaca

Alia theoria E U E R R I

pag. 463

ibid.

## S E C T I O I V.

## V I S I O.

1. Qui radii a cornea tunica reflectan- tur	464
Convexa corneæ figura	465
vires refringentes	ibid.
in animalibus	466
2. Qui radii ad lentem crySTALLINAM ad- veniant	ibid.
Ejus lentis refractione	467
Inventores	468
3. Objecti corporis imago in retina pin- gitur	469
4. Locus ubi pingitur	470
ad exteriora nervi optici	ibid.
Ingressus nervi optici cæcus est	ibid.
Experimenta MARIOTTI	471
PICARDI	ibid.
STANCARI	ibid.
Aliorum	ibid.
Quare axis opticus non est in nervi ingressu	472
5. Imago ubi pingatur	ibid.
In chorioidea secundum aliquos	ibid.
Contra eam sententiam	ibid.
Quare respondeat E. MARIOTTE	473
Ejusque sequaces	ibid.
Quæ contra urgeant ejus adversa- rii	474
Argumenta alia	ibid.
Radii non possunt in chorioideam ve- nire	475
Cur evanescat objectum apud MA- RIOTTUM	ibid.
6. Imaginis in retina pictæ mensura	475. seqq.
minimum quod sit objectum visi- bile	476
de angulo optico minimo sensibili	477
Valde exiguus est	477. 478
Videtur in fibra unica pingi	478
7. Imago inversos habet fines	ibid.

Cur



Cur ergo anima non videat inverſa		Artificium quo vitia oculi metimur	
an vere videat	pag 479		pag. 501
8. Cur duobus oculis idem videamus	ibid. 480	17. Presbyopia	501. 502
Unicum punctum diſtincte vide-		a nimis plana cornea tunica	502
mus	ibid.	& lente	ibid.
Duratio ſpeciei viſibilis	481	& oculo breviori	ibid.
9. Videmus unico oculo	481. 482	& humorum defectu	ibid.
nempe diſtincte	ibid.	augetur ab ætate	503
Alter adjuvat	483	& tamen nonnunquam reſtituitur	ibid.
Neceſſe eſt multos homines & beſtias		18. Remedia mali	503. 504
unico oculo videre	ibid.	Vitra convexa	504
10. Similes impreſſiones non diſtinguun-		Eorum menſura	505
tur	483. 484	19. Microſcopii vires	ibid.
ſed diſſimiles	483. & 486	facit ut proxima diſtincte adpareant	ibid.
unico oculo cur duplicia videamus	485	& lucidiora	ibid.
non a nervorum conjunctione	486	Menſura augmenti	506
quæ nulla ſit in infectis	487	aliquanto minor	507
11. Conditiones imaginis diſtinctiſſimæ	487	Minima tamen corpuscula reddit con-	
humores pellucidi	ibid.	ſpicua	ibid.
An icterici flava videant	488	20. Cur credatur interiora oculi mu-	
12. Oculus undique atratus	ibid.	tari	ibid.
Oculi ſplendentes	489	casque mutationes neceſſario re-	
13. Requiritur retina non nimis cal-		quiri	508
loſa	489. 490	ut & remota & proxima diſtincte vi-	
Inde cæcitas nocturna	490	deamus	ibid.
quæ varie dicta eſt veteribus	491	uti videmus	508
neque nimis ſenſilem oportet eſſe reti-		Oportet ergo oculum poſſe brevio-	
nam	491. 492	rem fieri	ibid.
Inde cæcitas urna	492	& longiorem	509
Ejus exempla	ibid.	Organa ejus mutationis in oculo	
Qui noctu videant	492. 493	eſſe	ibid.
& cur	ibid.	21. Eo referunt corpus ciliare	ibid.
In tenebris viſus	493. 494	ut oculum longum reddat	ibid.
14. Punctum viſionis diſtinctæ	495	alii ut brevem	510
Cur cis idem & ultra confuſe videam-		alii ut lentem convexam	ibid.
mus	ibid.	alii ut planiorem	511
Diverſum eſt in diverſis homini-		alii in lente cryſtallina cauſam muta-	
bus	496	tionis quaſiverunt	ibid.
Etiam in ejusdem hominis duobus ocu-		22. Alii in muſculis rectis	ibid.
lis	ibid.	qui oculum breviorẽ reddant	ibid.
15. Myopes qui	496. 497. ſeqq.	aut longiorem	512
ob oculos prominentes	497	aut in obliquis, oculum producenti-	
& longos	ibid.	bus	ibid.
& lentem cryſtallinam gibbam	ibid.	23. Alii in ſphinctere uveæ	ibid.
Phænomenorum explicatio	498	qui corneam faciat eminere	ibid.
16. Remedia mali	499	24. Contractio pupillæ	513
Ab ipſa ætate	ibid.	Omnino confuſam ſimagineẽ corri-	
a mutato vitæ genere	ibid.	git	ibid.
a vitris concavis	500	25. Ad priora	ibid.
Eorum vitrorum menſura	501	Proceſſus ciliaris non valet ad lentem	
		cryſtallinam mutandam	513. 514



- & lente crystallina exempta tamen &  
remota videmus & proxima pag. 514  
In lente crystallina vires non resident,  
a quibus mutari queat 515  
26. De musculis oculum mutaturis nihil  
sperandum 515. 516  
Contra uveæ circulum 516  
27. Possit sufficere contractio pupillæ ibid.  
& remota & proxima una videmus ibid.  
& ostenditur oculum se ad diversas  
distantias non adaptare 516. 517  
nimia hic nocuit extensio variabilis  
puncti visionis distinctæ 517  
28. Animæ judicia de imagine in re-  
tina depicta 518  
Imago non exprimit eas in corpore qua-  
litates, quas mens in iis percipit 518. 519  
Cæcus a nativitate restituto visu di-  
stantiam non videt 519  
neque alia plurima ibid.  
subest multum arbitrarii ibid.  
29. Judicium de magnitudine corporis 520  
sæpe fallit ibid.  
ut in corporibus valde lucidis ibid.  
Fallimur in distantia inæquali 521  
nam remota minora adparent ibid.  
Alii errores subtiliores ibid.  
Unitas, a qua proportionales magnitu-  
dinis sumuntur 522  
30. De loco judicium pag. 522  
uno oculo intuenti ubi sit locus adpa-  
rens ibid.  
Errores inde nati 523  
Retrogressio corporum, dum nos pro-  
gredimur ibid.  
Corpora, quæ in oculo sunt, extra  
eum videmus ibid.  
31. Distantia corporum ibid.  
In retina nulla ibid.  
Quo ab angulo metiamur 524  
Quæ alia auxilia adhibeamus ibid.  
pallorem duplicem ejus quod contue-  
mur 524. 525  
a minus distinctis partibus 525  
distantiis corporum majorum diminu-  
tis ibid.  
corporum interpositorum multitu-  
dine ibid.  
32. Unde de motu judicemus 526  
& de quiete ibid.  
33. De convexitate ibid.  
& concavitate ibid.  
facilis in istis error 527  
34. Lux imaginaria ibid.  
ex pressione nata 527. 528  
Colores imaginarii 528  
similiter nati ibid.

## LIB. XVII. SENSUS INTERNI.

## SECTIO I.

## INTELLECTUS.

1. Quam parum hic firmi sciatur 529  
2. Sensatio est motus excitatus in sen-  
sorio ibid.  
qui in cerebrum venit 530  
per fluidum corpus 531  
3. Non repræsentatur animæ objectum  
externum ibid.  
& ne cerebro quidem 532  
secundæ qualitates sunt *relative* 533  
sed neque primas qualitates anima per-  
cipit 533. 534  
nisi. *relativas* 534  
4. Perceptio ibid.  
In ea distinguitur. Corpus ipsum sen-  
sui subjectum ibid.  
ejus in organum sensus impressio ibid.  
impressionis ejus in cerebrum propa-  
gatio ibid.  
repræsentatio, quæ animæ fit 534. 535  
dum apperceptio animæ 535  
Ea nonnunquam obscura est 535. 536  
5. Ordo idearum 536  
Superfunt aliquamdiu impressiones  
rerum ibid.  
& anima potest longius præsentis re-  
tinere ibid.  
Fortissimæ idæ visoriæ 537  
6. Memoria ibid.  
Num in corpore resideat 538  
M m m m 2 cum



cum per vitæ corporeæ vires au- geatur	pag. 538.	tenebrarum commoda	pag. 555
& dure scat	ibid.	Adtenti omnes alias actiones suspendunt	ib.
perque morbos pereat.	539. 540	Catalepsis	556
& aliquo cum ordine	540	12. Judicium	ibid.
7. Rerum vestigia quid sint	541	13. Ingenium	557
ignoratur	ibid.	quare a judicio frequenter separatur	ibid.
ut revocari possint	542	an sit corporis	ibid.
aut sponte redeant	ibid.	cur id sit creditum	557. 558
Memoria est signorum	ibid.	ut id verum sit	558
Imaginatio sensationum	ibid.	celerior cogitatio	559
Vestigium potest æquivalere sensa- tioni	543	Sensus ex corpore sensu acrior	ibid.
robur a repetitione	ibid.	14. Signa	560
8. Admirabilis vestigiorum ordo	543. 544	Loquela	ibid.
Nectuntur per classes	544	characteres	ibid.
per definitiones	ibid.	primi imitatores	ibid.
per tempus, quo primum natæ sunt	544. 545	secundi hieroglyphici	561
per signa prima	545	tertiæ alphabetici	ibid.
per secunda	ibid.	Magna utilitas horum signorum	ibid.
per conjunctionem in genus	ibid.	Eorum ope abstrahitur	562
Signorum vis etiam ad producendos motus	545. 546	& fiunt notiones	ibid.
denique conjunctio per animæ impe- rium	546	15. Quid Veritas sit	ibid.
Hæc non possunt mechanice expli- cari	546. 547	& error	ibid.
neque certæ sunt pro peculiari classe idearum regiones in cerebro	547	Unde errores	ibid.
9. Copia vestigiorum maxima	ibid.	Maxime erratur in ideis complexis	ibid.
Homines beata memoria pollentes	548	quod non eatur per singula	563
rerum non cohærentium	ibid.	quod auctoritati pareatur	ibid.
Constantia vestigiorum	549	16. Delirium	ibid.
ars memoriæ	ibid.	Ejus causæ	564
absque signis vix est memoria	ibid.	Quæ sanguinem incitant	ibid.
omnium tamen aliquando subrepat oblivio	ibid.	Quæ ideam aliquam nimis fortiter imprimunt	565
somnus vestigiorum	550	Varia genera erroneæ ideæ adoptatæ	562. 563
Mechanismus oblivionis	ibid.	Quibus tollatur furor	564
10. Anima	551	& Mania	565
non est corporea	551. 552	Fraudes piæ	ibid.
11. Cogitatio	552	17. Fatuitas	566
num perpetua	ibid.	a mania differt	ibid.
non certum est aliquando nullam esse	ibid.	ejus exempla	ibid.
Cogitamus per signa	553	Endemia fatuorum	ibid.
Adtentio	ibid.	hydrocephalici fatui	ibid.
ejus utilitas	ibid.	aliæ causæ	567
an plura cogitemus una	554	Sanatio	ibid.
Hinc necessaria adtentio	555	Sedes deliriorum in cerebro	ibid.
		& ejus vitiis variis	ibid.
		delirii febrilis	571
		Phrenitidis	572
		Maniæ	ibid.
		morbi hypochondriaci	ibid.
		amentia	572. 573
		non sufficiunt	573. 574
			SECT.



## S E C T I O I I.

## V O L U N T A S.

1. Dolor quid	pag. 574
ejus effectus	575
utilitas	ibid.
2. Voluptas quid	576
Utilitas voluptatis & doloris	577
3. Aliæ cupidines	ibid.
Spes	577. 578
Curiositas	578
Gloria	ibid.
4. Affectus animi	579
non omnes sunt corporei	ibid.
Voluntates contrariæ unde	ibid.
Genera affectuum	580
5. Effectus	580 581
Lætitia	581
Gaudii	ibid.
Amoris	582
Studii	ibid.
Pudoris	ibid.
Misericordiæ	ibid.
Mœroris	583
Nostalgia	ibid.
Metus	584
6. Effectus terroris	586
alii a metu	ibid.
& iræ	586. 587
Chamæleontis phænomena	588
Odium & averfatio	ibid.
7. Mechanismus, quo ad affectus animi	ibid.
hi motus nascuntur	ibid.
Non ad utilitatem propriam	ibid.
Motus in exemplo	589
Laquei	ibid.
Non possunt admitti	ibid.
Est tamen aliquid sphincterum simile	590
8. Affectuum animi lingua	ibid.
Omnibus animalibus communis	ibid.
9. Physiognomia	590. 591
10. Excitatio affectuum	592
imitatio	ibid.

## S E C T. I I I.

## S O M N U S.

1. Ejus ad vigiliam portio	592
major in fetu	593

infante	pag. 593
Quæ sit in bestiis	ibid.
etiam infectis	594
piscibus	ibid.
Omnia animalia dormiunt	ibid.
aliqua parum	ibid.
2. Somnolentiæ phænomena	594. 595
delirium ante somnum	595
3. Somnus verus	ibid.
phænomena	595. 596
Fames suspenditur	596
4. Num cordis motus crescat	ibid.
Non credibile	597
In somno vires minuuntur	ibid.
nam humores per somnum stagnant	ibid.
& minus est causarum moventium	598
hinc a somno frigus	ibid.
& pereunt, qui per externum frigus	ibid.
dormiunt	ibid.
Unde phænomena, quæ videntur ma-	
jorem cordis motum indicare	599
5. Causæ somni	ibid.
Labor	599. 600
Pastus	600
An is somnus a pressa aorta sit	ibid.
Non videri	ibid.
Porro cur non videatur is somnus ab	
aorta pressa supervenire	601
an a revulsione	ibid.
a voluptate	ibid.
a voluntate	ibid.
Id quidem non videtur	602
5. Causæ somni aliæ	ibid.
debilitatio	ibid.
6. Causæ, quæ sanguinem in caput	
congerunt	603
Frigus	ibid.
laqueus	ibid.
7. Phlogiston varium	604
minerale	ibid.
animale	ibid.
vegetabile	ibid.
8. Et imprimis familia narcotica	605
Opium	ibid.
varie adsumtum	606
Sopit principium sentiens	ibid.
etiam irritabile	607
Num in corde	ibid.
Ita WHYTTIUS	607. 608
per experimenta	608



Sed ea ad causam demonstrandam non valent	pag. 609	Moderari destructionem corporis, quæ fit per motum	pag. 618
& opium potius cordis vires incitat	609. 610	hinc nutritionem promovere	619
neque ab ejus elementis chemicis alia expectes	610. 611	& resorptionem	ibid.
Opium in cerebro effectus	611. 612	reparare spiritus	ibid.
minori copia sumti	ibid.	Somni prælongi exempla	620
& magna	611. 612	Num homo unice expurgiscat a stimulo	620
& maxima	612	13. Phænomena expurgiscentium	620. 621
& mors ipsa	ibid.	14. Somnia	621
Aliqui tamen homines magnam vim opii tulerunt	612. 613	In iis imagines coram anima obver- santur	ibid.
tum bestię	613	non sine conscientia	ibid.
9. Causa proxima somni per experi- menta	ibid.	neque plenum est delirium	ibid.
cerebri pressio	613. 614	oriuntur ex sensationibus	622
a morbis	614	præsentibus	ibid.
potissimum ab aqua	ibid.	præteritis	ibid.
10. Vigiliarum causæ	615	Somnia motus excitant vehementio- res, quam sensatio in vigilante	ibid.
quibus quæcunque causa motum in corpore sustinet	ibid.	ordo tamen superest	623
etiam in anima	616	ex lege adfociationis idearum	ibid.
Cerebri inflammatio	ibid.	unde confusio fiat	624
dolor	ibid.	15. Uti somnia fiant a vestigiis	ibid.
potus aquosus calidus	ibid.	etiam per leges adfociationis	ibid.
11. In quo convenient diversæ somni causæ	617	Ut fiant in universum	ibid.
Sunt aliæ a motu diminuto	ibid.	a fortiori sensatione, quæ non sinat cerebrum quiescere	ibid.
aliæ ab aucto	ibid.	16. Morbi in somno superstites	625
Videntur convenire in motu impe- dito spirituum	ibid.	Pergit cordis motus	ibid.
est in ea re mediocritas	618	& intestinorum, & respiratio	ibid.
12. Somni effectus	ibid.	Sed etiam motus voluntarii varii	ibid.
		Noctambuli	625. 626
		Eorum phænomena	626
		causa morbi	626. 627
		& periculum	627

## FINIS TOMI QUINTI.











